









Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze.
CFMAGL 1.7.257



Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze.
CTMAAGL 1.7.257



Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze.
CFMAGL 1.7.257



1.7. 253

DE PLANTIS
Epitome vtilissima,
PETRI ANDREAE
MATTHIOLI SENEN-
SIS, MEDICI EXCEL-
lentissimi, &c.

NOVIS PLANE, ET AD VIVVM EXPRESSIS ICONIBUS, descriptionibusq; longè & pluribus & accuratiorib. nunc primum diligenter aucta, & locupletata, à

D. IOACHIMO CAMERARIO, MEDICO CELE-
berrimo inclytæ Reip. Noribergensis.

COMPENDIVM IN EORVM MAXIME GRATIAM ATQVE
vsum adornatum, qui plantis conquirendis & indagandis student; ac, quæ de eis plurib.
à Matthiolo in Dioscoridem disputantur, breuiter descripta simul de-
pictaq; oculis subijcere cupiunt.

ACCESSIT, PRAETER INDICEM QVAM EXACTISSI-
mum, liber singularis de itinere ab vrbe Verona in Baldum montem plantarum
ad rem medicam facientium seracissimum, auctore


FRANCISCO CALCEOLARIO, PHARMACOPOEO VERONENSI.



M. D.

LXXXVI.

Cum gratia & privilegio S. Caesaræ Maiestatis ad hæc specialiter concessis.
FRANCOFVRTI AD MOENVM.



ILLVSTRISSIMO
PRINCIPI AC DOMINO.

DN. MAVRICIO, LANTGRAVIO

Hassiae, Comiti in Catzenelnbogen, Dietz, Zigenhan & Nida, &c. Domino suo
clementissimo,

S. D.

ILLVSTRISSE Princeps, Domine
clementissime, Quamquam iam dudum
nihil prius neque antiquius habuerim,
quam (sicuti multis receperam) Latinum
opus Botanologicū collectum à me nō exi-
guis laboribus & sumptibus, tam ex inchoatis lucubratio-
nibus Medici & Philosophi praestantiß. D. Conradi Gesne-
ri, p. m. quā meis observationibus proprijs quamplurimis,
tandē elaborando perficere atq; in publicū dare: hoc ta. men
meum institutum huc vsq; variis occupationes multaeq; a-
liis causae retardarunt & quominus id ad optatum finem
perduceretur, impediuerunt. Cum vero imprimis, Illu-
striß. princeps, D. parens vester, Dominus meus clemen-
tissimus, pro sua Celsitud. singulari erga rem herbariam,
affectione, cuius ut est peritiß. ita etiam amantißima &
benignißima in me voluntate, quam nunquam satis pra-
dicare animo subiectißimo possum, me hac in parte muni-
fica liberalitate non parum adiuuerit, ac simul etiam ali-
) (2 quoties

Epistola

quoties à me postulauerit, ut in cepto opere sedulo pergerem, illudq; omnibus modis urgerem, erubesco profecto nonnihil, ut verum fatear, quod nondum ipsius Celsitud. aliorumq; expectationi, quod tamen non mea culpa sed alijs remoris nonnullis subinde interuenientibus accidit, satisfacere potuerim. Interea autē, ne videar plane malum nomen (quod sane cupio à me esse lōgissimum) promissi huius admonere me ipsum, & illius loco, hoc aliunde desumptū specimen, Epitomen videlicet plantarū olim ab Excellentiss. Petro Andrea Matthiolo p. m. editam, & nunc rogatu amicorum & typographi à me pluribus in locis auctam nouisq; typis exornatam, ad V. Ill. CL. mittere statui, submisit orans ut V. Ill. CL. quam in sua ineunte iam etate, quemadmodum ad omnes liberales artes & praeclara studia, ita quoq; ad vtilissimam cognitionem stirpium, aliarumq; rerum naturalium peculiari quadam inclinatione ferri & exemplo paterno duci omnes norunt, mihiq; est perspectum, meo nomine apud Illustriss. principem Dominum parentem Vestrum, Dominum meum clementiss. intercedere, ipsiusq; Cels. persuadere non grauetur, me, quod dicitur, omnem lapidem moturum esse, ut primo quoq; tempore promissum opus, Deo adiuuante, absolua-
tur atq; in lucem prodeat. Præterea etiam ab V. Ill. CL. submisit peto atq; contendo, ut hanc exiguam meam opellam hilari benignoq; vultu accipere & me sua benignitatis fauore, sicuti hucusque Clementiss. fecit, impoſterum quoq; complecti ac me sibi commendatum habere non dedigne-

Dedicatoria.

dignetur. Quod superest, ego Deum opt. max. dies no-
ctesq. orare non desinam, ut V. Illustr. & praeclariss. indoli
suo spiritu semper aſsit, & laudatiſſ. curſum uniuersae vi-
tae una cum illustriſſ. principe Domino patre ſuo, Domino
& mecenate meo clementiſſ. ac cateris illuſtriſſima Do-
mus Haſſiaca principibus ſaluam & incolumem in omni
proſperitate conſeruare quam diutiſſ. velit. Bene va-
leat V. Ill. CL. Norimb. Cal. Martij Anno Chriſti.
1586.

V. Ill. CL.

deditiſſ.

Ioachimus Camerarius M.D.

):(3

SERENIS-

SERENISSIMO PRINCIPI
FERDINANDO ARCHIDUCI
AVSTRIAE, DUCI BVRGVNDIAE,
*&c. Comiti Tyrolis, &c. Domino
suo clementissimo.*



AMETSI ingrauescente iam ætate decreuif-
sem SERENISS. PRINCEPS, omiffis stu-
dijs ac lucubrationibus, quod vitæ reliquū
erat, in otio atq; animi, & corporis tranquil-
litate transigere, cū tamen ab ipsis primor-
dijs is à natura fim factus, qui semper putē, si
tantum possem, studiosam iuuare posteritatem, non potui
meam non immutare sententiam, nec multorum precibus
non indulgere. Nam cū non pauci, qui discendæ medicæ
materiæ, magno ac feruenti tenentur desiderio, me sepe ro-
garent, vt in eorum gratiam atq; vsum Compendium con-
scriberem, in quo plantarum icones cum nominibus, &
compendiosa earum historia extarent, vt eo duce quæcun-
que loca vbi stirpes proueniant, tutò ad eas noscendas in-
dagandasq; adire possent, ne de sua ipsorum in me confiden-
tia frustrarentur, Compendium hoc in eorum vsum con-
scribere decreui, quod quamuis succincto ac Laconico ser-
mone conscriptum videatur, erit tamen (ni fallor) & gra-
tum, & perutile, non solū ijs, qui indagandis, noscendisq;
simplicibus medicamentis, nauant operam, sed ijs quoque,
qui hanc facultatem iam adepti, publicè morbis omnibus
passim medentur. Siquidem in hoc plantarum Compendio
non solum earundem omnium nomina, diuersarum natio-
num idiomate conscripta spectabuntur, & historiæ, ac qui-
bus o-

NCI-
DVCI
IAE,

decreuif-
missis stu-
ta reliquū
is tranquil
is primor
per putē, si
non potui
in precibus
la medicæ
me sepe ro-
dium con-
inibus, &
e quæcun-
scendas in-
e confiden-
vsum con-
conico ser-
lor) & gra-
noscendisq;
ijs quoque,
is omnibus
Compendio
arum natio-
orix, ac qui-
bus o-

bus oriatur in locis, vt à me studiosi postulabant. Sed etiam qualitates cum primæ, tum secundæ, ac tertiæ & omnium quoque vires, ac singularia quædam nostra auxilia compendiosè descripta sunt. Cæterum vbi quispiam plura, melioraq; legere concupierit, ad nostra amplissima in Dioscoridem commentaria se conferre poterit, vbi (vt spero) quæ desiderabit, inueniet. Atqui cum in adeo magnam molem opus illud excreuerit, vt haud commodè hinc inde circūferri possit, non sanè absque ratione rogarunt me studiosi, de quibus diximus, vt Compendium conscriberem: quod cum rectè factum iri cognouerim, eò quoque libentius ad eum conscribendum me appuli, vt noscat futura posteritas quot modis Matthiolus illam iuuare contenderit. Verùm quoniam apud omnes scriptores mos inualuit, vt sub magnorū Principum, Heroumq; nominibus, & auspicijs, sua scripta quicq; in lucem producant, cum ego quoque id ipsum institutum sim semper sequutus, haud alijs iustius, & rectius compendium hoc meum consacrare potui, quàm tuæ Amplissimæ Celsitudini, quòd iam in sextum decimum annum in eius corporis cura (quæ sua est clementia, & optima de me opinio) primarij Medici munere fungar. Huc accedit, quòd quicquid est meæ substantiæ, & facultatum, id sanè omne tuæ Celsitudini acceptum referre possum. Quin etiam eiusdem liberalitate, beneficentia ac dilectione foueor, sustentor, & alor. Siquidem hæc me multis modis, si haud ad reponendam gratiam, saltem ad declarandam gratitudinem, vel gratitudinis conatum me reum statuunt: quare cum Celsitudini tuæ mea hæc, qualiacunque sint, ei iure debeantur, eam suppliciter peto, vt hæc meas lucubrationes, & plantarum veluti manipulare libellum alacriter ac be-

):(4 nignè

nighè excipere, meq; in hac laboribus confecta ætate, suo
patrocinio, gratia, & fauore prosequi, ac tueri non desinat.
Vicissim ego, quæ fidelem seruitorem, & Clientem decent,
summa fide, ac voluntate, pro virili mea vsque ad occasum
vitæ meæ me præstiturum polliceor, meq; totum tuæ Cel-
situdini dedo, ac voueo: quam Deus Opt. Max. incolumem,
& modis omnibus florentem quàm diutissime conseruet.

E. Sereniss. Celsitud. tuæ

Fidelis & humilis Seruator

Petrus Andreas Matthiolus.


BENE-

etate, suo
on desinat,
m decent,
loccasum
tua Cel-
olumem,
nseruet.

Matthiolus.

BENE.

BENEVOLO LECTORI IOACHIMUS
Camerarius Medicus, S. D.

NGVLARIS amor & innata quaedam propensio ad cognitio-
nem rerum naturalium, imprimis verò erga studium rei herba-
riae, ex quo non solum liberalis admodum oblectatio, & ingenua
voluptas percipi, sed etiam utilitas atque fructus non exigui ad
Medicum imprimis peruenire solet, me incitarunt, quo semper nullis labori-
bus aut sumptibus pro ratione mearum facultatum parcendo studuerim, hoc
tam praeclarum ^{Matthiolus} opus proficui, excolere, atque etiam pro virili illustrare.
Quae causa fuit, ut ante aliquot annos, opera & humanitate eximia Cl. V. D.
Casparis VVolsij Medici Tigurini doctissimi, cōsecutus fuerim Opus istud am-
plum & laboriosum (quamuis solummodo adhuc inchoatum & sparsim minu-
tioribus in cartis quamplurimis annotatum) quod seculi nostri (ut verè qui-
dam vir doctus illum nominare consuevit) alter Plinius, Doctiss. vir D. Con-
radus Gesnerus p. m. iam dudum in manibus habuit. Idq. in ordinem redige-
re, elaborare & proprijs meis obseruationibus additis, tandem ad utilitatem
communem in publicum dare iam pridem constitui, à quo meo proposito, acce-
dentibus praesertim amicorum multorum, qui editionem hanc expetunt, quo-
tidianis adhortationibus, me nullis alijs rebus auocari patiar.

Cum verò hac in parte variae occupationes & longiores nonnullae meae supe-
riorum annorum peregrinationes, non parum impediementi mihi obiecerint,
quo minus extremam manum huic operi imponerem, in ista autem bibliotheca
herbaria D. Gesneri aliquot plantarum icones partim iam sculptas, partim
solummodo delineatas reperissem: quidam non solum artis Medicae peritiss. sed
etiam nonnulli magni nominis Viri ^{Philosophi & Mathematici}, à me postularunt, ut reli-
quam partem typorum, et si profecto maxima pars adhuc cōcinnanda restabat,
eodem modo curarem parari, atque interea dum alterum volumen, de quo su-
perius dixi, absolueretur, hanc Epitomen Excellentiss. Medici Petri Andreae
Matthioli, &c. (cum illius exempla apud nos pauca inuenirentur, & typo-
graphi ideo ea recudere cuperent) auctam prodire in lucem sinerem.

Quamquam verò in eiusmodi scriptis aliorum expoliendis, certis de causis
non libenter verser, atque in illa multum temporis mihi insumendum non ex-
istimem (neg. mihi aliorum de illis ignota sunt iudicia) sed potius ad proprias
lucubrationes, qualescung. sane illae sint, elaborandas me conuertere totis viri-
bus studeam: tamen alijs hanc editionem à me requirentibus honestè hoc offi-
cium denegare non potui, omnino mihi persuadens, beneuolum lectorem can-
dido animo, dum meliora, volente Deo, consequantur, hosce meos labores accē-
pturum,

pturum, meq; pro sua humanitate ad reliqua que in manib. habeo recte absol-
uenda, libenter esse adiuturum, quod equidem, ut faciat, illum magnopero-
gatum velim.

Quam assidua autem diligentia & accurata in inspectione opus sit, in pictori-
bus & sculptoribus recte instruendis, qui (ut hoc & simile genus artificum so-
let) præter alia mirifica ac sæpenumero permolesta vitia, potissimum idio-
tya quadam laborant, & ego ad fastidium usque iam pridem sum expertus, &
norunt alij, quibus cum eiusmodi ingeniis aliquid fuit negotii. Nisi enim quis-
piam continuo illis asit, eosq; instiget, urgeat atq; instruat, ne elegantia nescio
quam, nimirum qualem ipsi somniant, affectet potius quam genuinæ proprie-
tati sterpium animum aduertant, vel negligentius etiam sæpenumero tractet,
atq; peruertant omnia, facillime aliquid deprauari & naturalem gratiam atq;
formam amittere solet.

Cum verò aliorum negotiorum multitudo, & crebra ad exteros auocatio-
nes me illis præsto semper esse minime permisissent (quamuis ante operis absolu-
tionem, nam initio mecum esse non illi fuit concessum, perdoctus & diligens
admodum iuuenis M. Ioach. Iungermannus meæ sororis filius ad hanc partem
Medicinæ illustrandam planè natus, mihi ut plurimum vsui fuerit) non caue-
ri ideo potuit, quin interdum, ubi præsertim à æstibus examinare peritiores
singula voluerint, aliquid desiderari vel etiam reprehendi queat, quemadmo-
dum, exempli causa ingenua quadam confessione ipsemet quædam hic breuiter
indicare non dubitauit. Acori folia mucronata magis esse par erat. Phumaius
caule altiore indiget. Flores Iasmini quinis plerumq; folijs ornantur. Cedri ma-
ioris conij calum spectare perhibentur. Chamacerasi folijs minutas crenas abo-
leuit sculptor. Siliqua Ceratia fructus binos ternos aut plures sæpenumero con-
iunctos producit. Sycomori 2. folia nimis acuminata pinguntur. Sesami effi-
gies nusquam acurata inuenitur, eius folia inferiora tripartita ferè herbam
cannabinam æmulantur, flores nonnihil cum digitali & antirrhino commu-
ne habent, ut nuper obseruauit in siccis Syriacis Clariss. viri Domini D. Leon-
hardi Rauwolfii, quas ipsemet pro singulari nostra amicitia liberaliter mihi
communicauit. Flores Xyli non exquisite picti pleniores esse debebāt. Auricula
muris folia iusto tenuiora & acutiora sunt, totius plantæ iconem aliquando me-
liorem exhibebimus. Melanthium sylvestre alterum cornicula plerumq; graci-
liora, & curuiora, & æstibus nonnunquam profert. Oblongam capsulam semi-
num Canna Indica, qualis pingitur, nondum vidi, triplicem enim, qualem
Ricinus, ut plurimum gignit, & quasi spinosam, sed non pungentem. Flores
stramonii utriusque pentagoni tantum visuntur, & potissimum in altera spe-
cie, quam Daturam vocant, plures tam fructus quam flores desiderantur, &
ordo

A D L E C T O R E M.

ordo foliorum ramulorumq; turbatus pictoris incuriam arguit. Eiusdem negligentia argumenta sunt in Ricino omisi geniculi. Et si quæ sunt alia.

Horum omnium nomine confido beneuolum lectorem facile me habiturum excusatum, vel etiam meam qualemcunq; diligentiam esse approbaturū. Quod si Deus Opt. Max. vitam mihi & plusculum temporis quam hucusque factum est, atq; alia tædiosa largitus fuerit, nihil in me laboris, studij aut operæ desiderari patiar, ut promissa reliqua in hoc genere primo quog; tempore à me expediantur & cum alijs communicentur.

Videbit autem mediocriter in cognitione herbaria versatus, plantarū icones, quantum fieri ob commemoratas causas potuit, nos studuisse, imitari in hoc CL. V. D. Conradi Gesneri institutum, non solum integras, quod ab alijs quog; antea sepe est factitatum, sed præcipuas quog; earum partes, ut sunt radices, caudices, caules, cortices, folia, flores, semina, fructus tam exterius quam interius ante oculos quasi per anatomiam quandam proponere. Utinam verò plures typi essent non nihil grandiores à D. Gesnero facti. Sed cum id à me postea mutari non potuerit, in cæteris eadem forma necessario fuit sequenda. Cæterum ubi nota asterisci est apposita, de meo id esse additum profiteor. Omitti verò etiam quasdam stirpes, cum descriptionibus suis contigit, partim quod nobis vel nondum visa, vel ad manus non essent, ideoq; exacte pingi non possent. Partim quo cauere ne nimium auctus liber modum excederet. In animo tamen habemus alteram quog; partem concinnare, in qua ille, quas modo excludi necesse fuerat inter alias plures, locum inueniet suum. Interea hæc ipsa beneuolus lector æqui boniq; consulere & meos conatus in posterum promouere & ab obtrectatoribus quibus tædium potius quam ratiocinatio cordi est, morsibus defendere ut velit, etiam atque etiam peto. Vale.

IRIS.

NOMINA.

IRIS, Græcè *ἰρις*.] Arabicè, *Asmeniuni*, & *Aierfa*.] Italicè, *Giglio celeste*, & *Giglio pa-*
uona [20.] Germanicè, *Blaw gilgen*, *Wellwurh*, vnd *Himmel Schwertel*.] Hispa-
 nicè, *Lirio Cardeno*.] Gallicè, *Glayen*, & *Flambe*.] Boemicè, & Polonicè, *Kofatec*.

IRIS.



GENERA.

Alterum domesticum, alterum sylvestre, MATT.
 Illius tres numerantur species, versicolor,
 lutea, candida. Huius tantum duæ, Maior, &
 Minor.

FORMA.

Folia gladios referunt, flores versicolores Idem.
 Iridis cœlestis modo habentur, caules læues,
 cubitales, radices albicantes, solidæ, genicu-
 latæ, numerosis inferna sede agnatis.

LOCVS.

Nascitur in hortis, & Viridarijs.

QUALITATES.

Excalfacit, & siccat ordine secundo. Inci- Auicenn.
 dit, abstergit, trahit, aperit, concoquit, deij-
 cit, emollit. Sarcotica est, acris, amara, & o-
 dorata.

VIRE.

Radix ex aceto pota, Serpantium morfi- DIOSC.
 bus aduersatur. Recens ex melle subdita par- Gal.
 tus extrahit: cocta, & illita strumas, veteresq; Auicenn,
 duritias emollit: cum rosaceo autem, & ace-
 to capitis dolores mulcet. Ex melle illita cum
 albo veratro, maculas in facie delet. Huius
 succus potus aquas extrahit, quin etiam bi-
 lem crassam, & pituitam, ex hydromelite se-
 ptem drach. pondere potus. Eiusdem deco-
 ctum tineas ventris pellit, menses, & vrinas
 ciet, dentium dolores mulcet, & pectus ex-
 purgat. Aridæ farina, cum cinnamomi, & MATT.

Anethi pondere dimidio, & croci momento, testium tumores, doloresque
 tollit, vbi coccineo panno, albo meraco infuso excipiat, & calidum appona-
 tur. Hemorrhoidas fotu eijcit. Radicis succus naribus infusus cerebrum à pi-
 tuita mirificè purgat. Potum radicis decoctum obstructiones aperit, præfer-
 tim vbi crassa fuerit impacta materia. renum calculos eijcit. Datur potandum
 commodissime Ictericis & aqua intercutem laborantibus. Eadem in passo de-
 cocta & cum hordeacea farina illita, parotidas bellè discutunt.

A

IRIS

N O M I N A.

Iris Sylvestris maior, Græcis, *ἰρις ἀγροικη*.] Italis, *Giglio a Turro saluatico*.] Germanis, *Wild blau Eilgen*.] Gallis, *Flambe Sauvage*.

IRIS SYLVESTRIS
MAIOR.

F O R M A.

MATT. Folia, caules, flores, radix, perinde ac in domestica habentur, verum minora, & rudiora.

L O C U S.

Idem. Nascitur in saxosis collibus, & asperis locis.

Q U A L I T A T E S.

Idem. Excalfacit, & siccit, valentius tamen quam domestica.

V I R E S.

Idem. Easdem cum domestica vires habet, sed acriores, ac etiam valentiores.



IRIS.

[Turro saluarico.]

NOMINA.

Iris Sylvestris minor, Græcis *ἴρις ἀγρία μικρά*.] *Ital.* *Ciglio* & *Turro piccolo*.] *As*
quidam falso *Iridem* *Illiricam* vocant.

IRIS SYLVESTRIS MINOR.



FORMA.

Folia habet *Gladioli* pau. *MATT.*
lo longiora, radicem tenuem, subrufescentem, inodoram, & graminis fere modo repentem, caulem breuem, florem cæteris minorem, odore *Armenici mali*, purpureum, & aureis quibusdam lineis varium.

LOCVS.

Nascitur in montibus, col libus, & pratis. *Idem.*

QUALITATES.

Excalfacit, & extenuat or- *MATT.*
dine primo, aut secundo inchoante.

VIREs.

Præstat eadem, quæ cætera *Idem.*
Iridis genera, minori tamen efficacia. Fit è floribus

oleum, quo quidam vtiliter vtuntur, ad tumentes ex partu *mammæ*, & ad testium inflammationes.

A 2

*CHA-

IRIS.

*CHAMÆIRIS vel Iris humilis, Græce χαμæίρις.

CHAMÆIRIS.

FORMA.

Longiora & angustiora
Gladiolo fereq; graminea
habet folia, radicem nodo-
sam, tenuem, utq; reliquæ
Irides, repentem, flores par-
uos, pulcre variegatos, odo-
re pruni maturi, sine caule
ferè, inter folia eminentes.

LOCVS.

Passim in pratis Austria-
cis ad radices montium sitis
provenit, & propter venu-
statem floris in hortis ali-
tur.

QUALITATES.

Calore cæteris non ce-
dit & potissimum foliorum
vrendi vis insignis est.

VIRE.

Et hæc cum præcedenti-
um viribus cōueniunt. Sed
caute est agendum, propter
vim nimium causticam.*



Aco-

NOMINA.

ACORVM, Græcis ἀζαρπών] Mauritanis, *Vage, aut Vgi.*] Italis, *Acoro*, vulgò *perpèvam calamo Aromatico.*] Germanis, *Ralmus.*] Boemis *Prust Vuorec.*] Polonis, *Tatarskie, Ziele.*

ACORVM.

FORMA.

Folia habet Iridis, angustiora tamen: radices non dissimiles complicatas, nō in rectum, sed obliquum aëtas, & summo cespite sparsas, geniculis interceptas. gustu acres; amaræq; odore haud ingrato.

Numerosis infima sede capillamentis.

LOCVS.

Nascitur in Ponto, Colchide, & Galatia.

QUALITATES.

Radix exsiccatur, & siccat Auicenna, ordine tertio, incidit, aperit, prouocat, & acris est, amara, atq; etiam odorata.

VIRES.

Pota radix urinam, menses, & secundas trahit: lateris dolores tollit: locinorosos, & lienosos iuuat: Pectori quoq; prodest: urinæ stillicidijs, & a serpente demorsis mirificè auxiliatur, hocq; præsertim nomine in Antidotis additur.

tum mirificè commendat: decoctæ radicis vapor hianti ore exceptus tussim sanat.

CENSURA.

Proculdubio aberrant, qui Acorum calamum odoratum esse existimant, quemadmodum & qui Galangam Acorum faciunt.

ACORVM falsum, Græcis *Pseudācoron*.] Italis, *Giglio giallo*, & *Acoro bastardo*.] Germanis, *Geset Effen*.] Gallis, *Flambe de Riuieres*.] Boëmis, *Kosárec* & *luti falešni*.] Polonis, *Mieć*; *Konne Korzenie*.

ACORVM FALSVM.**F O R M A.**

MATT. Folijs est Iridis longioribus, quemadmodum & caulibus, & floribus, qui tamē haud versicolores, sed lutei spectantur, differunt tamen facie, quippe quod minores sint, & angustioribus folijs. Radice nititur Iridis maiore duriorēq; subrubente, & inodora.

L O C V S.

MATT. Nascitur in palustribus, & aquis.

Q U A L I T A T E S.

Radix, cuius tantum est usus, exiccat, sed non nisi parum ex-calfacit. Nulla enim est acridine prædita: attenuat, roborat, resoluit.

V I R E S.

Constat multorum experimento, valere pseudoacorum, propria sua ipsius vi, ad omnes neruorum, & cerebri affectus.

**MEVM.**

MEVM, Græcis Μήν. Arabicis, Mu. Italis, Imperatrice. Germanis, Beerwurh.

MEVM.



FORMA.

Folijs & caule anetho simi- DIOSC.
lis est, binum ferme cubito-
rum altitudine attollitur, spar-
sis in obliquum rectumq; ra-
dicibus, longis tenuibus, odo-
ratis linguamque excalfacien-
tibus.

LOCVS.

Nascitur in montibus, & MATT.
collibus apricis. Optimum af-
fertur ex Gargano Apuliæ mō-
te. In Hispania & Macedonia
copiosum.

QUALITATES.

Excalfacit ordinetertio, & Gal.lib 7.
siccat secundo, incidit, dige- simp. me-
rit, aperit.

VIREs.

Radix ventriculi flatus dis- DIOSC.
cutit, ictis à serpentibus miri-
ficè subuenit. Feruefacta radix

ex aqua, vel trita citra coctionem præclusos renes, & farctam quoque pituito-
sis excrementis, vesicam, atque urinæ difficultatem expedit: quin etiam ventri-
culi flatus discutit: Torminibus, vterinis affectibus, articulorumq;ne cruciati-
bus medetur. Auxiliatur quoq; pectoris fluxionibus ex pelle delincta: Menles
pellit in defensionibus addita. Infantium pubi illita urinam mouet: caput attam-
en dolore afficit, vbi copiosius sumatur.

A 4

*MVT-

MEVM,

*MYTTELINA, Meum alpinum, vel Caros alpinus, alijs Sefeli Creticum.]
Heluetijs Muntz vel Muntzen.

MYTTELINA.

F O R M A.

Folia profert non ita tenuia vt Meum, nec tam lata vt Caros, sed medio quodam modo se habentia, nata ex radice quandoque minimi digiti crassitiem æquante, vt plurimum tamen minore, superiore parte barbata odorata & cum acrimonia dulci, vt Mei vel Dauci cretici. umbellam gerit florum ex albo purpureiscentium.

L O C V S.

Nascitur in alpib⁹, in monte Glarona & alibi in Heluetia.

Q U A L I T A T E S E T
V I R E S.

Facile coniectu fuerit ex-
calfacere huius plantæ radicem, aromatica cum sit. Condiunt ea lactarij Colostra & recoctam suam Glaronenses & Valesij. Eius pabulo in montibus vacca plurimum & optimum lac reddunt.*



C Y P E.

N O M I N A.

9

CYPERVS, Radix oblonga, Plinio Cyperis, Græcis κύπερος, ἰσχυροκνήσαν.]
Afris Saherade.] Italis, Ciperio.] Germanis, Wilder Galgan.] Hispanis, Iuncia anel-
lanada.] Gallis, Souchet.] Boemis Galganplancy.

CYPERVS.

* G E N E R A.

Duo genera Cyperi habentur, quorum differentia potior in radice, Dioscorides tertium addit, quod curcuma putatur.

F O R M A

Cyperus planta est, quæ por-
raceis ferme provenit folijs, longioribus tamen & exilioribus, caulem edit cubitalem, & nonnunquam maiorem, angulosum, alba intus medulla, ut in iunco, in cuius cacumine folia sunt minora, stellarum modo radiantia, inter quæ semen prodit spicatum herbacei coloris. Radices illi sunt subnigræ, coherentes, oblongis oleis similes, aliquando etiam longæ galangæ modo, quo fit ut hoc cyperi genus à nonnullis appelletur sylvestris galanga.*

L O C V S.

Nascitur hoc cyperi genus prope Timaui fontes, in lapideis finibus.

Q U A L I T A T E S.

Radix absque morfu exal-
cit, & exiccat, quin etiam rob-
Galen. 7.
simp. mc.

rat, & adstringit: ac simul incidit & aperit. Eupolitica est, & odorata.

V I R E S.

* Radices vlceribus quæ præ nimia humiditate cicatricem difficulter admittunt, mirifice profunt, vlceribus item oris conueniunt, & calculo vexatis congruunt, & vrinam mensesq; prouocant.*

A 5

CYPERVS

* *Cyperus rotundus*, Græcis κύπερος, ἐρίγγυλος,] Germanis Runder winter
Galgant.] Æthiopibus nostro tempore Arabico vocabulo *Soed* dicitur.

CYPERUS ROTUNDUS.

FORMA.

DIOSC. Folia fert porraceis proxima, sed longiora & exiliora, Caulem odorati iunci cubitalem aut maiorem, angulosum, in cuius cacumine minuta folia cum semine exoriuntur. Radices contiguas inter se oleis oblongis rotundisq; similes, nigro colore, suavi odore, amaro gustu.

LOCVS.

In lacunosis & palustribus nascitur.

QUALITATES.

Et huic calidavis inest.

VIREs.

Venarum spiracula laxat, Urinam ciet, Ad calculos a-
quamq; subtercutem vtilissi-
me bibitur. Aduersus Scor-
pionum ictus remedio est. Per
frigerationibus vuluæ & præclusionibus fori prodest, Pellit menses, Contra
ulcera oris etiam si depascent vorentq; farina eius efficax est. Malagmatis calfa-
cientibus & vnguentorum spissamentis adijci solet.*

CARDA-



Runder wilder
dicitur.

vs.



nes, Contra
agmatis calfa-

CARDA-

NOMINA.

II

CARDAMOMVM, Græcis Καρδάμωμον.] Mauritanis, Cordumeni.] Italis, Carda-
momo.] Germanis, Cardamomelun.] Hispanis, Grana de paraíso.] Officinis, Mele-
geta, & grana paradisi.

CARDAMOMVM.

GENERA.

Tria ad nos afferuntur ge- MATT.
nera: Maius, Mediū, & Minus.

FORMA MAIORIS.

Maiores capitulum fici, seu
pyri faciem refert: semine in-
tus subrufo, anguloso-
que: Medium folliculo con-
tegitur oblongo, triquetro,
striatoque, in quo semen est
oblongum, colore minus ru-
fescens. Minus minore con-
stat capitulo, ipsoque triangu-
lari: semine subrotundo, aspe-
riusculoque: semen omnibus
acre & odoratum: maioris ta-
men acius, & odoratius. Mi-
nus, ut medium acedinis ve-
hementia superat, ita, & odo-
ris fragrantia.

Idem.

LOCVS.

Afferitur in Europam ex A-
lexandria Ægypti, ac etiam à
Lusitanis ex India Orientali.

Idem.

QUALITATES.

Semen facultatis est admo-
dum calidæ, non tamen usque
adeo, ut nascitur, sed quanto

Gal. 7.
simp. me.

suauius, magisque fragrans est, tanto imbecillior ei calida facultas est: quin etiam
quiddam amaritudinis respicit. Ceterum hæc Galenus de suo scribit Cardamomo. MATT.

VIRE.

Datur ex aqua comitialibus, Ischiadicis, vuls, resolutis, torminosisque, & cō-
tra latas ventris tinas: ex vino vero renum affectibus, urinæ difficultatibus,
scorpionum ictibus, ac ceterorum venenosorum animalium, auxiliatur: Idem
cum radicis lauri drachma potum, calculos comminuit.

DIOSC.

CENSURA.

Cum in vulgari Cardamomo, quo passim utimur, nihil sit amaroris, nec eius
odor caput feriat, nec semen fractu contumax sit, affirmare quidem non ausim,
hoc nostrum, esse illud, cuius antiquiores meminerunt.

NAR-

NARDVS Indica siue spica Nardi, Græcè *Νάρδος*, *Νάρδου σάχυν*.] Mauritanis, *Stumbel*, siue *Senbel*.] Germanis, *Epifenarde*.] Italis, *Spico*, & *Spigonardo*.] Hispanis, *Azumbar*, aut *Esfige fil*.] Gallis, *Aspic de vltre mer*.] Boemis, *Nardus Indiansky*.

F O R M A.

DIOSC. Spica non est, quæ in cul-
Gal. morum summitate oritur: Sed
MATT. radix quæ spicæ figuram habet.
Complures enim ab vna basi
oriuntur spicæ, perinde ac in
lilij aut allij radice, verum ca-
pillaceæ, & comosæ, colore
ferrugineo, pluribus ima par-
te capillamentis, odore haud
iniucundo.

L O C V S.

DIOSC. Nascitur in India in monti-
bus, & circa Gangem fluvium.

Q U A L I T A T E S.

Gal. s. Excalfacit ordine primo, &
simp. me. siccatur secundo completo: Ad-
stringit, extergit, & aperit.

V I R E S.

DIOSC. Potavrinæ elicit, & aluum
sistit, cohibet subposita vteri
quascunque fluxiones. Præstat
ad ventriculi erosiones, & flatus. Medetur splenetis, & iocinorosis, atque et-
iam ictericos iuvat. Auxiliatur eius decoctum in defæctionibus, vteri inflam-
mationibus: præstat & ad glabras oculorum genas, siquidem densiore pilo eas
cohonestat. Additur in antidotis: & vritur in fictili nouo ad ocularia medica-
menta.

C E L T I-



NOMINA.

13

CELTICA NARDVS, siue Spica Celtica, Græcis, Νάρδος κελτική.] Italis, Spica Celtica.] Germanis, Celtischer Nardus.] Gallicè, Nardus Gaulois.] Boemis, Celtika Nardus.

NARDVS CELTICA.

FORMA.

Exigua planta est, folijs oblongis, colore flauo, sed languido, floribus luteis. Caule tenui, & imbecilli, radice squamosa, Spicæ faciem referente, è qua tenues, & numerosæ prodeunt fibræ.

DIOSC.
MATT.

LOCVS.

Nascitur in Luguriæ montibus, in Istria, & in Carinthia, & Styriæ alpibus.

QUALITATES.

Excalfacit magis quàm Indica, minus vero liccat.

Gal lib. 2.
simp. mc.

VIREs.

Eadem omnia præstat quæ Indica, & Syriaca: sed vehementius vrinam cit, & stomacho utilior est, auxiliatur Iocinoris inflammationibus, & felle suffusus. Bibitur ex ab-

DIOSC.
Gal.

sinthij decocto ad ventriculi inflammationes, & ex meraco aduersus lienis, renum, & vesicæ vitia, & venenatos ictus.

* SPICA



] Mauritanis,
nardo.] Hispano-
rdus Indiansky.



is, atque et-
teri inflam-
ore pilo eas
ria medica-

CELTICA

* *SPICA* Celtica fastigiato flosculorum ordine à præcedente differens. Appi-
ctus etiam Hirculus est & alia quæpiam cognata planta.

F O R M A.

Differt à superiore, quod
cauliculi nō vt illi glabri sint,
nec flosculi in umbellam con-
gesti, sed ramuli aliquot, & ad
horum exortus foliola adna-
scuntur, ita vt cōtinua serie su-
periora longitudine superata
ab inferioribus vna cum infi-
dentibus flosculis frequentibus,
tendant in fastigium. Ra-
dix non discrepat, sed squamo-
sa quoq; est, transuersaq; vlti-
ma parte veluti abrupta aut
præmorsa, ab eius infima par-
te tantum fibræ deorsum ten-
dunt alias simplici ordine, ali-
as duplici triplicive, quod ra-
rius est, & tunc ordine pertur-
bato.

D I O S C.

* Hirculus huic vere similis
est sed odore graui, herba can-
didior sine cauliculo. minori-
bus folijs, radice neque amara
neq; odorata.

† Cognata est Planta *Spicæ*
Celticæ odore, sapore & folio-
rum figura. sed radix cōspicua
in tantilla plantula ad minimi
digiti crassitudinem accedit sine squamis, fibræ in ima tantum eius parte sub-
sunt.

L O C V S.

Nascitur hæc Celticæ Nardi species in montibus prope Sedunum & alibi.
Hirculus cum Celtica Nardo qui eo adulterari solet, apportatur. Plantula au-
tem peculiaris illa à Calceolario quondam pro vero Folio missa est.*

NARDVS



Terens. Appi-



parte sub-

m & alibi.
lantula au-

NARDVS

NOMINA.

NARDVS montana, Græcis Νάρδος ὀρεινή. Italis, *Nardo Montana*.

15

NARDVS MONTANA.



FORMA.

Folia habet maioris Phu, MATT.
sed minora: caulem spithamæ
longitudine, umbellam puni-
ceo colore. Radices duas An-
toræ, aut testiculi modo, * &
interdum plures * subnigri-
cantes, ac fibratas, odore Phu,
aut Asari.

LOCVS.

Nascitur in Dalmatiæ mon- DIOSC.
tibus, & Cilicia. MATT.

QUALITATES.

Excalfacit, & siccat, sed cæ- Gal. lib. 8.
teris longe minus. simp. mc.

VIRES.

Iisdem cum cæteris viribus DIOSC.
poller. Sed illis quoq; ad cæ- Gal.
tera est imbecillior.

* NARDVS

*NARDVS MONTANA longius radicata. Græcis Νάρδος ὀσμυνη μακρορίζα.

Habetur differentia quædam huius montanæ Nardi in radicibus potissimum, quæ interdum oblongæ visuntur, ut ex hac icone ex ipsa veritate desumpta patet. *



PSEUDO-

PSEVI
kana



berat. L.
& illiti
liatur, à
latitua fl
liquia c
lat, illin

Qui
mnino

NOMINA.

17

PSEVDONARDVS, seu Nardus Italica. [Italica, Spigo.] Gallis, *Aspic.* Boemis, *Spi-
kanard domaci.*

PSEVDONARDVS SIVE NAR-
DVS ITALICA.



GENERA.

Alterum mas, alterum fœ- MATT.
mina, quæ propriè Lauendula
vocatur.

FORMA.

Mas folio constat latiore, MATT.
longiore, robustiore, albidio-
re; quam fœmina. Tota plan-
ta fruticosa est, ac lignosa ros-
marini modo, folijs numero-
sis, longiusculis, cauliculis te-
nuibus, angulosis, dodrante
longioribus, spicatos flores ge-
rentibus, purpureos, & odore
fragrantes, verum adeo acuto,
ut nares feriat.

LOCVS.

Nascitur in collibus, & locis MATT.
saxosis, à Sole illustratis, & feri-
tur in hortis.

QUALITATES.

Excalfacit, & siccit ordine MATT.
secundo completo: Aperit, at-
tenuat, resoluit, concoquit.

VIREs.

Confert omnibus frigidis MATT.
cerebri affectibus. vètriculum
roborat, & Iecur ab infarctu li-

berat. Lienosos iuuat, vterum calefacit, & menses ciet. Flores ex vino decocti,
& illiti vrinam pellunt, & flatus dissolunt. Eorundem decoctum ictericis auxi-
liatur, à iocinoris infarctu affectis, additis Marrubio, & Fœniculi radicibus. Stil-
latina florum aqua pota, amissam reddit loquelam: Præstat eadem ad animi de-
liquia cum pota, tum naribus, & arterijs admota. Oleum quod è floribus distil-
lat, illinitur vbi excalfacere sit opus.

CENSURA.

Qui hanc plantam, aut lauendulam, Cneoron album esse contendunt, o-
mnino hallucinantur.

B

PSEUDO-

PSEUDO-

PSEUDONARDVS. Foemina sine Lauendula.] Italis, *Lauanda*.] Germanis, *La-
uendel*.] Gallis, *Lauande*.] Boemis, *Lauendula*.

PSEUDONARDVS FOEMINA
SIVE LAVENDVLA.

FORMA.

MATT. Planta est fruticosa, pseudo-
nardo similis, sed folijs angu-
stiorib⁹, brevioribus, tenuio-
ribusq³. Floribus pariter pur-
pureis, atque spicatis, sed pa-
tentioribus, & mitiore satis o-
dore, ac magis grato.

LOCVS.

Idem. Oritur sponte in collibus
saxosis, & apricis, sed plerum-
que in hortis, & viridarijs co-
litur.

QUALITATES.

Idem. Excalfacit, & extenuat, mi-
tius tamen quam pseudonar-
dus.

VIRES.

Idem. Ea omnia potest, quæ mas
Pseudonardus. Atqui pecu-
liariter vestibus interposita, eas à tinearum rosione vendicat, & odoratas red-
dit.

CENSURA.

Ridendo tenentur errore, qui Lauendulam Cneoron album esse fatentur.

ASA-



NOMINA.

19

ASARVM, Græcis, Ἀσάριον, ac etiam Νάξος ἀγρία. [Arabibus, Asarum.] Italis, Asaro. & Baccara. Germanis, Aselswurk. Hispanis, Asarabaccara. Gallis, Cubaret. Boemis, ac pariter Polonis, Kopytnik.

ASARVM.

FORMA.

Folij est hederaceis, rotundioribus tamen, ac minoribus, prælongis nitentibus pediculis, floribus purpureis, cytini effigie, semine vinaceo rum nucleis simili, cauliculis angulosis, radicibus numerosis, geniculatis, tenuibus, & odoratis.

LOCVS.

Prouenit in vmbrosis montibus. In syluis, alijsq; opacis locis.

QUALITATES.

Excalfacit ordine secundo, Mef. & siccat tertio, aperit, attenuat, resoluit, incidit. acris est, subamara, & odorata.

VIRES.

Vrinam cit, hydropicos, & ischiadicos iuuat. Pota alui, Mef. & vomitiones ciuit, pituitam,

& bilem deijcit. Facit quoq; ad iocinoris, & lienis infarctus & ad scythicos tumores. Confert quoq; diuturnis febribus ab obstructionibus prouenientibus. Radices senis drachmis ex mulso potæ menses trahunt. Oleum in quo Asarum diu fuerit insolutum, vna cum Ladano spinæ dorsi illitum sudores prouocat.

CENSURA.

Decipiuntur, qui Asarum, & Baccharem nihil inter se differre contendunt.

B 2

ASA-



atas red-

centur.

ASA-

ASARINA, Græcis *A'sarion*.] Italis, *Asarina*.

F O R M A.

ASARINA.

MATT. Folij prouenit Afari, rotundioribus tamen; scabris, leuiter circumferratis, humi acubantibus; cauliculis hirsutis: Floribus melinis anthemidis modo. sed minoribus. Radices mittit tenues, longasq; summatellure vagantes, acuto gustu, quadam cum leuiuscula amaritudine.

L O C V S.

Idem. Prouenit in montibus.

Q U A L I T A T E S.

Idem. Excalfacit, & ficit, quin etiam attenuat, incidit, aperit, & modicè abstergit.

V I R E S.

Idem. Herba ipsa, cum radicibus pota drachmę pōdere ex mulla, siue oxymelre, aluum exoluit, ducitq; crassam pituitam, & acres humores: quare præfertur rei herbariæ peritis ad Gallicæ luis dolores, & articulares morbos: Datur quoq; commode hydropicis, & ictericis: Sunt etiam qui ad comitiales eam commendent, & ad neruorum resolutiones. Citur in urina, & mensis, & intestinorum animalia necat.



PHV,

PHV, G
Yerua
Polon



ficcat secun

Phuma
ris compu
& asthma,
quodd veni
num, in qu
internoru

NOMINA.

21

PHV, Græcis ποδαντ Αγγλια Νάξος.] Mauritanis, Fu.] Italis, *Valeriana*.] Hispanis, *Yerua benedetta*.] Germanis, *Waldran*.] Boemis, *Kostlyk*.] Gallis, *Valerienne*.] Polonis, *Koslek*.

PHV.

GENERA.

Genera habentur tria, Ma- MATT.
ius, Minus, Minimum.

FORMA.

Maius folia fert olus attri seu DIOSC.
Elaphobosci: caulem cubita- MATT.
lem, aut proceriorem, laeuem,
cauum, & purpurascensem ge-
niculatumq; , umbellâ ex pur-
pura albicantem, radicem mi-
nimi digiti crassitudine, adna-
tis inferiori parte fibris, subfla-
uo colore, odore graui, simul
& iucundo, nardum æmulan-
tibus.

LOCYS.

Nascitur in montibus, ac et- MATT.
iam campis, vliginoso solo.

QUALITATES.

Excalfacit excessu primo, & Gal. lib. 8.
siccat secundo completo. Aperit, attenuat, concoquit, & prouocat. simp. mc.
Auicenn.

VIREs.

Plu maioris radix yrinarum, & menses cit, hausta flatu pellit, auxiliatur late- DIOSC.
ris compunctionibus. Præstat quoque aduersus stranguriam, veterem tussim, MATT.
& asthma, cum dulci radice, vuis passis, & Aniso decocta. Miscetur Antidotis,
quodd venenatis bestijs, & pesti resistat: oculorum claritatem adiuuat, vbi vi-
num, in quo decocta fuerit, guttatim instilletur. Additur quoq; in potionibus
internorum vulnerum.

B 3

PHV

dolores,
cis: Sunt
nes. Cit

PHV,

PHV minus, Græcè *φού μικρόν*.] Italis, *Valeriana minore*.] Germanis, *Gemein Valerian*.] Hispanis, *Teruabenedicta*.] Gallis, *Valerienne des pre*.] Boemis, *Kopistnik*.

PHV MINVS.

FORMA.

MATT. Folijs prouenit Fraxino, aut Sorbo similibus, nigricantibus, humi stratis: caulibus maiori similibus, sed longioribus. Umbella etiam simili, aut paulo minore: radicibus numerosis albicantibus, odore cum quadam grauitate iucundo.

LOCVS.

MATT. Nasceitur humecto solo.

QUALITATES

Idem. Excalfacit, & siccat valentius, quàm maius.

VIREs.

Idem. Radix viribus omnibus prædita est, quibus & maior, gustu tamen acrior est: quo fit, vt maiori aperiendi, attenuandi quæ sit facultate. Nam & venenis magis resistit. Peculiariter autem valent eius radices ad testium tumores à frigiditate, aut flatu genitos: si in vino decoquantur: & vapore fumi suffiantur testes.



PHV

NOMINA.

23

PHV minimum, siue Valeriana montana aut palustris. [Italis, *Valeriana minima*.]
Germanis, Klein Valerian.

PHV MINIMUM.



FORMA.

Folio est maioris effigie, sed MATT.
admodum minore, cauliculis
angulosis, dodrantalibus, fo-
lijs vtrinque per interualla emer-
gentibus. Umbella in cacumi-
ne exigua, colore subpurpureo.
Radice tenui, prælonga tamen,
& numerosis capillamentis fi-
brata, iucundi odoris.

LOCVS.

Nascitur in montibus & pla-
nicie vliginosa solo. Idem.

QUALITATES.

Excalfacit, & siccit, sed cæ-
teris minus. Idem.

VIREs.

Vires sunt illi, quæ cæteris e-
adem, sed longè imbecilliores. Idem.

B 4

*PHV

**Phy peregrinum*. *Valeriana rubra*, alijs *Polemonij species*, nonnullis *Been rubrum*, vel *Ocymastrum Valerianthon*.] *Parisienfib. Phu latifolium*.] Germ. fremder Baldrian/Gespöretter Baldrian.

PHY PEREGRINVM.

FORMA.

Caulib. oritur ab eadem radice, quæ crassiuscula est, alba & odorata, pluribus, duorum dodrantum altitudine, aut maioribus, lauib. geniculatis, subcandidis, folijs latis, oblongis, in acutum desinentibus, pulcre virentibus. Flosculi oblongi, tenues, rubetes eleganti purpura, caudati in caulicum fastigijs racematim diggeruntur stipanturque dense admodum, è quibus semina fiunt plumosa vt in cæteris *Valerianis*.

LOCVS.

Circa *Pisam* *Italiæ* in ædificijs antiquis oritur, nec non in mœnjs. Apud nos non nisi in hortis visenda.


QUALITATES.

Radix odorata dulcis cum grata acrimonia aliqua ac minima ferè amaritudine calida est in secundo gradu, sicca in primi sine.

APPENDIX.

Non desunt, qui putent esse *Narcissum* *Virgilij* in *Georg.* & *Columellæ* in hortorum cultu, cui *Dioscorides* *Flores Phu* comparauit.*

CASSIA



CASSIA solutiua, siue Ægyptia Siliqua.] Officinis, *simpliciter Cassia.*] Italis, *Cassia.*] Gallis, *Casse laxative.*] Boemis, *Cassia.*

CASSIA SOLVTIVA.



FORMA.

Arbor qui Cassiam profert, MATT.
procera est, folio siliqua acutiore, solida, ac compacta materie, pullo intus colore, cortice cinericio, radicibus magnis. Siliquas profert, sesquicubitales, teretes, ligneo putamine, sed tenui, ac fragili; colore in rubrum nigricante, nigra, pingui, dulciq; intus medulla, semine siliqua omnino simili.

LOCVS.

Prouenit in Ægypto, sed pri MATT.
mas tenet, quæ circa Cayrum shabetur.

QUALITATES.

Pulpa exsiccatur, & hume- Mes.
tat ordine primo, resoluit, & edat dolores.

VIRES.

Sanguinem mundat, bilisq;
feruorem extinguit, aluum item commodissimè citat, vrinæ difficultatibus mirificè auxiliatur. Bilem & pituitam excernit, pectus, & fauces mulcet. Renes expedit, addita præsertim dulci radice. Frequenter deuorata, calculos in renibus renasci prohibet. Auxiliatur biliosa febre affectis, facilius tamen operatur addito Hieræ puluere. Exterius illita Erysipelas extinguit, & cæteras, quæ cute tenus habentur inflammationes. Sumenda parum ante cibum. Nam si secus sumatur, faciliè in nutrimentum transit.

*CASSIA poëtica Monspelienſium.] Hiſpaniſ Guardaloba.

CASSIA MONSPELIENSIVM.

FORMA.

Paruus eſt frutex Sparti caule ſtriato, folijs Lini, ſucculentis, colore nigricante, qui tamen nonnunquam ad ſeſqui cubiti altitudinem attollitur. Fert floſculos multiplices herbaceos flauſcentes, olei floribus ſimiles, ad foliorum exortus prodeuntes, & fructum deinde alparagi marini æmulum, initio oblongum, in tres floris appendices deſinētem, qui matureſcit autumnō, & rotundior fit, Auguſto menſe rubeſcens, pulpa glutinoſa, ſapore & odore ingrato. Radix cortice craſſo, fulco vel ſubruſſo prædita eſt.

LOCVS.

In Romano, Narbonenſi agro vbere prouentū oritur, & alibi paſſim in Galloprovincia iuxta ſepes & oliueto- rum margines, Nec non in Hiſpania vulgaris eſt.

QUALITATES.

Nihil fere aromatici habet, ſed radix valide aſtringit.

VIREs.

Quidam vtuntur radicis cortice in obſtuctione iecoris.*

*COSTI



*COSTI RADICES.



Varia radicū genera pro co-
sto ad nos afferūtur, quorum
quædam hic appingere libuit.
A. Costus est amarus pharma-
copolarum, levis, alb^o intus,
medulla per medium magna,
lineis in cortice trāsuerfis, in-
grato admodum & vitioso sa-
pore, medicato tamen. B. Co-
sti radix dodīcalis ferè, dura,
insipida, subdulcis, inodora,
gravis, solidissima, tortuosa,
inæqualis, rugosa nonnihil,
fuscaq; foris, serra si seces, in-
tus lauis, plana politaq; est, si-
milis ferè rhapsodicæ vulgo
dictæ, id est, centaury maiori,
cui cognatam plantam esse
crediderim. In medio partem
modice cauam & in ea mate-
riam alienam & terreum ali-
quid inuenire est, nescio an se-
cundum naturam, vel potius
vitio quodam. Radix certe
mihi inutilis & afferri indigna
videtur. Ne vltā quidem olet,
cum succum reddit, præ duri-
tie cultro fragilis est, minime

autem tenax. Macerata in aqua breui mollis euadit, & colore pallida. D. Costi
pharmacopolarum species maior, solida, ponderosa & crassa radice, lineis à
centro radicis ad superficiem ductis apparentibus multis, species videtur cen-
taurei maioris, etsi odorem eius nō habet, saporem vero subdulcem. E. Costus
Lusitanicus qui iridem redolet, digiti crassitudine, aut paulo crassior, superfi-
cies è ruflo ad fuscum tendit, aliquando subalbicat, substantia intus alba, laxa
raraq; est & friabilis. F. Costi caulis pars infima, canna striata foris, intus multa
medulla alba infarcta. G. Costus Arabicus. Omnino Zinziberi cognata radix
videtur substantia & figura, habet & filamenta intus, sed maior crassiorque est
& minus acris ac subamara, & suum quendam peculiarem saporera inter man-
dendum ostendit, color foris fuscus ferè, intus albicat, & ad luteum inclinat.
Teredines etiam vt Zinziber sentit. *

COSTVS

Costus vulgaris, *Officinis*, *Costus*, *sed perperam*.] *Italis*, *Costo bastardo*, & *Costo di Puglia*.

F O R M A

MATT. Folij exit pastinacæ domesticæ maioribus, dē floribusq; crispis, & asperiusculis, humi procūbentibus, caule cubitali, rotundo, geniculato, ramo foq; Umbellas in summitate gerit, floribus melinis. Semine nudo, ac subrotundo. Radice nititur vegeta, cortice crasso, ac carnolo, colore subalbicante, nō sine splendore.

PSEUDOCOSTVS.

L O C V S.

Idem. Nasctur in Apulia, monte Gargano.

Q U A L I T A T E S.

Idem. Excalfacit, & siccit ordine secundo cōpleto. Aperit, abstergit, incidit, attenuat. Amara est, & acris.

V I R E S.

Idem. Præstant (vt referunt, qui ad nos comportant) Pseudocosti radices ad omnes cerebri, & neruorum frigidos affectus, ad pectoris vitia, & ad ventriculi cruciatus, & viscerum omnium obstructions, & ad renum, vesicæ, & vteri morbos. Ideoq; auxiliantur diutino capitis dolore affectis, verriginosis, comitialibus, stupidis, veteriosis, conuulsis, resolutis, asthmaticis, tussientibus, ictericis, & hydropicis. Eadem status pellunt, vermes necant, vrinam ducunt, calculos pellunt, menses, & partus ciunt. Infunduntur earundem decocta, ad coli cruciatus, & coxendicum affectus.

I V N C V S



IVNCVS odoratus, Græcis, Σχοίνος ἀρωματικός.] Arabibus, *Adcher*.] Italis, *Squinanto*.] Germanis, *Camelschey*.] Hispanis, *Paya de mequa*.] Gallis, *Squinanthum*, & *paiſſure de Camely*.] Boemis, *Sitj Vuonne*.

IVNCVS ODORATVS



pipere, hydropicis, atque conuulsis. Decoquitur ex gallinaceo iure tota planta, fitque hinc potus admodum utilis fœminis, quæ vteri doloribus in puerperijs laborant. Miscetur antidotis.

CENSURA.

Manifesto tenentur errore, qui contendunt Schœnianthum, quo vtimur, esse supposititium.

FORMA.

Folia profert caricis vel zæ robustiora, tamen sursum spectantia, & sese stipantia. Culmos edit zæ modo, geniculatos, & flores in summitate odoratos. Radicē habet ima parte villosam, odoratamque.

LOCVS.

Nascitur cum in Arabia, & Theoph. Syria, tū in campestribus, & pascuis, tum etiā vbi stagnantes aquæ siccantur.

QUALITATES.

Modicè excalfacit, modicè adstringit, nec plane tenuitatis natura alienus est. Aperit, digerit, pellit, incidit, excoquit, modicè adstringit.

VIRES.

Cit vrinam, & menses, flatus resoluit, & venarum spiracula laxat. E potu flores medentur cruenta expuentibus, quin etiam ventriculi, pulmonis, iccinoris, renum, & vteri doloribus. Radix adstringentior est. Datur eadem vtiliter aliquot diebus potanda cum

CALA-

CALAMVS odoratus, Græcis κάλαμος ἀρωματικός. Italis, Calamo aromatico.

F O R M A

CALAMVS ODORATVS.

DIOSC. * Melior est fulvus, dense geniculatus & qui assulosè frangitur, lentus in mandendo cum aliqua acrimonia.*

L O C V S.

Theoph. Nascitur in India, quin etiam in Iudæa,
DIOSC. trans Libanum montem.

Q U A L I T A T E S.

Gal. lib. 8. Modicè exalfacit, modicèq; adstringit,
simp. mc. nec planè à tenuitatis natura alienus est. A-
perit, incidit, ac pellit.

V I R E S.

DIOSC. Vinam potu ciet, quare decoquitur ad
potiones cum apij semine ad hydropes: re-
num vitia, & vrine stillicidium. Menses tum
potus: tum in deflectionibus additus pellit:
suffitur vtiliter tussientibus, cum per se,
tum cum resina Terebinthina, hausto per
arundinem, aut infundibulum fumo. Ex-
petitur ab vnguentarijs ad eorum odora-
menta, nam & suffitionibus odoratis, & vn-
guentis adjicitur.


C E N S V R A.

MATT. Acori radices sunt, quæ in Myropolij calami odorati vicem præstant. Siqui-
dem odoratus calamus iam diu periit: verùm eadem Acori radices recte admo-
dum eius loco supponi possunt.

* A P P E N D I X.

Hæc frustula Calami odorati, quæ appinxi, cum pulcrè conuenirent Diosco-
ridis descriptioni, à doctissimo viro Bernardo Paludano Frisio, ex Syria & Ægy-
pto reduce mihi & domino C. Clusio liberaliter communicata sunt.*

M V S C V S



NOMINA.

31

Myscv's, Græcis, Βύλον ἢ ἀπλάγγων.] Aphris, Axnech, aut Vſnee.] Italis, Mosco.] Germanis, Mosß.] Boemis, & Polonis, Mech.

MVSCVS ARDOREVS

FORMA.

Capillacea est materia, ex MATT. annolis plerumq; arboribus dependens, colore subalbicante, ac incano.

LOCVS.

Nascitur in quercubus, po MATT. pulo, cedro, picea, pinu, abiete, larice, & alijs quandoq; arboribus.

QUALITATES.

Refrigerat, sed parum, & Galen. 6. propinquum est fere medijs. simp. mc. Adstringit, digeritq;.

VIRES.

Huius dilutum ex vino plu Gal. ribus dieb^o paratum, & haustum somnum inducit, ventriculum roborat, vomitiones, & alium cohibet. Recens decerptus, & oleo rosaceo imbutus capitis dolores

à calore exortos mirifice mulcet. Sanguinem è vulneribus, manantem compescit impeditus arctè que adalligatus. Expetitur quernus, laricens, ac etiam abiegnus vnguentarijs ad pulueres odoratos parandos, quos Cyprios vocant.

MVSCVS



MVSCVS terrestris. [Ital. *Mosco terrestre*.] Germanis *Deerlap*.

MVSCVS TERRESTRIS.

F O R M A.


MATT. Longas viticulas, funiculi instar gignit, oblongis numerosissimisque foliis vndique stipatas, quæ sæpe ad septem, octoque; vinarum longitudinem protendantur, compluribus vtrinque adnatis ramulis. Serpit humi, nititurque radicibus capillaribus plurimis, ex ipsis viticulis prodeuntibus, hederæ modo. Gignit quoque Iunio mense in ramusculorum cacumine Iulos, Corylaceis ferè similes, subflauo colore.

L O C V S.

Ident. Nascitur in syluis, sabulosis, & inuijs locis, interfaxa.

FACULTATES ET
VIRES.

MATT. Præstat eius decoctum ex albo meraco paratum, ad frangendos, educendosque renum calculos. Decoctus in aqua, & deinde contusus, mulcet admotus, & inflammationes, & earum dolores: proinde non desunt qui hoc auxilium usurpent ad calidam podagram. Superioris ætatis Pharmacopœi diu hac planta vsi sunt, manifesto errore, Celticæ Nar-dice,



CRO-

NOMINA.

33

CROCVM. siue Crocus, Græcis, Κρόκος. Arabis, Zabafaran, siue Zafaran. Italis, Zaffarano. Germanis, Saffran. Hispanis, Azaffran. Gallis, Zaffran. Boemis, Sfran. Polonis, Szaffran.

CROCVM.

FORMA.

Comosis prouenit folijs, MATT. longis, angustis, capillaceis, planis, non rotundis, Tragopogoni modo: Floribus purpureis, Colchico similibus, rubentibus intus staminibus, inter aureas quasdam ligulas exortis: Radice nititur bulbosa.

LOCVS.

Seritur in campis, & hortis, Idem. bulbis tantum transpositis.

QUALITATES.

Excalfacit excessu secundo, Gal. 7. & exiccat primo, quin etiam simp. me. frigidi, terrei; nonnihil ob- DIOSC. tinct. Aperit, pellit, digerit, roborat, & emollit.

VIRES.

Elegantem colorem præ- DIOSC. stat: ex passo potum crapulam arcet. Ex humano lacte illitum oculorum fluxiones cohibet. Additur in potionibus, quæ interaneorum causa temperantur. ad vuluæ etiam, sedisq; cataplasmata vtiliter inditur. Venerem stimulat, vtile & aurium collectionibus. Læritiam affert, ob id additur v- MATT. tiliter medicamentis ad cor facientibus. Sunt qui scribant exitiosum esse crocum tribus drachmis in aqua potum. Vrinam mouet radix ex passo pota.

C

*CRO-

Hæc est facies croci vbi defloruit. Folia enim ipsius confestim longiora fieri incipiunt, nec amplius erecta consistunt, sed circumcirca in humum funduntur, atq; sic per totam hyemem delitescunt sub niuib; donec æstate ingruente subinde contabescant.

Approximus hic quoq; radicem hirsuto involucre exutam, vt gemini sibi inuicem insidentes bulbi appareant.*



HELENI-

NOMINA.

35

HELENIVM, Græcis, ἡλένιον. Arabibus, *Iafin*, siue *Rafen*. Vulgò officinis, *Enula campana*. Italis, *tella Enoa*, siue *Enola*. Germanis, *Alant*. Hispanis, *Rai de Alla*. Gallis, *Aulned*. Boemis, *Vuoman*. Polonis, *Oman*.

HELENIVM.

FORMA.

MATT.

Folia habet Verbasco maiora, latiora, longioraq; hirsuta, & in acutum desinentia: caulē profert magnum, hirsutū: flores aureos Chrysanthemi modo, sed maiores: semen verbasci simile, tactu pruritus faciens. Radice nititur magna, vegeta, crassaq; intus alba, & exterius nigricante, subacri, & amaro sapore.

LOCVS.

Loca amat Vliginosa.

Idem.

QUALITATES.

Excalfacit, non tamen primo gustatu: verum calida, & sicca est, cum recrementitia humiditate. Aperit, prouocat, concoquit, incidit.

Gal. lib. 6.
simp. mc.
MATT.

VIRE.

DIOSC.

Potum radice decoctum menses, & vrinas ciet. Auxiliatur omnibus pectoris affectibus in eclegmate sumpta, ob idq; datur asthmaticis, & suspiriosis: Eadem flatus pellit, & demorsos à serpente iuuat. Stomacho quoq; utilis est in passio condita. Præcordijs medetur, & ventris tineas necat, illinuntur tum radix, tum folia, ad coxendicos affectus. Aqua à radicibus destillata, maculas in facie delet, & cutis nitorem conciliat.

C 2

GELSI-



GELSIMINVM, vel Iasminum, Arabibus, *Zambach*, *sive Sambach* aut *Iefemin*.] Italis, *Gelsimino*.] Germ. *Deiselreben*.

GELSIMINVM.

F O R M A.

MATT. Viticulosa, sarmentosaq; est planta, & topiario operi, umbraculisque contexendis peridonea. A radice viticulæ oriuntur longæ, flexiles, lentæ, viridesq; è quibus oblonga prodeunt folia, septena ex uno pediculo, mollia, & in acutum desinentia, flores mittit modo cædidos, modo cæruleos, modo flavos, lilij parvi effigie, odoris perquam iucundi acutiq;.

L O C V S.

Idem. Amat amænos, & calidos tractus, habeturq; in viridarijs, & hortis.

Q U A L I T A T E S.

Idem. Flores exalfaciunt, & siccant ordine secundo.

V I R E S.

Serap. Præstat oleum, quod inso-

Mef.

MATT.

latis in eo floribus paratur, ad omnes frigidos dolores, exalfacit enim & laxat. Illinitur quoq; vtiliter mulieribus, ad frigidos vteri cruciatus, frigidosq; quoscunq; neruorum, & articulorum affectus.

C E N S V R A.

Aberrant, qui putant Iasminum vnguentum antiquis parari solitum, ex nostrate Gelsimino.

* GELSI-



NOMINA.

37

* GELSIMINVM Catalonicum. Vel Chamægelsiminum grandiflorum peramænum.] Germ. Fremdd Veielreben/oder Jasminen mit grossen Blumen.

GELSIMINVM CATALONICVM.

FORMA.



Humilius est & nequaquam scandit, surculosis ramulis vix cubito vel sesquicubito longioribus, folijs Iasmini vulgaris minoribus, nigrioribus & rotundioribus, floresque fert grandiores vulgaris quadruplo maiores & rariores, superne candidos, inferne parum subrubentes, odore acriori & suaviori, floret autumnis & ferè per totam hyemem. Inferi solet in vulgare, & sic comode propagatur.

LOCVS.

Alitur studiose in vrceis pensilibus.

C 3

STYRAX,

STYRAX, Græcis, Στόραξ. Arabibus, Mehn siue Astarach. Officinis, Storax calami-
mira. Italis, Storace. Hispanis, Efforaque.

STYRAX.

F O R M A.

MATT. Styracis planta cotonea ma-
lo similis est, folijs tamen mi-
noribus solidis, robustis, sub-
rotundis, lentis ramorum sur-
culis. Flores habet albicantes,
Auratie mali haud longè dis-
similes. Baccas longis pedicu-
lis nitentes, albicante lanugi-
ne obductas, prominente an-
teriore parte cacumine.

L O C U S.

DIOSC. Nascitur in Syria, Iudæa-
q; MAT. circa Gabala, & Marathunta;
quin etiam Pisidiam, Cilici-
am, & Cassium Seleuciæ mon-
tem. Nascitur quoq; in Roma-
no agro circa Tybur.

Q U A L I T A T E S.

Gal. 8. Exalfacit Styracis lachry-
smp. me. ma ordine secundo, & desic-
cat primo. DIOSC. Emollit conco-
quit, resoluit.



V I R E S.

DIOSC. Styracis lachryma medetur tussi, destillationibus, raucedini, grauedini, & v-
teri præclusionibus, duritiebusq; Menses cit, cum illita, rum pota, aluum quo-
que emollit, si exiguum cum Resina Terebinthina, catapotij modo deuore-
tur. MAT. Cum autem sit odorata, suffitur odoris gratia, & vnguentarijs expetitur
ad odoramenta. Oleum ex ea paratum, hæc omnia valentius præstat.

P I N V S.

PINVS, Græcè Πίνος.] Arabicè, *Sonabar.*] Italicè, *Pino.*] Germanicè, *Tichstenbaum.*] Hispanicè, *Pino.*] Gallis, *Pin.*] Boemis, *Barouice.*] Polonis, *Sofzna.*

PINVS.



GENERA.

Domesticum, Montanum, MATT.
Maritimum.

FORMA.

Domestica pinus, numerosos fundit ramos, superiori caudicis parte, circumuagantes, comosis, ac robustis folijs, longis, angustis, numerosis, & in cacumine aculeatis. Noces edit magnas, ponderosas, compactas, solidasq; oblongis intus nucleis, duro crassoq; putamine obductis, gustu dulci, ac iucundo.

Idem.

LOCVS.

Copiosa habetur, in agro Rauennate, non longe ab Adriatici maris litore. Habetur etiam & in alijs Italiae locis, & praesertim in Cœnobiorum hortis, & viridarijs.

Idem.

QUALITATES.

Cortex exsiccat: folia refri-
gerant, resina autem exal-
cit, discutit, & purgat. emollit.

DIOSC.

VIRES.

Tufa, & illita folia inflam-

DIOSC.

mationes prohibent. Suffitus cortex partus, & secundas eijcit, potus verò aluum sistit, & urinā ciet: Foliorum ex aceto decoctum, vtiliter colluitur in dentium dolore; praestat idem, & nucis cortex, quin etiam ligni ipsius tædæ. Virides aciculæ contritæ, & ex meraco potæ, cordis dolorem sedant. Nuclei boni, crassiq; succi sunt, & multum nutriunt, sed non faciliè concoquantur. Impinguant, Venerem sollicitant, tabidos, resolutos, & stupidos iuuant, & renum, & vesicæ vlcera sanant.

Gal. 2. de
facul. ali-
ment,

PINVS sylvestris, Græcè, *πινος ἄγρια*.] Italicè, *Pino saluatico*.] Germanis, *Wildschwentbaum*.] Gallicè, *Pin sauvage*.

PINVS SYLVESTRIS MONTANA.

G E N E R A.

MATT. Alterum montanum, alterum maritimum: Huius duæ habentur species: illius autem tres.

F O R M A P R I M Æ.

Idem. Primæ in montano genere eadem ferè, quæ domesticæ facies est, coma tamè breviori, folijs rudioribus, & acutioribus. Nuces edit Cupressinis pauld crassiores, longiores, & in acutum desinentes, resinosas, autumno dehiscentes.

L O C V S.

Idem. Nascitur in montibus, & cliuosis locis.

Q U A L I T A T E S.

Idem. Cortex, sicciorè præstat facultate, vt resina, calidiorè quam domesticæ.



V I R E S.

Idem. Folia, cortex, resina, nuces eadem præstare possunt, quæ in domestica diximus, ac etiam valentius. Nucum recentium succus, vuluam angustiorè reddit: infusus, & mammas, nimis in virginibus extuberantes, cohibet. Idem præstat stillatitia earum aqua, sed non adeo valenter.

C E N S V R A.

Non desunt qui pinum montanum hanc, Dioscoridis piccam esse contendunt, sed proculdubio hallucinantur.

Hanc

N O M I N A.

41

Hanc Ananienſes in Tridentino agro appellant Mugo. Latinis, Pinus Sylveſtris repens dicitur. at Græcis, quod ſtipite careat, rectè *αἰτὴν ἀστέλιχ* vocari poterit.

PINUS SYLVESTRIS ALTERA,
MUGO DICTA.



F O R M A.

Caudicem nullum edit, ſed MATT. humo tenus ramos à radice fundit, qui lōgo tractu repunt. Fructum proferit prædictæ ſimilem, vegetiorē tamen paulo, reſinoſum, nec inodorum, nullo intus nucleo, qui mandi poſſit.

L O C V S.

Nascitur plurimum in ſummis montium cacuminibus. Idem. nos eam primū vidimus in Rauena, Ananienſium monte.

Q U A L I T A T E S.

Huic eadem ſunt qualitates, quæ cæteris pini generibus. Idem.

V I R E S.

Iſdem quoq; viribus pollet, quibus & cætera pinorum genera. Incolæ ramis vtuntur ad vafa vinaria cingenda, circulis inde paratis. Idem.

G S

PLINIUS

PLINIVS PINVM Tarentinam appellat, Ananienfium & Rhetorum fylva-
ni homines Cembro, & Cermolo.

PINVS SYLVESTRIS
CEMBRO.

F O R M A.

MATT.

Speciosa adolescit proce-
ritate, facie alijs haud abfimi-
li, piffiori tamen, ac tenuio-
ri coma: Strobilis piceis crafs-
fitudine fimilibus, breviori-
bus tamen: fub purpurafcen-
tibus, fragilibusque: Nuces
concludit triquetras, dome-
fticis longè minores, fractu
faciles, ut potè quæ dentibus
facile rumpuntur. Ineft his
nucleus puillus, dulcis, albi-
cans, fubrufa cõtectus mem-
brana, non ingratus efui. Re-
finam caudex fundit albam,
& odoratam.



L O C V S.

Idem.

Nafcitur copiofa in Ty-
rolenfi Comitatu, ac alijs cir-
cumftantibus montibus in
Vulturenæ alpibus.

Q U A L I T A T E S.

Idem.

Qualitate à cæteris Pini
generibus non variat.

V I R E S.

Idem.

Eædem profecto quæ cæteris: Tabulis ex ea paratis ad hypocausta extruen-
da maximè vtuntur Germani, odoris gratia: ac etiam ad alia ædium ornamenta.

PINVS

NOMINA.

43

PINVS Maritima, Græcis βαλάνια πίνος. Italis, Pino marino.

PINVS MARITIMÆ PRIMVM GENVS.



FORMA.

Folia habet angusta, prælonga, raraq; in capillamenti modum protensa, squamosis vbiq; ramis, lulis sursum spectantibus. Conos edit cæteris sylvestribus longiores, crassioresq; præduros, nucamentis in acutum extuberantibus, in quibus inanes concluduntur nucs.

MATT.

LOCVS.

Prouenit in Maritimis Italia, Agro cum Pisano, tum Senensi, & (vt audio) apud Calabros.

Idem.

QUALITATES.

Cortex eius mitius exiccat minusque resina excalfacit quam cæterorum sylvestrium.

Idem.

VIRES.

Eadem quæ cæteris illi sunt facultates. Vtuntur incolæ pinguißima eius materie ad nocturnas faces.

Idem.

Eadem

Eadem quæ alteri.

PINVS MARITIMÆ SECVN-
DVM GENVS.

F O R M A.

MATT. Comosior huic opaciorq;
quàm alterius, sed breuiori-
bus capillamentis. Strobilos
profert maiores, lōgiores, du-
riores, ac pulchriores, promi-
nentibus vndiquaq; nucamen-
tis, vacuis intus nucibus, ac su-
peruacuis.

L O C V S.

Idem. Nascitur haud longè à ma-
ri, iisdem ferè vt altera locis.

Q U A L I T A T E S.

Idem. A cæteris qualitate haud
differre videtur.

V I R E S.

Idem. Viribus ab alijs minime dif-
crepat.



L A R I X.

LARIX, Græcis Λάριξ.] Italis, Larice.] Germanis, Lerchenbaum.] Gallis, Melze, siue Meleze.

LARIX.



FORMA.

Arbor est eximie procerita. MATT.
tis. materie æterna, cortice
perquàm crasso, in rimas de-
hiscente, & intus rubente: Ra-
mos emittit circa caudicem
ferè totam: extremitatibus sa-
licis modo lentis, subluteo co-
lore: odore nò iniucundo: fo-
lijs gregatim circum ramulos
prodeuntibus, densis, oblon-
gis, mollibus, comosis: Conos
edit Cupressinis æmulos, mol-
liores tamen, flores purpure-
os, & odoratos. Resinam fun-
dit liquidà, ac copiosam, quin
etiam Agaricum gignit.

LOCVS.

Prouenit in montibus, & Idem.
cliuosis locis. Larice abūdant
Tridentinæ alpes: & circum-
stantia loca.

QUALITATES.

Cortex siccatur pini modo: MATT.
Resina excoctificat, atqui minus
quàm pinca, & abiegna.

VIREs.

Resina aluum ducit, abster- Idem.
git, prouocat, aperit, glutinat, attrahit, Suppuratos, & tabidos iuuat; delinēta
purulenta extrahit. Renes, & vesicam expurgat, calculos expellit: deuorata ar-
ticulorum dolores lenit. Gonorrhæam sistit addito succino, & corallio, aut ca-
phuræ momento, oleum ex ea distillatum cum ad plura utile, tum maximè vul-
neribus glutinandis, & neruorum affectibus.

CENSURA.

Qui Laricem nostratem non esse legitimam dicunt hallucinantur: & qui Vi- MATT.
truuius, & Cæsaris commentarijs addicti, Laricem igne haud quaque comburi
posse negant. cum tamen eius materies resinosis ceteris resiniferis plantis ha-
beat. antiquorum omnium testimonio qui de ea scripserunt.

LARI-

Vt accuratius indicarentur ramorum tubercula è quibus conferunt enascuntur folia, non inutile putauimus fore, separatam ramulum hic appingere, cum depicta præcedens arbor, vt proportio non violaretur, necessario illud in spacium angustius contractum exhibeat obscurius.*



P I C E A,

NOMINA.

47

PICEA, Græcis πεύκη.] Italis, *Pezzo*.] Germanis, *Nor-Tannenbaum*.] Hispanis, *pino negro*.] Gallis, *Pesse*, *Pignet*, *sive Garipoolt*.

PICEA.



FORMA

Facie est Abietis adeo emul- MATT.
la, ut Syluanos quandoq; fal-
lat. Est tamen nigrioribus fo-
lijs, latioribus, læuioribus,
mollioribusq; ac minus acu-
leatis. Hæc ramos circum-
quaq; vestit atq; operit. Co-
nos edit Spithamæ longitu-
dine: fragili nucamentorum
congerie, in quibus semen
concluditur. omnino inutile.

LOCVS.

Nascitur in montibus, & Idem.
syluis.

QUALITATES.

Siccat cortex, adstringit, DIOSC.
Pini modo, ita resina pari fa-
cultate exalfacit.

VIRES.

Ea omnia præstat, quæ pi- DIOSC.
nus, etsi Resina ignobilior MATT.
est, & minus efficax. Materies cum ad ædium, nauiumque fabricas, tum ad vasa
vinaria, & alia domestica vtenfília aptissima habetur. Cortex coriarijs expetitur
ad densanda coria.

ABIES

ABIES Græcis, ἐλάτη.] Italis, *Abiet*, *Abete*, & *Abeto*, *Ανεξο*, *Auedia*, *Crouat*.] Germanis, *Dannenbaum*/weiss *Dannen*.] Gallis, *Sapin*, *Sap*, *Vergno*. Hispanis, *Abeto*.

ABIES.

FORMA.

MATT. Piceam tota facie æmuletur, angustioribus tamen folijs, & aduersa parte candidantibus. Resinam fundit liquidam, larigna similem, quam lachrymam abiegnam vocant: splendidiore tamen, & gustatu amariorem, ac odoratiorem multo. Gignitur lachryma intra corticem excitato tumore, quo resecto, collachrymat. Annoſæ arbores incanæ spectantur, ob dependentes vndiq; mulcicommas.

LOCVS.

MATT. Nascitur in altis montibus, inter larices, & Piceas.

QUALITATES.

MATT. Cortex exiccat Piceæ, & Pinus modo. Lachryma verò magis quàm Larigna exalfacit, & eadem præstat valentius. glutinat mirificè recentia vulnera, & præsertim caluarie, vbi tamen cerebri membrana haud detecta appareat. Iuuat sumpta semunciæ pondere Ischiadicos, podagricos, ac calculosos: quin & Asthmaticos, suspiriosos, ac purulentos.



* ABIETIS

* AEIETIS PARTICVLÆ.



Particulas hasce separati^m exhibere volui vt abundè satisfaceret herbariæ reistitudo. A. Ramulus est cum folijs veteribus & nouis, & squammulis quoq; circa initia surculorum nouorum. B. Flores crocei, bicolores, qui paulò ante solstitium emergūt. C. Conus nouellus & imperfectus. D. Con^o perfectus, qui sursum versus cre- scit, minime pendulus, aperiturque vere, decidit verò rursus ex arbore quando folia incipiūt emergere. E. Coni scapus à laminis nudus. F. Laminæ coni, item lingu- læ, nucleus, & semen. *

D LENTI-

LENTISCVS. Græcis *Σκῆνος*.] Mauritanis, *Dara*.] Italis, *Lentisco*.] Hispanis, *Mata aut Arueira*.] Gallis, *Lentig*.] Germanis, *Mastixbaum*.

FORMA.

MATT. Folijs est Myrto proximis, ostionis exvno processu prodeuntibus, saturatè virentibus, ac perpetuis: cortice subrufo. Fructum profert racemosum, rubentemque invuè modum, è quo oleum elicitur: corniculos quoque gignit, in quibus liquor est limpidus, pusillis refertus culicibus. Resinam quoque fundit, quam Mastichen vocant, grumofam, duramque, sed omnium præstantissimam.

LOCVS.

Idem. Nasceitur plurima in Chio, Creta, Cypro, & alijs Aegæi maris insulis: quin etiam in Italia, & præsertim in Hetruria, & Campania.

QUALITATES.

Gale. li. 7. Planta exicat secundo or-
fimp. mc. dine completo, aut tertio in-
DIOSC cipiente: in caliditatis autem
& frigiditatis differentia, medium tenet, adstringit, roborat, resoluit. Resina hæc omnia potest, at præter hæc emollit, & exalfacit.

LENTISCVS.



VIRES.

DIOSC. Lentiscus auxiliatur sanguinem reiicientibus, dysentericis, mensum profuuijs sedisque & vteri procurrentijs. Idem caua vlcera explet, ossa ferruminat, vrinam pellit, dentes commotos firmat. Oleum è baccis pressum adstringit, & præscripta omnia potest. Resina autem præter hæc peculiariter tussi veteri medetur, stomachichos iuuat, & durities emollit. Eadem commansa pituitam elicit, & halitum commendat. Articulorum frigidis dolores tollit atque mulcet, si cum cumino, salvia, & Lauri baccis illinatur.

TEREBIN-

NOMINA.

51

TEREBINTHVS, Græcis *τέριυνθος*.] Arabibus, *Baton, Botin, aut Albotin*.] Italis, *Terebinto*.] Gallis, *Terbentin*.

TEREBINTHVS.



FORMA.

Folij est Fraxini, crassio- MATT. ribus, pinguioribus, & rotundioribus, Cotino proximis: materie Lentisco haud ab simili, perinde ac cortice. Floret oleo modo, & fructus rubentes, racemosque gerit: cornicula quoque edit rubentia, caprinis haud minora, liquore quodam, & culicibus referta: ut in Lentisco. Resinam fundit liquidam & odoratam, Larignæ aut Abiegnæ similem, ceterisque præstantiorem, Lentiscina excepta.

LOCVS.

Provenit in Syria, Cy- DIOSC. pro, Lapidia, & multis Italiæ MATT. locis: habetur & Romæ, in antiquarum domorum ruinis. Nascitur & in Tridentinis montibus: saxosa enim & calida amat loca.

QUALITATES.

Folia, cortex, & fructus Galen. 3. excofaciunt, & siccant ordine secundo, adstringunt, roborant, repellunt, con- sim. med. trahunt. Resina verò excofacit, extrahit, emollit, abstergit, deijcit. MATT.

VIRES.

Aridæ bacæ potæ vrinam cient, & lienosos iuuât. Resina hausta vnciæ pon- Gal. dere renes expedit, & vesicam, & articulorum morbis auxiliatur. Medetur ea- DIOSC. dem delincta tussientibus, tabidis, suppuratisque, crassa, purulentaque expectorât: scabiem & lepram sanat, aluum emollit, vrinâ cit, vulnera & vlcera purgat, & carne replet. Additur in antidotis.

D 2 CVPRES-

CYPRESSVS, Græcis *κνμάριος*.] Arabibus, *Saro*, sine *Sero*.] Italis, *Cipresso*.] Gal-
lis, *Cypres*.] Germanis, *Cipressen*.] Hispanis, *Cipres*.] Boëmis, *Cyp: ijs*.

GENERA.

Duum est generum. Mas
alterum, alterum Fœmina.
Hæc fastigiato est culmine.
Illa ramos in latum spargit.

FORMA.

MATT. Vtraq; procera rectaque,
candice glabro, & ramos in
summitate tantum habens.
Folijs virescens perperuis, Sabinæ
bacciferæ proximis. Con-
nos gerit Lariceis æmulos,
solidiores tamē compactio-
resque, in quibus minutum
concluditur semē. Resinam
fundit liquidā sed modicam,
odore haud ingrato. Ligni
materies solida, spectabilis,
& suaviter odorata.

LOCVS.

Idem. Plurima in Creta sponte
nascitur, aquosos odit tra-
ctus, & colles, & mōtes amat.

QUALITATES.

Galen. 7. Coni folia & germina ex-
simp. me. iccant, absq; insigni acrimo-
nia, & per quā moderatē ex-
calfaciūt. Adstringit Cupres-
sus omnib. suis partibus, ro-
borat, glutinat, & resoluit.



VIRES.

Diosc. Folia ex passlo & mirrhæ exiguo pota, vesicæ rheumatismis, & vrinæ difficul-
tati auxiliantur: pilulæ autem ex vino tuscæ dantur commodissimè potandæ dif-
entericis, tussientibus & orthopnea affectis, sanguinemque reijcientibus. En-
terocellas tam potu, quam illitu reprimunt. Pilulæ, cum arboris coma suffite,
culices abigunt: folia trita & imposita vulnera conglutinant. Sanguinē suppri-
munt: trita ex aceto capillum tingunt. Illinuntur per se, aut cum hordeacea fa-
rina, ignibus sacris, vlceribus, quæ serpunt, carbunculis, & oculorum inflam-
mationibus: ad mora cum cerato stomachum corroborant. Pilularū decoctum
ex aceto paratum dentium rheumatismos cohibet. Earundem & mulorum
vnguium cinis oleo myrtino exceptus opitulatur illitis capillorum defluuijs.

LYNIP-

NOMINA.

53

IVNIPERVS, Græcis, *ἰουνiperός*.] Arabibus, *Arconas*, *sive Archenchas*.] Italis, *Ginepro*.] Germanis, *Wettholster* *sive Krametbaum*.] Hispanis, *Enebro*.] Gallis, *Genevre*.] Boëmis, *lalaunec*.] Polonis, *Zolaunec*.

IVNIPERVS.

GENERA.

Duo eius genera: Alterum DIOSC. maius, alterum minus.

FORMA.

Folio utraq; est aculeato, MATT. longiusculo, & angusto: ligni materies dura, compactaq; ac odorata: Baccas edit ceruleas, copiosas, erui magnitudine, odore haud ingrato: Resinam quoq; fundit mastiche haud absimilem, quam Arabes Sandaracem vocant.

LOCVS.

Nascitur in collibus, ac et- Pli. lib. 16. iam montibus, arido præfer- cap. 18. tim tractu:

QUALITATES.

Excalfacit & siccatur ordine Galen. 6. tertio: Baccæ tamen siccant simp. mc. ordine tantum primo. At- MATT. tenuat, aperit, digerit, resolu- uit, adstringit, roborat.

VIRE.

Bibuntur folia, aut eorum MATT.

succus vtiliter contra Viperarum morsus. Earundem decoctum menses elicit, & vrinas: Baccæ stomacho viles: Præstant eadem contra pectoris vitia, tussim, inflationesque. Resina suffita, aut aspersa destillationes sistit: hausta verò mensium abundantiam cohibet, tineas ventris necat, resolutis nervis medetur. & sanguinis excreationes suppressit, quin etiam fluentes hæmorrhoidas: In solutionibus dentium addita dolorem mulcet, quod & baccarum decoctum ex vino efficit. Carbores è Iuniperi ligno paratos, & suo ipsius cinere sepultos, integro anno ignem fouere Chymistæ promittunt.

D 3

*IVNIPER-



*LYNIPERVVS maior, in Galloprouincia Cade vocata.

LYNIPERVVS MAIOR.

FORMA.

Folio est alterius Iuniperi maiore, acuto, pungēte, bacca triplo maiore, resinosa. Lignum suavis est odoris, & liquorem exudat, Oleum de Cade dictum.

Locvs.

Vulgatissima est in Galloprouincia, necnon in pluribus Italiae locis.

QUALITATES
ET VIRES.

Pollet ijsdem quibus præcedens.

APPENDIX.

MATT. Pauci admodum sunt, qui non putent Oxycedrum esse Iuniperum maiorem, adeo vt plerique vulgarium illam ab hac nesciāt distinguere.*



SABINA.

NOMINA.

SABINA, Græcis, *Σάβινα*] Arabibus, *Abel, abehel, siue Alhorar.*] Italis, *Sabina, & Sabinna.*] Germanis, *Sebenbaum.*] Hispanis, *Sabina.*] Gallis, *Sauinier.*] Boëmis, *Klasterka, chnuogka.*] Polonis, *Szauina.*

SABINA.

GENERA.

Genera duo: Alterum frugiferum, alterum sterile. DIOSC. MATT.

FORMA.

Fructifera folijs exit Myrica crassioribus, minimè aculeatis. Differètia in baccis. In altera enim caruleæ, in altera rubentes spectantur. DIOSC. MATT.

LOCVS.

Seritur in apricis, & collibus, in hortis, & viridarijs, ac etiam sponte per se prouenit. MATT.

QUALITATES.

Tenuium maximè est partium: Excalfacit, & siccatur sine, med. dine tertio: gustu acri & amaro, & adstringente. Digerit, resoluit, aperit, prouocat, abstergit, penetrat, sitim accendit. Gale. li. 6. MATT.

VIRES.

Vinam sanguinolentam ducit, menses elicit: sætum interficit, ac etiam ex pellit, cum pota, tum suffita. Vtriusque folia nomas cohibent, vlcera in capibus puerorum manantia sanât, foliorum puluere, & butyro bubulo illito: Suffita gallinarum pituitam, & grauedinem excutit. Ex butyro & melle delincta, asthmaticis medetur. Nigra & fordida vlcera cum melle purgat. Additur quoque multis in antidotis. DIOSC. Gal. libid. MATT.

CENSURA.

Qui Sabinam bacciferam non concedunt, apertè delirant.

D 4

SABINA



SABINA Sterilis, Græcis, *ῥεγάδης* *ρεγαδινός*.] Italis, *Sauina sterile*.

SABINA STERILIS.

FORMA.

MATT. Vulgaris est notitiæ, folijs cupressi ferè similibus, sed acuto pungentiq̃ue cacumine, grauitè olentibus, amariusculis, feruentibusq̃ue.

LOCVS.

Idem. Nascitur in apricis, & feritur quoque in hortis & viridarijs.

QUALITATES
ET VIRES.


Idem. Non adeò multum differt à baccifera, verùm tum acrior est, tum quoque graueolentior: Excalfacit, & siccatur tamen valentius. Digerit, resoluit, aperit, abstergit, prouocat, & parumper adstringit.



CEDRVS,

CEDRVS, Græcis, Κέδρος.] Arabibus, Serbin.] Italis, Cedro.] Resina autem eius Latinis, Cedria, Græcis, Κεδρία.] Arabibus, Kitran, Sut, Alkitran.] Italis, Cedria.

CEDRVS.



GENERA.

Duum generum est: Maius MATT. videlicet & minus. Maioris generis duo, quemadmodum & minoris.

FORMA.

Procera arbor est, Abieti Idem, perquam similis. Quæ in maioris genere floret, fructū non fert. Altera verò contra, nunquam floret, sed conos tamen profert cupressi longè maiores. Resinam fundit laudatissimam. Ligni materies æterna.

LOCVS.

Maior in Syria, Iudæaque MATT. prouenit, & præsertim in Libano monte.

QUALITATES.

Vtraque est calida, sicca. Galen. 7. que temperatura, tertio quodammodo ordine secundum vtranque: At Cedria quantum ferè gradum attingere videtur, abundè calida simul, & tenuium partium. Eadem at- MATT.

tenuat, digerit, resoluit, expellit, putrefacit.

VIRES.

Cedria infusa defuncta corpora conseruat, & viua putrefacit: additur oculis medicamentis, magno iuuamentò. Vermes aurium necat: cauis dentium indita eos frangit, & dolores leuat. Conceptum impedit inuncto ex ea genitali ante coitum: pediculos illitu enecat: pulmonum vlcera purgat, & obesos extenuat.

CEDRVS PHOENICIA, Græcis, ἐξέχεδος.] Italis, *Cedro minore*.

CEDRVS PHOENICIA.

FORMA.

Gale. li. 7. Arbor est Iunipero per o-
simp. mc. mnia similis. Sed maioribus
folijs aculeatisq; baccis qua-
druplo maioribus, colore au-
reo rufescente, sapore dolci,
esui haud ingrato.

LOCVS.

MATT. Nascitur in Iapidæ mon-
tibus, non longè à Pefino op-
pido.

QUALITATES.

Gal. lib. 7. Excalfacit, & siccit ordine
simp. mc. ferè tertio. Aperit, prouo-
cat, resoluit, digerit.

VIRES.

DIOSC. Baccæ stomacho aduersan-
tur: auxiliantur tamen tussien-
tibus, conuulsis, & urinæ stil-
licidio laborantibus. Eadem
cum pipere potæ menses du-
cunt. Sumuntur quoque contra leporem marinum, ex vino. Inunctæ toti cor-
pori ex ceruina medulla, aut adipe: à serpentibus hominem tutum reddunt.
Ideoque bellè adduntur in Antidota.



LYCIA

N O M I N A.

LYCIA Cedrus, Græcis, Κέδρος λυκία.] Italis, Cedro Lycio.

39

LYCIA CEDRVS.



FORMA.

Folijis cōstat Phœnicia: Ion MATT.
gè minoribus, frequentiori-
busque longè minus aculea-
tis, ita vt Iuniperum parum
quadantenus referat. Eadē, si
digitis atterantur non insua-
uem spirant odorem, talis e-
nim habetur, qualis ferè in pi-
neorum strobilis percipitur.
Cortice caudex obducitur
subrufo: ramos emittit len-
tos, vitilium instar: baccas ge-
rit alterius, minores, ruben-
tesque, amaro sapore: odore
non ingrato.

Locvs.

Nascitur in quibusdā Mo- Idem,
rauiæ montibus.

QUALITATES.

Excalfacit & siccatur, minus Idem,
tamen quàm Oxycedrus.

VIREs.

Eadem ferè omnia præstat quæ Oxycedrus, sed non adeo valenter.

Idem.

LAVRVS,

LAVRVS, Græcis, Δάφνη.] Arabibus, *Gaur*, siue *Gar*.] Italis, *Lauro*.] Germanis, *Sorberbaum*.] Hispanis, *Lauret*, siue *Laurerio*.] Gallis, *Laurier*.] Boëmis, *Bobeck*.

LAVRVS.

GENERA.

DIOSC. Laurus quædam tenui folio constat, altera latiore.

FORMA.

MATT. Vtraque folia habet oblonga, lata, in acutum desinētia, solida & odorata: flores utriusque tenues, muscosi que: Baccas oliuius haud dissimiles: è quibus Laurinum fit oleum.

LOCVS.

Idem. Nasceitur in apricis nō longè à mari, & circa amēnos lacus, quod frigoris & algoris sit impatiens. In Italia copiosa in hortis, viridarijs, & collibus feritur, ac etiam per se nascitur.

Gale. li. 6.
simp. mc.

QUALITATES.

Folia & baccæ excalfaciunt, & siccāt vehementer, atque hæc quoque magis quàm illa. Radicis autē cortex non nihil adstringit, & minus acris est, & minus calida.

MATT. Laurus attenuat, aperit, prouocat, incidit, emollit, digerit, flatus pellit.



VIRES.

DIOSC. Opitulatur fori omnes lauri partes vuluæ, & vesicæ vitijs. Baccæ tritæ, & melle, aut passō exceptæ, delinctæque, auxiliantur omnibus thoracis rheumatismis. Dantur contra Scorpionum ictus: Illitæ vitilignes emaculāt. Earundem succus vtilissimè aurium dolori, & grauitati instillatur, cum vino vetere, & rosaceo. Radicis cortex pota, calculos rumpit, & partus necat. Septem lauri baccæ à prægnantibus propediem parituris, cum se dormitum recipiunt deuorata, facilem, fœlicemque partum præstant.

MATT. Laurus attenuat, aperit, prouocat, incidit, emollit, digerit, flatus pellit.

* 1 INVS

* TINVS. Laurus Sylvestris, Catoni Laurus Syluatica. Græcè *Δάφνη ἀγρία*.] Italis, *Lauro saluatico*, *Lauro regia*, *Lentagine*.] Brutijs, *Moleſſo*.] Hispanis, *Vua de perro*, *Follade*, *Durillo*.

TINVS.



FORMA.

Est cærulea bacca. Vuarū granulis simili in Corymbacea umbella copiosè disposita, sapore acerbo, tenui pericarpio, tenui quoque crusta seminis, quam præcedit flos ex albo purpurascēs, ramulorum summitates obtinens. Ipsa stirps lauro humilior est, in alas diuisis ramis longiusculis articulatis, quibus adnascuntur folia ordine distincta eo, ut semper gemina sibi inuicem opponantur, Laurina fere, nitētia, inodora tamen & lata, lanugine tenuissima pubescentia.

Plin.

LOCVS.

Peregrina nobis hæc stirps est, in paucorum hortis conspicua. Italiæ ac Hispaniæ agri & alię forte regiones huius feraces sunt, in primis verò ea sylvæ Hetruriæ abundant.

VIRE.

Nemo veterum harum meminit, nec recentiorum quispiam.*

PLATA-

PLATANVS, Græcis, *πλατάνος*.] Arabibus, *Dalb.*] Italis, *Platano.*] Gallis, *Plan.* si-
ue *Plane.*

PLATANVS.

FORMA.

MATT. Procera, ramosa^{que} arbor
Platanus est, folio vitigineo,
crassiore, inferna parte albi-
cante: Cortice vestitur crasso,
subcandicante. Flosculos edit
tenuēs, pallidosq; baccis ro-
tundis, scabris: longo à pedi-
culo dependentibus.

Locvs.

Plin. Amat flumina & fontes, et-
si vini irrigatione plurimum
gaudeat.

QUALITATES.

Gale. li. 8. Platanus humidioris, frigi-
dioris^{que} essentia est, non ita
multò quam symmetra: At-
qui cortex, & pilulæ magis ex-
iccant.

VIRES.

Tenera folia prohibet, re-
soluunt, reprimunt, & phleg-
monas nascentes adiuuant: in
vino autem decocta & illita, oculorum fluxiones sistunt: corticis decocto exa-
ceto parato vtiliter colluuntur in dolore dentes: Virides pilulæ in vino potæ
serpentium moribus auxiliantur. Exceptæ autem adipe igni ambusta sanant.

*ACER



* ACER maior, nonnullis Platanus Germanica, alijs Carpinus Plinij. Græcis, σφένδαμνος. Germanis, Ahorn/ Waldschern. Gallis, Plafne.

ACER MAIOR.



GENERA.

Tria sunt Aceris genera: ma Theop. ior Sphendamnus dicitur, minor Glinos, & tertium genus est κλινότροχος.

FORMA.

Maior pulchra arbore est & procera, cortice mediocriter leui, materia interiore tenera & tractabili, ramos expandit plures, quibus folia lata, vitiginea, pediculo rubete annectuntur, flores confertim dependent ex viridi flauescetes, quibus succedunt fructus alati gemelli vni pediculo exaduerso adhaerentes.

LOCVS.

Montib. gaudet, sed & planis & campestribus assuescit.

FACULTATES & VIRES.

Aceris radix contusa ioci Plin.

moris doloribus efficacissime imponitur.

Si latus immeritum morbo tentatur acuto,

Aceris radicem tundis & vna

Cum vino capis, hoc praesens medicamen habetur.*

Sere, Sam,

FRAXI-

FRAXINVS, Græcis, *μελίζα*.] Italis, *Frasino*.] Germanis, *Eſchenbaum*.] Hispanis, *Fraſno*.] Gallis, *Frefne*.] Boëmis, *Gelin*.] Polonis, *Zefion*.

GENERA.

Theophr. Genera cius duo: Excelsum
lib. 3. c. 11. alternum, ac procerum. Alte-
de hift. ri humilium, & minus auſtile.
plant.

FORMA.

Idem. Excelsum lignū habet can-
didum, crassiuentum, nerua-
tum, mollius, enodius, ac cri-
spius. Humile verò scabrius,
durius, & flauius. Vtraque fo-
lijs est laurinis haud abſimilis,
angustioribus tamen, & sen-
sim per ambitum ferratis, for-

MATT. bimodo prodeuntibus. Fru-
ctum fert in ſilijs linguæ a-
uicularum ſimilem, ſubru-
brum, & gultu amarifculo,
ac medicato.*Præter fructum
alia quædam fert, vt muſcos in
globum coactos ſpecie pillu-
larum.*

LOCVS.

MATT. Nascitur in mōtibus & cli-
uosis ſyluis.

QUALITATES.

Idem. Excalfacit & ſiccit, adſtrin-
git, reſoluit, abſtergit, atte-
nuat.

FRAXINVS.



VIREs.

Dioſco. Folia, aut earum ſuccus ex vino pota, viperarum morſibus medentur. Spu-
MATT. ma è viridi ligno manans dum incenditur, addito cyclamini, & rutæ ſucco: o-
mnibus ſimul parumper calefactis ſurditati auxiliantur, ſi in aurem ſanam in-
fundantur, dum ſe cubitum recipit æger. Corticis recentis decoctum potum
lienem abſumit. Fructus datur vtiliter potandus in lateris dolore, & ad vri-
nam ciendam. Idem venerem excitat, & in furno ſiccatus, potuſque calculoſis
auxiliatur.

POPVLVS

POPVLVS alba, Græcis, *Αλευν*. Arabibus, *Haur*. Italis, *Populo bianco*. Germanis, *Bellen Poppelbaum*. Hispanis, *alame blanco*. Gallis, *Peuplier*.

POPVLVS ALBA.



GENERA.

Tria populi sunt genera: MATT.
Alba de qua nunc sermo est,
Nigra, & Lybica, siue Alpina.

FORMA.

Alba arbor est procera, cras Idem.
so cortice, sed læui. Folia sunt
illi vitiginea, inferna parte
maximè albicantia, ac lanugi-
nosa. Infrugifera arbor est.

LOCVS.

Nascitur circa flumina, & Idem,
vliginoso tractu.

QUALITATES.

Mistæ quodammodo tem- Gale. li. 7.
peraturæ est, ex aqua tepida, & simp. me.
terrena extenuante essentia,
quin etiam abstergentis facul-
tatis est particeps.

VIRES.

Cortex vnciæ pondere potus subuenit Ischiadicis, & vrinæ stillicidio: cum DIOSC.
mulino irene haustus, sterilitatem inducit. Idem præstant etiam folia à purga-
tione ex vino pota: Instillatur vtiliter foliorum succus in aurium doloribus.
Gemmarum quæ primo foliorum partu extuberant, ex melle illitæ hebetes oculo-
s iuuant. Tam albæ quàm nigre cortex particulatim incisus, & sulcis sterco-
ratis obrutus, quocunque anni tempore edules fungos profert. Idem præstat MATT.
alba populus humotenus secta, & aqua calida, quæ fermentum exceperit, per-
fusa: infra quatrimum enim fungos dabit, esui quàm gratissimos.

E POPVLVS

POPVLVS Nigra, Græcis, *αἰγιόγος*. Arabibus, *alhurioni*. Italis *Populus nigra*. Germanis, *Aspen*/huc *Pepel Weiden*. Hispanis, *Alamo*, *Nigrolio*. Galles, *Tremle*.

POPVLVS NIGRA.

FORMA.

MATT. Nigra albâ proceritate superat: folio est hederaceo, nō tamen vt in alba dissecto, sensim per ambitum serrato, apice in acutum desinente. Fructum fert racemosum, baccis Erui magnitudine, in quibus copiosa, albaque lanugo concluditur. Cortex est illi cinereus, crassusque: Materie alba ac contumaci, ad ædium & utensilium fabricas idonea.

Locvs.

MATT. Nasceitur in flumiorum ripis, & scrobium aggeribus.

QUALITATES.

Gale. li. 6.
sim, med.

Flores exalfaciant ordine primo, in desiccando verò & humectando, parum temperatis, & medijs ad siccius deflexerunt. Verum subtiliū potius quàm crassarum sunt partium. Folia autem quodammodo floribus similia sunt, verum imbecilliora. Flores & folia digerunt, resoluunt, & attenuant: quæ omnia efficacius præstat refina.

VIRES.

DIOSC. Folia recentia ex aceto illita podagricos iuuant. Baccæ ex aceto potæ comi-

MATT. tialibus auxiliantur. Prima erumpentia germina odorata sunt, & glutinosa: conciliant eadem capillorum nitorem, ijs contusis cum recenti butyro, insolatis, & illitis.

POPVLVS



POPVLVS Lybica, siue Alpina, Græcis, *νεγκις*. Italis, *Popolo montana*.

POPVLVS LYBICA.

FORMA.

Folio est cæteris tenuiore, MATT.
rotundiore, angulosoq; pun-
ctim albis notis consperso, te-
nuiq; pediculo appenso, con-
tinuò ferè se mouente, etiam
si nullus in aëre spiritus sen-
tiatur. Caudice est cæteris bre-
uiore, nigrioreq; cortice ve-
stito, & materie imbecilliore,
alba tamen & tenaci: Fructum
nullum fert nec flores.

LOCVS.

Nascitur in montium syl. Idem,
uis, & syluestribus locis.


QUALITATES.

Qualitates illi sunt quales MATT.
& cæteris generibus.

VIRES.

Folia eadem præstant, quæ Idem,
Nigræ, non tamen adeò sunt
efficacia.

E 1 ALNVS,



ALNVS, Græcis, *αλνθα*. Italis, *Alno*, *Onio* *Onizo*, & *Auno*. Germanis, *Erlenbaum*. Gallis, *Auno*. Boemis, *Vuolfa*. Polonis, *Olfa*.

ALNVS.

FORMA.

MATT. Folio est coryli, crassiore cortice scabro, materie molli, rubente. Fructum fert viridem, oblongum, moris forma similem, squamosumq; maturescit autumnino, minuto intus semine, fuluo colore.

LOCVS.

Theophr. Nascitur secus flumina, & vliginoso tractu.

QUALITATES

MATT. Exiccat manifestè, sed in frigiditate & caliditate, parum à medijs abest.

VIRE.

MATT. Folia resoluunt, restringunt, delassatosque recreant. Cortex verò præter hæc corroborat. Folia recentia illita tumores absumunt. Eadem pedum plantis supposita fatigatos viatores iuvant. Pulices necant rore matutino aspersa, & in cubiculis sparsa. Cortex, quod magis astringat, usurpatur gallæ vice ad coria inficienda. Sunt etiam qui eo vnà cum fructu vtantur pro galla ad scriptorium atramentum parandum. Expetuntur pali ex alno parati ad ædificiorum fundamenta, quæ in fluminibus & aquosis locis struuntur, quod in aqua nunquam putrescant.

BETVLA



BETULA, Græcis, *Σκῦδα*. Italis, *Bettola*, *Betula*, & *Bidello*. Germanis, *Brefen*.
Boëmis, *Brikg*.

BETULA.



FORMA.

Folijs exit, nigra populi MATT.
haud absimilibus, per ambi-
tum serratis. lulos edit, ut Co-
rylus: sed fructū nullum. cor-
tex illi albus, membranofus-
que, bituminofus, & pinguis.
Materies candida, flexilis, ac
tenax, caudice terebro perfo-
rato, aqua clarissima, copiosa-
que distillat, & potu non in-
grato.

LOCVS.

Nascitur in sylvis Septen- Idem.
trionalibus, præsertim locis
frigidis, ac niuosis.

QUALITATES.

Folia excalfaciunt, & sic Idem.
cant, resoluunt, attenuant,
abstergunt, aperiunt, & ama-
ra sunt. Cortex verò, quod bi-
tuminofus sit, excalfacit, & e-
molliit.

VIRES.

Aqua quæ è perforato caudice distillat, cum renum, tum vesicæ calculos eij- Idem.
cit. Illita faciei nitorem conciliat, & maculas delet. Eadem oris vlcera sanat. Fo-
liorum succus coagulo admixtus, cascum à teredine & vermibus præseruat. Li-
gni materies ad cingenda vinaria vasa peridonea est. Alpini è corticibus con-
uolutis nocturnas faces parant: Bituminosi enim cum sint, nō minus quàm tæ-
da flagrant, & incenduntur: optimi quoq; è Betula parantur carbonēs ad fun-
denda metalla peridonei.

VLMVS, Græcis, *ῥαλέα*. Arabibus, *Didar*, *sive Lu Zich*. Italis, *Olmo*. Germanis, *Bämen*. *Rüstenholz*. Hispanis, *Vlme*. Gallis, *Orme*.

V L M V S.

G E N E R A.

Theoph. Campestris, & Montana, quam Græci, *ῥεραπεύειαν* vocant.

F O R M A.

Theoph. Montana rectior, auctior, ac procerior. Campestris fruticosior. Vtraque folium habet crispum, asperum, leuiter circum ferratum oblongumq;

MATT. Folliculos profert magnos, numerosos, crispas, humani feroti ferè effigie, lento, clarioq; liquore refertos, culicibus quoq; numerosis conclusis. Ligni materies nervosa, tenax, robusta, non tamen speciosa. Montana siliquas & semen profert. Cortex exterior illis est asper crassusq;, interior verò qui lignum ambit, lori modò lentus.

L O C V S.

Theoph. Montana in montibus; Plin. campestris, in campestribus locis habetur.

Q U A L I T A T E S.

Gal. Folia, & cortex adstringunt,

MATT. inspissant, abstergunt, resoluunt, emolliunt, glutinant.

V I R E S.

DIOSC. Crassior cortex ex vino vnciatim potus pituitas, & aquas trahit. Fouentur vitiliter fracta ossa, foliorum, & radicum corticis decocto. Humor è medulla ca-

MATT. strate arboris, defluentem capillum reddit, & continet ne fluat illitus. Liquer in folliculis contentus vitreo vase exceptus sepelitur in fimo equino calido, sale vasi substrato, viginti quinque diebus, quo postea vulnera celeriter sanantur, si cum splenijs illinantur. Quin etiam puerorum, adolescentiumque enterocelas sanat.

CARPI-



NOMINA.

CARPINVS, Græcis, *Καρπίνος*. Italis, *Carpino*.

71

CARPINVS.

FORMA.



Arbor est folijsvlmo proxi- MATT.
mis, tenuioribus tamen; caudi-
ce procero, cortice subalbi-
cante, scabro: ramis copiosis,
robustis, foliosis patulisq;. Ex
his per Æstatē petioli quidam
pendent, è quibus triquetra
quædam folia subpallida cir-
cumqua; racematim exeunt,
quorum medius apex, cæteros
longitudine superat, & inter
hos parua quædam capitula
spectantur, ciceris magnitudi-
ne, aut paulo maiora, in quibus
semen. Radicibus nititur fir-
mis, crassisque. Ligni materies
alba, solida, tenaxq;, è quibus
iuga boum villici parant.

LOCVS.

Crescit passim in omnibus Idem.
fere syluis.

QUALITATES, ET VIRES.

Qualitates, atq; vires, nemo est (quod sciuerim viderimq;) qui describat. Idem.

E 4 ARVN-

ARVND. Græcis, Κάλαμος. Arabibus, *Casab.* Italis, *Canna.* Germanis, *Rhor.* Hispanis, *Canas.* Gallis, *Cannes siue Roseaux.*

ARVND.

GENERA.

MATT. Domestica, quæ seritur, & Aquatica spontè proueniens, quanquam Plinio Arundinū 29. describantur genera.

FORMA.

Idem.

Satiua, quæ à radicum geniculis seritur, ad vitiū palos, ad decem cubitorum altitudinē adolefcit, robusta, ac firma, intus tamen inanis, compactis per interualla geniculis: corrice squamoso, aspero, subalbicantē. Folia habet longa milij Indici similia, aspera vbiq; superficie: & acuta circumferentia. Radix illi est albicans, dura, tuberosa, contorta, informis, geniculataq;. Secantur quotannis humotenus: sectæq; illico regerminant.

Locvs.

Idem.

Domestica in imis vinearum locis seritur. Vliginoso præsertim solo: Aquatica autem sponte prouenit, cum stagnantibus aquis, tum quoque in fluminibus, & mari.

QUALITATES.

Gale. li. 7. Cortex adustus excalfacit ordine tertio, ac etiam plus siccatur. Viridia folia resimp. mc. frigerant. Folia & cortex adstringunt, abstergunt, & corroborant: radix verò attrahit.

VIREs.

DIOSC. Folia tusa & imposita, ignibus sacris medentur. Corticis cinere sanatur alopecia. Radix pota menses & vrinas ciet. Eadē recens tusa, & illita scorpionum ictibus auxiliatur, quin etiam aculeos, & alia corporibus infixis extrahit.

ARVND.



NOMINA.

73

ARVNDOPALUSTRIS, Græcis, Κάλανος ἐλῆιος. Italis, Cannella, & cannuccia aquatica. MATT.

ARVNDOPALUSTRIS.

FORMA.

Calamo est tenui, geniculato, læuibus internodijs, inani ac fragili, folijs longis, asperis, & per ambitum acutis: paniculis in summitate comosis tactu mollibus, læuibusque.

LOCVS.

Prouenit sponte in paludibus, lacubus, & cæteris stagnantibus aquis.

FACULTATES,
ET VIRES.

Vires sunt illi eadem, quæ Idem, & cæteris generibus.



E 5

MYRICA

MYRICA siue Tamarix, Græcis, *Μοΐρα*. Arabibus, *Tarfa*, seu *Carfa*. Italis, *Tamarigo*. Germanis, *Tamarisfen*. Hispanis, *Tamargueira*, siue *Tamaru*. Gallis, *Tamarisc*.

MYRICA.

GENERA.

DIOSC. Duum est generum. Urbani & sylvestre.

FORMA.

DIOSC. Urbana, folijs est cupressi
MATT. viridioribus: Fructumq; gerit
gallæ similem, & in altum ar-
borescit. Sylvestris folia ha-
bet Sabinæ bacciferæ similia,
tenuiora tamen, ac magis vi-
rentia, fructum quasi florem
ferens compage muscosum.

LOCVS.

DIOSC. Urbana, in Ægypto & Syria
prouenit: Sylvestris in fluui-
orum alucis fruticat.

QUALITATES.

Gal. lib. 6. Abstergetis est, ac inciden-
simp. mc. tis facultatis, absq; perspicua
dificcatione: & adstrictionem
nonnullam habet.

VIRES.

DIOSC. Domesticæ fructus datur vtiliter cruenta expuentibus, celiacis, & contra
feminarum profluua, regium morbum, & phalangiorum morsus. Illitus tu-
mores inhihet, Vtriusq; cortex in eisdem vsus adhibetur. Foliorum decoctum
potum ex vino lienem absomit, dentiumq; dolorem collutione sedat, & in de-
fessionibus muliebria cohibet. Sarmetorum cinis aspersus ambusta sanat. Ra-
mi concisi, & ex aceto illiti lienem attenuant. Cortex potus alui fluxiones fi-
stis: Radicum decoctum diutius cum passis viuis potum, lienosam elephantia-
sim curat.

ERICA



NOMINA.

75

ERICA, Græcis, *ἐρίκη*. Italis, *Erica*. Germanis, *Seident*. Hispanis, *Queiro*. Gal-
lis, *Bruyere*.

ERICA.



FORMA.

Frutex est non multū à My- Pli. lib. 24.
rica differens, colore rosifima- cap. 9.
rini, & penè folio, floret bis in
anno, Vere scilicet, & Autum-
no, floribus parvis, copiosis,
subrubentibus.

LOSVS.

Nascitur in aridis, in cam- MATT.
pestribus, collibus, & sylvis.

QUALITATES.

Digerendi per halitum fa- Gale. li. 6.
cultatem habet. sinap. mc.

VIRES.

Folia & flores. serpentium DIOSC.
ictibus illitu medentur. FO. MATT.
liorum & florum decoctum
quinq; vnciarum pōdere die-
bus triginta potum, vesicæ cal-
culos frangit, idque facilius
succedit, si à trigesimo die in
balneo eiusdem decocti sederint affecti aliquot diebus continuis, & super ipsa
Erica decocta sederint. Florum decoctum potum lumbricorum, & ventris do-
loribus medetur: foliorum succus impositus oculorum imbecillitati succurrit.

ERICA.

ERICA altera, Italis, Erica secunda.

ERICA ALTERA.

FORMA.

MATT. Ramos edit tennes, folijs alterius longioribus, acutioribusque, angustis, ac numerosioribus, quibus circumquaque ramuli stipantur. Flores edit paruos rubentesque.

LOCVS.

Idem. Nascitur arido solo, & in cellibus apricis, & montibus non valde excelsis.

QUALITATES,
ET VIRES.

Idem. Si hæc planta Erica est: Ericæ facultatibus proculdubio insignitur.

CENSURA.

Idem. An hæc planta Erica legitima sit, aliorum indicio relinqu.



ERICA

ERICA BACCIFERA, Matthiolo.

ERICA BACCIFERA.

FORMA.


Procumbit hæc planta humi, & latas MATT.
occupat areas, folijs penè vulgaris Ericæ:
Baccas edit in purpura nigricantes, iuni-
perinis non absimiles, sed molliore pul-
pa, lenta, vt in prunis, quæ mense Augu-
sto maturescunt. Ramis est lignosis obse-
quiosisque.

Locvs.

Prouenit in montibus, qui Boemiam Idem.
à Silesia disternant, & à quorum fon-
tibus Albis fluuius originem ducit.

FACULTATES,
ET VIRES.

De qualitatibus & viribus, quid certi Idem.
dicam, non habeo.



· RHAMNVS

RHAMNVS, Græcis, *Páuvos*. Arabibus, *Naufig*, siue *Naufegi*. Ital. *Ramno*, siue *Marruca*. Hispanis, *Scambrones*. Gallis, *Burguespm*, siue *Neprun*.

RHAMNVS.

GENERA.

DIOSC. Trium est generum: Candidum, Candidius, Nigrum.

FORMA PRIMI.

DIOSC. Candidum ramos fert re-
MATT. ctos in acutæ spinæ modum,
folijs parvis, oblongis, sub-
pinguibus, tenuibus. Baccis
rubentibus, pisi magnitudi-
ne, cortice albo, & tenui.

Locvs.

DIOSC. Fruticat in sepibus, & fru-
tetis.

QUALITATES.

Gal. lib. 8. Desiccat, & digerit excessu
simp. mc. secundo, & refrigerat primo
completo, aut secundo inci-
piente.

VIRES.

DIOSC. Folia ignibus sacris, & serpentibus vlceribus efficaciter illinuntur.

RHAMNVS



RHAMNVS secundus, Italis, Marrucabianca.

RHAMNVS SECVNDVS.



FORMA.

Primo candidior est, folijs MATT.
falicis, auersa parte candidis,
virgis aculeatis albicantibus:
rubentibus inter folia baccis.

Locvs.

Nascitur in fruticetis, & se- Idem,
pibus.

QUALITATES,
ET VIRES.

Viribus & qualitatibus ni- DIOSC.
hil prorsus à priori genere ab-
esse videtur.

RHAMNVS

RHAMNVS Tertius. Italis, *Marruca nera*.

FORMA.

DIOSC. Nigrioribus est folijs quodantenus ad ruborem vergentibus: Ramos mittit quinum fere cubitorum, cæteris spinosiores, lævi cortice obductos, fuluo colore. Fructum edit latum candidum folliculari specie, verticillo similem, in cuius medium osficulum concluditur, in quo parvus inest nucleus. Aculei aliqui illi longi, rectique, nonnulli verò, ut rubi incurui.

LOCVS.

MATT. Nasceitur in maritimis, in campestribus, & locis incultis.

QUALITATES,
ET VIRES.

DIOSC. Folia ignibus sacris, ac serpentibus vlceribus vtiliter illinuntur. Fama est ramo huius, valvis fenestrisve imposito veneficia depelli. Eadem omnia potest, quæ Rhamnus primus.

CENSURA.

Falluntur qui putant Rhamnum tertium, esse Dioscoridis Paliurum, sed adhuc magis cæcutiunt, qui idem esse Dioscoridi adulterinum contendunt.

* RHAMNI

RHAMNVS TERTIVS.




NOMINA.

81

*RHAMNI SPECIES. Oleaster Germanicus. Germ. Weibendorn, Rheindorn/
oder Sanddorn. Batauis, Schyt bestien.

RHAMNI SPECIES.



FORMA.

Multis cinericeis furculis
assurgit hæc arbuscula, sex cu-
bitorū aut paulo procerior,
frequentius humilior, in qui-
bus folia oblonga angusta o-
leæ similia, minora tamen,
candidioraq; tenuissima la-
nugine subrus pubescentia,
superius vero in viri cinerici-
a. Flores herbacei totis ra-
mulis adnascuntur, quibus sin-
gulis deinde succedunt bac-
cæ rotundæ, Myrti aut Aspa-
ragi baccis similes, sed mino-
res, pulpa molli lutea, tenui
glabra & rufescente obdu-
cta cute. intus parua semina
insunt, oblonga, pallenti tu-
nicæ involuta. Tota stirps a-
culeis albicantibus longisq;
vndiq; vallatur, Et multifida
diffusaq; radice nititur. Ma-
teria eius à spino sola molli-
tie differt.

LOCVS.

Nascitur in Hollandiæ ac
potissimum Flandriæ mariti-
mis littoribus, & alibi in cõ-

uallibus ac iuxta profluentes amnes solo lapidoso arenosoq;. Nec deest Ger-
maniæ copiosa ad Lycum Vindeliciæ amnem & ad Danubium ab eiusdem Ly-
ci ostio vsq; ad Petras fauces per quas Danubius fluit, tribus millibus passu-
um supra Keilheimium oppidum sitas.

FACULTATES.

Acinos purgatricem habere facultatem affirmant, vnde Bataui quoq; ipsos
agnominarunt. Paratur & Rob de baccis illis, quod vehementer acidum est &
attenuans & incidens, vt berberis ferè, commendaturq; ad dysenteriam.*

F

SPINA

SPINA infectoria. Italis *Spino merlo*, *Spino Ceruino*, *sive Spino guercio*. Germanis, *Wegdorn*.

SPINA INFECTORIA.

F O R M A.

MATT. Arbuscula est non magna, folijs pyri brevioribus, & angustioribus: Ramos fundit numerosos, quorum fastigium in aculeum definit. Baccas edit copiosas ligustrinis æquales, quæ primum virides, & per maturitatem nigrae spectantur. Ligni materies exterius albicat, medullitus verò rufescit.

L O C U S.

MATT. Prouenit in sepibus, & fenicosis.

Q U A L I T A T E S.

Idem. Exoluit aluum baccarum succus, aperit, & expellit, & caloris & siccitatis haud est expers.

V I R E S.

Idem. Fit è baccarum succo medicamentum aluum exoluens, hoc modo. Sumuntur succi earundem libræ duæ, & sacchari sesquilibra, & coquantur ad Iulapij spissitudinem: demum linteolo percolantur additis Zingiberis, cinnamomi, & Caryophyllorum nonnihil, omnibus in puluerem contrusis. Huius liquoris vncia epota crassam, lentamq; pituitam ducit: Ideoq; podagricis, Ischiadicis, paralyticisque belle confert. Baccarum succo vtuntur pictores: viridem colorem inde parantes.



HALT-

NOMINA.

83

HALIMVS, Græcis ἅλῖμος. Arabibus, *Molochia*. Italis, *Halimo*, Venetis *Bidone*.

HALIMVS.

FORMA.

Ramos plures à radice fundit, lentos, DIOSC.
& obsequiosos, folijs Oliuæ pinguiori- MATT.
bus, albicantibusq;, salso sapore. Semen
profert racemosum in caulium summi-
tatibus.

LOCVS.

Nascitur maritimis locis, & circa sali- DIOSC.
nas.

QUALITATES.

Excalfacit temperatè, & exiccat, & vt Gal. 6.
cætera salia corroborat, adstringit, & ab- simp. me.
stergit. MATT.

VIRES.

Cocta ex iure, aut aqua addito oleo, MATT.
aut butyro aluum subducit: Radix cocta, DIOSC.
deuorataq; lactis vbertatem facit, & cõ-
uulsa, rupta, torminaq; mulcet. Idonea
planta est Halimus ad sepiendos horto-
rum toros, quippe obsequiosa cum sit,
facile quocunque distrahitur.

CENSURA.

An hæc planta legitima sit Dioscoridis Halimus non desunt rationes, quæ
rem dubiam reddunt.

F 1

AQVI-



AQVIFOLIUM. Italis, *Agrifolio*. Germanis, *Walddisteln* oder *Stechpalmen*.

AQVIFOLIUM.

F O R M A.

MATT. Planta est arborescens, ad acutæ spinæ magnitudinem, folijs Laurinis, perpetuis, & in toto ambitu per interval- la sinuatis, aculeatisq; car- nosis, ac læuibus. Virgas edit lentas, & obsequiosas, viridi libro vestitas: baccas rotun- das, rubentesq; rusci modo.

L O C V S.

Idem. Arborefcit in syluis, & syl- uestribus locis.

Q U A L I T A T E S.

Idem. Radices emolliunt, discutiunt, & resoluunt.

V I R E S.

Idem. Fouentur radicum deco- cto vtiliter articuli, qui pri- us luxati duritiem contraxe- runt. Idem ossa fracta ferru- minat. Id quod valérius præ- stat radicum ipsarum cortex excoctus, & illitus. Folia suspenduntur circa funes: è quibus salsæ carnes sub tecto pendent, ad arcendos mures. Sunt qui è tuso ra- dicum cortice arte quadam viscum parant ad aucupia.

C E N S V R A.

Hallucinantur qui hanc arborem Theophrasto Agriam, siue Ariam faciunt: atq; in eodem errore versantur, qui eandem existimant eiusdem esse Cratæo- gonon.

ACVTA



N O M I N A.

85

Acvta Spina, Græcis, *ἑλὲκανθος* & *ἑλὲκανθα*. Arabibus, *Ambiberberis*, *sive Berberis*. Italis, *Netruscus*, *Bagaia*: *Ananiensibus* *Amperlo*. Germanis, *Hagedorn*.

ACVTA SPINA.

F O R M A.



Arbor est Sylvestri pyro si- DIOSC.
milis, minor tamen, & valde MATT.
spinosa. Baccas profert myrti,
plenas, rubentes, fragiles, &
intus nucleos, radicem multi-
fidam altè descendentem. Fo-
lia Apij hortensis modo diui-
sa, sed longiora: floribus race-
mosis, ac cædidis, cortice sca-
bro, & materie pyracea.

L O C V S.

Prouenit in Syluis, sepibus, MATT.
& fruticetis.

Q V A L I T A T E S.

Fructus est tenuium parti- Gal. 8.
um, & paulum quiddam inci- simp. inc.
suum obtinet. Adstringit, ro-
borat, & prohibet.

V I R E S.

Baccæ deuoratæalui, & scæ- DIOSC.
minarum profluuia sistunt. Radix illita aculeos, & spicula extrahit: Nuclei in
puluerem tritri, ac poti calculos tum frangunt, tum eiiciunt.

C E N S V R A.

Deluduntur qui Berberum communis vsus oxyacantham faciunt.

F 3

BERBE-

BERBERVS Vulgaris, siue Crespinus. Italis *Crespino*. Germanis, *Wersich*.
Gallis, *Espine*, siue *Vinette*.

BERBERVS VVLGARIS SI-
VE CRESPINVS.

F O R M A.

MATT. Complurib⁹ ab radice fruticat ramis, siue aculeatis stolonibus. Cortice vestitur candidanti, laui, tenuiq³. Ligni materies flaua sed fragilis. Tota planta acutissimis aculeis scatet, ternis simul prodeuntibus, albis, planis, fragilibus. Folia habet punicea tenuissimis circumdata spinis, flores aureos, odoratos, racematim dependentes. Fructus rubentes, baccis oblongis, racemosis, vinosisq³, adstringenti, & acido gustu. Radicibus haud altis, fuluo colore.



L O C V S.

Idem. Nasceitur in sepibus, frutetis, ac fenticosis locis.

Q V A L I T A T E S.

Idem. Baccæ refrigerant, & siccant, cohibent, roborant, & adstringunt.

V I R E S.

Idem. Vinum quodè baccis exprimitur, datur vtiliter potandum cum sirupo violaceo, & oxalidis aqua, in ardentibus, ac perniciosis febribus: cum myrtino autem, & aqua plantaginis, cæliacis, & dysentericis, & in fæminarum profusuijs. Idem sitim sedat ex prislana haustum. Columellam procidentem gargarizatu reprimat. Auxiliatur quoq³ sanguinem reiicientibus. Vlcera serpentia cohibet, & humida exiecat, faucium, & gutturis inflationes reprimat. Intestinorum animalia necat, ac pellit.

C E N S V R A.

Decipiuntur, qui vulgarè Berberim oxyacantham legitimā esse contendunt.

VVA

VVA SPINA, sine Crispa, Italis, Vva spina, sine vva marina, Germanis, Creußbeer,
Gallis, Groislier.

VVA SPINA.



GENERA.

Altera Sativa, altera agre- MATT.
stis, ac sponte proueniens.

FORMA.

Vtraq; arbuscula est parua, MATT.
fruticosa, folio Apij, siue O-
xyacanthæ ramulis, ac virgis
albicantibus, vbiq; aculeatis.
Baccas profert rotundas, suc-
cosas, & hirsutas: & præsertim
sylvestris, acido, ac austero sa-
pore. At vbi maturitatem sen-
tere, flauescunt, & subdulces
euadunt.

LOCVS.

Sativa in hortis, pomarijs, Idem.
& vineis feritur, Sylvestris in
sepibus, & senticosis locis
sponte prouenit.

QUALITATES.

Baccæ frigefaciunt: exiccant, Idem.
roborant, & adstringunt.

VIRES.

Baccæ veniunt in ciborum vsum vva acerbæ modò: nam iusculis incoctæ Idem.
appetitum excitant. Sitim sedant, & grauidarum malaciæ succurrunt. Dantur
deuorandæ cæliacis, dysentericis, & cruenta expuentibus.

RIBES vulgaris, Italis, *Ribes*. Germanis, *S. Johannis Treublein*. Gallis, *Ribes* seu *Raifins de oultremer*.

RIBES VVLGARIS.

GENERA.

MATT. Duum est generum, Domesticum, & Sylvestre.

FORMA.

MATT. Paruulavtraq; est arbor, folio paruo, vitigineo: Ramulos habet lentos, & quibus fructus rubescentes, & vuæ modo racemosi dependent, baccis copiosis, rotundis, vinosis, piperris magnitudine, gustu acido, & adstringenti, cum aliqua dulcedinis specie.

LOCVS.

Idem. Domestica seritur ad sepandos hortorum puluinos. Sylvestris, nascitur sponte in Boemia, in siluosis collibus, & in alijs Germaniæ locis.

QUALITATES.

Idem. Vuæ refrigerant, exiccant, adstringunt, & roborant.

VIRES.

Idem. Datur vtiliter in acutis febribus: Ventriculæ æstuantem refrigerat, sitim restinguit, nausæam, & vomitiones sistit, cibi appetentiam incitat, cæliacos & dysentericos iuuat, & biliosis fluxionibus obnoxios, sanguinis feruorem demulcet, bilis acrimoniam retundit, & impetum domat.

CENSURA.

Cæcutiunt, qui hanc plantam Mauritanorum Ribem faciunt, ac pariter qui Vrsi vuam esse contendunt apud Galenum.

LIGV-



LIGVSTRVM, Græcis, Κύπρος. Arabibus, Kenne, & Henne. Officinis, *Alcanna*. Italis, *Cuistrico*, *Olivella*: *Oluetra*, & *Cambrössene*. Germanis, *Deinholz*, oder *Mundholz*, oder *Reinweiden*. Hispanis, *Alfena*, *sive Hallena*. Gallis, *Troesne*, *sive Trezilhon*.

LIGVSTRVM.



F O R M A.

Arbor est oleæ folijs latioribus tamen, mollioribus ac viridioribus: flore candido racemoso, sed qui decerptus statim flaccescat: Baccas profert in cacumine racematim coherentes, hæderæ minores, lauiiores, ac nigriores, sapore amaro, ac iniucundo, purpureo intus succo: materie robusta, ac dura.

DIOSC.
MATT.

L O C V S.

Prouenit in sepibus ac ne moribus.

Q U A L I T A T E S.

Folia mista sunt temperatæ, quin etiam & summa germina: Digerunt enim leuiter accedente aquea substantia modicè calida, quin etiam aliquid astrictioræ possident facultatis: ex terrena frigida, & siccitatis non sunt expertes.

Gal. lib. 7.
simp. me.

V I R E S.

Folia commanducata oris

DIOSC.

ulceribus medentur: & illita feruidis inflammationibus, & carbunculis. Decocto eorundem igni ambusta fouentur. Eadem trita, & illita capillum rufant: flores ex aceto fronti illiti, capitis dolores mulcent. Oleum in quo ligustri flores insolati fuerint, præstat illitum ad vulnerum inflammationes. Item ad capitis dolorem à bile prouenientem. Aqua à floribus distillata præscripta omnia potest.

C E N S V R A.

Non minus hallucinantur, qui Cyprum, & ligustrum duas faciunt plantas, quàm qui ligustrum nostrum phillyream esse contendunt.

F 5

PHIL-

PHILLYREA, Græcis, *φιλύρεα*. Italis, *Phillyrea*. Arabibus, *Mahaleb*.

PHILLYREA.

FORMA.

DIOSC. Arbor est Ligustri magnitudine folijs oleæ nigrioribus, & latioribus: fructu lentis, nigro, subdulci, racematim cohærente.

LOCVS.

DIOSC. Nascitur in asperis.

QUALITATES.

DIOSC. Folia adstringunt.

VIRES.

DIOSC. Ad ea omnia præstât Phillyreæ folia, ad quæ Oleaster, cum adstrictione est opus, maximè ad oris vlcera comanducata, aut si eorum decocto os colluatur. Vrinam quoque ac menses cient, E-poto decocto.

CENSURA.

Aberrant qui *φιλύρεαν* Tiliam faciunt.

* APPENDIX.

Habetur foliorum differentia triplex, vt lata quædam, quædam angusta esse obseruentur, quædam etiam medio modo se habentia, vt nihil obstat Dioscoridis descriptioni, folia oleæ latiora Phillyreæ tribuentis.*

MAHALEB.




N O M I N A.

91

MAHALEB. Mauritanis sic dicta vnguentarijs. Italis, *Machalep*.

MAHALEB.



F O R M A.

Arbor est non admodum MATT.
procera, folijs Tilia: haud ion-
gè abſimilibus: Flores edit al-
bos, è quib. bacca ſubnaſcun-
tur nigrae, officulo intus cera-
forum paulo minore, in quo
nucleus reconditur, quo ad o-
doramenta, & ſmegmata vtun-
tur vnguentarij.

L O C V S.

Nascitur in montibus. Idem.

Q U A L I T A T E S.

Excalfacit, emollit, abster- Serap.
git, attenuat, resoluit, & dolo- Auicenn.
res sedat.

V I R E S.

Nuclei contusi iliorum, & MATT.
dorsi doloribus vtiliter illinun-
tur. Id quod magis praestat o-
leum ex ijs expressum. Ex mel-
licrato hausti, animi deliquijs.

ſubueniunt: dantur quoque ad coli cruciatus, & renum calculos: ventris quo-
que tineaſ necant, & vrinam cient.

TILIA

ſta eſſe
dioſco-

ALEB.

TILIA MAS, Græcis, *φιλύρα ἐνὸς ἄκρου*. Italis, *Tilia maschio*, & *Carpino nero*. Germanis, *Steinsinden*.

TILIA MAS.

FORMA.


MATT. Arbor est magna, patentibus ramis, materie robusta spissaq; ac etiam sterilis: folia fert lata. oblonga tamen, in quibus ferè omnibus numerosæ extuberant bullæ, in quibus muscæ gignuntur, quæ tandem arescentibus receptaculis, inde gregatim euolant.

LOCVS.

Idem. Prouenit in syluis, & montibus, saxosis locis.

QUALITATES.
ET VIRES.

Idem. Quid de huiusce arboris facultatibus scribam, hæcenus non habeo.



TILIA,

TILIA, Græcis, *φίληρα*. Italis, *Tilia sine Teio*. Germanis, *Eindett*. Gallis, *Til, sine Tiler*.

TILIA FŒMINA.



GENERA.

Quædam mas est, quædam fœmina. Theoph. lib. 3. c. de hist. plant.

FORMA.

Fœmina folia fert hederacea, nisi quodd in angulum acutorem rotundantur. & quam iuxta pediculum curviora, de mediotamen in acutius coacta preterduntur: Flos calycula intectus præter folij pediculum, amentumq; futurum, pediculo alteri adnexus, viridis dum in calycula est, detectus autem leuiter flauus. Baccas fert orbicularas, oblongas, magnitudine fabæ, quinis eminentibus angulis: Cortex fœminæ flexilis, & materies alba, tenaxq; cui exigua est medulla.

LOCVS.

Non solum in montibus: MATT. sed in planitie quoq; prouenit, ac in cæmeterijs, & ædium arcis.

QUALITATES.

Adstringit: glutinat, discutit: inspissat, abstergit.

VIRES.

Cortex commanfus, ac deinde illitus, vulnera recentia glutinat. Folia trita, & aqua conspersa pedum tumores discutunt. Humor è medulla castratæ arboris defluens, capite illitus non solum capillos replicat, sed fluentes continet. Aqua è floribus distillata sua peculiari dore datur vtiliter Epilepticis. Ligni carbones in puluerem tusi, auxiliantur his qui ab alto deuoluuntur fractis, ac cõtus.

CISTVS,

CISTVS, Græcis Κίσκος ἢ κισθαρον, καὶ κισσαρον. Arabibus, *Romiet*, *Althei*, *sue lbaie*, *Althu*. Italis, *Cisso*. Hispanis, *Cerguacos*.

CISTVS.

G E N E R A.

DIOSC. Mas vnum. Alteramverò
fœmina.

F O R M A.

DIOSC. Mas ramosus frutex est, sed
improcerus, & folijs rotundis,
acerbis, hirsutis. Flosilli mali
punicæ haud absimilis.

L O C V S.

MATT. Nascitur in Apennino Ita-
DIOSC. liæ saxosis locis, & asperis.

Q U A L I T A T E S.

Gal. lib. 7. Folia, & parua germina ad-
simp. mc. stringunt, & exiccant non in-
strenuè: Frutex aded frigidus
est vt tepidi calidi sit particeps:
Flores præter prædicta non in-
strenuè desiccant.

V I R E S.

DIOSC. Flores in vino austero bis in
die poti, Dysentericis, ventris
imbecillitatibus, defluxioni-
busq; & humiditatibus opem ferunt, & nomas per se illiti cohibent. Meden-
MATT. tur quoq; vetustis vlceribus, & igni ambustis cum cerato. Folia, & flores in de-
fessionibus cohibent fœminarum fluxiones. In summa non parum præstant, v-
bi adstringere, & roborare sit opus.

CISTVS



N O M I N A.

95

CISTVS fœmina: Græcis, Κίσθηλος. Italis, Cisto fœmina. Patauinis, Salvia Saluega.

CISTVS FOEMINA.

F O R M A.


Foliagerit oblonga Salvia DIOSC.
æmula, albicantia, ac hirsuta. MATT.
Floribus albis cisti maris longè minoribus.

L O C V S.

Prouenit in collibus aridis, & saxosis, copiosa in agro Patauino.

Q U A L I T A T E S.
E T V I R E S.

Eadem illi sunt quæ mari qualitates & vires. Adstringit enim: & desiccatur.



Hyro-

HYPOCISTIS, Græcis, ἵποκιστος. Italis, *Hipocisto*. Offic. *Hipoquistidos*.

HYPOCISTIS.

FORMA.

DIOSC. Forma est mali punicæ cy-
MATT. tino similis, aut orobanches
fastigijs colore vario. Nā quæ-
dam rufa: quædam herbacea:
& quædam candida visitur. Li-
quatur Acaciæ modo. Cæter-
um tunditur recens, & elici-
tur succus, qui insolatus asser-
uatur ad vsum.

LOCVS.

DIOSC. Nascitur iuxta cisti vtriusq;
radices.

QUALITATES.

Gal. lib. 7. Magis adstringit quam cisti
simp. mc. folia. Vires habet Acaciæ pa-
DIOSC. res: verum aliquanto magis
siccat.

VIRES.

DIOSC. Efficax est auxilium ad om-
nium fluxionū affectus, nem-
pe sanguinis reiectiones, profluvia muliebria, Celiacos, dysentericosq; affe-
Galen. ctus. Quin si quam partem roborare consilium sit, quæ videlicet plusculo hu-
more exoluta fuerit, robur, & firmitatem illi non imbecilliter addit. Sic sanè
Stomachicis, epithematis, hepaticisque commiscetur, & ex viperis confecto
antidoto inditur.

LEDVM,



NOMINA.

97

LEDVM, Græcis, Ἀνδύ. Arabibus, *Casus*: Pingue autem quod ex eo colligitur, Latinis, *Ladanum*. Græcis, Ἀδάρυς. Arabibus, *Laden*, *sive Laden*. Italis, *Ladano*, *sive Odano*. Hispanis, *Xara*.

LEDVM.

GENERA.

Inter Cisti genera, & *Ladadiosc.*
num est. Duum est generum. *Matt.*
Alterum folijs grandioribus,
alterum verò minoribus.

FORMA.

Frutex est Cisti modo na- *diosc.*
scens, longioribus tamen fo-
lijs, & nigrioribus, quæ Verno
tempore quiddam cōtrahunt
pingue. * Nascitur etiam sub
hachypocistis quædam. *

LOCVS.

Prouenit in saxosis, & apri- *Matt.*
cis collibus in calidioribus re-
gionibus.

QUALITATES.

Ladanum exalfacit exces- *Gal. 7.*
su primo completè, vel in prin *simp. me.*
cipio secundi. habet etiam ad- *Matt.*
strictionis paululum. Emollit,
digerit, concoquit, venatum
ora patefacit, & spissat.

VIREs.

Capillum fluentem continet addito vino, myrrha, & myrteo oleo. Cicatri- *diosc.*
cibus decorem reddit ex vino illitum. Medetur aurium doloribus cum hydro-
melite, aut rosaceo infusum: suffitu secundas eiecit. Pessis immistum vuluæ du-
ritiem sanat. Inseritur in medicamenta, quæ aurium dolorem, tussimq; finiunt:
ex vino vetere potum aluum sistit, & vrinam ciet. Fiunt ex eo orbiculati globi:
odorandi pestilentia tempore additis cinnamomo, Caryophyllis, Santalis,
Agallocho, Mosco, & Ambaro.

G ROSA,



ROSA, Græcis, Ροδὸν. Arabibus, *Nard, Vard, seu Neron.* Italis, *Rosa.* Germanis, *Rosen.* Hispanis, *Rosas.* Gallis, *Roses.*

ROSA.

GENERA.

Matt. Domestica & Sylvestris. Domestica & si plura Plinio sint genera, nostro tamen quo tria tantum in usum venerunt, videlicet puniceum, album, & quod carnis colorem refert. In albo genere ea est admodum odorata, quam Moscheram, & Damascenam Itali vocant.

FORMA.

Matt. Rosarum, & rosacearum plantarum forma cum omnibus notissima, explorataque sit, superfluum est hic eam describere.

LOCVS.

Urbana in hortis, Viridarijs, pomarijs, & vineis floret. Sylvestris in sepibus, senticosis, memoribus, & campestribus provenit.

QUALITATES.

Mesue. Constant Rose diuersis sanè partibus, nempe terrestribus, & aqueis, quibus substantiam, & adstrictoriam facultatem acceptam referunt. Aëreis à quibus cum subdulcem, tum odoratū saporem accipiunt. Igneis à quibus amarorem sibi vendicant. In vniuersum autem refrigerant, & adstringunt.

VIRES.

Diosc. Folia, cor, ventriculum, iecur, & retertricem insuper facultatem, corroborant, dolores calidos, & inflammationes auferunt. Aridis in vino decoctis expressus liquor facit ad dolores capitis, oculorum, gingivarum, sedis, recti intestini, ac vulvæ penna illitus, & infusus. Eadem sine expressione tusa, præcordiorum inflammationibus, humidis stomachi vitijs, igni sacro illini prodest. Flosculi medij cum suis capillis gingivarum defluxiones cohibent, & feminarum profluuia. capitula pota etiam aluum, & cruentas reiectiones sistunt. Succus & corroborat, & aluum exoluit. Verum id longè magis præstat dilutum pluribus repetitis macerationibus.

*ROSA



* Rosa sylvestris, Canina Rosa, Græcis *ῥόδον ἄγριον, κυνὸς ῥόδον*. Germanis, Wilde rosen, Heckrosen.

ROSÆ SYLVESTRES.

GENERA.

Sylvestrium Rosarum plures observantur varietates, ut sequitur.

FORMA.

Alia vulgo provenit, aculeatis virgis, prælongis rubo similibus, rosa pusilla, ut plurimum quinis foliolis constat, alba subrubensve, quarum hæc altior spinosiorq; illa humilior est. harum ramis spongiolæ villosæ vermiculis prægnantes adnascuntur. Alia odoratior sed minor etiam flores pallide rubentes fert, cuius virgæ rubente quoq; cortice vestiuntur. Est & parva fruticosa spinosissima Rosæ exiguis candidis odoratis. Minima omnium saxatilis colore floribus ruberrimo. Maxima sylvestrium est quæ tota olet, & frequenter albicantes, raro purpurascens flores profert & spongiolis hirsutis non caret.



LOCVS.

Omnes sponte exeunt, prima quidem & quinta in aggeribus, & pratorum marginibus, altera in calidioribus regionibus, nam apud nos colitur, tertia in maritimis & arenosis locis, quarta in petrosis.

VIRES.

Radix sylvestris rosæ valet ad morsum canis rabidi, Spongiolæ cinere cum *Plin.* melle Alopecie capitis expleantur. Spongiolarum quoque in pulverem tritarum magna vis contra calculum & dysuriam, & capillum nutriendum inunctione. Sed & fructus cum semine pulueratus idem præstat quotidiana apud nos experientia.*

LYCIUM Italicum. Italis, *Licio nostrano*.

LYCIUM ITALICVM.

F O R M A.


Matt. Planta est aculeata pruni sylvestris faciem referens, minoribus tamen folijs. Flores mittit candidos, è quibus baccae gignuntur, ligustri ferè similes, sapore acerbo, atq; adstringenti, è quibus succus exprimitur.

L O C V S.

Matt. Nascitur copiosum in agro Tridentino circa Arcem de Gresta, saxosis locis.

Q U A L I T A T E S , E T
V I R E S.

Matt. Adstringit, cohibet, roborat, siccatur, & reprimunt: & ubi legitimum lycium non sit ad manus, nihil prohibet, quin hoc eius vice succedere valeat. Succus è baccis à me extractus, hæc omnia belle præstat.



BACCÆ,

NOMINA

Buxus, Græcis, Πύξος. Italis, Bosso.

101

Buxus.

FORMA.

Buxus provenit folio myrti minore, densiore, carnosiore, viridioreque. Fronde est perpetua, ob idque topiario operi peridonea, flore herbaceo, fructu rutæ simili: Materie spississima, flava, densissima, atque ponderosissima, adeo, ut nec carient sentiat, nec in aquis fluitet. *Matth.*

LOCVS.

Locis gaudet cum frigidis, *Idem.* tum apricis. In Corsica frequens, crassissima, provenit.

QUALITATES.

Exiccat manifestè, sed in calore non longè à medijs abest, adstringit quoque & roborat.

VIREs.

Capillum rufant tum folia tum rami in lixiuio decocti.

Non desunt quoque qui asserant sanari alui defluuia ligni scobe deuorata, aut pota: Sunt & qui asserant buxi decoctum idem præstare, quod Guaiaci ad Venericum morbum.

CENSURA.

Delirant, qui Buxum & Guaiacum Indicum ynam, & eandem faciunt arborem.

G 3 Evo-



EVONYMVS, Græcis, ἐβώνυμος. Hetruscis, Silio. Italis *cateris*, *Fusano*, siue *Fusaro*, quod ex eo fusi à tormitoribus fiant.

EVONYMVS.

FORMA.

Theoph. Arbor est mali punicæ magnitudine, atque etiam folio
rimo de eiusdem, maiori quàm chamæ-
plāt. hist. daphne, molli, vt punica. Germinare incipit mense septem-
bri, & floret deinde vere. Flos illi albæ violæ simili odore in-
festus, veluti cruorem infe-
rens. Fructus cum putamine
filiquæ Sefamæ proximus, præ-
Matth. ter quàm quod in versu diui-
ditur quaternos. Materię est
buxi modo pallida, ac solida,
verum non aded grauis.

LOCVS.

Matth. Nascitur frequens in Italia
in sepibus, dumeris, & syluis.

QUALITATES, ET
VIRE.

Theoph. Fructus deuoratus pecus
ibidem. enecat, quin etiam folium
Matth. idem facit, & potissimum ca-
pras nisi purgentur Anacho. Lixiuum in quo bacca decocta fuerint (vt no-
stræ affirmant mulieres) capillos splendidos facit, furfures extergit, & pedicu-
los necat. Ligni materies expetitur à tormitoribus ad fusos parandos.



ACA-

NOMINA.

103

ACACIA, Græcè *ἀκκία*. Arabibus, *Achachie*. Italis, *Acacia*.

ACACIA.

GENERA.

Duum est generum: maius & minus.

FORMA.

Nascitur Spinæ instar fruticosa, non se in rectum attolens. Florem habet cæcidum, & semen Lupino similem in folliculis, è quo exprimitur succus & siccat in umbra.

LOCVS.

Primum in Ægypto nascitur.

QUALITATES.

Succus maioris condensatus medicamentum est frigidum, & terrosum, immista etiam quadam essentia aquea; & sanè coniectura est non esse simile, verùm quædam habere in se dispersas partes tenues, & calidas, quæ in ipsa ablutione segregantur. Estq; etiam hoc tertij ordinis exiccantium, & secundi refrigerantium, vbi quidem elotum fuerit, illorum verò primi.

VIRES.

Succus utilis oculorum medicamentis, valet ad ignem sacrum, & vlcera, quæ ferpunt. Perniones, pterygia, & oris vlcera: mensium abundantiam sistit: prociuum vuluâ cohibet, citam aluum supprimit, aut porus, aut suppositus, capillos denigrat. Spinæ decoctum solutos artus fortè committit. Gummi cutis spiracula obstruit, ambustis ex ovo illitum pustulas erumpere non patitur.

APPENDIX.

Vbi Acacia defuerit, licet eius vice, tum Rhois arbusculæ folia, tum lentisci foliorum succum, tum etiam hypocistidem medicamentis immiscere.

G 4

ACA-

ACACIA altera, Græcis, Ἀκακία ἑτέρα. Italis, *Acacia secunda*.

ACACIA ALTERA.

FORMA.

DIOSC. Prouenit ad Ægyptiæ spinę similitudinem. longè tamen minor, tenerior, humiliorq; munitur etiam aculeorū vallo, folium habens rutæ. Fert Autumno semen, lenticula minus in siliquis cōnexis ternum, quaternūve, gustu etiam adstringente. Color siliquis inest aureus, & fulgore quodam respersus, aded vt in sole auri modo splendeat.

Matth.


LOCVS.

DIOSC. Prouenit in Cappadocia, & Ponto, quinciam & in Italia.

Matth.

QUALITATES, ET
VIRES.

DIOSC. Adstringit, cōhibet, roborat, & replet, atqui viribus alteri inferior est, & ocularibus medicamenti inutilis.



VITEX,

VITEX, siue Salix Amerina, Græcis, ἄγνος καὶ λύγος. Arabibus, Fam incheft, Samancheft, siue Benge best. Italis, Virice, siue Agno casto. Germanis, Echaßmuller siue Scusschamb. Hispanis, Gattiglio casto. Gallis, Casto. Officinis, Agnus castus.

VITEX.



GENERA.

Duo habetur genera: maius, & minus. *Plin. lib. 24. ca. 9.*

FORMA.

Maior in arborem salicis modo assurgit. Florem mittit album cum pupureo: quæ & candida vocatur. Minor quam nigram appellant, ramosa assurgit, folijs cædidiore, & lanuginosis, flore est tantum purpureo: Nō multum à salice vitium vsu distat, & foliorum quoque aspectu, nisi odore gravior esset. Ramos gerit lōgos, fractu peruiaces, & semen racemosum ut piper.

LOCVS.

Nascitur in fluminum ripis, maritimisque locis, asperis, & torrentium ripis. *Diosc.*

QUALITATES.

Excalfacit, & siccatur ordine tertio, tenuisque substantia habetur, tum gustu acris simul & adstringens, aperit, resoluit, saporem inducit, atque emolliat. *Gal. l. 6. simp. me. Diosc.*

VIRES.

Semen potū venenatis ictibus, hydropicis, lienosisque auxiliatur, lac euocat, mentes ciet, drachmæ pondere in vino potum. Genituram exoluit, caput tenet, & soporem affert. Foliorum decoctum, & seminis, mulieribus vuluæ malo opportunis opitulatur. Semen cum Pulegio potum purgationes mouet. Instillatur capiti cum aceto, & oleo in lethargo, & phrenitide. Folia suffusa, aut substrata venenata fugant: Illita quoque serpentium moribus auxiliantur, testium duritias cum butyro, & folijs vitium emolliunt: Semen cum aqua illitum facit ad sedis rimas, & cum folijs, medetur luxatis, vulneribusque.

ELÆAGNOS, Græcis, ἐλαῖαγνος.

ELÆAGNOS.

FORMA.

Theoph. Elæagnos natura fruticosa, lib. 4. cap. cæteris amerinis non absi-
ii. de pla. milis, figura quidem cæteris
hist. proxima. sed molli, lanugi-
 nosoque folio. flore populi
 albæ, sed minore, fructu
 nullo.

LOCVS.

Matth. Nascitur in insulis fluitan-
 tibus.

FACULTATES, ET
VIRE.

Matth. Cùm sit hæc planta vitici
 admodum similis, credide-
 rim ego similes quoq; habe-
 re facultates.

APPENDIX.

Nascitur in Boemia plan-
 ta, cuius hic imago spectatur,
 quæ quidem notis omnibus
 Elæagno astipulari videtur.
 verùm cùm baccas oliuæ similes proferat, non ausim ego affirmare stirpem
 hanc legitimam esse Theophrasti Elæagnum, cùm illi sterilis habeatur, nisi for-
 tasse idem deceptus sit, vel eius codex deprauatus, ut multis alijs in locis obser-
 uauimus.

* Doctissimis viris alijs & imprimis Carolo Clusio est Ziziphus alba, Bello-
 nio Cappadocica. *

SALIX,



SALIX, Græcis, *ἰρίδα*. Arabibus, *Buluf, Dhulles, Saffaf, sine Calif.* Italis, *Salice, si-
ue Salcio*. Germanis, *Weiden / sine Gelbinger*. Hispanis, *Salce, siue Salgueiro*.
Gallis, *Saulx*.

SALIX.



GENERA.

Plura traduntur genera. *Theoph.*
lib. 3. c. 13.
FORMA. *Plin. lib.*

Quædam in tantam proce-
ritatē assurgunt, ut ex eis fiant
perticæ, & pali ad vitium peda-
menta, aliæ non tam proceræ
crescunt, colore rufescentes,
sequacis admodum lentitiæ,
quæ ligandis cadorum vina-
riorum circulis commodè fin-
duntur. Has salices Græcas vo-
cât. Rursus aliæ firmiores cor-
bibus, & rusticanae supple-
tili expetitæ, aliæ namq; sunt
minuscule spectabili tenuita-
te texendis canistris, cistellis,
ac calathis aptissimæ. Omnium
folia oleagina, oblongaque
sunt. Supernè virentia, & in-
fernè candicantia.

LOCVS.

Nascuntur humecto solo, *Idem.*
in fluuiorum & in fossarum
aggeribus.

QUALITATES.

Flores exiccant absque morfu: Folia vim spillandi habent. Item Salix quan-
dam habet adstrictionem. *Gal. l. 6.*
simp. me.

VIRES.

Trita folia cum exiguo pipere, & vino pota ileosis subueniunt, sumpta per se, *Diosc.*
& cum aqua conceptum impediunt. Semen vtiliter cruenta expuentibus da-
tur. Cortex eosdem præstat effectus. Eiusdem cinis aceto subactus, & illitus
callos, & clauos tollit. Succus foliorum, & corticis in malicorio cum rosaceo
calefactus aurium doloribus auxiliatur. Eorum decocto fouentur vtiliter po-
dagrici. Recentia folia adduntur in soporiferis lotionibus. Sparguntur eadem *Matth.*
vtiliter circa febricitantium lectulos.

* SALIX

* *SALIX pusilla*, humilis, Salicula repens. Græcis χαμαίρτα. Germanis, Erdweiden/ Steinweidlin/ Kriechweidlin/ Bergweidlin.

SALIX PUSILLA.

FORMA.

Humi repit tota nec in rectum attollitur, sed vndique adnatis caudici radiculis sese propagat. Folia non oblonga nec tam acuminata sunt ut vulgarium Salicum & modice splendent. Lignosis, tenacibus, nodosisque ramulis color subruffus est, nouellis tamen surculis subuiridis. Florem & fructum nullum in ea obseruare potui.

Locvs.

Nascitur in alpihus circa lapides copiose repens. *



OLEA-

OLEASTER, aut Sylvestris Olea, Græcis, *ἀγριέλαια*. Italis, *Oliuo Saluatico*. Germanis, *Wilder Ölbaum*. Hispanis, *Zebuche*. Gallis, *Chiuier Sauvage*.

OLEA SYLVESTRIS.

FORMA.

Domestica, longè minor *Matt.* provenit: Folijs breviorib. & aculeatis ramis. Bacca & si numerosa fecunditate vincant, magnitudine tamen satius cedunt, quin & gustatu adstringentiore sentiuntur.

LOCVS.

Nascuntur in Hetruria *Matt.* copiose. Quin etiam in Dalmatia, & ferè in omnibus Adriatici, & Aegæi maris Insulis.

QUALITATES.

Adstringunt magis, *Matt.* gisq; refrigerant rami, ac *Fo-* *Diosc.* lia, quàm domestica. Oleum vehementer adstringit.

VIREs.

Folia trita, & imposita igne *Diosc.* sacrum, vlceraq; serpentia, Epynictidas, carbunculos, & nomas cohibent: quin etiam fordida vlcera repurgât, cutem à capite vullam conglutinant, oris vlceribus comanducata medentur. Succus & decoctum eorundem, eundem præstat effectum:

Succus peculiariter facit ad sanguinis eruptiones, muliebreq; profluvium, prodest vix, & pustulis oculorum: Vlcerâ, & veteres defluxiones sistit, quapropter in collyria additur, & ad palpebrarum erosiones per quam utilis est. auribus subuenit, cum exulceratis, tum purulètis. folia illinuntur celiacis vtiliter cum hordeacea farina. Sudor emanans ex cōflagrantibus lignis, scabiem, lichenas & furfures, sanat. Bacca trita, & illita medentur furfuribus, & depascentibus vlceribus. Ossium verò nuclei, ex adipe, & farina scabros vngues eximūt. Oleum sylvestris oliuæ inungitur, colluiturq; vtiliter gingiuis putrilagine laborantibus, dentes mobiles firmat, & gingivarum fluxiones sistit. Idem in doloribus capitis, vtiliter pro rosaceo substituitur, defluentes capillos retinet, tardius canitiem sentiunt, qui eo quotidie perunguntur.

OLEA

OLEA sativa, Græcis, Ελαια ὀλεός. Arabibus, Zaiton, siue Caiton. Italis, Oliua domestica. Germanis, Delbaum. Hispanis, Olivo, siue Azevimo. Gallis, Olinier.

OLEA DOMESTICA.

G E N E R A.

Matt.

Antiqui genera decem fecere, nostro autem ævo tria tantum habentur.

F O R M A.

Idem.

Folia habent oblonga in acutum desinentia, crassa, pinguiâq; supernè virentia, & infernè albicantia, sapore amaro, & acriusculo; flores mittunt albos, racematim dependentes, è quibus bacca prodeunt primùm virides, deinde pallescentes, & postremò purpureæ prius factæ, saturatè nigrescunt.

L O C U S.

Idem.

Seritur in collibus & in campis.

Q U A L I T A T E S.

Gal. 6.

simp. me.

Oliuæ rami quantum habet adstrictionis, tantum & frigiditatis participes sunt: fructus verò, ubi rectè maturuerit, moderatè calidus est: immaturus autè magis tum restringit, tum refrigerat.

V I R E S.

Diosc.

Colymbades trita, & am-
bustis illita pustulas gigni prohibent, & sordida vlcera purgant. Oliua flaua, & recēs stomacho vtilior est, & ventri difficilis: nigra autem & matura stomacho auersatur, & oculis, & dolorem capitis mouet. Arefactæ autem illitu depascuntia vlcera sistit, & carbūculos emarginat. Amurca in cupreo vase ad mellis crassitudinē decocta adstringit, & cæteros præbet Lycij affectus. Illinitur dentium dolorib⁹, & vulneribus cū aceto, vino, aut mulso. Additur in medicamēta ocularia: infunditur vtiliter, sedis, vuluæ, & genitalium exulcerationibus. Iumētorum scabiem sanat, cum lupinorum, & Chamæleontis herbæ decocto. Cruda, recensq; podagricis, & articulorum doloribus auxiliatur, peruncta in villosa pelle, & imposita hydropicorum tumores reprimat.

Q U E R.



NOMINA.

III

QUERCUS, Græcis, *Δῦρ*. Arabibus, *Chullor*, *Hullet*, *sive Delur*. Italis, *Quercia*. Germanis, *Eychbaum*. Hispanis, *Rebre*. Gallis, *Chefie*.

QUERCUS.

FORMA.

Folij est oblongis, firmis, *Matth.* robustis, per ambitum vtrinque sinuatis, caudice crasso, cortice rudi, scabroq; in ramis vero lauiori. Materie robusta, dura, graui, compacta, firmaq;. Glâdiferâ est arbor, & præter glâdes gallas quoq; producit cum maiores, tum etiam minores, quas omphacitides vocant. Alios quoque fert fructus, de quibus Theophrasto lib. 3. capit. 8. & 9. de plantarum historia abundè scriptum est.

LOCVS.

Nascitur vbiq; ferè in syluis. *Idem.*

QUALITATES.

Quæcunq; sunt in hac ar- *Gal. 6.* bore partes adstringētis quasimilitatis sunt participes. Sed ceteris adstringentior est, quæ in trunci cortice membrana subest, tum quæ sub glandis ipsius calyce, ea videlicet, quæ fructus carnem conuestit: folia etiam non instrenuè desiccant.

VIRES.

Corticis decoctum, qui libro crassiori subest; quin etiam illius, qui glandium *Diosc.* putamini succedit, datur vtiliter potandum dysentericis, cæliacis, & sanguinem reiicientibus. Eadem in pello supposita vteri fluxiones cohibet. Aqua à tenerrimis folijs distillata, sistit pota Iecorarias fluxiones, renū calculos comminuit: & alba mulierum profluua cohibet. Datur quoq; dysentericis, & sanguinem reiicientibus. Datur & in pestilentialibus febribus, quodd aduersus venena non parum valeat. Recentia folia ventriculi ardorem tollunt, si super lin- *Matth.* gua teneantur. Aqua, quæ in marcescentium quercuum cavitatibus reperitur scabiem omnem vlcerosam sanat: Glandes vrinam cient, & resistunt deuorata venenatorum moribus. Intritæ crudæ inflammationes leniunt.

FAGVS,



FAGVS, Græcis, Φηγος. Arabibus, *Chinars*, sine *Chiacas*. Italis, *Faggio*. Germanis, *Duchbaum*. Hispanis, *Haia*. Gallis, *Fau*.

FAGVS.

FORMA.

Matt.

Folij est Carpini vulgaris non abſimilibus, grandioribus tamen, læuoribus, minusque rugosis: Fructus calyculo includitur rotundo, quadantenus echinato, hispido, ac scabro, nucleo intus triangulari, tunica castaneæ simili circumtecto: Nucleus albicat, Sapore castaneorum subdulci, & adstringente: Materies dura, sed non admodum firma: Arbor in magnam aſurgit proceritatem, ramis grandioribus ac patulis.

LOCVS.

Matt.

Prouenit in ſyluis, tam in planitie quàm in montibus, & collibus.

QUALITATES.

Gale. 6.

Valentius adstringit, quàm *ſimp. me.* quercus, folia autem tenella non inſtrenuè deſiccant.



VIRES.

Diosc.

Matt.

Folia trita, & illita tumoribus profunt & imbecillas membrorum partes corroborant. Folia eſicata labiorum, gingiuarumque vitijs mirificè auxiliantur. Glandis fagineæ cinis renum calculis vtiliter illinitur. Harum pabulo maxime delectantur glires, & aues quæ roſtro ſunt validiore.

ILEX,

NOMINA.

113

Ilex, Græcis, *Πεύθε*. Arabibus, *Carmas*, *sive Barbes*. Hispanis, *Anzina*, *sive Azinbeira*. Italis, *Elice*, *sive Leccio*. Germanis, *Steineichen*. Gallis, *Tense*.

Ilex.



GENERA.

Duum est generum, *Alte-Columel-*
rum folio spinoso: Alterum *la.*
sine spinis.

* Differt etiam latitudine
& angustia foliorum.*

FORMA.

Arbor est spectatae proce-*Matth.*
ritatis, cortice in rufum ni-
gricantē, materia admodum
densa, graui, ac robusta, sub-
rufescentiq;. Folijs est lauri-
nis, perpetuò virefcentibus,
sensimq; in toto ambitu, ser-
ratis, aut spinosis, & aversa
parte albicanibus, robustis,
ac duris. Glandes fert quernis
longè minores.

LOCVS.

Spinosa in Hispania fre-*Matth.*
quentissima: Quæ verò spi-
nis caret, in quàm plurimis
Hetruriæ syluis habetur.

QUALITATES.

Non differt qualitatibus, *Gal. 6.*
à quercu, nisi quòd valentius *simp. me.*
adstringit.

VIRE S.

Glandes, quernas viribus antecellunt. Radicis cortex cum aqua coctus do-*Diosc.*
nec mollitus intabescat, & tota nocte illitus capillos denigrat, prius Cimolia
terra purgatos. Cætera, cum quercu, & fago communia sunt. Rubentes pi-*Matth.*
lula, quas præter glandes fert, trita, cum aceto vulneribus recentibus, & cru-
entis oculis vtiliter imponuntur.

GENSVRA.

Non rectè sentiunt, Columellæ testimonio, qui Plinij, & Theophrasti au-
toritate freti putant, haud legitimam esse Ilicem, quæ folijs spinosis non pro-
uenit.

H ILEX

* ILEX latifolia, Græcis, ἰλίνοσ πλάτυλλος.

ILEX LATIFOLIA.

F O R M A.

Conuenit cum priore magnitudine, altitudine, materia ligni firma ac solida. Folio differt latiore ambitu sinuoso & aculeato. Glans interdum maior, interdum minor quam sit quercus, locorum ratione varians spinoso innititur calyculo, per maturitatē alicubi nigricans, nucleum habēs intus album, grati saporis, flosculi pusilli flauescētes racemulum cōficiunt oblongum, qui Maio mense inuenitur.

L O C U S.

Copiosa est in quibusdam nemoribus, collibus, campis aut conuallibus, & nō infrequens in Hispania, In Narbonensi Gallia ac Prouincia quoque reperitur, nec non in Italia.

Q U A L I T A T E S.

Folia ipsius refrigerant & reprimūt vt reliquarum glandiferarum.



V I R E S.

Tam huius quam præcedentis folia tusa oedematosis tumoribus imponuntur, & imbecillis partibus roborandis vtiliter adhibentur.

A P P E N D I X.

Obseruantur nonnunquam in eadem Ilice diuersa folia, vt humilis ac tennellæ per margines spinosa horreant, adultæ verd aculeis careant.*

SYBER.

SVBER, Græcis φελλός. Italis, *Sugaro*. Germanis, *Pantoffelholz*.

S V B



GENERA.

Alterū folijs est prolisioribus, acuminatioribusque, alterum verò latioribus, brevioribus, & per ambitum serratis. *Matth.*

FORMA.

Arbor est perpetuæ viriditatis, fructu, & folio Ilicis, sed crassissimo cortice vestitur, atque Ilici magnitudine cedit. Glandes quoque profert iligneis pares, paulo tamen minores, deterioresq;.

LOCVS.

Latifolium in Romano agro frequentissima nascitur. *Idem.* Quod verò prolisioribus folijs est, in agro Pisano provenit in Italia.

QUALITATES.

Idem præstat quod Ilex, & eodem ferè modo adstringit. *Idem.*

VIRE.

Suberis cortex tritus, ex aqua calida potus sanguinem ex utralibet parte fluentem sistit. *Idem.*

Eiusdem cinis ex vino calido haustus sanguinem excreantibus mirificè medetur. Eius glandes quemadmodum cæterarum glandiferarum arbores, in pulverem tritæ, potæq; drachmæ unius pondere ex succo plantaginis auxiliantur omnibus alui, & veri fluxionibus. Decoctum earundem haustum datur aduersus venena. Illinuntur eadem cum axungia maleficis vlceribus. Calyx quo glandes in arbore sustinentur, eadem possident facultates, sed magis adstringunt.

SYBER Angustifolium, Græcis, φελλὸς στενόφυλλον.

SYBER ALIVD.

FORMA.

Matth. Folij est angustioribus,
longioribus, acutioribusque.
Cetera verò cum priori com-
munia sunt.

LOCVS.

Idem. Nascitur plurimum in Ro-
mano agro.

QUALITATES.

Idem. Qualitatibus, ac tempera-
mento nihil ab altero distat.

VIREs.

Idem. Iisdem quoque viribus
poller, quibus & alterum ge-
nus.



PHELLO-

N O M I N A.

II7

PHELLODRYS, Græcis pariter *φελλόδρυς*. Arcadibus, *Φήλου πρίνο*, Theophrasto teste. Italis, *praesertimq; Hetrusci, Cerrosugaro*.

PHELLODRYS.

F O R M A.

Caudicem habet suberi nō *Mart*
abfimilem, & folia & glandes quercui siue cerro fimilia.

L O C U S.

Nascitur in agro Senensi *idem*.
in montanis syluis.

Q U A L I T A T E S.
E T V I R E S.

Non differt suis in facultatibus ab alijs glandiferis. *idem*.



H ; CASTA-

CASTANÆ, Græcis Κάσταναι ἢ σαρδάναι κάλανοι ἢ διδο κάλανοι ἢ λήπια. Arabibus, *Sadianaluch Castal, & Stebulor*. Italis, *Castagne*. Germanis, *Kistun*. Hisp. *Marones*. Gallis, *Cuistaignes*. Boemis, *Kastany*.

GENERA.

Matth. Domesticæ, & sylvestres. In domesticarū genere habentur maiores, quæ marones vocantur, & minores, quæ peculiariter Castanæ vocantur.

FORMA.

Matth. Arbor est procera, amplaq; folijs oblongis, iuglâdis similibus, venosioribus tamen, & per ambitum fimbriatis, fructu echinato: nuce intus solida, altera parte plana, altera gibbosa, triplici tegminis ambitu septa, membrana primū tenui, crispâq; & amara, mox lento ac coriaceo cortice, demum echinato calyce, alba intus pulpa, ac dulci. Ligni materies solida, ac diuturna.

LOCVS.

Idem. Montibus, & opacis gaudet magis, quam apricis, & campestribus.

QUALITATES.

Diosc. Adstringunt, cum ipsæ nuce, tum quoq; membrana subrufescens quæ carnem ambit.

VIRE.

Diosc. Dantur contra venena, & *Auic.* præsertim contra Ephemerum. Item ad tussim antiquam: prunis inassatæ, & cum saccharo deuorata. Flatus gignunt, & concoctu difficiles sunt, sed ubi rectè concoquuntur, memorabile alimentum præbent, crudæ tamen magis nocent. Siftunt tum alui, tum ventriculi fluxiones. Dantur cruenta expuentibus. Tritæ cum sale, melleq; subactæ, imponunt vtiliter rabidorum canum morfib; & cum polenta, & aceto illitæ mammarum duritias excutunt. Venerem excitant, & caput grauant. Tenuis earum membrana ex vino austero pota duarum drach. pondere, sistit valenter immodicos alui fluores, & sanguinis reiectiones, quin etiam cum pari ramentorum eboris pondere, alba vteri profusa, ex Nymphææ aqua potæ.

CASTA-



CASTANÆ EQVINÆ.

FORMA.



Arbor est spectata proce- *Matth.*
ritatis, folio pentaphylli, senis
tamen diuisuris: & ricini fo-
lio lōgè grandiore, longo, te-
nuiq; pediculo nirente. Echi-
nos fert in cacumine magni-
tudine nostratibus æquales,
subrufo colore, verum durio-
re ac crassiore, aculeis raris
sed robustis, ac firmis. Singuli
singulā includunt castaneam,
nostratibus haud dissimilem,
crassiorem tamen, rotundio-
remq;: Cortice subnigrican-
te, præterquam anteriori par-
te, ea enim albicat, macula
cordis figuram præferente.
totus idem robustus est, nulla
alia intus tunica, quæ carnem
ambiat: Sapor pulpæ nostra-
tibus ferè similis habetur, sed
dulcior paulò, nec adeo man-
dentibus gratus.

LOCVS.

Constantinopoli primum *Idem.*
ad me allata sunt.

QUALITATES.

Adstringunt: & flatus deuorata pariunt.

Idem.

VIREs.

Equinæ vocata sunt, quod anhelosis, & tussientibus equis deuorata sint sa- *Idem.*
lutares. Dantur quoque sanguinem reijcientibus.

H 4 GALLA,

stata, &
dubire-
agis no-
pienti-
canum
t. Vene-
eropota
inis re-
iprosta-
ASTA:

GALLA, Græcis *καλίσ*. Arabibus, *Hafes*, *sive Hafus*. Italis, *Galla*. Germanis, *Gallëpfel* / *sive Eychëpfel*. Hispanis, *Galla* & *Bughala*. Gallis, *Noix de galle*. Boemis, *Galles aneb bublinkj*.

GALLA.

GENERA.

Diosc. Altera omphacitis, altera plana.

FORMA.

Diosc. Omphacitis, parva est, rugosa, solida, nullo foramine peruia, vutq; acino magnitudine æqualis. Plana nucis iuglandis magnitudinem explet, cortice leui fungosa medulla, perforataque, & anteriore parte coronata.

LOCVS.

Plin. Nascuntur Gallæ, in omnibus glandiferis arboribus. Verum in quercu copiosiores habentur, ac vtiliores.


QUALITATES.

Gal. 7. simp. me. Omphacitis exiccat ordine tertio, & refrigerat secundo, acerbum admodum est medicamentum, frigidū, terrenūq;: repercutit fluxiones, & partes laxas contrahit, ac constringit. Altera, quæ maior est & flaua, desiccatur & ipsa quidem, sed râtò minus, quantò minus acerbæ qualitatibus est particeps.

VIRES.

Diosc. Gallæ omphacitides tritæ excrescentias in carne, fluxionesq; gingivarum atque oris vlcerationem cohibent. Nucleus dentium cauernis inditus dolorem sedat. Cremata vino, aut aceto extinctæ, sanguinem supprimunt. Decoctum eorum ad vulnæ procidentia, fluxionesq; in deflectionibus vtile, capillos denigrant aceto, aut aqua macerata. Illinuntur vtiliter dysentericis, caliacisque cum vino, aut aqua, ac etiam potui dantur. Integratum decoctum, potum iisdem auxiliatur affectibus. In summa, vbi adstringere, siccare, ac sistere sit opus, præstantissima sunt auxilia, sed dis inflammationes sanant, & procidentia cohibent.

RHVS.



NOMINA.

121

RHVS, Græcis *ρῶς*. Arabibus, *Sumach*, *Rosbar Sardifcos*, seu *Rosaidicos*. Italia
Rhu siue *Somacho*. Germanis, *Gerberbaum*. Hispanis, *Sumach*, & *Sumagre*.
 Gallis, & Officinis, *Sumac*.

RHVS.



FORMA.

Arbuscula est binum fere **DIOSC.**
 cubitorum altitudine, folijs
 oblongis, subrubentibus in
 ambitu serratis ilicis modo.
 Botros profert acino quadā-
 tenus lato vuarum gracilium,
 densos, magnitudine tere-
 binthi.

LOCVS.

Nascitur in montibus in- **DIOSC.**
 ter saxa.

QUALITATES.

Adstringit, & desiccatur or- **Gal. 8.**
 dine tertio, & refrigerat se- **simp. me.**
 cundo.

VIRE S.

Foliorum decoctum capil- **DIOSC.**
 los denigrat, atq; etiam utili-
 ter dysentericis infunditur, &
 potandum propinatur. Instil-

latur auribus purulentis, folia ex aceto, aut melle illita gangrenas, & pterygia
 cohibent. Semen eisdem præbet effectus: caeliacorum dysentericorumq; ci-
 bis inspergitur. Fracta, desquamataq; ac sugillata, illitum ex aqua ab inflam-
 matione tuetur. Linguae asperitates cum melle abstergit, candida foeminarum
 profluvia sistit, hæmorrhoidas sanat addito querno carbone. Gummi quod è
 trunco profilit, cauis dentium inditum dolores finit. Recentium vuarum suc-
 cus, & seminis cortex, eadem omnia possunt.

H 5

VIBUR-

RHVS,

VIBURNUM, Italis, quibusdam Viburno, quibusdam verd Lantana. Gallis, Viorne & Maufrage.

VIBURNUM.

FORMA.

Math.

Ramis exit digitali crassitudine, bicubitalibus, folijs ferè vimeis, crassioribus & incanis, sensim per ambitum ferratis. Flores edit albos, umbellatim coherentes, à quibus acini prodeunt, lentium modo pressi, qui primò rubescentes, ultimò nigricantes fiunt: Virgæ adeo lentæ flexilésq; sunt, vt ad fascies colligandos, peridoneæ habeantur.

LOCVS.

Idem.

Nascitur in sepibus, frutetis, & incultis collibus.

QUALITATES.

Idem.

Folia aspera sunt, & gustu adstringentia, fructus, vbi ad vltimam peruenit maturitatem, aluum exoluit.

VIREs.

Idem.

Foliorum decoctum, ex vino austero paratum, vacillantes dentes confirmat, & gingivarum rheumatismos cohibet, atqui longè magis valebit, si cum oliuæ folijs decoquantur in posca: Gargarissatur idem ad Columellæ procidentiam, & ad faucium fluxiones. Acini immaturi in pulverem triti dantur ad alui fluxiones. Paratur è radicibus corticibus sub terra maceratis, & diu tulsis viscum ad aucupia haud inutile.

CENSURA.


Non desunt, qui plantam hanc Viburnum minimè esse contendunt, sed decipiuntur,

COTINVS.



COTINVS, Italis, *Scotano*, & *Rosa*. Germanis, *Welsch Preßelgholtz*.

C O T I N V S.



F O R M A.

Planta est fruticosa, folio *Matth.* saq; ramis tenuibus, numerosq;, cortice rufescente: folijs densis, Terebinthi rotundioribus, ac latioribus, graueolentibusque, materie adeo flaua, vt ad lanificia coloranda maximè insectoribus expetatur. Gerit in ramusculorum cacumine papposam quandam congeriem, colore ex candido rufescente, in qua siliquæ oblongæ hyperici ferè modo proueniunt.

L O C V S.

Prouenit copiosa in Tri- *Matth.* dentino agro, Veronensi, & in alijs non paucis Italiae locis. & præsertim in Apennino monte.

Q U A L I T A T E S.

Vis illi adstringentia inf- *Matth.* gnis, exiccans, cohibensque.

V I R E S.

Foliorum decoctum in collutionibus adhibetur auxiliatur, oris, & linguae *Matth.* vlceribus, quineriam columella, & faucium fluxionibus. Valet idem ad genitalium quoq; vlcera, si eo saepe abluantur. Adduntur folia in defensionibus, quæ ad menses cohibendos parantur. Siccorum foliorum ac ramusculorum puluis, ventri prius aceto rosaceo illito admotus. alii fluxiones quasunque compescit. Expetitur tota planta coriarijs admodum ad suas spissandas pelles.

P A L M A.

PALMA Græcis, *ελειθε*. Arabibus, *Machla*, *sive Nachal*. Italis, *Palma*. Germanis, *Dattelbaum*. Hispanis, *Palmera*. Gallis, *Palmiers*, *sive Dattiers*.

PALMA.

GENERA.

Theoph. Mas est & Fœmina: Vtraq; fructifera: quin etiam, & humilis palma habetur.

FORMA.

Matth. Arbor Palma est procera, caudice squamoso ramos in cacumine tantum fundit in orbem actos caecuminibus ad terram pectantibus: folijs longissimis, duplicatis gladij figura: Flores profert numerosos, tenuibus quibusdam villis appensos, in magni racemi modum, Crocinis facie similes, sed multò minoribus. Si antequam emergant magno quodam cœluduntur involucre, quod palmam elatem vocant, quo tandem dehiscente emergunt, & panduntur. Hinc subinde Dactyli prodeunt, qui per Autumnum vnâ cum ficubus maturefcunt, rufo colore, nucleo intus durissimo, oblongo, canaliculatoq;.

LOCVS.

Matth. Nascuntur præstantiores in Iudæa, & Aegypto: Cypri, Lybiaq;, & in alijs quoq; Europæ regionibus. Sed ibi raro fructus ad maturitatem perducunt.



QUALITATES.

Gal. 8. Est adstrictioris facultatis omnibus suis partibus, at fructus eius, & maximè dulcis, non *simp. me.* paucam obtinet caliditatem.

VIREs.

Diosc. Contra alui scæminarumq; profluvia in vino austero bibitur. Hæmorrhoidas sistit, vulnera illitu glutinat. Dactyli dolorem capitis inferunt, copiosiores in cibo inebriant. Sicciore sanguinem excreantibus, stomachicis, & dysentericis vtilis in cibo: Medentur esu faucium asperitati. Nuclei in crudo fistili ad albedinem vsq; cremati, Spodij vicem supplent. Vim adstringendi habent: Valentq; contra oculorum vnam, & pustulas: corporis excrescentias cum vino reprimunt, & vlcera ad cicatrices perducunt. Auxiliantur deuorati scæminis albo vteri profluvio laborantibus, & præsertim si exempto osse infarciantur Eboris Scobe, Margaritis, carollis rubeis, & deinde sumantur à ieiunis quotidie tres aut quatuor.

PALMA

PALMA Humilis, Græcis, χαμαίπῆρες. Italis, *Palma minore*. Siculis, & Neapolitanis, *Cefaglioni*.

PALMA MINOR.



F O R M A.

Crescit fefquicubitali longitudine, folijs cæteris abfimilibus, fed breuioribus longè, & anguftioribus. Flores edit ex obliquo capillacea quadam coma emergentes, è quibus bacca racematim prodeunt. Pars radici propinquior in globum extuberrans internū, germen quoddam quod cerebrum vocant numerosis inuolucris circumfeptum habet, tenerimum, fapidum, & ori gratiffimum.

L O C V S.

Nafcitur in Sicilia, & Creta, & alijs quoq; regionibus.

Q U A L I T A T E S.

Adftringendi pollent fa- cultrate. Itaque roborant, & cohibent.

V I R E S.

Germen quod cerebrum vocant eftur fecundis men-

sis pro bellarijs cum pipere, & falis modico, perinde, ac carduus, & cinara: Eft enim fapidum, & ori gratiffimum. Id (vt aliqui aiunt) ad venerem excitandam præftare haud parum creditur: folia præftant, ad fportulas, tegetes, & capitis vmbracula: Rami verò vna cum folijs ad fcopas parandas, pro verrendis domibus, funt enim non folum ad hoc peridoneæ, fed etiam vtilis, quod non conterantur nifi tempore longo. Cætera cum maiori palma communia habet. Bacca fua adftringenti vi, dantur contra omnes corporis fluxiones.

* T H A M A-

* THAMARINDI, vulgo, Indis Puli & Ambili. Græcis ἐξουίνυς.

T H A M A R I N D I.

F O R M A.

Fructus est pulpa nigra cum ossibus durissimis in massas coacta, sapore acido non ingrato. Eius arbor à varijs autoribus varie describitur. Nempe folio salicis à Serapione, qui fructum rubrum copiosiore carne, quam siliquæ & firmiore, coloreq; ex luteo in nigrum languescente & pingui succo scatente ipsi tribuit. Garzias inquit arborem esse magnitudine Fraxini aut Nucis, aut Castaneæ, ligno densò non fungoso: ramosam & multis folijs ornatam tenuiter incisis magnitudine palmarum: fructum noctu folijs inuolutum, interdiu panis ostendi arcuatum, digito inflexo similem, cute viridi, ante maturitatem, postea cinereo, ubi sicatur, qui facile auelli possit, pulpa viscida & lenta, cuius est vsus abiectis nucleis, qui intus continentur satiuorum lupinorum magnitudine, quodammodo rotundi, sed plani, colore furui, sed leues, Fructus viridis acidus est non sine suauitate. Mihi planta è semine nata est folio coluteæ fere, sed longiore, cuius imaginem hic exhibemus.



L O C V S.

Nascuntur multis Indiæ locis, sed qui locis montosis & ad septentrionem obuersis proueniunt, præferuntur & diutius incorrupti manent.

Q U A L I T A T E S.

Refrigerant & exiccant tertio ordine, aut saltem ipsius initio.

V I R E S.

Thamarindi infundi solent pondere §. 4. in aqua frigida aut stillatitia in tybi liquore per tres horas, vt facta expressione exempti inspersiq; modico Saccharo propinentur ad purgandos biliosos humores & pituitosos incidendos & attenuandos. Indi sine molestia se purgant Thamarindis cum oleo nucis Indicæ sumptis. Folia vero Thamarindorum tria partibus corporis erysipelate infectis imponunt.*

Arabibus,

Arabibus, Italis, Siculis, Ciprijs, Musæ.

M V S A.



F O R M A.

Planta est vnicaulis quinū *Mattk.* senūve cubitorum longitudine, folio arundineo, quod tamen per quam longo latōque ambitu se diffundit, adeo ut tricubitali longitudine: latitudine verò scilicet cubitali ac etiam quandoq; grandiore, * per medium folium costata perpetua & crassa discurret, aliquando aculeis quibusdam à tergo armata *, caulis squamoso vestitur cortice arundinum ferè modo. Evertice germen emergit molle cubitali longitudine à quo alia ab origine ad summum prodeunt germina, è quibus fructus quidam oriuntur, cucumeris mediocris magnitudine, cortice fici: Substantia pulpæ consistit Melopeponum modo, nullo intus nucleo, aut semine, sapore cum quadam insipiditate dulci.

L O C V S.

Nascitur in Syria, Egypto, Idem. Cypro, & Sicilia.

Q U A L I T A T E S.

Excalfacit in medio primi, & in fine eius humectat.

Serap.

V I R E S.

Fructus estur in cibis, sed parum alit. Priuatim prodest thoracis, pulmonis, & vesicæ ardoribus, aluum emollit, verum liberior eius vsus stomacho aduersatur, quin etiam lecur obstruit: Factum in vtero alit, affectis renibus opitulatur, yrinam ciet, & Venerem stimulat.

Musæ

Musæ imaginem cum fructu iam maturo, hic etiam excudi curauimus, ut rei plantariæ studiosis cumulatissime satisfiat.



CVCIO-

NOMINA.

129

CYCIOPHERA, Græcis, Κονκίφερον. Italis, *Cuciofera*.

CYCIOPHERA.

FORMA.



Palmam tum caudice, tum *Theoph.*
folijs, hæc planta refert: ve- *lib. 4. cap.*
rùm à Palma differt, quod *4. de pla.*
hæc simplex indiuiduâq, *al. hyß.*
furgat, illaverò cùm aliqua-
tenus adoleuit, scindatur, &
bifida fiat: iterumque horum
vtrinq; pari modo diuidatur,
& subinde virgas breues &
multas proferat. Nos tan- *Matth.*
tum fructum vidimus. quo fit
vt plâta imaginem hic osten-
dere nequeamus. Fructum *Theoph.*
itaq; profert, magnitudine,
figura, & succo singularem.
Quippe magnitudine, ferè
qua manum impleat, figura
rotundum, colore flauican-
rem, succo dulcem, & ori gra-
tissimû, non racematim con-
gestum, vt in Palma, sed per
singula discretum: nucleo ma-
gno vehemèter duro, ex quo
anulos detornant, quibus in
versicolorib⁹ stragularijs vin-
culis vtuntur. Materies à Pal-

ma plurimum distat. Altera enim rara corpore, neruosa, & viridis, altera spissa,
grauis, carnosaq; & cæsa crispa admodum atq; dura.

LOCVS.

Prouenit copiosa apud Persas, & Indos.

Plin.

QUALITATES, ET VIRES.

Fructus non differt admodum à dactylorum facultatibus.

Idem.

I

MALVS

MALVS Punica, Græcè *πόσειδον*. Arabicè, *Cuman*, *Ruman*, *sive Roman*. Italicè, *Melagrano*: *sive Pomo granato*. Germanicè, *Granatöpfelbaum*. Hispanis, *Granadas*, *sive Romanas*. Gallis, *Pomes de Grenades*, aut *Mygrames*.

G E N E R A.

MALVS PVNICA.

Matth.

Domesticū alterum, alterū Sylvestre: Domesticorum tria genera, alia n. dulcia sunt, alia acida: vinosa verò nonnulla.

F O R M A.

Idem.

Arbor quæ Punica poma profert minimè procera est, folijs ferè myrti, sed maioribus, rubro inhærente pediculo. Rami illi sunt flexiles, aculeatiq;. Flores punicei, calathi modo patuli, ore stellatim circumsepto, è quo folia prominent tenuia coccineo colore: agrestis papaveris æmula, granulis quibusdam capillamentis appensis, ut in Roda: Poma cariaceo vestiuntur calyce, exterius rufo, interius flauo: innumerus granis repleta, succosis vinosisq;, ossiculo intus latente, quæ intercurrentibus flauis, tenuibusque membranis, miro quodā naturæ ordine distinguuntur. Ligni materies flaua, cinereo libro vestita.



L O C V S.

Idem.

Seruntur in hortis, Vincis, & viri Jarijs. Sylvestres sponte nascuntur in collibus, & maritimis locis & aridis.

Q U A L I T A T E S.

Diosc.

Malum Granatum omne adstringentem facultatem obtinet. Acida tamen plus adstringunt, quam vinosa. Et hæc magis quam dulcia. Acini longè magis adstringunt, ac exiccant, quam vinum. Et his valentius quoq; putamen, & cytini. Vinum autè præter adstrictionem refrigerat, & exiccat.

V I R E S.

Gal. lib. 8.

simp. me.

Dulcia stomacho utiliora, sed febrientibus obsunt. Acida æstuantem stomachum iuvant, & urinam cient. Vinosa nē diu fortissunt naturā. Acinorum nucleis acidi punici, insolati, & obsonijs in pulverem sparsi fluentem aluum & stomachū sistunt. Dantur vtiliter sanguinem ex-puentibus ex caelesti aqua. Acidorum succus coquitur cum melle, ad oris, & pudendorū vlcera, Cytini & Balusti sanguinolenta glutinant: & humida gingivarū vitia curant, & eorum decocto dentes cū moti firmanantur. Enterocellis quoq; vtiliter illinuntur. Malicorium hæc omnia præstare potest. Radicis decoctum potu latas ventris tineas pellit. Exprimatur è sylvestribus cytini succus qui insolatus, hypocistidis vicem explet, Malicorium ex vino decoctum, ac illitum pernicioses sanat.


*MALA

*MALA Punica, vulgo Mala Granata. Germanis Granatöpfel / vel Martze
Magdalenenöpfel.

MALA PVNICA.

F O R M A.

Exhibemus hic differenti-
am Malorum Punicorum tri-
plicem, non tamen negamus
inueniri plures posse. Dulces
continebat acinos & corticis
colorem magis fuscum quam
cetera habebat, quod superio-
rem locum hic obtinet, & quo
grana possunt aspici, dissectum
quoque pingitur. Postea ma-
lum Punicum minus adieci-
mus quod flavo & eleganti ru-
bore distincto cortice grana
intus acida tegit. Vltimum lo-
cum tenet, quod vulgo Mu-
zum vocatur, & medium quasi
consistit inter acida & dulcia,
quanquam interdum utraq;
magnitudine superat. Corti-
cis flavedo minus hilaris est,
saturatius tamen rubet.*



MYRTVS Græcis, *μύρτιν*. Arabibus, *Aes*, *Alas* *sive* *As*. Germ. *Welschheidebeer* baum. Italis, *Myrto Mortina & Mortella*. Hispanis, *Murta*, *sive* *Raiam*. Gallis, *Meurte*.

G E N E R A.

Matth. Duo Satiuum, & Sylvestre: Satiui duplex est genus, candidum, & nigrum: Extant quoq; alia duo genera nempe Exoticum, & Tarentinum.

F O R M A.

Idem. Satiua facile in arborē adolefcit, at sylvestris magis fruticat. Folijs utrāq; sunt oblōgis, crassiusculis, firmis, odoratis, in acutum desinentibus: ramis obsequiosis, floribus candidis, numerosis, intus capillamentis, eximio odore. Satiuarū utrūq; genus baccas fert oblongas, aggregatas oleas quadantenus referentes: & multo sylvestribus maiores, parvis numerosisque intus nucleis.

L O C V S.

Idem. Satiua in hortis, viridarijs, Vineis, & aucupijs feritur, sponte vero nascens Maritimis plurimum provenit locis, & circa amœnorum lacuum ripas: sed in Hetruria in syluosis quoque collibus virefcit.

Q U A L I T A T E S.

Gal. 7. Constat ex contrarijs substantijs, virefcit tamen in ea frigidum terreum, habet verò & tenue quiddam calidum, vnde valenter desiccatur.

V I R E S.

Diosc. Semen datur sanguinem expuentibus: & in vesicę erosionibus. Baccarum vinum Stomacho vtile vrinam cit, & prodest potū ad phalangiorum, & scorpiionum ictus ex mero. Idem præsumptum crapulam arcer. Præstat idem etiam semen, quo illito fluentes capilli continentur. Foliorum decoctum ad infestationes vbi adstrictione opus sit, plurimum præstat. Foliorum farina ex vino illita luxatos artus iuuat, inflammatos ictus, quin & testium inflammationes. Myrteum condimentum languidos ventriculos roborat, idcirco & cæliacis, & dysentericis vtile. Frondes, itemq; baccarum semen tritum contra fungorum strangulationē mirificè præstant. Baccæ quoquo modo haustæ, aut deuoratæ cor corroborant, & eius tremori mirificè conferunt.

MYR-



MYRTVS Tarentina. Italis. *Mortina Tarentina.*

MYRTVS TARENTINA.



FORMA.

Folio est nostrate longè mi *Matth.*
nore robustioreq; fructu co-
piofiore, sed minuscule & in
summitate pluribus apicibus
coronato. colore ex nigro
purpurascēte, minutis, cre-
bris, albicantibusq; intus of-
ficulis: floribus nostratis simi-
libus.

LOCVS.

Prouenit copiosa in Apu- *Idem.*
lia circa Tarentum. vnde illi
nomen.

QUALITATES ET
VIRE.

Non differt viribus, quali- *Matth.*
tatibusq; à nostrate.

F O R M A.

Matth.

Folio est nostrati haud ab-
mili, dilutior tamen, acumi-
nata, copiosioreque. & adeo
denso, ut eo rami ubiq; stipen-
tur. Fructum fert oblongum, è
longoq; pediculo dependen-
tem, lacinibus refertum, flo-
res albicant, ut in ceteris gene-
ribus.

L O C V S.

Matth.

Seritur in Italia in hortis, &
viridarijs, tanquam peregrina
ad topiaria opera contexenda.

Q U A L I T A T E S, E T
V I R E S.*Matth.*

Nō differunt viribus, & qua-
litatibus à ceteris generibus.
Folijs siccis utuntur Coriarij
non solum huius sed omnium
Myrti generum ad spissanda,
crispandaq; coria.



MYR-

NOMINA.

135

MYRTILLVS, Vitis Idæa, Græcis *χαμαίμυρτος*. Italis, *Myrtillo*. Ananienſibus, *Calauæ* *Χα*. Germanis, *Heidelbeer*.

MYRTILLVS.

FORMA.

Frutex eſt cubitalis, caudi- *Matth.*
ce duro, ramis tenuibus, vi-
reſcentibusq; ſolijs myrti mi-
noribus, robuſtis, lenſimque
perambitū ferratis: flores edit
tintinnabuli eſſigie, inter fo-
lia è petiolis dependentes, co-
lore ſub puniceo, ruſo intus
ſtamine: è quibus baccæ ſub-
naſcuntur, Myrti non abſimi-
les, ſed paulò minores, vinoſæ
& auferiuſculæ: & ſumma par-
te vinbilitæ, cæruleo colo-
re ad nigrum inclinante.

LOCVS.

Prouenit in montibus, & *Matth.*
ſyluis.

QUALITATES.

Fructus refrigerat, exſiccatur, *Idem.*
roborat, reſprimit, & cohibet.


VIREs.

Dantur baccæ cūm recen- *Idem.*

tes, tum quoq; ſiccæ deuorandæ dyſentericis, & cæliacis. Eduntur quoq; æſta-
te fragorum vice à paſtoribus. Nam auferiuſculæ cum ſint, & vinoſæ, ſitim ex-
tinguunt, & non ingratus ſunt cibus. Vſurpantur ab infectoribus ad coloranda
ſtamina, cæruleo colore; ac etiam à pictoribus: Germani autem Pharmacopæi
ijs paſſim vtuntur Myrti baccarum vice, cūm ijs deſtituantur.

I 4

*VITIS



MYR-

*VITIS IDÆA rubra. nonnullis Rhus minimus Plinij. Germ. Rot-Heidelbeer/
Steinbeerlin, Kronsbeer. Gallis Aurelles rouges.

VITIS IDÆA RVERA.

FORMA.

Suffrutex est exiguus, folijs
buxi, interdum leuissime ceu
ferratis marginibus, flosculis
arbuti candidis, confertis, ex
quibus bacce rubetes in sum-
mitate ceu corona quadam
denticulata nascuntur, sapo-
re acidæ & astringentes, radix
tenuis serpit.

LOCVS.

Amat loca syluosa saxosaq;
& copiose crescit circa abie-
tes atq; piceas.

QUALITATES.

Frigidam & siccam habent
facultatem & simul adstrin-
gendi vim maiorem quam ni-
gri myrtilli.

V I R E S.

Pulueres efficiuntur ex aci-
nis aridis, & exhibentur calculosis. Horum quoque in dysenteria vsus est non
contemnendus.*



CERA-

CERASA, siue Cerasia, Græcis, κεράσια. Arabibus, *Sarasse*. Italis, *Cirege*. Germanis, *Kirschen*. Hispanis, *Cerejas*. Gallis, *Cerises*.

CERASIA.



CENSURA.

Diuerſa ceraſorū ſunt genera: nā alia dulcia, alia ſubamara, alia auſtera, alia acida, alia inſipida habentur: quin etiam alia domeſtica, alia ſylueſtria.

FORMA.

Arbor folia fert, meſpilo *Idem*. latiora, per ambitum ferrata: flores albos, racematim prodeuntes, è quibus rubentes oriuntur bacca, è longis pediculis dependentes, & pro na parte diuiſe, duro intus officulo. piſi magnitudine, in quo nucleus includitur. Ligni materies fibroſa, compactaque, cortice læui, & inuolucris pluribus reſerto.

LOCVS.

Domeſtica Ceraſus in hor *Matth.* tis, vineis, & viridarijs ſeritur. Sylueſtris in ſyluis prouenit, ac etiam in vallibus.

QUALITATES.

Quæ dulcia ſunt, magis *Gal. lib. 7.* quæ in intellinis ſunt, ſubduſimp. me.
cunt, ſed ſtomacho minus v-

tilia habentur. Contra verò auſtera: Quæcunq; verò acida ſunt, pituitosis excrementosisque ſtomachis conueniunt: ſiquidem auſteris magis deſiccant, & non nihil etiam incidunt. Sylueſtria autem cæteris adſtringentiora ſunt.

VIRES.

Viridia alium leniunt, ſicca verò cohibent. Gummi quod è trunco emanat, *DIOSC.* communem cum omnibus viſcoſis, & mordacitate carentibus medicamentis *Gal. loco* facultatem obtinet, quæ ad arterias exaſperatas accommoda eſt. Propriè autem *citato.* calculis vexatos ex vino potum adiuuat. Idem cum vino potum veteri tuſſi me- *DIOSC.* detur, colorem commendat, viſum exacuit, & appetentiam incitat.

CHAMÆCERASVS, Græcis, χαμαικέρως. Italis, Ciregionano.

CHAMÆCERASVS.

FORMA.


Matth. Arbuscula est Spitama paulo maior. Baccæ, quæ cum austeris magnitudine certant, breui petiolo innituntur, sapore austero, ac adstringenti.

LOCVS.

Matth. Prouenit spontè cum in valle Anania in agro Tridentino, tum in Boëmia, & Austria secus itinera, & prope sepes.

QUALITATES,
ET VIRES.

Matth. Baccæ cum cæteris austeriora habeantur, etiam cæteris sicciora iure fuerint, magisque adstringentia.



SILIQVÆ,

NOMINA.

139

SILIQVÆ, Græcis, Κεράρια. Arabibus, Charumb. Italis, Carole, & Carobole. Germanis, S. Johannis Brodt. Hispanis, Alfarbas Carrouges. Officinis, Carobe. Gallis, Caronge.

SILIQVÆ.

FORMA.

Arbor, quæ Siliquas pro-
fert, folio viret fraxino latio-
re, duriore, ac magis circinna-
to. Floret discedente hyeme,
aut vere iam appetente, fru-
ctificat verò Æstate & Autu-
mno, dependentibus siliquis,
primum viridibus, & deinde
cùm siccantur, ex rufo nigri-
cantibus, mansu lignosis, sed
dulci pulpa, succoque prædi-
tis: Semine Ægyptiæ Siliquæ
haud dissimili.

LOCVS.

Nascuntur copiosè in Apu-
lia, Campania, Creta, Syria,
Cypro, ac alijs calidioribus
regionibus.

QUALITATES.

Adstringunt, & exsiccant. Gal. li. 7.
simp. me.

VIRE S.

Recentes stomacho aduersantur, & alium solvunt. Eadem siccata sistunt, DIOSC.
stomachoque vtiliores sunt. Vrinam quoq; ciunt. Eadem etsi omnium con-
sensu adstringunt: compertum est tamen earum decoctum potum misce-
re iuuare tussientes, ob dulcem melleamque substantiam, quæ ijs inest.

*SILIQVÆ

*SILIQVÆ SYLVESTRES, vel Arbor Iudæ, alijs Cercis, nonnullis Fabago vel Siliquastrum, item, Cucuaia. Germanis, Wild Johannes brodt / Judas Baum. Gallis, Gaynera. Italis, Carobaria. Hispanis, algarouo loco, vel Arbor a' amor,

FORMA.

Speciosa admodum est arbor, & interdum satis magna fit, nullo germinandi ordine: caudex plerunq; non recta attollitur, sed incuruatur & declinat. Folia representant avari figuram, sed multo ampliora sunt, & singula longis petiolis dependent. Flores promit primo vere purpurascens, ex quibus Siliquæ gignuntur latæ, rubræ, siue potius purpureæ, in quibus semen, ut in Cerasijs, sed longè minus.

LOCVS.

Amat loca umbrosa & aspera. Circa Bononiam copiosè nascitur. In Germania ex semine provenit, & in hortis colitur.*

SILIQVÆ SYLVESTRES.



MALA,

MALA, Græcis, Μᾶλα. Arabibus, Tufa, seu Tufalta. Italis, Mele, seu Pomi. Germanis, Depffel. Hispanis, Manzanas. Gallis, Pomes.

MALA.



GENERA.

Numerosum sanè est malorum genus, ac magis quàm explicari possit sapore, forma ac mole diuersum. Alia enim austerū, alia acidū, alia dulcē simul, & austerū, quædam dulcē, & manifestè acidum, & nonnulla cum acore acerbum saporem habent.

FORMA.

Malorum arbor vnico tantum exit caudice, ramos inde statim in longū, latumq; mittens, crasso satis libro, colore exterius cinereo, & intus flavo: folijs virescit oblongis & tenuiter per ambitum serratis. Flores mittit albos, foliatos, aut ex cædido senim purpurascentes, è quibus poma oriuntur, forma, colore, magnitudine, & sapore varia.

LOCVS.

Domestica in hortis, vineis, & pomarijs habetur. Syluestria verò locis campestribus, tum etiā in syluis, & collibus spontè nascuntur.

QUALITATES.

Adstringētia mala, succum frigidum, terreumq; habent. Acida autem frigidum quidem, sed tenuium partium. Mediæ autē temperaturæ sunt dulcia, quæ ad calidius vergunt, quemadmodum omnis qualitatē expertia, insipidave, ad frigidius inclinant. Syluestria cæteris adstringentiora habentur.

VIRES.

Cruda in cibis omnia ferè refrigerant ventriculum: quamuis dulcia quæ Adioscopia vocantur minus lædant, & quæ in hyemem & ver asservantur: vbi prius maturuerint. Præstant dulcia ad Melancholicos affectus: quin etiam, ad pleuriticos. Ea enim si cineribus incocta, & Glycyrrhizæ succo, amylo, & Saccharo albissimo conspersa propinentur, tam mane, quàm vespere, illos quidem mirificè iuuant.

COTONEA

Fabago
Judas
vel arbor

MALA

COTONEA Mala, Græcè, *Κυδώνια μῦλα*. Arabicè, *Saffargell*. Italicè, *Mele Cotonè*. Germanicè, *Küsten/sive Quitten*. Hispan. *Membrillos*. Gall. *Pomes de Coing*.

GENERA.

DIOSC. Tria Cotoneorum numerantur genera. Palma illis quæ propriè Mala Cotonea nominantur. Secundo loco Struthia vocata, & tertio quæ media inter hæc habentur, Miluiana seu notha appellata.

FORMA.

Matth. Præstantiora, & quæ primas tenent, pressa sunt, & in toros ferè diuisa. Melopeponum modo colore ad aurum inclinato. Lanuginosa, & cæteris odore præstantiora. Struthia maiore admodum corporis mole spectantur, & forma magis pyra, quàm mala referunt. Miluiana autem inter hæc media, cum facie, tum sapore, odoreque esse videntur. Arbor cõmuni malo ferè similis est: atqui folia angustiora sunt, læuiora, carnosiora, robustioraque, & à tergo albicantia, florem fert album sylvestris rosæ figura.

LOCVS.

Matth. Prouenit nata in hortis, vineis, & viridarijs.

QUALITATES.

Idem. Valenter adstringunt, cohibent, roborantque: quin etiam refrigerant ordine primo, & siccant secundo.

VIRES.

DIOSC. Cocta, tostave Stomachum iuuant, & vrinam cient. Præsumpta aluum cohibent, contra verò citant. Pro sunt celiacis, dysentericis, & purulenta excrementibus, præsertim cruda. Succus crudorum datur vtiliter orthopnoicis. Decocto fouentur vtiliter sedis, & valvæ procidentia: Illinuntur cruda ad cohibendam aluum, & vomitiones. Vinum ex his expressum hæc omnia quoque præstare potest, quin etiam oleum quod ex ipsis conficitur, inunctum. Seminum mucago illinitur vtiliter omnibus inflammationibus, & linguae scabritiem lauigat.

*COTO-



* **COTONEA** Maiora, siue Struthia. Græce *στροβιλήνα*, vel *στροβίλα* Galeno. Germanice, *Grosse Quitten*.

Huc refer quæ de alijs sunt dicta.*



PERST-

ele Coto-
de Coing.

ant ordi-

am cohi-
excrean-
Decocto
ibendam
stare po-
mucago
figat.
Coto-

PERSICA, Græcis, *περσικὴ μῆλα, καὶ ῥοδάκνηνα*. Arab. *Sauchfeu, Chauch*. Ital. *Pesche, & Persiche*. Germ. *Pfersich*. Hispan. *Pexegos*. Gallis, *Pesches*. Polon. *Broşkyini*.

G E N E R A.

P E R S I C A.

Matth.

Persicorum perplura reperiuntur genera: Quædã enim rubent, alia aureo colore fulgent, alia virescunt, alia albicant, alia sanguineo succo madent, alia duracina vocantur, quæ duriores sunt pulpa: & quæ ab osse non diducantur. Et alia Cotonæa, alia nucipersica, quæ nucum Juglandium faciem representent, appellantur. Sunt etiã quæ pro nucleo amygdalâ dulcẽ habeant Persica amygdalâ appellata.

F O R M A.

Idem.

Persica malus arbor est folijs Amygdalæ per omnia similibus, quemadmodum & floribus, quamvis in persica magis purpurascens spectetur. Ligni materies fragilis, radicesque imbecilles, nec altè descendentes, unde fit, quod hæc arbor cito cõsenescat, & cadat.

L O C V S.

Idem.

Habetur vbique copiosa in Italia, sed in Apulia copiosissima provenit.

Q U A L I T A T E S.

Gal. li. 7.
simp. me.

Germina, & folia vincetem habent amaram qualitatem. Alioqui sanè etiã digerens medicamentum est. Fructus verò eius, nempe esculentum hoc persicum, humidior est, & frigidior temperie.

V I R E S.

Diosc.

Gal. li. de

alim. fac.

Matth.

Acerba Persica aluum cohibent, sed sicca vehementius. Decoctum è siccis alui stomachi machinæ fluxiones sistit. Pravi succi sunt, & quæ faciliè corrumpuntur. Flores recentes deuorati non solum aluum deiciunt, sed vomitiones quoque faciunt. Hydropticorum aquam pellunt: sed non absque egrotantium incommodo. Lachryma arboris datur ex plantaginis aut portulacæ succo ad sanguinis reiectiones: tussientibus verò & anhelosis ex Tussilaginis aqua, & Croci momento: facit quoque ad raucedinem & arteriæ impedimentum. Datur calculosis cum succo raphani, aut limonum, duarum drachmarum pondere. Recetia folia illinuntur vtiliter ventri ad interaneorum vermes, ex aceto. Eorundem succus vermiculosus, ac purulentis auribus vtiliter infunditur.

* P E R S I C A



NOMINA.

148

*PERSICA rubra siue sanguinea. Germ. Diote Pfirsich.

PERSICA RUBRA.

FORMA.

A reliquis parum discrepant nisi maiora essent & intus saturate rubente & quasi sanguineo succo turgent. Caro etiam à nucleo non facile abscedit sed firmitus adhærescit.*



K MALA

st. Fructus
temperie.

cis alui sto
Flores re-
nt. Hydro-
yma arbo-
rulentib.
ad rauced-
monū, dua
aneorū ver
r infundit.
PERSICA

MALA Armeniaca, sive Præcocia. Græcis, Μῆλα ἀρμενιανὰ ἢ πρæκοκία, ἢ ἐρρι-
κία. Arabibus, Mermex mex, Mesmes, sive Mismis. Italis, Armeniache, Bacoche,
Moniache, & Grisomele. Germanis, S. Johannis Pfirsich. Hispanis, Alcincoques.
Allarchigas, Aluaricoques. Gallis, Abricot Carmagnoles, & Chicandeliç.

ARMENIACA MALA MAIORA.

GENERA.

Matth. Plures eorum visuntur spe-
cies, magnitudine, & sapore
quoq; differentes.

FORMA.

Idem. Arbor rarò procera admo-
dū visitur. Folia fert Piri haud
ab similia, subrotunda, & per
ambitum ferrata. Flores al-
bos, cerasi modò, è quibus
fructus prodeunt persicorum
forma ac ferè magnitudine,
aureo colore, sæpe cum pur-
pura misto, os omnia infra se
concludunt, vtraq; parte tur-
gens, in quo nucleus conclu-
ditur, in quibusdam amarus,
in quibusdam verò dulcis.

LOCVS.

Idem. Habentur in hortis, vine-
is, & Viridarijs.

QUALITATES.

Gal. lib. 7. Fructus humidior, frigidi-
simp. me. orque est, vtrunque secundo
quodammodo excessu.

VIRES.

Matth. Oleum è nucleis expressum, mirificè valet ad inflammatas hæmorrhoidas
inunctum. Valet quoq; ad vlcera tumores, & ad linguæ impedimenta: & pa-
riter ad aurium dolores. Idem potus vnciarum quinq; pondere, cum vini Cre-
tici vncia, calculos pellit, & colicos iuuat.

ARME-



ARMENIACA minora, Græcis, Μῆλα ἀρμενιακά μικρά. Italis, præsertimq̃, He-
truscis Armoniache, Bacoche, & Moniache minori: Inlubribus autem, & Venetis
Armellini.

ARMENIACA MINORA.

FORMA.

Arbor est, mali proceritate, *Matth.*
folijs albae populi, floribus ce-
rali admodum similibus, ac pa-
riter racematim prodeunti-
bus. Fructus edit mali Persici
effigie, minores tamen, colo-
re aureo subrutillante, & odo-
re iucundo.

LOCVS.

Habentur passim in hortis, *Idem.*
viridarijs, & vincis.

QUALITATES,
ET VIRES.

Non differunt suis in facul- *Idem.*
tatibus à maioribus. verùm ta-
men austeriori sunt sapore.



CITRIA MALA, siue medica mala, Græcis, Μήδινά, ῥεῖλα, ἢ κεδρόμηλα. Italis, Cedri, & Citroni. Germ. Citron Deyffel/siue Züden Deyffel. Hilp. Cidras. Gal. Citron.

CITRIA MALA, SIVE MALA MEDICA.

GENERA.

Matth. Maiora, & minora.

FORMA.

Idem.

Proueniunt maiora melopeponū magnitudine. Minora verò paulò limonibus grandiora: & gustu suauiora. Planta quæ perpetuo pomifera est, aurantiorum ac limonum arbores magnitudine æquat. Folijs virescit perpetuis, aurantiorum similibus, vbiq; veluti acu tenuissima perforatis, foraminibus, visum effugientibus. Flores edit ex albo purpureascentes: solidos, calathi figura è quibus poma proueniunt, oblonga, rugoso cortice, flauo, ac luauē odorem spirante. Acidam includunt medullam, succo plenam, in qua semen reconditur hordei figura, sed quadantenus crassius: duro obductum cortice, amaro sapore. Arbor nunquam sine fructu visitur.

LOCVS.

Idem. Natale solum ijs est calidis Regionibus, maritimo præsertim tractu, & circa amœnos lacus, & si etiam serantur in hortis, & vinctarijs.

QUALITATES.

Gal. lib. 7. Succus vincentem habet qualitatem acidam, & siccam, ut ipse, tertij sit ordinis exiccantium, refrigerantiumq;. Cortex autem exicat, & non parum habet acrimonie, & proinde desiccatur secundo excessu, non tamen frigidus est, sed aut temperatus, aut paulò infra. Porro caro pariter crassi sitici est, & puitosa frigidaq;. Semen amarum est, & digerendi videlicet, siccandi; facultatem obtinet secundo quodammodo ordine à temperatis recedens. Folia verò & digerunt & exiccant.

VIRE S.

Matth. Semen in vino potum venenis resistit, peculiariter autem Scorpionum ictibus aduersatur, aluum mouet: oris suauitatem commendat. Succus grauidarum malacia succurrit. Pomum vestiaris impositum, tinea abigit. Idem totum venenis aduersatur, & succurrit pestilentialibus febribus affectis. Cortex in charo, aut melle conditus, ventriculum, & cor corroborat. Succus flauam reprimat bilem, & pestis contagia arceat, & situm sedat.

MALA



MALA Limonia, Italis, *Limoni*. Gallis, *Limons*. Germ. *Limonen*.

LIMONIA MALA.



G E N E R A:

Maiores & minores quæ et. *Matth.*
iam succi bonitate differunt,
& corticis crassitudine. Nam
quæ grandiora sunt, & succo,
& cortice, carneq; longè sunt
præstantiora.

F O R M A.

Planta perpetua frondevi. *Idem.*
ret, quemadmodum & Citrus,
folijs etiam similibus, sed pau-
lò angustioribus. Flores fert
albos, & odoratos, à quibus
poma oriuntur oblòga, citri
faciem referentia, atq; etiam
colore magis diluto. Eadè o-
mnib; ferè gètib; nota sunt,
magis quàm describi debeant.

L O C V S.

Seruntur tanquam peregrini. *Idem.*
na in hortis, & viridarijs, &
quanquam mangonio cultor-
um in frigidis regionibus vi-
uant, quod hyeme in conca-
meratis cellarijs recòdantur,
earum tamè proventus non
est nisi in locis calidis, & præ-
sertim maritimis, & circa la-

cus amantissimos. Ideoq; in Apulia, Calabria, & alijs Regni Neapolitani regio-
nibus copiosa limonia proueniunt.

Q U A L I T A T E S.

Idem qualitatibus prædita sunt, quibus & Citria mala.

Idem.

V I R E S.

Sirupus qui è limonũ succo paratur, extinguit non solùm bilis feruorem; sed *Idem.*
quoq; ad sitim extinguendam, & ad pestilentes febres conducit. Aqua distilla-
ta è limonum acida pulpa: expetitur mulieribus ad faciei nitore conciliandum,
quin etiam ad vitiligines, & corporis, cutisq; infectiones delendas, nam & va-
ros delet, & acaros quoq; interimit. Sirupis admista, datur vtiliter acutè, aut cò-
tagiosè febrientibus. Eadem lumbicos necat. Immaturo limonis succus, seculi
ciæ pondere cum vino potus calculos renum pellit.

K 3

AVRAN-

AVRANTIA mala. Italis, *Aranci*. Germ. *Pomeranz*. Gallis, *Pomme d' Orenge*.

AVRANTIA MALA.

GENERA.

Matth. Sunt quæ dulcia: quæ acida: & quæ inter hæc media habentur, ut de punicis quoque diximus.

FORMA.

Idem. Arbor est citro similis, & perinde ac illa perpetua comaviret, folijs lauro latifoliae proximis ac suaviter odoratis, crassis, lævibusq; , & in acutum desinentibus. Ramos habet flexiles, ac obsequiosos; topiarijs operibus haud inidoneos, aculeis firmis, acutisq; refertos. Cortice ex viridi subalbicante: flores albos odore per quam præstanti, è quibus suavis admodum distillatur aqua. Poma fert rotunda, aureo colore, odorataq; . Cortice crassiore, pulpa, & succo referta, in qua semen citri simile.

L O C V S.

Idem. Seritur in viridarijs, & hortis: Maritimis præsertim tractibus: Abundant ijs Campania, Apulia, Calabria, & aliæ Regni Neapolitani regiones, quin etiam Liguria & Benaci Lacus viridaria.

QUALITATES.

Idem. Refrigerant & exsiccant, quæ scilicet acida, & vinosa sunt: dulcia verò caloris non sunt expertia. Cortex omnium calidus est.

VIRES.

Idem. Aqua è floribus distillata, præter quam quod præstâtissima habetur ad odoramenta: præstat quoq; pota sexvnciarum pondere ad sudorem ciendum: quare datur vtiliter cõtra febres pestilenciales, in quibus exanthemata spectantur in cute. Cor corroborat, & spiritus viuificat. Cortex saccharo conditus ventriculorum roborat, & flatum pellit. Omnium succus sitim exstinguit & febrientes iuvat, præter dulcium aurantium. Nam is febrientibus non adeò salubris est, nec sitim sedat.

P O M A



POMA ADAMI. Italis, *Lomie* & *Pomi d' Adamo*. Germ. *Adams Deyffel*.

POMA ADAMI.

FORMA.



Arbor quę hæc edit poma, *Matth.* folio est *Limonię* Arboris maiore, patentioreq; ramis etiam similibus: floribus *Citrei mali* æmulis, fructu *Aurantij* duplo, triplove maiore rotundo: Cortice haud crasso, pallido, crispo, & inæquali fixuris quibusdam apparentibus, perinde ac dētibus demorso, succosa, acidaq; mader pulpa, sapore limonum haud lōgè absimili, insipidiore tamen, in qua semina latitant. citrei mali, aut limonij æmula. Hęc poma, quidam putant limonia esse fœminini generis.

LOCVS.

Seruntur cum *Citrij*, li- *Idem.* monijs, aurantijsq; malis, & iisdem, vt illa proueniunt locis.

QUALITATES.

Idem.

Refrigerant, exiccant, & adstringunt.

VIRES.

Præstat eorum succus ad ea omnia ad quę limonia præstare diximus: minore *Idem.* tamen efficacia: Peculiariter autem valent poma ad scabiem, si per medium secta: & tenuissimo sulfuris puluere aspersa, & deinde feruentibus cineribus calefacta, scabiosis corporis partibus infricentur.

K 4

PYRA,

PYRA, Græcis, *ῥαία*, Arabibus, *Humechte Cirmette*, *sive Kemetry*. Italis, *Pera*. Germanis, *Pyren*. Hispanis, *Peras*. Gallis, *Poyres*.

P Y R A.

G E N E R A.

Matth. Multa ac varia pyrorū numerantur genera, odore, sapore, colore, forma: ac proventu differentia. Quin etiam & Sylvestria quoq; copiosa visuntur.

F O R M A.

Matth. Varia est quoq; pyrorum facies: quodd cū omnibus notum sit quemadmodum & plāta: nec huius nec illorum formam describere libuit.

L O C Y S.

Proueniunt vbiq; in collibus, agris, Vineis, hortis, & viridarijs. Sylvestria verò locis incultis, & in syluis.

Q U A L I T A T E S.

Gal. lib. 5. Vim habent exiccandi: ac
simp. me. etiam adstringendi: Atqui
& 2. de a. Sylvestria longè magis ad-
lim. fac. stringunt. Huc quoq; referri possunt quæ de malis & punicis dicta sunt: namq; sapor vires palam facit.

V I R E S.

Diosc. Pyra adduntur vtiliter in repellentibus cataplasmatibus. Decoctum siccorum, & cruda ipsa aluum adstringunt, ieiunos esitata lædunt. Recentia cocta esu stomacho grata sunt: Sylvestria præstant dysentericis, cæliacis, & sanguinem excreantibus. Ligni arboris cinis datur vtiliter potandus contra fungorum strangulationem: ad quod etiam valet pyrorum sylvestrium succus potui datus: Quin etiam si ipsa cum fungis coquantur, eos innoxios reddunt.



MESPI-

MESPILVS prima, Græcis, μέσπιλον, ή μεσπίλη, Αβανία. Arabibus, Zarat, Zarny, & Alzarur. Italis, Azarolo. Hispanis, pariter Azarolo.

MESPILVS PRIMA.

G E N E R A.

Duum Mespilus est generū DIOSC. folijs, & fructu diuersum.

F O R M A.

Primum genus arbor est *Math.* spinosa, mediocris proceritatis, & materia Pyro haud absimili, folijs laciniatis Apij æmulis, aut Oxianthæ, floribus albicantibus, racematim coharētibus. Fructus illi sunt Sorborū crassitudine, rubentes, vulgaribus mespilis equales, sed arctiore vmbilico, tribus intus ossiculis.

L O C V S.

Copiosa Neapoli, ubiq; in *Idem.* viridarijs, & vineis.

Q U A L I T A T E S.

Fructus acerbus est ante- *Gal. li. 7.* quam matureseat, refrigerat, *simp. me.* exiccat, & adstringit, quæ etiam qualitas in germinibus & folijs viget.

V I R E S.

Ventris fluxiones cohibent fructus, & multò fortius quàm sorba. Siftūt fau- *Gal.* cium gutturis quæ fluxiones, ubi eorum decocto os collatur. Dantur vtiliter in DIOSC. mulierum granidarum malacia. Condiuntur cum zaccharo, & asseruantur ad *Math.* omnia supradicta.



MESPILVS vulgaris, Græcis, μέσπιλον, ή μεμεκίλη. Arabibus, Zaror zarur, & Al-zarur. Italis, Nespulo. Germanis, Dessel. Hispanis, Nesper. Gallis, Nespier.

F O R M A.

Matth. Folijs est mali, sed minoribus: flores fert albicantes, Cotonæ mali æmulo: fructū rotundū latiore umbilico, quinque acutis processibus coronato.

L O C V S.

Habetur in vineis, hortis, & sepibus.

Q U A L I T A T E S.

Gal. li. 7. Fruct⁹ acerbi admodū sunt, simp. me. & strenuè coercentes, multò & 2. de 4. fortius quàm sorba. lim. fac.

V I R E S.

Diosc. Adstringunt vehementer, aluum fluentem cohibent.

Matth. Sicca folia in pulverem aspersa, recentia vulnera glutinant, & sanguinis profluvium sistunt. Dantur vtiliter sanguinem reijicientibus. Mespilorum officula in pulverem contrita, renum calculos valenter pellunt, vbi cochlearis mensura ex vino, in quo vulgaris Petrosilini radices decoctæ fuerint, ebibantur.

MESPILVS VVLGARIS.



L O T V S.

NOMINA.

155

Lotus, Græcis, λωτός. Arabibus, Sedar, siue Alfadar. Italis, Bagolaro, siue Perlaro. Germanis, Zurgelbaum. Hispanis, Almez. Gallis, Alyfier.

LOTUS, SIVE CELTIS.

FORMA.



Lotus arbor est vasta magnitudinis, incisuras foliorum habet, perinde ac Ilicis. Baccas fert Cerasi minores, per maturitatem nigrescentes, & longo pediculo nirentes cerasorum modo: nulli cortex iucundior, aut oculos excipiens blandius: nulli rami longiores, validioresque, aut plures, ut dixisse totidem arbores liceat.

LOCVS.

Montes & valles amat, & expetitur domibus, ramorum petulantia.

QUALITATES.

Non ita multo adstrictioris facultatis est particeps, sed & tenuium est partium, & exicatoria.

VIRES.

Baccæ aluum sistunt, ramentorum ligni decoctum, siue potum, siue Clysmate infusum dysentericis, ac foeminis vterinis fluxibus laborantibus auxiliatur. Rufat capillos, & defluentes cohibet, & citam aluum cohibet.

CENSURA.

Sunt qui contendunt Athenæo Zyzophum nostratē lotum designare, sed decipiuntur, & hallucinantur.

PSEUDO-

PSEVDOLOTVS, Italis, *Loto bastardo*.

PSEVDOLOTVS.

FORMA.

Matib. Arbor est procera, folijs latis, oblongisque, firmis, ac nervosis, fructu Sebestenorum effigie, sed longè minore, colore per maturitatē cæruleo, pluribus intus ossiculis, sapore non ingrato.

LOCVS.

Idem. Italiæ peregrina hæc arbor est, & raris in viridarijs habetur.

QUALITATES.

Idem. Eadem ferè illi qualitates sunt, quæ legitimæ loto tribuntur.

VIRES.

Idem. Vires quoque eadem illi sunt, si rerum experimentatoribus credimus.



CENSURA.

Non rectè sentiunt, qui Pseudolotum hanc Guaiaci plantam esse putant.

LOTVS

Lotvs Africana altera, Italis, *Legno santo, sed falso.*

LOTVS AFRICANA ALTERA, SIVE
LOTI AFRICANÆ SPECIES.



FORMA.

Arbor est procera, folijs al- *Matth.*
terius loti latioribus, baccis ro-
tundis, acuminato tamen ca-
cumine, colore caruleo subni-
gricante. Hæ pediculis carent,
calyculis tamen ima parte ob-
ductis, perinde ac glandes, &
Mixa, arboris ramis, & surcu-
lis seriatim coherent.

LOCVS.

Habentur arbores multis in *Idem.*
locis in Italia, è longinquis ta-
men regionibus allata.

QUALITATES,
ET VIRES.

Sunt qui velint arborem *Idem.*
hanc eisdem cum loto pollere
viribus. Id quod nos quoque
putamus.

CENSURA.

Aberrant, qui hanc loti spe- *Idem.*
ciem, Guaiaci esse Plantam
contendunt.

CORNVS,

CORNVS, Græcis, *Κεραία*. Italis, *Corniola*: Fructus *Cornole*, & *Cornie*. Germanis *Arbor*, *Cornelbaum*, *Surberbaum*, siue *Dierßen*; Fructus, *Welsch Kirschen*. Hispanis, *fructus Cornizelos*. Gallis, *Cornier*, Fructus verò *Cornoille*.

GENERA.

Theoph. Duum est generum. Quædam enim mascula est, quædam verò femina.

FORMA.

Theoph. Masculæ folia habet Amygdalæ (re autem vera virgæ sanguineæ vocatæ, haud dissimilia) Corticem heruosum, & tenuem, caudicem nō nimis crassum. Cæterū femina virgas paruas amerinæ salicis modo è latere profert, & fruticosior est. Nodos ambæ perinde ac Amerina, tum geminatos, tum inuicem cōgruos habet. Mari materies excors, tota quæ solida. Fœmina verò medullam continet, & mollior est. Flos oleæ, baccæ oliuissimiles, oblongæ, rufi colore, & singulari pediculo, plures, ossiculū intus habet oblongū oliuæ modo, in quo nucle⁹ sapore dulci, odoratuq; grat⁹. Ambæ fructū ferūt, sed fœminæ vix gustabilē esse dicūt.

LOCVS.

Matth. Nasçitur in syluis, in collibus, & dumetis.


QUALITATES.

Gal. li. 6. Fructus admodum acerbus est, ideo valenter adstringit, folia quoque & gemina acerba sunt, valenter quæ desiccant.

VIRE.

DIOSC. Baccæ in cibo adstringunt, ideoq; albo profluuiio fœminarum atque dysenterix salutes, sanies quæ virentia folia torrendo resudarunt, impetigini conuenienter illiniuntur: folia maxima vulnera glutinant in duris hominum corporibus. Ligni materies, quod durissima sit, & admodum robusta, expetitur, pistonnarijs fabris, ad parandum rotarum dentes: aduersatur lignum à cane rabido demorsis, nam huius tantum contactu in rabiem aguntur.

VIRGA



VIRGA sanguinea, Italis, *Sanguineo*, & *Sanguinello*. Germanis, *Hartriegel*.

VIRGA SANGVINEA.

FORMA.



Arbor est fruticosa, virgis *Matth.* corno tenuioribus, robustis, ac geniculatis, cortice sanguinis modo rufescente, folijs firmis, nervosis, cornoque proximis, brevioribus tamen, ac latioribus: Floret vere, umbellis subalbicantibus, è quibus baccæ oriuntur orobi magnitudine, primū virides, & per maturitatem nigricantes, racemosaque, è quibus oleum exprimitur rusticis, ad lucernarum usum.

LOCVS.

Nascitur in sepibus & frutetis. *Idem.*

QUALITATES,
ET VIRES.

Baccæ, amaro, acerbo, adstringenti que gustu sunt, itaque abstergunt, roborant, cohibent, ac repellunt. Idem quoque præstat oleum, quod ex eis elicatur.

SORBA,

SORBA, Græcis *ῥοβία*. Italis, *Sorba*. Germanis, *Speyerling* / *Sporöpfel* / *huc Speyerbiern*. Hispanis, *Sorbas*. Gallis, *Sorbes*, & *Cormes*. Boëmis, *Kzerbiny*.

SORBA.

G E N E R A.

Matth. Duo Sorbi domesticæ arboris genera, alterū quidem mas, alterū fœmina: quæ pomorum diuersitate noscuntur. Duo item quoque syluestrium, quorum alterum Terminaliale vocatur.

F O R M A D O M E S T I C Æ.

Matth. Vtraque caudice exit recto ac longo, ramis in altum assurgentibus: folijs fraxini, sed angustioribus, auersa parte albicantibus, & per ambitum serratis: flores profert albos racematim prodeuntes, è quibus fructus pariter racemosi, in altera quidem orbiculari, & succo odoratiore, ac mitiore, in altera verd o-uati pyri faciem referētes, & gustui asperiores, insuauioresq; , & minus olentes, colore pallido, in latere rufescente. Hic mas, ille fœminæ esse creditur. Ligni materies durissima & compacta. Fructus straminibus imposti aut suspensi, maturantur.



L O C V S.

Idem. Habentur ferè vbique locorum in Campis, Vineis, & Viridarijs.

Q U A L I T A T E S.

Gal. li. 3. Adstringunt vt Mespila, sed imbecilliore effectu.

simp. me.

V I R E S.

DIOSC.

Sorba deuorata aluum sistunt, & præsertim sicca anteaquam maturescant. Id quod præstat earum farina, si polentæ loco sumatur. Quod & decoctum eorum in potu præstat. Datur vtiliter farina delingenda dyentericis, cœliacis, & sanguinem reiicientibus, ac etiam fœminis vterinis fluxibus opportunis.

SORBUS

NOMINA.

161

SORBUS Sylvestris, vel Aucupalis, Italis, *Sorbo saluatico*. Ananienſibus, *Temelo*. Germanis *Eberaſchen*/Vogelbeer.

SORBUS SYLVESTRIS.

FORMA.



Folia, & ferè vniuerſa plan- *Matth.*
tæ huiusce facies, à domesti-
ca parum differunt. Fructus
verò aliter ſe habet. Ex mu-
ſcarijs enim, ſambuci modo
dependet, ſed baccis quadru-
plo maioribus, colore aureo
ſubruſcente, ſapore acerbo
adſtringentiq;.

LOCVS.

Prouenit ſyluoſis, ac frigi- *Idem.*
dis locis inter cæteras agre-
ſtes plantas.

QUALITATES
ET VIRES.

Baccæ adſtringunt, ſiccant, *Idem.*
& repellunt. Aſſeruantur
hyeme ad aucupia, quòd tur-
dis gratiſſimæ ſunt. Arboris
virgæ quod ſolida, robuſtâ-
que ſint materie, expetuntur
à ruſticis pro ſtimulis boum
parandis.

L SORBUS

SORBUS Torminalis, Italis, Sorbo Torminale, & Sorbo Saluatico. Germanis, Wilder Sperwerbaum. Boemis, Vuoskerusse. Fructus, Elsbeer.

SORBUS TORMINALIS.

FORMA.

Plin.

Matth.

Folio exirviginoso, Platani modo, læui, haud infirmo, baccis racematim coherentibus, asperiusculis, & oblongis, coronato umbilico, colore ferrugineo: Sapore ante maturitatē perfectam acido, & austero, postea non iniucundo.

LOCVS.

Matth.

Nascitur in syluis, cum cæteris syluestribus.

QUALITATES.

Matth.

Baccæ adstringunt, non tamen adeo valenter, vt domesticæ.

VIRE.

Matth.

Plin.

Possunt eadem omnia quæ domestica: sed inefficaciora habentur: Adstringunt enim aluum, & dysentericorū torminibus vtilia sunt, vnde illi nomen.

CENSURA.

Matth.

Decipiuntur profectò, qui hanc Torminalis Sorbi plantam Crateogonum esse censent, seipsosq; accusant, negligenter legisse Plinium.

PRVNVS,



PRUNVS, Græcè, Κοκκύμυλ. & Κοκκυμυλέα. Pruna verò Κοκκύμυλα. Arabi-
bus Anas, Anas, siue Agias. Italis, Pruno susino, Fructus Sueine, & Sueine. Ger-
manis Pfannen / & Kiechen. Hispanis, Prunas, Andrinus, Ciruelas, Ame-
xeas. Gallis, Arbor Prunier, fructus Prunes.

P R V N V S.



G E N E R A.

Prunorum genera, varia, Matth.
& multiplicia sunt facie, ma-
gnitudine, colore, & sapore
differentia.

F O R M A.

Arbor est procera, radici. Idem.
bus haud altè descendentibus,
paucisq; caudice sub-
recto, cortice scabro, multis
ramis brachiato, folijs latis
oblongisq; per ambitum ser-
ratis: floribus candidis, folia-
tis, racematim prodeuntib.
Fructu carnosio, tenui vesti-
tus cuticula, ossiculo intus
oblongo, in quo nucleolus.

L O C V S.

In vineis, hortis, & virida- Idem.
rijs habetur.

Q U A L I T A T E S.

Folia refrigerant, exiccant, DIOSC.
adstringunt, prohibent. Fru- Gal.

etus verò aluum subducunt, idq; recentes magisque sicci.

V I R E S.

Folia Pruni in vino decocta, collutione, & gargarizatu, Columellam, gin- DIOSC.
guas, tonsillâsq; fluxione laborantes reprimunt. Arboris gummi aggluti-
nat, & ex vino potum, calculos rumpit. Idem ex aceto illitum: infantium li-
chenas sanat. Recentia pruna deuorata stomacho inutilia sunt.

L 2

* Pruna

* Pruna cerea præcocia, Germanis, *Spilling* / & Serotina, *Zipparten*.

P R V N A C E R E A.

F O R M A.

Præcocia parum differunt à reliquis prunis sed tamen toto habitu inelegantiora videntur, cortex stipitis scabrior, folijs acuminatioribus vestiti rami, oblongioribusque, Fructus verò cerei plerumque; copiosiore sætu arbores onerāt, præcociores sunt reliquis prunis & pulpa minus lapida constant. Serotina minora sunt, colore quoque cereola, sub finem octobris colliguntur, subdulcia, modice astringunt, plura, quinq; ferè, ceu à botro dependent.

L O C V S.

Hortis vinetisq; hæ quoque arbores familiarissime sunt.

F A C U L T A T E S.

Præcocia aluum subducunt vt alia pruna dulcia, sed cauendum à nimio ipforum esu, nam ventriculum grauant & putredini obnoxia sibi similes humores gignunt, ideoque multis alui profluuium nec non dysenteriam conciliant.

Serotina vero saluberrima vulgo putantur & visceribus, imprimis pulmonibus, utilia. Siccata & cocta addito saccharo placent.*



P R V N V S

PRUNVS Sylvestris, Græcis, Κοκκύνη & ἀγρία. Fructus, Italis, Prugnole Sal-
uatiche. Germanis, Schlehdorn / arbor, Fructus, Schleen. Boemis, Trnfi.

PRUNVS SYLVESTRIS.



FORMA.

Humilis est arbuscula, fru. Matth.
tiosa, & ubiq; aculeata, folio
fatiuæ Pruni longè angustio-
re, duriore, asperioréque, flo-
ribus albis, ac numerosis. Bac-
cis vuæ Acinis æqualibus co-
lore in purpura nigricante.
Viridi intus pulpa, austero,
adstringente admodum gu-
stu. In quibus os includitur
ceraforum simile.

LOCVS.

Nascitur in dumeris, sepi. Idem.
bus, & Syluis.

QUALITATES.

Tota planta exiccantis, ad Idem.
stringentisq; est facultatis,
quemadmodum & bacca.

VIREs.

Bacca Cæliacis, & dysen. Idem.
tericis vtiliter deuorantur.
Eadem cum arbusculæ radi-

cibus, ex aqua vel austero vino decoctæ, sanant oris, linguæ, gingiuarum, Co-
lumellæ, & faucium vlcera, & fluxiones tum collutione, tum gargarizatu,
quare non parum recreantur hoc medicamento, qui hydrargyro peruncti
oris vlceribus, & fluxione laborant, & præsertim addito Lycio, alumine, &
Rhodomelle. Idem decoctum in defensionibus auxiliatur feminis vteri pro-
fluuiio obnoxijis. Aqua è floribus distillata, interficit hausta intestinorum ver-
mes, oculorumq; fluxiones cohibet.

SEBESTENA, Græcis, Μύξα, μύξα, & μυξάρι. Arabibus, *Sebesten Motheica*, *Makeira*, & *Mokaita*. Italis, *Sebesteni*. Gallis, *Sebeste*.

SEBESTENA.

F O R M A.

Matth.

Arbor est Sebestenus Pruno non admodum dissimilis, folijs comatur pruni rotundioribus, ac firmioribus. Floribus albicantibus, racematis prodeuntibus, è quibus Baccæ oriuntur, prunis parvis similes, calyculo quodam ut glandes ima parte colligatæ, ossè intus triquetro, in quo nucleus. Ii maturitatem adepti in atrum virescunt, gustu prædulci, ac lenta, tenaciq; pulpa, ex qua Syri, & Ægyptij viscum ad aucupia parant.

L O C V S.

Idem.

Proueniunt in Syria, & Ægypto, unde ad nos conferuntur.

Q U A L I T A T E S.

Idem.

Emolliunt, sitim sedant, & aluum citant.

V I R E S.

Idem.

Baccæ à cortice purgatæ, linguæ asperitatem mirificè leniunt, & dantur utiliter ex flaua bile febricitantibus. Pectori opitulantur, quo fit ut tussientibus, & lateris dolore affectis opem ferant. Ventris tineas pellunt, urinæ ardoribus succurrunt. Baccæ triginta, aut quadraginta ex iure carniū maceratæ, deuoratæq; aluum commodissimè citant, sed pinguiore, crassioresque eligendæ sunt.

ZIZYPHA,



ZIZYPHA, Græcis Ζίζυφα. Arabibus, *Hunen Zufalzes, siue Hanab.* Officinis *Iuiuba.* Italis, *Ginggiola.* Germanis, *Rot Brustbeere.* Hispanis, *Azufecifa.* Gal-
lis, *Iuiubes.* Boemis, *Iuiuba.*

Z I Z Y P H A.



F O R M A.

Arbor est Zizyphus Pru. *Matth.*
no humilior, caudice con-
torto, cortice scabro, viti vi-
niferæ haud absimili, mate-
rie Oxiaanthæ proxima, ra-
dicibus firmis, ramis vbiq[ue]
spinosis, è quibus quidã pro-
cessus exeunt iunci modo
lenti, tenuisq[ue], sparti modo,
spithama longiores, è qui-
bus vtrinque per intervalla
folia exeunt, impari tamen
exortu, oblonga, nõ magna,
firma, vt in Clematide pri-
ma, & sensim per ambitum
ferrata. Flores edit pallidos,
& baccas Oliuarũ instar pri-
mum virides, subinde palle-
scentes, & per maturitatem
rubentes, in quibus os con-
cluditur oliuæ simili pulpa
dulci, & gustui non ingrata.

L O C V S.

Seruntur in hortis, & viri *Idem.*
darijs.

Q U A L I T A T E S.

In humiditate, & caliditate temperata sunt.

Matth.

V I R E S.

Exiguum præbent alimentum, difficilè concoquantur, & stomacho inuti-
lia sunt. Conferunt pectoris, pulmonis, & lateris morbis, à caliditate genitis. *Gal. 2.*
Medentur quoq[ue] cum maxime renum, tum etiam vesicæ affectibus. *de alim. facul.*

L 4

ARBVTVS,

ARBUTVS, siue Vnedo, Græcis κούρα. Arabibus, *Hariladib*. Italis, *Albatro*. Hispanis, *Madronho*, & *Madrometro*. Gallis, *Arbousier*.

FORMA.

ARBUTVS.

Matth. Folia profert laurinis similia, breuiora tamen paulo, crassioraq; colore exviridi pallescente, & in ambitu serrata, iuba per medium excurrente costa. Caudex cortice vestitur subrubro, haud crasso, aspero tamen, & squamoso, à quo rami prodeunt rubentiores. floret mensibus, Iulio, & Augusto, Floribus cædis, paruis, Lilij conuallij haud longè dissimilibus, racematim dependentibus, è quibus fructus gignuntur rotundi, Sorborum ferè magnitudine, qui primo exortu virent, deinde flauescunt, & per maturitatem rubent, aspero tactu, nullo intus ossiculo, fragorum modo, quorum etiam effigiem referunt. sapor his insipidus, simul & austerus, & vbi eduntur, linguam, & palatum stimulant, acetosa quadam substantia. quæ exterius conteguntur, integro anno maturescunt.



LOCVS.

Matth. Nascitur in collibus, & syluosis vallibus.

QUALITATES.

Gal. 7. simp. me. Arbor acerba vnà cum fructu est, qualitate: at fructus stomacho infensus est, & capiti dolorem infert. Adstringit, roborat, & inspissat.

DIOSC.

VIRES.

Matth. Arboris folia experuntur Coriarijs ad spissanda coria: Non desunt, qui foliorum stillatitia aqua vtantur aduersus pestem, eam in principio dantes cum puluere ossis ceruini cordis, magno (vt ipsi dicunt) auxilio. In summa vbi adstringere, & roborare opus est, Arbutus eximie præstat.

AMYGDA-

AMYGDALA, vel Amygdalus arbor, Fructus, Amygdala vel Amygdalum.
Græcis, Ἀμυγδαλή & Ἀμύγδαλος τὸ δένδρον, ἀμυγδαλή, vel ἀμυγδαλή, vel ἀμύγδα-
λον, ὁ καρπὸς. Arabibus, lauz kauz, siue Lauzi. Italis, Mandorle. Germanis, ar-
bor, Mandelbaum, Fructus, Mandelstern. Hispanis, Almendras. Gallis, A-
mandes.

AMYGDALAE.



V I R E S.

Amaræ illiæ vitia cutis in facie corrigunt. Eædem fronti admotæ, aut temporibus cum DIO SC.
aceto, aut rosaceo, capitis dolorem mulcent. Siliuntur ad vlcera putrescentia, serpentiaque,
& cum melle ad canum etiam morsus. Deuoratæ ventriculi dolores sanant, aluum emol-
liunt, somnium faciunt, & vrinam ciunt: dantur ad renum morbos, & ad pulmonum affectus,
cum resina terebinthina. Præstant ad coli inflationes, & præcipuè oleum ex ijs expressum.
Quibus septenisve præsumptis, ebrietatem non sentiunt potatores. A vulpibus deuoratæ eas
interficiunt, quin etiam & gallinæ. Gummi datur vtiliter sanguinem reiicientibus. Impeti-
gines ex aceto illitum tollit, tussi vetustæ cum diluto vino potum medetur, calculosis verò
cum passo. Dulces impinguant, lateris dolores, ac tussim sedant, & præsertim earum cremor, Matth.
Oleum ab ijs expressum mulcet intrinsecos dolores omnes intestinorum præsertim, vteri, ac
renum, si calidum sex ynciarum pondere bibatur, est enim certum auxilium.

L 5

PISTA-

GENERA.

Aliæ dulces, aliæ amaræ, a- Matth.
liæ maiores, aliæ minores.

FORMA.

Arbor est vtrique spectatæ Matth.
peritatis, caudice crasso, cor-
tice aspero, radicem habet vt
plurimum vnicam robustam,
grandem, altè descendentem.
Folia Persico per omnia simi-
lia, ac etiâ flores, nisi dilutiori
esset colore. Nuces edit cordis
figura, quæ antea quam obdu-
rescant, integræ cum putami-
ne comeduntur: duplici con-
teguntur putamine, quemad-
modum iuglandes.

LOCVS.

Tractu gaudent calidiore, Idem.
quo fit, vt in Apulia, & Sicilia
copiosissimè proueniant.

QUALITATES.

Dulces nihil prorsus adstri- Gal. li. 6.
ctoriæ facultatis habent, sola simp. me.
enim extenuandi, atq; abster- 2. de
gēdi facultate pollent, & mo- ali. fac.
deratè calidæ sunt. Amaræ o-
mninò extenuandi, & calefa-
ciendi, & abstergerendi faculta-
tem possident. Gummi ex cal-
facit, & adstringit.

PISTACIA, siue Pistacea. Græcis *πισταχία*. Arabibus, *Pustech*, siue *Festuch*. Officinis, & Barbaris *Fistici*. Italis, *Pistacchi*. Germanis, *Welsch Pimpernistlein*. Hispanis, *Allocigo*. Gallis, *Pistaches*.

PISTACEA.

FORMA.

Matth.

Tota arbor Terebintho similis est, folijs colore ex viridi in luteum inclinante: nuges racematim prodeunt in ramorum extremitatibus, rubra exterius tunica, & odorata, nuce intus alba, vnguentariae glandifacie simili. Internus nucleus cuticula contegitur rufa, atqui medulla virescit, sapore pineæ nuci proximo, sed odoratiore ac gratiore.

LOCVS.

Idem.

In Persia, Arabia, & Syria vnde in Italiam quoq; aduecta sunt, copiosa proueniunt.

QUALITATES.

Gal. & Auic.

Excalfaciunt, & humectant, impinguant, roborant, aperiunt, non tamen valde nutriunt.

VIRES.

Matth. Idem.

Stomacho amica sunt deuorata, aut ex vino pota. Profunt contra serpentium morsus. Venerem excitant, tabidos, & suppuratos iuuant. Iocinoris obstructions aperiunt.

STAPHILO.



STAPHILODENDRON. Italis, *Pistaci Saluatici*. Gallis, *Pistaches sauvages*. Germanis, *Wild Pimpernusslein*.

STAPHILODENDRON, SIVE
PISTACIA AGRESTIA.



FORMA.

Humilis Staphilodendron *Matth.* est planta, folio Sambuci, materie admodum imbecilli. Floribus albicantibus, racematim dependentibus, quemadmodum & fructus, qui quibusdam in folliculis prouenit, colore subrufo, Ciceris ferè effigie, sed maior, in quo subnrens nucleus concluditur, sapore dulci, sed nauscam commouens.

LOCVS.

Prouenit in Syluis, & fru- *Idem.* tetis.

QUALITATES,
ET VIRES.

Neminem habeo, qui de *Idem.* horum viribus, & facultatibus scripserit: verum cum nauscam moueant, si copiosè edantur, vomitiones eadem mouere posse non dubitamus.

Nvx

Nvx Juglans, Græcis *κάρνα βασιλική*. Arabibus, *teluz leuz*, *sue Gianezi*. Italis, *Noci*, Germ. *Nuß*, & *Welschnuß*. Hisp. *Noeses*. Gallis, *Noix*.

F O R M A.

NVX IVGLANS

Matth.

Caudice assurgit procero, ac crasso, ramis multis, ingentibus, & longè, lateq; diffusis, libro vestitur cinereo, crasso, ac rimoso. Radicibus nititur prælongis robustisq; frondibus pluribus vtrinque ab vno pediculo exeuntibus, vt in fraxino oblongis, & grauiter olentibus. Primo germinatu panniculas quasdam edit, quæ breui flauescences decidunt, quas nuces sequuntur, duplici obductæ monumento, nempe calloso primum calyce, mox ligneo putamine, crispo intus nucleo, quadripartitoq; callosa intercedente membrana. Leguntur nuces inchoante Autumno, perticis excussæ, & siccantur in umbra.

L O C V S.

Idem.

Proueniunt vbiq; in campis, & collibus.

Q V A L I T A T E S.

Gal. li. 7.

Folia, & germina adstrictio simp. me. nem quandam possident, ex-

Item 2. de terum euidentem, multamq;

alim. fac. in nucis putamine recenti pariter, ac sicco. Recentes nuces neq; adstringentis qualitatatis, neque oleosæ conspicuè sunt participes. Nuclei inueterati verò oleosi sunt, & tenues.

V I R E S.

Diosc.

Deuoratæ ægrè concoquuntur, ideoq; stomacho inutiles sunt, biliosæ, & capitis dolores inferentes, & russientib. inimicæ. Cum ruta verò, & caricis præsumptæ à ieiunis, venenis resistunt, nec minus si à veneni haustu comedantur largius deuoratæ tineas latas pellunt. Illinuntur vtiliter mammarum inflammationibus, cum mellis exiguo, & ruta, cum calyce suo perustæ, tum deuoratæ, tum vmbilico admotæ, tormina sedant. Nuclei vsti alopecijis impositi præferti sunt remedio, recentes stomacho innocentiores sunt, & illitæ liuores auferunt. Panniculæ siccæ, & in puluerem contritæ ex vino albo potæ vteri præfocationibus auxiliantur.

Matth.


Nvx



Nvx Indica. Italis, *Noce d'India*. Mauritanis, *Neregin*, *Dabig*, *sen Giaux*. Ialend.
Italis, *Noce de India*. Germanis, *Indianisch Nuß*. Hispanis, *Noiez de las India*.

NVX INDICA.

F O R M A.



Arbor Palmæ faciem ex-
plicat. Fructus tamē edit præ-
grandes, magnorum Melo-
peponum instar. Nang; ma-
gna involucri mole obte-
guntur, colore subrufescēte,
tenax, callosusque, exvillosa
tamen materie constans: quæ
manibus extrita, in capilla-
menta fatiscit. Hoc sub inuo-
lucro nux occultatur. puta-
mine plerumq; triquetro, vil-
loso atq; barbato. Cornu in-
star præduro, anteriori parte
humanam fere faciem refe-
rente, nucleo intus oui anse-
rini magnitudine, inani, sub-
stantia pingui, duriuscula ta-
men, alba, callosa que, sapore
butyroso, tenui subaspera que
cuticula obtecto.

L O C V S.

Prouenit hæc arbor copio-
sa in India Orientali, vnde ad
nos affertur. *Idem.*

Q U A L I T A T E S.

Nuces exalfaciunt, & hu-
meant ordine primo: emolliunt, læuigant, & dolores sedant. *Idem.*

V I R E S.

Additur nucleus à tenni cuticula repurgatus, in medicamentis, quibus ex-
tenuata corpora refocillantur. Idem genituram auget, & venerem allicit. O-
leum, quod ex ijs exprimitur, vtiliter inungitur ad hæmorrhoidarum dolores,
quin etiam lumborum, genuumq; cruciatus mulcet. Præstat idem, ad neruo-
rum dolores, & ad pectoris asperitates, non modo illitum, sed etiam delinctū.
Raucedini opitulatur, macie affectos impinguat, & induratos articulos emol-
lit. Quodd autem latiore sagina corpora reficiat: Idcirco maximè expetitur à
strigolis mulieribus. *Idem.*

NVX

Nux Myristica, Græcis, *Μοσχάριον, μοσχάριδιον, κέριον μυριστινόν, ἢ κέριον ἀρωμα-
πικόν*. Arabibus, *Iezbaue Iusbague, siue Glauziban*. Italis, *Noci Moscade*. Ger-
manis, *Muscatenuss*. Hispanis, *Nuez de especie*. Gallis, *Nois Muscades*.

F O R M A.

MYRISTICÆ NUCES.

Matth. Arbor, quæ Myristicas pro-
fert nuces, nostratib⁹ Persicis
haud absimilis est, angustiori-
bus tñ folijs, ac brevioribus.
Fructu nostratibus nucib⁹ in
arbore existentib. persimiles
sunt. Primò .n. crasso ac viridi
cortice cōteguntur: cui dein-
de subest nux ipsa duro satis
putamine oclusa, nostrate ta-
men tenuiore, quam macis
(quem vocant) reticuli instar
ambit: putamine autē fracto,
nux myristica inuenitur, quā
vulgus medicorū Muscatam
vocant. Id quod palam faciūt
nuces integræ, quæ ex India
melle asseruatæ ad nos cōue-
hūtur. Ceterū arbores absq;
omni cultu fructus edūt sup-
peditante tantum natura.

L O C V S.

Matth. Afferuntur ex India, ex insu-
la præsertim nomine Badam.

Q U A L I T A T E S.

Auicenn. Excalfaciunt, & siccant or-
Serapio. dine secundo completo, quin
etiam adstringunt.

V I R E S.

Matth. Commonsa oris suauitatem commendant, & sœtentis animæ viru abolent.
Lentigines in facie emendant. Visum acuunt, ventriculum corroborant. Lie-
nem absumunt, vrinam cient, fluētē aluum sistunt, flatu discutiunt, & frigi-
dis quibuscunq; vteri affectibus mirificè profunt. E recentibus prius cōtulis,
& in cacabo calefactis, prelo exprimitur liquor, qui refrigeratus, ceræ instar cō-
crescit, fragrantissimum spirans odorem, & nervorum, & articulorum diutur-
nis doloribus, à frigore excitatis vtilissimus. Idem expetitur Venereis vnctio-
nibus. Mulcet mirificè nux ventriculi dolores, à flatu genitos, & contra vene-
rosorum animalium ictum ex vino pota maximè præstat.

Latinis,



Latinis, Nux Metella; Recentioribus Stramonium. Græcis nostris, παρονόκη-
λας, aut βαρυκόκκαλος. Arabibus, Leuzalrachaha. Italis, Noce Metella, Para-
coculi. Germ. Stechpffel/ Derrenpffel. Gallis, Pomme de Peru.

NVX METELLA.



FORMA.

Solanis eius planta adeò si- *Serap.*
milis est, ut aliud nihil quàm *Auicem.*
ipsum representet: verum *Matth.*
eius folia opiū redolent. Flo-
res gerit albos, convolvuli
maioris, siue levis similis æ-
mulos. Fructus Mespilorum
magnitudine, circumquaq;
aculeatus umbilicatusq; vi-
ridi colore, in quo semen,
Mandragoræ simile.

LOCVS.

Seritur nūc passim in hor- *Matth.*
tis, ut alia peregrina.

QUALITATES.

Frigida est excessu quarto, *Serap.*
obstruit, mulcet, vomitio-
nes ciet.

VIRES.

Pota quatuor granorum *Serap.*
pōdere cum vino foriem fa- *Auicem.*
cit ebrietatem, duorum verò drachmarum pondere hausta, statim interimit,
nisi succurratur epoto butyro calido, vomitu, & aquæ calidæ balneis cū
brachijs, tum cruribus adhibitis.

*NVCII

* *Nvci* Metellæ congener planta, Tatulæ, vel Datura, Germanis, *Yggelkol*,
ben/*Stachelnuss*. Hispanis, *Burladora*. In Malabar, *Vnnata Caya*. In Canara,
Datiro. Arab. *Marana*. Persis & Turcis, *Datula*.

F O R M A.

T A T V L A.

Caule assurgit crasso ramo-
so ultra humanâ altitudinem,
quam tamē excedit ramorum
ambit^o, folijs amplis Stramo-
niæ similibus maioribus ta-
men, & in longiores acutio-
resq; angulos desinente am-
bitu, odore opio aliquantum
similia, admodum abominan-
do. Flos in extremis ramis
prouenit vt in Stramonio, cui
subnascitur fructus oblon-
gus aculeis horridus, in quo
semina ante maturitatem cā-
didissima, postea penitus atra
efficiuntur.

L O C V S.

Nascitur in Malauar, sed
apud nos in hortis colitur.

Q U A L I T A T E S.

Frigida est excessu tertio &
secca secundi fine, & pernicio-
sa qualitate non caret.



V I R E S.

Semen dimidiæ drachmæ pondere qui hauserit, diu mente alienatus rema-
net. Si quantitas fuerit nimia, interimit. Gentiles ad prouocandas vrinas cum
pipere & folijs Betele id exhibent & perutile esse dicunt. Sed nolim experiri
cum alia medicamenta ad eam rem vtilia non desint. Semine per noctem in
aceto macerato, deinde exacte trito, vtiliter illinuntur herpes miliares &
erysipelata serpentina, nam breui sanantur. Radix verò drachmæ vnus ponde-
re ex vino pota somnum profundum inducit, in quo varia insomnia & miræ
rerum facies obuersantur.*

N V C E S

Nuces Auellana, seu Pontica, seu Prænestina. Græcis, Κάρυα ποντική, λεπτο-
 χέγυα. Italis, Nocciuole, auellane, & nocelle. Germanis, Haselnüß. Hispanis,
 Auellanas. Gallis, Noifilles, Noilettes, Auellaines.

NUCES AVELLANÆ.

G E N E R A.

Domestica, & Sylvestria. *Matth.*

Caterum ex domesticis, aliæ oblongæ, aliæ rotundæ sunt, veruntamen oblongas præstātiores, & gustui gratiores esse cōstat, & illas præferim, quæ rufo sunt putamine, & fractu minime contumaces.

F O R M A.

Arbor est, quæ rarò proce-
 ra spectatur, sed quæ ab ipsis
 statim radicibus fruticosa sit.
 Arborefcit tamen ramis in
 summitate frōdosis, folijs alni
 latoribus, crispiorib. tenuio-
 ribusque, & ambitu serratis.
 Cortice vestit tenui, & enodi
 materie: floret hæc arbor nū-
 quam, sed iulos emittit autu-
 mno longi piperis figura, quo
 tēpore folia decidunt. Nuces
 eduntur æstate, quorum puta-
 men viridi callosaq; vestitur
 membrana, molli, & quæ in
 barbæ modū simbriata prætra-
 hitur. Quanquam id nō in o-
 mnib. fiat. Nuci nucleus, quā-
 doq; albus, quandoq; purpu-
 rea vestitus membrana, dulcis, ferè Amygdalarum modo, sed duriore pulpa.

L O C V S.

Domestica habentur in hortis, vineis, & viridarijs. Sylvestres verò vbiq; p- *Idem.*
 ueniunt in syluis, & secus itinera.

Q U A L I T A T E S.


Plus habent essentiaë terrestris, ac frigidaë quā iuglandes, quin & plus alunt, *Gal. 2.*
 siquidem densiores sunt, & minus pingues. *alim. fac.*

V I R E S.

Stomacho infestæ sunt, medentur tussi veteri, si trita in aqua mulsâ sumantur. Tosta & *Galen.*
 cum exiguâ piperis potæ, destillationes concoquunt. Crematarum cinis cum axungia, aut
 visâ adipe illitus alopecij capillum reddit. Deuorata minus Amygdalis alunt, cibis in ven-
 triculo supernatant, & caput tentant, sed virides innocentiores sunt. *Diosc.*

M

AVELLA-



AVELLANÆ Indicæ, Italis, Nociuole d'India. Arab. Fauſel.

G E N E R A.

Tria nobis aliata ſunt genera.

F O R M A.

Matth. Prima, quod Serapioni Fauſel appellatur, Myſticiæ nuci ſimillima ſpectatur, niſi quod pars altera plana, altera eminentior eſt. Sed nullo penitus odore referta, & ſapore adſtringenti. Naſcitur hæc nux lanuginofa, ſeu potius capillaceo inuolucro incluſa, In dicæ nucis modo barbaro. Ar bor quæ eam profert nuci In dicæ ſimilis habetur, proceritate tamen minor. Secundum & tertium genus, ex eorum imaginibus hic expreſſis, facile quiſpiam intelligere poterit.

L O C U S.

Matth. Afferuntur ex India vna cū Myſticiſ Nucibus.

Q U A L I T A T E S.

Serap. Refrigerat, quæ Fauſel appellatur, corroborat, & valenter adſtringit.

A V E L L A N Æ I N D I C Æ.



V I R E S.

Matth. Confert calidis morbis quibuſcunque tam hauſta, quàm exterius illita: decoquitur in vino ad dentium dolores, & fluxiones. Si enim eo calido foueantur, non modò eorum dolores mulcet, ſed vacillantes firmat: illinitur quoque ad palpebrarum ſcabiem, & additur in collyrijs, quæ parantur ad oculorum inflammationes. Eſt quoque ad dyſenteriam mirificum auxilium, ex rubro vino auſtero drachmæ pondere quotidie pota, aut cotoneorum malorum ſucco. De cæteris autem generibus quid dicam non habeo.

MORVS.

MORVS, Arbor, Græcis, *Μορέα*, ἡ συρμαίνουσα. Arabibus, *Tut*, *sive Thut*. Italis, *Moro*. Germ. *Maulbeerbaum*. Hisp. *Moras*, *del Moral*. Gallis, *Maurier*.

MORVS.

GENERA.

Duum est generum, album *Matth.* videlicet, & nigrum, à fructu appellationem sortitum.

FORMA.

Nigra Morus caudice plurimū est cōtorto, gibberoq; ac nodoso. Ramos edit crassos, in latum spatiantes, libro vestitur crasso, lento ac flexili, cui materies subest robusta, & medullitus flava. Radicibus nititur numerosis, magnis, ac robustis, non tamē altē descendētib; Nigra folia latiora, crassioraq; sunt, & ambabus in acutum desinentia, & circumquaq; serrata. Nigra fructum fert Rubi, grandiorē tamē, oblongioremq; Sanguineo succo per maturitatem madentem. In alba: utem, bacca minores habetur, quæ vbi ultimā sensere maturitatis coctionē, melleā prorsus dulcedinem recipiunt.

LOCVS.

Alba vbiq; scatur Italia, ac *Idem.* et Hispania ad alēdos sericeos

Bombyces, tantum sata, Nigra verò etiam vbiq; habetur, aut in hortis aut in viridarijs.

QUALITATES.

Immatura Mora vbi auerint admodum ventrem restringunt. Maturorum succus adstringit modico: immatura vero, & tota arbor admistam quilitatem habent, exstringente, & purgante compositam, in radicis autem cortice purgatoria cum quadam amantudine exuperat qualitas. *Gal. li. 8. simp. me. & 2. de ali. fac.*

VIRE.

Mori succus decoctus in aereo vase atque insolatus adstringentiore redditur. Idem facit ad fluxiones, & tonsillarum, vnaq; inflammationes, addito mellis exiguo, immatura, siccæque coeliacos iuuant, & dysentericos. Radicis cortex decoctus in aqua, & porus aluum resolut, latus veneris tinea excutit & his quoq; auxiliatur, qui aconitum biberunt. Succus foliorum potus valet contra Phalangiorum ictus, seruet facit corticis, & foliorum iuē dentes aptissimè in dolore colluntur. Succus ex incisa radice emanans, vbi concreuerit, in dolore denium efficacax est, tubercula discutit, & aluum purgat. *Diosc.*



SYCOMORVS, Celso Morolycos. Aegyptijs, Ficus Pharaonis. Græcis, Συκό-
μορος, & Συκόμορος, vel Μορόσυκος. Arabibus, Muneiz, & Imeiz, Aliumeiz,
& Giunmeizi. Italis, Sicomoro, & Fico d' Egitto.

SYCOMORVS.

FORMA.

DIOSC.
Theoph. Arbor est magna Fico simi-
lis, frondosa, multo lacte abun-
dans, folijs mori. Fructū ter,
aut quater anno fert, non ra-
mis, vt ficus, sed caudice ipso
caprifico nō dissimili, dulcio-
rem grossis, sine granis inte-
rioribus, qui non maturefcit,
nisi prius vngue, aut ferro scal-
patur. Decerpis fructibus, a-
lij ac alij ex eodem loco sub-
nascuntur, terno ita, & qua-
terno partu copiofa.

LOCVS.

DIOSC. Nascitur plurimum in Ca-
ria, Rhodo, Syria, & Aegypto.

QUALITATES.

Galen. Succus è vulnerato cortice
manans, conglutinat, discutit,
emollit.



VIRES.

DIOSC. Fructus aluo utilis, sed perexiguū præbet alimentum, & stomacho ad-
uersatur.

PSEUDO-

PSEVDOSYCOMORVS. Italis, *Sicomoro falso*. Mauritanis, *Azadaracht*.

PSEVDOSYCOMORVS.

F O R M A.

Arbor est procera. Folijs *Matth.* vulgaris lori longioribus, & in acutum desinētibus. Baccae edit virides, è quorum ossibus Monachi verticillos parant, quibus funiculo traictis, suas numerant preces.

L O C V S.

Nusquam in Italia (quod *Matth.* sciuerim nouerimque) hac planta sponte nascitur. Habetur tamen aliunde allata, in Cœnobiorum claustris, templorum areis, & alijs in locis.

Q U A L I T A T E S,
E T V I R E S.

Deleteriae facultatis parti- *Anicen.* ceps est, sed quid præter id præstare valeat ignoratur.

C E N S V R A.

Ridiculum est credere vnà cum vulgo, hanc plantam esse sycorum.

M 3

F I C V S,



FICVS, Græcis, *σῆκα*. Arabibus, *Sin Fin, seu Tin*. Italis, *Fichi*. Germanis, *Feygen*. Hispanis, *Igos*. Gallis, *Figues*.

G E N E R A.

Matth. Varia si. num genera sunt, cùm facie tum colore diuersa.

F O R M A.

Idem. Arbor caudice plurimum est breui, contortoque, subalbicâte libro, lacteoque succo madente, gustu ad stringenti, acamaro, adeo vt exulcerare possit, materies illi alba, & fungosa, tenaxq;. Radicibus nititur multis, sed summa tellure vagantibus. Folia illi sunt aspera, ampla, firma, virginea, rotundis ac robustis pediculis nitentia. Fructus edit nullis apparentibus floribus, à foliorum exortu, extremis tantum ramis, turbinatos, & varios, siquidem alij pyri faciē repræsentât, alij se stiles sunt inter hos medij. Differunt et colore, quippe quod alix albe, alix nigrae, alix purpureæ, alix virides, alix subruftæ, alix pallide, & alix variegato colore spectentur. Molli præterea sunt pulpa, grans minutis referta, & esui gratissima.

L O C V S.

Idem. Habentur in hortis, vineis & viridarijs, in Italia, & Hispania copiose.

Q U A L I T A T E S.

Gal. 2. de alim. fac. Commeabiles sunt, & facile in totum corpus penetrant, nam abstergendi vi pollent haud obscura, flatuosa tamen sunt aliquatenus.

Diosc. Arida verò vim habent excalfaciendi ordine primo completo, aut secundo incipiente. Habent & partium tenuitatem quandam. Pinguiores magis concoquantur, gustu verò aciores, magis extergunt ac discutiunt. Arbor tenuium est partium. Lac & foliorum succus valenter calidus est, coagulat, exulcerat, aperit, soluit.

V I R E S.

Diosc. Maturi Fici aluum soluunt, sed facile sistitur fluxio, cæterisq; autumnalibus fructibus, sunt innocentiores, sitim sedant, caloremq; restringunt. Siccæ vires alunt. Guttur, renibus, vesicæ, Suspiriosis, Hydropicis, & comitialibus aptissimi sunt. Thoracem purgant. Earundē decoctū cū Hyssopo tussis veteri, diuturnisq; pulmonū vitijis cōuenit. Cum Cnici pulpa tusa, & deuorata aluū emollit. Idem arteriæ, & tonsillarū inflammationib. vtiliter gargarizatur. Coctæ, illitæq; duritias discutiunt. Crematæ, & cerato addito perniones sanant. Lacteus fici succus, lac in ventriculo concretū dissoluit, exulceratq;. Porus menstrua ciet, & infusus vermiculosas aures sanat. Percussis à Scorpione, venenatorum ictibus, & rabiosi canis morsibus auxiliatur. Cavis dentium inditus dolorem tollit. Verrucas aufert circumplisus. Lac dum coquitur, si fuligineo ramo assidue moueatur, aluum soluit.

FICVS



Ficus Indica, Opuntia. Italicè, Fico d'India. Germ. Indianische Feigen.

INDICA FICVS.

FORMA.



Arboris faciem repræsentat, quanquam sine caudice, sine ramis, germinibusq; cōstet, vt ex appicta hic imagine quispiam cernere potest. Si quidem hæc abscisso vno tantum folio, humiq; ad mediū vsque sepulto, prognatis ex se radicibus, paulò post folia superne ex ipso prodeunt, adeò vt hac serie folijs è folijs prodeuntibus in arboris speciem assurgat. Folia ei crassissima sunt, ita vt quandoque pollicis crassitudinem æquent, è quibus tenues, longæ, acutæq; prominent spinæ, etsi sine spinis etiam habeantur. Parit hæc in foliorum summitatibus, fructus pulpa, & sapore ficubus nostratibus similes, sed crassiores, & qui superiore parte in coronæ speciem desinant. Colore ex viridi purpurascente.

LOCVS.

Peregrina in Europa est arbor, & in Italia à multis, in hortis colitur.

idem.

QUALITATES, ET VIRES.

De viribus, & qualitatibus, quid veri, certi q; afferam, sanè non habeo: refertum tamen, qui Orientales Indias sunt peruagati, eorum esu cruentam reddi urinam, non sine lumentum terrore, qui horum vires ignorant.

M 4

IBERIS,

IBERIS. Græcis, *Ἰβέρη*, *μαυρά*, *ἡ ἀγριόρδεα*. Arabibus, *Seiraragi*, *Aseiraragi*, *Scitharegi*, *sive Hausab*. Italis, *Iberide*, seu *Lepidio*. Germanis, *Wilder Kress*. Hispanis, *Nasturtio montano*. Gallis, *Chasserage*, & *Passerage sauvage*, *sive Nasturtium sauvage*.

IBERIS.

F O R M A.

DIOSC. Folia habet Nasturtij, Caulis cubitalem, ramosum, florem lacteum, semen Thlaspi simile, sapore acri, grauique odore.

L O C V S.

Damocr. Nasctur secus itinera, in ruderibus, templorum arcibus, & in agrorum incultis extremitatibus.

Q U A L I T A T E S.

Excalfacit ordine quarto, nasturtij modo, minus tamen eo desiccatur.

V I R E S.

Galen. Radix contusa, cum salsa axungia, horis quaternis ad-
Diosc. alligata, Ischiadicis mirum in modum medetur.

C E N S V R A.

Hallucinantur qui Iberidem & Lepidium duas contendunt esse plantas.



Libri primi Finis.

TRIT-

TRITICVM, Græcis *τρεῖς*. Aphris, *Henta, Henea, siue Hantha*. Italis, *Grano, siue Formento*. Germanis, *Weissen*. Hispanis, *Trigo*. Gallis, *Fourment*.

TRITICVM.

GENERA.

Plura notantur genera, cum *Matth.* à locis, tum à colore, viribus, maturitate, prouentu, & spicarum numero, forma ac magnitudine denominata.

FORMA.

Triticum omne radicibus *Theoph.* numerosis, ac pretenuibus *li. 8. ca. 4.* titur: folio singulari, germinibus omnino multis, sed quæ in ramos brachiarum non possint. Tota hyeme herbaceum est: remollito autem cælo, cauliculis de medio assurgit, cuius tertio, aut quarto geniculo spica geritur, non prius euidens, quam folliculo inclusa. consumato eo, flos erumpit quarto, aut quinto post die, ac totidè ferè diebus perdurat, & post florè granum crassescit, quod ubi maturuerit, demetitur.

LOCVS.

Seritur ubiq; locorū. Locis *Matth.* autè maritimis, & tractu am-

niore, calidioreque frugalius, ac copiosius prouenit.

QUALITATES.

Excalfacit foris impositum, non tamen refrigerat, nec desiccatur, manifestè. *Gal. li. 3.* habet etiam quiddam glutinosum, & obstruens. Fermentum autem excalfacit, & trahit. *simp. me.*

VIRES.

Tritici farina illinitur ex hyoscyami succo ad neruorum fluxiones, & contra *Diosc.* interaneorum inflationes. Furfures ex aceto decocti turgentes mammas resoluunt: viperarum moribus, & torminosis auxiliantur. Tritici pollen, si ex hydrelæ decoquatur, omnem discutit inflammationem. Glutinum ex similagine, & polline, quo chartæ glutinantur, sanguinè excreantibus prodest, si frequenter delingatur. Panis è similagine confectus plus alit, quàm cibarius. Comendatur *Matth.* tritici oleum ad vlcera sinus, ad manuum, pedumq; rimas, atq; ad cutim læuigandam: Paratur compressis granis inter calefactas igni ferri laminas.

M

FRUMEN-

FRUMENTVM Indicum. Indis *Maitz*. Italis, *Grano*, siue *formento Indiano*. Germanis, *Türckisch Korn*. Boemis, *Turecken Zizto*.

FRUMENTVM INDICVM.

G E N E R A.

Matth. Quatuor est generum, quę tantum granorū colore differunt. Est enim q̃ nigrū, quod rufum, quod album, quodq; fulvum semen proferat.

F O R M A.

Matth. Caule exit arundinaceo, quemadmodū & folio, crasso, rotundo, procero, geniculato, alba intus medulla, in cui⁹ cacumine paniculę funduntur diuulsę, superuacue, nullis intus granis. Fructum edit folliculo membranaceo inclusum ē medio calamo ex latere prodeuntē, cuius spica piceę arboris conum cum crassitudine, tum lōgitudine æquat, circa quam omnino nuda coaceruantur grana penitissime sese stipantia, læuia, & subrotunda, pisi magnitudine, alba intus substantia. Radicibus nititur numerosis, durisque.

L O C V S.

Idem. Seritur in campis, & agris, stercoreato solo.

Q U A L I T A T E S.

Idem. Nostrate tritico paulō calidius est, ac glutinosius.

V I R E S.

Matth. Farina vtiliter miscetur cataplasmatibus, quę pus mouent. Id quod etiam valentius præstat fermentum ex eadem farina paratum. Ex ea quoq; rura alpinis tractibus pultem, quam suo idiomate vocant Polenta, conficiunt, & addito butyro, & caseo avidissime vorant. Est enim cibus non insuauis, sed crassum præbet alimentum.

FRUMEN-



FRUMENTVM Saracenicum. Italis, *Formentone*, & *Saracino*. Germanis *Heidenform*. Boemis, *Pohanka*.

FRUMENTVM SARACENICVM.



F O R M A.

Folijis prouenit primo statim exortu subrotundis, quæ paulò post hederaceâ formam concipiunt : acutiora tamen sunt, & molliora. caulem edit rubentē, inanem, fragilem, bicubitale, & sæpe maiorem, foliosumq; flores candidos, paruos, racemosos, è quibus semē oritur triquetrum, pullo colore, sed alba intus medulla.

L O C V S.

Seritur passim in aruis, perinde ac alia frumentacca, bisq; in anno feri potest: nempe vere, & post messē. Itaq; bifenum est.

Q U A L I T A T E S.

Calfacit, & humectat, verum non multum à temperatis distat.

V I R E S.

Farina ex lacte decocta præstat illita ad biliosas inflammationes. Rura, non solum ex ea panes pinlunt, sed pulcem quoq; conficiunt, quam polentam vocant, quæ non ingratus est cibus, vbi recte fiat, & caseo & butyro aspergatur. Præstissimam quoq; exutis granorum putaminibus, è granis parant, & ex carniū iure decoquunt ad esum.

C E N S V R A.

Proculdubio falluntur, qui Saracenicum frumentum, ocymum, quod pauli genus est, esse statuunt.

H O R D E V M,

HORDEVUM, Græcis *ῥεῖβη*, & *ῥεῖ*. Arabibus, *Xabaen*, *sive shaix*. Italis, *Orzo*. Germanis, *Gersten*. Hispanis, *Cenada*. Gallis, *Orge*.

H O R D E V M.

G E N E R A.

Theoph. Varia sunt hordei genera:
lib. 8. cap. aliud enim binis versibus, ali-
4. de his. ud ternis, quaternisve, cumq;
plant. plurimum senis: est enim vel
eiusmodi quoddam genus.

F O R M A.

Matth. Folio exit tritici latiore, as-
periorq; quin etiam culmo
fragiliore, sed octonis articu-
lis geniculato, simplici stipu-
la, folioque, & eo quidem sca-
bro, ac tritici latiore. Grana
simplici amiciuntur tunica,
quæ tamen solidè inhæreat.
è cuius cacumine aristæ pro-
deunt firmiores, longiores,
mordaciorésq; quàm in triti-
co. Nititur fibrata radice.

L O C V S.

Idem. Seritur in agris, perinde ac
triticum.

Q U A L I T A T E S.

Gal. 7. Exiccat, & refrigerat ordi-
simp. me. ne primo, pauxillumq; abster-
git, & paulò plus deficcet, quã
farina fabacea, cui non insint cortices, cætera verò similia sunt, foris vrentibus.

V I R E S.

Diosc. Minus quàm triticum alit. Præfana verò præstat contra acrimonias, & gut-
turis scabritias, & exulcerationes. Eadem cum fœniculi semine cocta lactis v-
bertatem facit: & tumores concoquit. Farina cum ficu, ex mulsâ decocta col-
lectiones, & duritias discutit: cum meliloro autem, & papaveris calyce, lateris
dolores finit. Hordeaceus panis ventriculum grauat, & frigidos, lentosq; suc-
Matth. cos gignit. Præfana febricitantibus, & pleureticis commodissimè datur: quin
etiam tabidis, & hæctica, aut marasmo laborantibus, & præsertim addito semi-
nis melopeponis, cucurbitæ, cucumeris & papaveris cremore, Hordeū. quod
non diu fuerit elixum, inflat, & ventriculo nocet.

Z E A,



ZEA, Græcis Ζέα, ἡ Ζεία. Arabibus, *Haia*. Italis, *Spelta*, *Biada*, & *Pirra*. Germanis, *Spelsh* / *S. Peterstorn* / *Kintorn* / *sive Dincelstorn*. Hispa. *Spelta*. Gallis, *Espeautre*.

Z E A.

G E N E R A.

Duum est generum, vni DIOSC. simplex, altera in geminis putaminibus grana bina iuncta gerit. & ob id dicoccos appellata.

F O R M A.

Folio prouenit tritico haud *Matth.* ab simile, tenuiore tamē culmo firmiorēq; verum spica à tritico differt, quod plana sit, granis tantum vtrinq; è lateribus simplicibus versibus, prodeuntibus: aristis longis, ac tenuibus. Dicoccos grandiore firmiorēq; culmo, & spica maiore prouenit.

L O C V S.

Seritur vbique locorum in *Idem.* agris, cæterorum frumentaceorum modo.

Q U A L I T A T E S.

Vniuersa sua facultate quo- *Gal. l. 6.* dammodo in medio est tritici- *simp. me.* ci, & hordei, itaq; ex illis cognoscatur.

V I R E S.

Valentius alit quàm hordeum. Digeritur in panificia, sed minus quam triticum nutrit. Leues efficit panes, concoctu faciles, haud ingrati gustus. Ex Dicocco paratur Halica, quæ plus alit, quàm Oryza: aluumq; magis cohibet: stomacho longè vtilior. Decocta in aceto, ac illita lepras tollit, vnguium scabrities extricat: incipientibus agilopijs medetur. Infunditur vtiliter decoctum dysentericis, quos ex cruciat dolor.

C E N S V R A.

Non recte sentiunt qui Halicam, & Far adorem vnâ, & eandem esse rem existimant.

S E C A L E S.



SECALE, siue Farrago. Italis, *segala*. Germanis, *Rott*. Hispanis, *Centeno blanco*. Gallis, *Seigle blanche*. Boemis, *Zito*.

SECALE.

FORMA.

Matth. Folio prouenit tritici angustiore: stipula tenuiore, sed firmiore, ac procetiore, spica pendente, aristis infirmioribus, sed fecundis granis. diu floret, adeo, vt quadragesimo tantum die à flore mature-scat.

LOCVS.

Seritur alpinis tractibus.

QUALITATES.

Matth. Refrigerat & humectat ordine primo: emollit, abstersione non vacans, & pus mouet.

VIRES.

Plin. li. 18. cap. 16. Sordidos efficit panes, agrestibus hominibus idoneos, amarulentos, ac lentos, atq; facile permeabiles: minus alit quàm triticū, & hordeum.

Matth. Decocta integra ab equis deuorata, tineas eorum pellit. Fatina additur in cataplasmatibus, quæ puri mouendo parantur. Idonea eadem est ad glutinum librarium parandum. est enim cæteris tenacius: culmorum cinis aqua subactus, & illitus, pedum, manuumq; rimas sanat.

CENSURA.

Cæcutiunt qui Secalem olyram esse putant, & pariter hallucinantur, qui Secalem cum Siligine confundunt.

Avena



NOMINA.

191

AVENA, Græcis, *Ἀvena*. Arabibus, *Cartamum*, *sive Churtal*. Italis, *Vena*, *sive Gena*. Germanis, *Habern*. Hispanis, *Avena*, *sive Auca*. Gallis, *Avoine*.

AVENA.



FORMA.

Folio, & stipula non admo- *Diosc.*
dum à tritico distat: Spica illi
denuisa, folliculis veluti par-
nis locustis bipedibus depen-
dentibus, in quibus granum
includitur oblongum atque
subalbicans.

LOCVS.

Scratur in campis. gaudet- *Matth.*
que frigido tractui.

QUALITATES.

Similem hordeo vim ha- *Gal. li. 6.*
bet. Illita enim desiccatur, & *simp. me.*
digerit mediocriter, & sine
morsu. temperiem autem ha-
bet paulò frigidiorē, & non
nihil quoque adstringit.

VIREs.

Avena in cibis aluum sistit, *Diosc.*
& eius pulve ruficantes iuuan-
tur. Eadem cum putamine *Matth.*
calefacta, & in sacculis adhibita flatuosos dolores tollit. vilis quoque ad alen-
dos equos, ac etiam homines. Nam putamine exuta, vescitur à Germanis, ex
iure carniū decocta. Sic enim parata cibus sit haud ingratus, & præsertim
ubi estur antequam dissiliat.

ORYZA.

ORYZA, Græcis, ὄρυζα, & Theop. ὄρυζον. Arabibus, *Arz*, seu *Arzi*. Italis, *Risò*. Germanis, *Weiß*. Hispanis, *Arroz*. Gallis, *Riz*.

FORMA.

Matth. Folio provenit arundinaceo, carnosò, porraceo haud absimili: culmo cubito maiori, geniculato, triticeo crassiore, ac robustiore, in cuius cacumine spica geritur in ramulos diuisa, in qua semen vtrinque; impari exortu conspicitur: putamine subflauo, aspero, striatoque. quo exuto candidum remanet granum.

LOCVS.

Idem. Gaudet locis vliginosis, ac palustribus. verum copiosissima provenit in Asia, Syria, & Ægypto. Seritur & in Italia.


QUALITATES.

Gal. li. 3. Habet adstrictorium quippiam, ac etiam siccandi, resolventis; potestatem.

VIRES.

Diosc. Oriza in cibis mediocriter alit, sed aluum cohibet. Ex lacte decocta, aut amygdalarum dulcium cremore, aut ex pinguium carniū iure, cibus fit haud ingratus. Quin etiam concoctu facilius, & ori gratior. Datur in cibis vtiliter dysentericis, cæliacis, & diarrhæa laborantibus: præsertim ubi prius torrefacta, in lacte, in quo igniti calculi extincti fuerint, decoquatur. farina bellè quidem admiscetur cataplasmatibus repellentibus. Eadem mammarum incipientes inflammationes arceat: cum rosis & anthemide decocta & illita.

MILIVM,



MILIVM, Græcis, Κέϋρος. Arabibus, *leuers*, *Geguers*, *sue Ciaures*. Italis, *Miglio*, *sue Meglio*. Germanis, *Hirß*. Hispanis, *Millo*, & *Miyo*. Gallis, *Mil*, *sue Miller*.

MILIVM.

FORMA.



Milium folia profert arundinacea, panico haud longè dissimilia, calamus bicubitalem, crassum, geniculatum, lanuginosumque. radicem multiplicem, ac duram, paniculis diuisis, è cacumine dependentibus, in quibus numerosa habentur grana, parua, subrotunda, solida, læuia, subflaua, ac tenui putamine obducta.

Locys.

Scratur in agris, pingui, & Matth. stercoreto solo.

QUALITATES.

Refrigerat ordine primo, Gal. 7. & siccatur tertio exsoluta, aut simp. me. certe secundo intenso: paululum etiam habet tenuitatis. comestum minimum confert nutrimenti, & ventrem desiccatur.

VIRES.

Milium & eius panis minus cæteris frugibus alit. Eius pulve sistitur aluus si Diosc. deuoretur, & promouetur vrina. fit ex eo fomentum optimum ad siccandum citra morsum, vbi prius calefactum cum sacculis adhibeatur. Fitq; magis efficax auxilium admixtis sale, & anthemidis floribus: Siquidem rectè ad tormina adhibetur, quæ à flatu excitantur, & ad lateris dolores. Quæ in milij aceruo conduntur, diutius à carie, & putredine tuentur. imò & ipsæ carnes recentes in milio æstate reconditæ, à putredine vindicantur.

N MILIVM

MILIVM Indicum. Hetruscis, *Sagina*. Longobardis, *Melega*. Venetis, *Sorgo*. Germanis, *Weißer Hirs*/ *Sorgsane*.

MILIVM INDICVM.

FORMA.

Matth. Frugis est genus tam forma, quam proceritate arundinem referens. eius tamen calamus inanis non est, sed alba farctum medulla, sambuci modo: Paniculas in cacumine gerit magnas, crassasq; numerofo semine refertas, colore plurimum rubro: et si nigro quoq; & subalbicante.

LOCVS.

Idem. Seritur in campis aratro cultis, ac stercoreatis.

QUALITATES.

Idem. Refrigerat, siccatur, cohibet, & resoluit.

VIRE.

Matth. Facultas ei haud milio dissimilis. Rura ex eius farina panes conficiunt, sed concoctu contumaces, & qui parum alant. Aluum adstringit. Seritur in Hetruria solum ad alendas columbas, & gallinas. calamorum medullae cinis cum pipere, & spongiae vstae puluere, vitello oui affati excepta, propinatur vtiliter à cœna septem diebus decrefcente Luna, ad gutturis strumas. Florum pulvisculus à paniculis excussus, ex vino rubro drachmæ pondere potus, rubra fœminarum profluvia sistit, si e rubris paniculis deligatur. namque quod ex albis excutitur, alba profluvia cohibet. Datur pari iuuamento etiam dysentericis.



PANI-

NOMINA.

195

PANICVM, Græcis, *καυμος*. Arabibus, *Dochon*. Italis, *Panico*. Germanis, *Se-
nich*/sue *Heydelsfenich*. Hispanis, *Panico*, sive *Paniso*. Gallis, *Paniç*.

PANICVM.

FORMA.

Folio, radice, culmoque *Matth.*
milio est per omnia simile:
Paniculis autē differt: Nam
in panico panicula prouenit
pedali longitudine, non ut in
milio diuulsa, sed prædensis
compacta racemis, granis
numerosis, & hirsutis.

LOCVS.

Seritur in campis mense *Idem.*
maio, & quandoque statim
post messem.

QUALITATES.

Exiguum dat alimentum, *Gal. l. 6.*
exiccat, & adstringit, ut mili- *simp. me.*
um, ac etiam refrigerat.

VIRE.

Datur edendum dysente- *Matth.*
ricis & alijs alui fluxionibus *Diosc.*
laborantibus. illinitur co-
limum.

Etum ubi siccare, & refrigerare sit opus. sed minus alit, & stringit, quàm mi-
lium.

N 2 PANI-

PANICVM Sylvestre, Græcis, ἐλνυος ἀγριος. Italis, Panico saluatico, siue Panica-
strella.

PANICVM SYLVESTRE.

FORMA.

Matth. Sponte per se prouenit,
gracili admodum culmo, ge-
niculato tamen, cubitali lon-
gitudine. folijs longis, angu-
stis, asperisque: paniculis par-
uis, longis, subrubentibus, ac
adeo hirsutis, & asperis, ut ve-
stibus pertinaciter inhære-
ant.

LOCVS.

Idem. Nasceitur in hortis, & viri-
datis: quin etiam in campis,
& vineis.

QUALITATES.

Idem. Exiccatur, refrigeratur, adstrin-
git, magis quàm satium.

VIRE.

Idem. In ciborum usum non ve-
nit, eo tamen delectantur a-
uiculæ, quibus paniculæ offeruntur. cætera cum panico satiuo communia
habet.



SESA-

NOMINA.

197

SESAMVM, Græcis, σισαμῶν. Arabibus, Semsem, siue sersera. Italica, Sefamo. In officinis vulgo, Gingolena.

SESAMVM.

FORMA.

Caule prouenit milio simili- Theoph.
le, crassiore tamen, ac proce- lib. 8. cap.
riore, folijs rubentibus, flore quod pla.
viridi, aut herbaceo, semine hist.
vasculis incluso papaueris
modo.

Locvs.

Seritur in campis, quos ste-
riles reddit.

QUALITATES.

Non parum glutinosum Gal. lib. 8.
est, & pingue, quare emplasti- sim. me.
cum est, & emolliens, modi-
cè calidum. Eiusdem faculta-
tis est, quod ex eo conficitur
oleum.

VIREs.

Cibus inutile sesamum est, Diosc.
& halitus grauitatem facit,
neruorum crassitiem illitu
discutit. medetur auribus fra-

ctis, ambustis, inflammationibus, coli doloribus, & cerastæ moribus. facit &
ad capitis dolores æstu concitatos, ex rosaceo illitum. Eadem facit herba ex vi-
no decocta, quæ peculiariter oculorum inflammationibus, ac doloribus au-
xiliatur.

N ; Loli-



LOLIVM, Græcis, *αἶα*. Arabibus, *Steilen*, *sive Zeued*. Italis, *Gioglio*, *sive Loglio*. Germanis, *Ewalch*, *Rünveissen*, *sive Eulch*. Hispanis, *Toio*. Gallis, *Turaye*.

LOLIVM.

FORMA.

Matth. Cum hyeme nascitur, folio est longo, pingui, hirsuto, adultum deinde culmum edit tritici graciliorem, in cuius cacumine spica exit longa, aculeatis siliquis, impari exortu vtrinque referta, e quibus grana terna quaternave cumulatum apertè prodeunt, contumaci obducta putamine. maturefcit vna cum tritico.

Locvs.

Idem. Nascitur in arvis è tritico, hordeoq; corruptis vlgine seminibus, aut per hyemem imbre nullo madidis. Corripitur contra & ipsum, & in triticum conuertitur.

QUALITATES.

Gal. li. 6. Excalfacit in principio tertij
simp. me. ordinis, & exiccat in fine secundij.
Matth. Item attenuat, resoluit, abstergit, inebriat, somnum mouet, & mentem tentat.



VIREs.

Diosc. Farina nomas, putrescentia vlcera, gangrenas compescit, cum raphanis, & sale illita. Ex aceto verò & sulphure viuo feros lichenes, & lepras sanat. Strumas quoq; discutit, cum fimo columbino, & Lini semine decoctum in vino. rumpit, quæ agre ad coctionem perducuntur. Illinitur vtiliter Ischiadicis ex aqua mulsa decoctum. Si cum polenta, myrrha, & thure sufficitur, conceptionem adiuuat.

FOENVM

FOENVUM GRÆCVM, Græcis, Τύλιν, & Βούκαρες. Arabib. Oilit, Nelbe, seu Hebbe. Italis, Fieno Greco. Germanis, Senigree, seu Bockshorn. Hispanis, Alformas, vel Alloluas. Gallis, Fenigree, seu Senegre.

FOENVUM GRÆCVM.



F O R M A.

Planta est trifolio similis, fo
lijs per ambitū serratis, cauli-
bus exilibus, compluribusq;
Flores edit albicantes, è quib⁹
cornicula prodeunt incurua,
longa, acuminataq; in quib⁹
semen gignitur subfaluum,
pingue, & graue olefcens. Ra-
dice nititur tenui, sed fibrosa.

L O C V S.

Seritur pingui solo Februa- Idem.
rio, & Martio calidiori tractu.

Q U A L I T A T E S.

Excaltat ordine secūdo, & Gal. l. 8.
ficcatur primo. Digerit, resolut, simp. me.
emollit, pellit, & abstergit. Matth.

V I R E S.

Farina ex multa aqua deco- DIOSC.
ctaduros tumores digerit im-
posita, sed feruentibus inflam-
mationibus obest. Lienis ex-
tenuat cum aceto, & nitro il-
lita. Mucoso seminis decocto
iuuantur vteri præclusiones,
ac tumores, si in eo infundant
semina. Seminis mucago ca-
pillis, furfures, & manantia
capitis vlcera purgat, & mulie-

bres locos dilatat, & emollit, cum anserino adipe supposita. Decoctū eius pro-
dest ad tenasmos, & fetidam dysentericorum proluuiem. Oleum, quod ex eo
exprimitur, & Myrto, capillos, & genitalium cicatrices absterget. Medetur vl-
cerose scabiei, si cum quarta parte seminis nalturci excipiat aceto, & rubin-
de illinatur. Farina ex multa vsurpatur vtiliter ad genitalium tumores. Eadem
cum sulphure, & nitro lentigines delet, quin etiam parotidas sanat. Podagram,
chiragram, & articulorū luxationes. Ex vino subacta, carcinomata purgat. Da-
tur vtiliter potandum fœnogræci decoctum ad diuinam tussim, & vbi pectus
fuerit exulceratum. Seminis mucago fronti ex lincolis adhibitum, oculorum
fluxiones auertit. Decoctum verò eius ex aqua oculorum inflammationes ar-
cet instillatum.

LINUM, Græcis, *Alyar*. Arabibus, *BaZarichichen*, seu *BeZercheran*. Italis, *Lino*. German. *Lein*/sive *Flachs*. Hispanis, *Lino*. Gallis, *Lin*.

FORMA.

Matth. Caulē edit sesquicubitalem, teretē, rectū, obsequiosum: folia oblōga, angusta, molliaq; ramulos promit in summitate ternos, quaternosve, in quib⁹ cærulei emicant flores. semen edit in orbiculatis folliculis in acutū desinentibus, planum, lęue, cordis figura. Radice niti tur vnica, nō tamē sine fibris.

LOCVS.

Idem. Seritur passim in campis, atrito, ac stercoreato solo.


QUALITATES.

Gal. 6. Excalfacit semē ordine primo, mediumq; est inter siccitatem & humiditatem. *Quin* etiam emollit, resoluit, concoquit, & abstergit.

VIREs.

Diosc. Seminis farina cū melle, oleo, & exigua aqua decocta, discutit, atq; emollit tam internas, quā externas inflammationes. Eadem cruda vitia cutis in facie, & varos tollit. Illita cum nitro, & siculneo cinere, parotidas, & duritias discutit. Ex vino decocta fauos, & vlcera, quę serpunt expurgat. Scabros quoq; vngues eximit. cum pari nasturtio, & melle illita. Delineta cum melle pectoris vitia extrahit, & tussim lenit. Estur decoctum semen, melle, & pipere additis, ad excitandam venerem. Eiusdem decoctum infunditur ad interaneorum, & veri erosiones: alui excrementa euocat, & est vtile admodum in deflectionibus quę ad vuluę inflammationes perantur. Oleum quod ē semine exprimitur valet ad neruorū conuulsiones: perutile quoq; est omnibus sedis affectibus, & ad emolliendos induratos feminarum locos. infunditur vtiliter coli dolore vexatis, daturq; magno auxilio, potandū pleuriticis, & nephriticis. Medetur ambustis, ex aqua rosarum potum, & illitum. Præstat quoq; ad Lucernarum vsum, quod diutius igni resistat: Expeditur pictoribus, lapicidis, lignarijs, cæmentarijs, & ferrarijs fabris.

LINUM



Lino.

LINUM Sylvestre, Græcis, Λινον ἄγριον. Italis, Lino saluatico.

LINUM SYLVESTRE.

FORMA.



Complures ab vna radice emittit *Matth.*
caules, graciles, teretes, rectos, ac fle-
xiles, folijs in caule vniuerso lini æmu-
lis, sed breuioribus, ac firmioribus.
Flores in cacumine exeunt pusillis è
ramulis, aurei, lini floribus facie haud
abfimiles.

LOCVS.

Nascitur sponte in conuallibus in- *Idem.*
culto solo.

QUALITATES, ET
VIRE.

Herba ipsa vna cum floribus deco- *Matth.*
cta, & cum recenti butyro illita tumo-
res resoluit, & inflammationes lenit.
quin etiam induratos articulos emol-
lit, addita althææ radice, & gallinaceo
adipe.

CENSURA.

Linum sylvestre hanc plantam à no- *Matth.*
bis inuentam vocare libuit, non so-
lum, quòd linum facie referat, sed quod lini modo in stamina trahi possit.

N ,

* LINUM


* *LINUM* Sylvestre caruleo flore.*LINUM SYLVESTRE.*

F O R M A.

Linorum sylvestrium varietas ex alijs autoribus peti potest, est enim infinita fere. Nobis elegantiusculam hanc speciem addere libuit, caruleo flosculo *Satiui* æmulam, ut etiam folijs in tenuissimis virgulis sine ordine digestis, semen minus est, radix perennat.

L O C U S.

Oritur sponte circa *Vienam*, præsertim gramineis declivibus & iuxta vias.*



Gos

Gossipium, Græcis, Εύλιν, Βάμβαξ, siue παπαδάξ, siue ἑριφύλλον. Officinis, & Barbaris, *Cotum*, *Bambax*, seu *Bambasum*. Italis, *Bambagia*, siue *Cotone*. Germanis, *Waimwoll*. Gallis, *Coton*.

G O S S I P I U M.

F O R M A.

Planta est quæ Gossipium *Martib.* profert folijs vitigineis, floribus luteis, umbilicotenus purpurascens: fructu exigui mali magnitudine, barbato, nucis ponticæ fere modo. is lanugine per quam alba refertus est, seminibus pipere maioribus, in quibus medulla est alba, ac pinguis. Planta seritur, adolescitque tribus, aut quatuor mensibus, ad arbusculæ proceritatem.

L O C U S.

Seritur in Creta, Cypro, & *Idem*. Sicilia insulis, quin etiam in Apulia, & alijs in Regionibus calidioribus.

Q U A L I T A T E S.

Lanugo excofact, & exsiccat, *Idem*. seminis verò medulla excofact, & humectat.

V I R E S.

Lanugo combusta mirum in modum sanguinem è vulneribus manantem *Idem*. sistit. eadem accensa, & naribus suffita, vteri strangulatus auertit. Seminis medulla ruffientibus, & ægrè spirantibus auxiliatur: genitale semen auget, & venereum stimulat. Oleum è semine expressum lentigines, albos, & cæteras cutis infectiones in facie perunctum delet, & palpebrarum asperitates lenit.

C I C E R,



CICER, Græcis, ἐγὲ βιβός. Arab. Chemps, Hamos, seu Halhamos. Italis, Ceci. Germ. Sichern, Sickererbs, siue Sifererbs. Hispanis, Grauanços. Gallis, Cices, siue Chiches.

GENERA.

CICER.

Matth. Satiuū est & Syluestre. Satiuū
Diosc. triū est generū, candidū co-
lumbinum vocatū. Rubeū
venereum dictū, & nigrū a-
rietinum appellatū.

FORMA.

Idem. Adolefcit cubitali altitudine, fo-
lijs oblongis, dēticulatis, subalbi-
cantibus, pilosis: caule lignoso, ra-
mis multis brachiato, florib⁹ sub-
purpureis ē quibus siliquę prode-
unt breues, turgentes, hirsutę, in
acutū tenuemq; mucronē desin-
entes, in quibus ad summū
grana duo concluduntur.

LOCVS.

Idem. Seritur pingui solo vere appe-
tente, & maturefcit æstate.

TEMPVS.

Idem. Demetit̃ arēscētib⁹ sili-
quis, nam si citius extirpetur, se-
men rugosū euadit.

QUALITATES.

Gal. 6. Cicera calida sunt, & modicē hu-
simp. me. mida, atq; amaritudinis nō omni-
Matth. no expertia. Prouocant, abster-
gunt, aperiunt, attrahunt, discu-
tiunt, incidunt & flatūs excitant.

VIREs.

Diosc. Satiuū Cicer vrinā ciet, colorem commendat, menses, & partus pellit.
Lac auger cum eruo decoctū. illinitur vtiliter ad testium tumores, verrucosās
formicas, scabiē, vlcera capitis manantia, & impetigines. Item cum melle ad
carcinomata, & contumacia vlcera, addita hordeacea farina. Arietinum autē
præter hæc præstat peculiariter cū rore marino ad hydropem, & regium mor-
bum, epoto eius decocto. Lēdunt Cicera exulceratā vesicā, & renes, attamen
Matth. calculū frāgunt. Venerē stimulant & geniturā augēt. Farina ex Intubi stillaticia
aqua decocta, & illita locinoris tumores resoluit, & serpentiū morib⁹ medetur.

CENSURA.

Errant maximē Germani, qui pisorum ius potandum exhibēt ad abstergen-
dum ventriculū, sibi persuadentes pisum columbinū esse cicer.

CICER



CICER Sylvestre, Græcis, *ῥέβανθος ἄγριος*. Italis, *Cecisalaatichi*.

CICER SYLVESTRE.

FORMA.

Satiuo ciceri simillimum *Matth.* habetur, sed folia denticulata non sunt, & siliquæ minores rotundioresque spectantur. Est planta in vniuersum hirsutior, atque asperior.

LOCVS.

Nascitur sponte in agris, *Matth.* & locis incultis.

QUALITATES.

Excalfacit & siccatur, & cum *Matth.* plus amaritudinis habeat, magis quàm satium abstergit, & aperit.

VIRES.

Ventrem subducit, sed flatulentus, & intestinorum dolores gignit. *Plin.*

FABA,



FABA, Græcis, *Κόκκος*. Arabibus, *Hachille*, *Haballe*, *sive Bachale*. Italis, *Fana*. Germanis, *Bonten*. Hispanis, *Hana*. Gallis, *Fave*.

G E N E R A.

Matth. Plura fabarum extant genera, forma, colore, & magnitudine differētia. Alię enim magnę sunt, alię parvę, alię subrotundę, alię compressę, & alię quidē colore albicante, alię subrutilo, & alię subnigro.

F O R M A.

Idem. Fabarum planta caule exit quadrangulo, obliquo, inani fragiliq; geniculis interfecto. alis etiam multis, ē quibus flores complures ex vno pediculo racematim prodeunt. non vtrinq; quidem, sed vno tantum latere seriatim appensi, versicolores, hirti, ac cristati. Exeunt ē cauli rami, in quibus folia habētur pingua, vtrinq; quaterna. E ramulculorum cuminumibus claviculę prodeunt prætenues, ac singulares, quę faciliē perduntur. Siliquas edit ceteris leguminibus maiores, carnosioresq; in quib; fabę cōcluduntur. Vnica nitē radice paucis adnatis fibris.

L O C V S.

Matth. Seruntur in agris ceterorum leguminum modo.

Q U A L I T A T E S.

Gal. l. 7. In exiccando, & refrigerando secundum vtrunq; ad medium temperamentum propinquissimē accedunt adstringunt, discutunt, deficcant, abstergunt, impingunt, sed flatus gignunt.

simp. me.

V I R E S.

DIOSC. Ex posca decocta datur vtiliter deuoranda dysentericis, & cæliacis. Lomentū eius tum per se, tum cum farina hordeacea illitum, vulnerum inflammationes mitigat, cicatrices concolorēs facit, turgentes lacte mammas iuuat, & ab inflammatione vindicat: Lac exstinguit, furunculos, sugillata, parotidasq; cum scæno-græci farina, & melle discutit: cum rosi autem, thure, & oui candido, prociētes oculos, tumores, vuasq; reprimat. Subactum verō cum vino oculorum suffusiones, & istus recreat. Manducata faba, & fronti illita fluxiones auertit. Fabarum putamine illiti, capillis, qui post euulsionem renascuntur, gracilescunt, & minus nutriti capessunt. Fabalium caulium & siliquarum cinis cum vetere axungia illitus, præstat ad coxendices, & veterem neruorum dolorem.

FABA



FABA Sylvestris. Græcis, *κλάμος ἀγρίος*. Italis, *faba saluatica*.

FABA SYLVESTRIS.



FORMA.

Caules edit quadrangulos *Matth.* humi repentes, ac sese inuicem implicantes: folijs domesticæ fabæ similibus: floribusque in purpura albicantibus, e quibus filiquæ prodeunt, lupinorum modo pressæ, sed fabarum longè minores. In quibus semen continetur rotundum, fabaceo sapore.

LOCVS:

Prouenit sponte in Apulia, *Idem.* campestribus locis.

FACULTATES, ET VIRES.

Sunt qui dicant hanc eas. *Idem.* cum domestica habere vires.

CENSURA.

Etsi non desint qui hanc plantam Aracum domesticum faciant, nos tamen sylvestrem fabam eandem esse censemus.

ARA-

inquis-
gnunt.

um per
ncolo-
furun-
thure,
o ocu-
barum
inrenti
ad co-

FABA

ARACVS, Græcis, ἀρακος. Italis, Araco.

ARACVS.

FORMA.

Matth. Aracus humi repit, caule anguloso, flexili, subaspero, cicercula haud absumile. folia illi sunt oblonga, caulem inferne ambientia, quæ summo cacumine clauiculas tenues fundunt: flores edit non magnos erui fere modo, è quibus filiquæ oriuntur pisi minores, in quibus semen est asperum, rotundum, pullo colore.

LOCVS.

Idem. Nascitur inter segetes, campetribus locis.

FACULTATES, ET
VIRES.

Idem. Abstergit, resoluit, desiccatur, & expurgat.



FABA

FABA Ægyptia, siue Colocasia, Græcis, Κλάμα ἀγυῖας. Italis, Fava d' Egitto.
Hispanis, Hava de Egipto. Gallis, Fave d' Egypte.

FABA ÆGYPTIA.

F O R M A.



Folia edit ampla instarga Diosc.
leri: caulem cubito longio-
rem digiti crassitudine: florem
roseum, dupla papaveris am-
plitudine, è quo folliculus pro-
dit oblongus, vesparum fauis
similis, in quo fabæ supra oper-
culum bullantis ampullæ mo-
do prominent. Radice nititur
arundinacea, grandi, Coloca-
sia peculiariter appellata.

L O C V S.

Prouenit in Ægypto, Asia, Diosc.
& Cilicia, in Lacubus, & palu-
dibus, feritur humenti glebæ
mandata, & ita in aquam de-
missa.

Q U A L I T A T E S.

Sicuti nostratem fabam ma- Gal. lib. 1.
gnitudine præcellit, ita & na- de alim.
turam humidior, magisq; facul.
excrementitiam sortita est.

V I R E S.

Manditur virens cruda, pariter & cocta: adstringendi facultatem obtinet, Diosc.
itaq; dysenteritis, & cæliaci prodest, in sparso polentæ vice Lomento. Corti-
ces in mulso vino decocti, si terni inde mulsi cyathi bibantur, magis proficient.
Quod in fabarum medio viride spectatur gustu amarum, facit ad aurium dolo-
res, si tritum cum rosaceo instilletur.

* Pinximus, hodierno die Ægyptijs dictam Colocasiam, quam peritissimi
quiq; negant ferre eiusmodi flores, quales Autor suæ tribuit, & nos parua ima-
gine representatos adieciimus.*

O

LENS,

ABA

LENS, Græcis, *Φακός*. Arabibus, *Ḥades*. Italis, *Lente*, & *Lenticobia*. Germanis, *Ensen*. Hispanis, *Lenteyas*. Gallis, *Lentille*.

LENS.

G E N E R A.

Math. Duum est generū Album, quod altero minus est, & in cibis gratius. Cinereo colore alterum, orbe paulo maiore.

F O R M A.

Idem. Maior folio exit viciæ, minore, flore haud longè absimili, in purpura candicante. Siliqua parua compressa, molliorq; in latitudinem fusa in qua semina terna, aut quaterna concluduntur, rotunda pressa, tenui putamine connecta.

L O C U S.

Idem. Seritur vbique in campis, cum cæteris leguminibus.

Q U A L I T A T E S.

Gal. lib. 8. In caliditate, & humiditate medium tenet, desiccatur tamen ordine secundo, valenter quoque adstringit. Ipsum itaq; eius corpus desiccatur, & sistit ventrem, decoctum vero prouocat. Inflat, lenit, glutinat, extinguit, purgat, discutit.

V I R E S.

Diosc. Cum cortice cocta, & deuorata aluum sistit: contrariè dicitur prouocat. Dantur vtiliter triginta grana delibrata ad ventriculi subuersiones: cum farina hordeacea decocta, & illita, podagras lenit. Sinus cum melle glutinat, erustas rumpit, vlcera purgat. Decocta in aceto duritias, & strumas discutit: Cura coroneo malo, aut meliloto medetur oculorum inflammationibus. & addita maris aqua, valet ad nomas, quæ in gangrenas euaserunt. Cocta in aqua maris, & illita, lac in mammis concretum dissoluit. Frequenter in cibo sumpta oculorum aciem obtundit, ægrè concoquitur. Stomachum lædit, eumq; & intestina inflat. Somnia tumultuosa excitat, estq; capiti, neruis, & pulmmoni inutilis.

* L E N S



NOMINA.

211

*LENS Minor. Græcis φακὸς ἡ φακὴ ἐλάττω. Germ. Klein Linsen.

LENS MINOR.



FORMA.

Strigosior est in totum quam maior, & tenuioribus exit cauliculis, durioribus & obliquis foliolis, angustioribusque & minoribus. flores exigui simpliciter albi, siliquæ minores minora semina habentes.

LOCVS.

Seritur & hæc in campis, vtræque solum amat tenue, cælique temperiem siccam.

QUALITATES.

Huc refer quæ de priore scribunt autores.

VIRE.

Æquipollent & hæc præcedentis facultatibus.*

O 2

PHA-

PHASIOLI, Græcis, Φασόλοι. Italis, Fagioli. Hispanis, Fajolos. Gallis, Fajolés.

PHASIOLI.

GENERA.

Matth. Diuersa, variaq; sunt Phasiolorum genera, varijs colorib; distincta. Nam candidi, rubescentes, melini, nigri, ac diuersi resperfi maculis reperiuntur.

FORMA ALBORVM.

Matth. Albi, & magis vulgares, qui in campis feruntur, sine pedamento per se reguntur, in latum sese pandentes, folijs hederaceis, latioribus tamen, & mollioribus, ternis ex uno pediculo prodeuntib; flore candido, pisi minore. è quibus cornicula prodeunt incurua, spithamę longitudine, in acutum desinentia, quę per maturitatem albescunt. In his semina plura cōcluduntur quadruipedum renibus similia, alba, vmbilico excepto, qui tantum in ijs nigricat.

LOCVS.

Matth. Seruntur in agris, mēse Maio, & quandoq; post mensem.

QUALITATES.

Simeon Sethi. Excalfaciunt, & humectant ordine primo. Atqui fului, flauī & rubri, albis calidiores sunt.

Simeon

Sethi.

Gal. 4.

simp. me.


cap. 23.

Matth.

VIRES.

In cibis sumpti inflant, & ventriculo laborem faciunt, semen tamen generant, & venerem sollicitant, & præsertim si cum longo pipere, galanga, & saccharo aspergantur. Id autem valentius præstant, si ex lacte bubulo coquantur, quousq; rumpantur. Redduntur in cibo innocentiores, si cum sinapi, aut cari semine edantur. Tumultuosa præterea, ac terrifica somnia representant, cornicula dum viridia sunt & tenera, elixantur, & cum pipere in acetarijs, eduntur. Phasioli masticati, & illiti sanant equorum morsus. Adduntur etiam in fucis, quibus mulieres faciem concinnant.

PISVM,



NOMINA.

213

PISVM, Græcis, Πισυόν. Italis, Pisello, & Biso. Germanis. Erbzig.

PISVM.

GENERA.

Dnum est generum, Al'te- Matth.
rum maius, alterū minus; Ma-
ius pedamento gaudet, minus
humi accumbit.

FORMA MAIORIS.

Maius caulibus exit fistulo. Idem.
sis, ramosisq; clauiculis mul-
tis è ramorum summitatibus
prodeuntibus, folijs nume-
rosis, longiusculis, subpingui-
busque. Siliquis cylindraceis,
rotundo, & candido semine
se se intus stipante albi cice-
ris maiore. Flores edit papi-
lionis animalis figura, umbi-
licotenus purpureos, & quā-
doq; in vniuersum candidos.
Radice est imbecilli.

LOCVS.

Facilem & solutam terram Columel.
desiderat, & in apricis seri. lib. 2.

QUALITATES.

Exiccant, & refrigerant fa- Gal. 1. de
tergendi facultatem non habent. fac. alim.

VIREs.

Vbi faba nō sit ad manus, pisum eius poterit esse succedaneum, præterquam
ijs in morbis, qui absterfione opus habent.

CENSURA.

Qui scribunt Pisorum iure hausto purgari puerperas, auriginosos sanari, &
aqua intereunte laborantes iuuari, proculdubio decipiuntur, quod hæc haud-
quaquam præstare possit medicamentū, quod refrigeret & siccet. cicera enim,
quæ pisa ij esse credunt, non ipsa pisa, id præstare possunt.

O 3

PISVM



asfolia.



E

albis

gene-
& fac-
antur,
ut cari-
, cor-
antur.
lucis,

svM,

Pisvminus, Græcis, Πισδν μικρόν. Italis, *Pisello minore*. Gallis, *Pois*.

PISV MINVS.

GENERA.

Matth. Duum est generū, album,
& subnigrum, quod Ervili-
am vocant.

FORMA.

Idem. Maiori per omnia simile,
sed minora & graciliora illi
sunt omnia, humiq; accum-
bit.

LOCVS.


Idem. Seritur, vt maius, apri-
co loco, solo probe culto, ac so-
luto.

QUALITATES.

Idem. In qualitatibus omnibus
nihil prorsus à maiori differt.

VIRES.


Idem. Vires eadem minori in-
sunt, quæ maiori inesse dixi-
mus.



ERVVM.

ERVVM, Græcis, *ὄρεος*. Arabibus, *Herbum, Keisene, sive Kersene*. Officinis, *Orobis*. Italis, *Eruo, sive Mocha*.

ERVVM.



GENERA.

Duum est generū, Candidū, Diosc. & Rufum. Gal. quoq; tertium addidit nempe pallidum, inter prædicta medium.

FORMA.

Planta est sarmētoſa, folio- *Matth.* ſaq; humi procūbens, ramis ſeſe implicantibus, folijs parvis, longiuſculis, lente minoribus. flores edit paruos, ſubpurpureos, & quandoq; candidos, ſiliquam piſi breuiorem, gracilioremq; in qua rotundum concluditur ſemen, concluſa inter granum & granum ſiliqua.

LOCVS.

Nāſcitur ſponte in aruiſ, & ſeritur quoq;.

QUALITATES.

Calſcit ordine primo, & *Gal. 3.* ſiccāt ſecundo intenſo: quate *ſimp. me.* nus autem amaritudinis eſt particeps, eatenus incidit, extergit, atq; obſtructiones aperit. Itē impinguat, vrinam ciēt, adēd vt quandoq; ſanguinem cum vrina trahat, quin

VIREs.

etiam emolliendi vim habet.

Farina vlcera cum melle purgat, Lentigines, & vitia cutis in facie, & maculas *Diosc.* in toto corpore affricta delet. Nomas, & gangrenas diutius ſerpere nō patitur. Mammarū durities emollit, carbunculos rumpit, atra vlcera emarginat, cum vino ſubaſta, & illita, viperarum, & canum morſibus medetur. vrinæ difficultates, atq; etiā tenaſmos ex aceto mitigat. Melle excepta, ac delincta, craſſa pul- *Matth.* monum excrementa eiicit. Eruum a ieiuniis deuoratum lienem minuit, inguinum bubones reſoluit ex melle illitum. Virentes ſiliq; cum ſuo caule, folijsq; contrita, illitaq; capillos denigrant. Farina vipereis patillis additur. Damnat autem Eruum in cibis ſumptum.

CENSURA.

Aſtipulandum haud ijs eſt, qui Eruilium Piſi genū, Eruum eſſe contendunt.

LUPINVS, Græcis. *ῥαῖς*. Arabibus, *Tarinus*, *Arinus*, seu *Tornus*. Italis, *Lupino*. Germanis, *Wickbonen* / *Seigbonen*. Hispanis, *Entramuces*, seu *Entramucos*. Gal-
lis, *Lupins*.

LUPINI.

FORMA.

Matth.

Vnico exit caule, haud in-
firmo, folio septifariam disse-
cto, piloso, molli, subalbican-
te, flore candido, siliquis faba-
ceis, compressis; albicantibus,
per ambitum crenatis, in qui-
bus quina, senave continen-
tur grana membranis distin-
cta, orbiculata, alba, pressa,
umbilicata, & insigniter ama-
ra. Radice nititur subflauo-
scente, ac diuaticata.

LOCVS.

Idem.

Seritur in agris, sterili solo:
nā ipse solum sibi impinguat.

QUALITATES.

Idem.

Excalfacit, & siccit mani-
festè, abstergit, aperit, dige-
rit, resoluit, & attenuat.

VIRES.

Diosc.

Matth.

Farina ex melle sumpta, ven-
tris animalia pellit. Idem præ-
stat ventri illita. Præstat hoc
idem eorundem decoctum cum ruta, & melle potum. Idem Lienosos iuuat,
quin etiam vlcera tetra, gangrenas, pustularū eruptiones, vlcera in capite ma-
nantia, vitiligines, maculasque fori sanat: menses, & partus extrahit in vellere
subditum cum myrrha, & melle. Eorum farina cutem, & liuores abstergit: in-
flammationes quoq; cum hordeacea farina, & aqua mitigat: coxendicum cru-
ciatus ex aceto lenit. Cocta in aceto, & illita strumas dissipat, & carbunculos
rumpit. Lupini in caelesti aqua decocti, quousq; lentescant in pultem, faciem
abstergunt. Radicis decoctum ex aqua, vrinam eiet. Ij vbi macerati dulcescere
cœperint, cum aceto poti, fastidium detrahunt, & cibi auiditatem faciunt.

*LVI-



*LUPINVS sylvestris, Græcis, *ἄγριος ἕρπον*. Germanis, *Wilde Fenchbonen*/Türkischer Weisel. Posteriore tamen vocabulo cum dignantur qui florem luteum profert.

LUPINVS SYLVESTRIS.

GENERA.

Lupini sylvestres aliquot à se invicem differentias habere observatur, inter quæ præcipuæ duæ.

FORMA.

Prior luteo flore copioso, pulchro, suaevolente spicato insignis est, violam luteam odore & colore prope æmulas. folia & caulis domestico similia sunt, siliquæ minores, duriores, hirsutiores, semina includentes minora, sapore amariss. multis maculis variegata. Alter altius excresecit, & ramosior fit, folijs tamen angustioribus, & minorib. flosculis è caruleo purpureo, rubentibus aut subrubentib. præditus est: fructus minuti, colore sordido, vario, & nonnihil liuente aspersi sunt.

LOCVS.

Oriuntur plerisque locis sponte, sed nobis non nisi sati proveniunt.

FACULTATES.

Amaritudine superant satiuos, ut Galenus inquit, ideoque præpollent in eiusdem cum ipsis generis facultatibus.*

O 5 RAPVM.



RAPVM, Græcis, ραπύλλη. Arabibus, Selien, Selgem, Selgrem, siue Alsegrem. Italis, Rapo, & Raio, Germanis, Rüben. Hispanis, Nabo. Gallis, Raue.

G E N E R A.

Matth. Trium est generum, sessile, longum, rotundum.

F O R M A.

Idem. Rapum aded omnibus vulgare habetur, vt superuacaneū sit eius formam describere.

L O C V S.

Idem. Seritur in campis, citoque prouenit, nam post messem factum, vbi seges prius fuerat, alpinis tractibus tribus mēsis perficitur.


Q U A L I T A T E S.

Gal. Radix exalfacit & humectat. Semen verò calidum est, & siccum: cum autem sit etiam amarum, abstergit, aperit, digerit, prouocat, flatus gignit, & venerem excitat.

V I R E S.

Diosc. Radix elixa ex iure carniū alit, sed flatus gignit, humentem ac mollem carnem creat. Venerem stimulat, & præsertim cum longo pipere deuorata: forūm rapi decoctum podagricos, & perniones iuuat. Si excauatę radici cera vna cum rosaceo adigatur, & feruenti sub cinere coquatur, auxilium non infimum erit ad exulceratos perniones. Cymæ prius elixæ, deuorata, vrinā cient. Semen potum venenis aduersatur: quare in antidotis additur. Constat experimento, valere ad variolas & morbillos, nam potum semidrachmę pondere morbillos latentes ad cutim expellit.

RAPVM



R A P V M L O N G V M .

Forma tantum ab altero
differt. Cætera verò nihil dis-
sident.



R A P V M

RAPVM sylvestre, Græcis, γογγύλη ἀγρία. Italis, Rapo salustico.

RAPVM SYLVESTRE.

F O R M A.

Matth.

Prouenit sylvestre rapum folijs, caule, floribus, siliculis, & semine domestico non ab similibus, sed omnia agrestiora, asperiora, hirsutioraque spectantur. Radicem habet raphani modo longam, crassamq; sed sapore domestici rapi, præditam, acriore tamen & amariore.

L O C V S.

Idem.

Nascitur in agrorum marginibus, & iuxta semitas.

Q U A L I T A T E S.

Idem.

Radix, quod acrior, amariorque sit, excalfacit ordine secundo, & siccatur in principio primi. Atqui semē id longē valentius præstat: præterea abstergit, incidit, aperit, attenuat, & prouocat, magis quàm domestici.

V I R E S.

Idem.

Semen in farinam tritum, lentigines, & albos exheret: potum ventris animalia pellit, & vrinam ciet.

A P P E N D I X.

Tametsi scimus hanc plantam non esse Dioscoridis sylvestre rapum, cum tamē notis omnib, rapum referat, nobis sylvestre rapum ipsam appellare libuit.

RAPVNCV-



RAPVNCVLVS, Italis, *Raponzolo*. Germanis, *Rapunzel*.

RAPVNCVLVS.

FORMA.



Planta est cubitalis, caulibus pluribus ab vna radice prodeuntibus, in cacumine ramosis. Folia profert antequam caulem edat, oblonga, humi accubantia, sed quæ in caule sunt, angustiora & longiora habentur. Flores fert in ramusculorum cacuminibus cæruleos. Semen concluditur simplici calyculo nigrum, ac minutum. Radice nititur longiuscula, crassiuscula, & media sui parte extuberante, alba, fragili, terrena, & subdulci sapore prædita. *Matth.*

LOCVS.

Nascitur in aruis non cultis, in collibus amœnis, & in pratis. *Idem.*

QUALITATES.

In caliditate & frigiditate radix non longè abest à tēperatis, imo nec in illis qualitibus. *Matth.*

VIREs.

Estur cruda radix, ac pariter cocta in acetarijs, quod maximè gustui placeat, & appetentiam excitet. Creditur quod radix elixa, & cum longo pipere deuorata, lactis vbertatem in nutricibus faciat.

CENSURA.

Non rectè sentiunt, qui putant Rapunculum, Rapum esse sylvestre Dioscoridis: Horum enim sententiæ repugnat Theophrastus lib. 7. c. 6. de plantarum hist. quippe qui sylvestre rapum radice constare longa raphani modo, breuiq; caule consistere scribit.

RAPVS,

NAPVS, Græcis, *Bouviās*. Italis, *Nauone*, & *Nagone*. Germanis, *Seckrüben*. Hispanis, *Nabicas*. Gallis, *Nauet*.

GENERA.

Matth. Plura Theophrasto & Plinio habentur genera. Verum nobis duo tantum feruntur, nempe album, & subflauum.

FORMA.

Idem. Folijs atq; radice, raphano similis est, caule verò, florib⁹, & semine rapum æmulatur.

LOCVS.

Idem. Seruntur napi in campis, raporum modo, & in hortis.

QUALITATES.


Idem. Radix excalfacit ordine secundo, & humectat primo incipiente: atqui semē excalfacit & siccit, abstergit, aperit, digerit, prouocat, & incidit.

VIRES.

Diosc. Cocta radix inflat, modicum alit. Semen potum venenorum vires hebetat, quare antidotis miscetur. Necat idem interaneorum vermes ex limonum, aut Citriorum succo potum: ex adianti autem decocto sumptum morbillos, & exanthemata ad cutim propellit, & morbi malignitatem superat. Datur vtiliter cochlearis mensura; addita Lini seminis drachma ad ciendam vrinam. Ventriculi cruditates vomitione extrahit ex oxymelite, & repēti aqua sumptum. Datur quoque diebus pluribus quotidie drachmæ pondere ex marrubij stillatitia aqua, aut decocto, vtiliter potandum regio morbo laborantibus. Semen, tustum pressumq; copiosum remittit oleum, ad omnia vtile, ad quæ semen.

Matth.

NAPVS.



RAPHA-

NOMINA.

223

RAPHANVS, Græcis, Ραφάνιον, & Ράφανος. Lat. *Raphanus*, & *Radix*. Arab. *Fugel*, *sive* *Fegiel*. Italis, *Rafano*, & *radice*. Germanis, *Dettrich*. Hispanis, *Rauano*, & *Rauanillo*. Gallis, *Reffort*.

RAPHANVS.



GENERA.

Duum est generum. Sati-
um & sylvestre, quod Ar-
moraciam Latini vocauerunt.

FORMA.

Folia fert napo similia, as-
pera, atq; hirsuta: caulis illi-
teres, flos alb⁹, silique tumē-
tes, ac mucronata, semine
int⁹ rotūdo, rufo, acuto sapo-
re. Radice nititur varia: non-
nullis. n. inest longa, alba, te-
res, tenera, fragilis, nec ad-
modū acris. Aliquibus crassā
napi figura, altera longē du-
rior & acrior. Differt quoq;
colore: namq; alba & nigra
vbiq; fere habetur, non solū
satiua, sed agrestis quoque.

LOCVS.

Satius feritur in hortis,
& agris. Agrestis sponte pro-
uenit in campetribus in a-
gro Romano.

QUALITATES.

Radix exalfacit excessu tertio,
& exicat secundo, sed in vtroque
agrestis efficacior. Semen autem
longē efficacius est. Quin etiam
digerit, aperit, prouocat, incidit,
extenuat, rarefacit.

VIRE.

Radix vrinam ciet. Decocta contra veterem tussim, & pituitę crassitiem in pectore efficac-
est, lieno sis vtilis, fuggillata cum melle delet: auxiliatur cōtra viperarū ictus. Alopecias ad pi-
lum reducit. Lentigines cum loliacea farina emendat: valet aduersus fungorum venenū quo-
quo modo sumpta: mentes ciet. Recens minutim incisa, & ex albo meraco, & butyro in sarta-
gine calefacta, pubique admota, remoratur vrinam pellit. Idem præstat eius succus duarum
vnciarum pondere ex vino Cretico haustus. Corticis vncia cum mercurialis tantundem croci
granis quatuor. Casia o. Joratæ drachma. Et duabus succi fabinæ: omnibus rarissimo linteolo
exceptis, & subpositis, subuenit præsentanco auxilio eggrē parturientibus. Radicis succus cum
oleo amarum amygdalarum & vini albi nonnihil feruefactus, addito colocynthidis momen-
to, aurium sonitus curat.

CENSURA.

Errant profectō qui raphanum rusticum, de quo statim dicitur, Armoraciam faciunt.

RAPHA-

RAPHANVS longus. Italis, *Radice longa*.

RAPHANVS LONGVS.

FORMA.

Radicis forma tantum ab altero raphano differt, quæ in hac longa, tenera spectatur, in altera dura solidaque habetur, ac magis quoque acris.

QUALITATES,
ET VIRES.

Cùm sit altera mitior: mitiores quoque vires possidet.



RAPHA-

RAPHANVS Rusticanus montanus, Grecis, *ἀργία / ἀργαρό*, Italis, *Rafano*, & *Ra-*
mano. Germanis *Renn*. Gallis *Rafan* siue *Reffort sauuage*.

RAPHANVS RVSTICANVS.

FORMA.

Folijs prouenit Hippolapa- *Marr.*
 thi proximis, radice longa, pol-
 licis crassitudine, ac etiam cras-
 siore, acerrimo gustu, sinapi-
 haud absimili: floribus in cau-
 lū in summitatibus albis, & pu-
 sillis.

LOCVS.

Nascitur sponte in pratis, vi *Idem*.
 ridarijs, & locus itinera.

QUALITATES.

Radix excofacit, & siccatur
 ordine tertio completo. Ape-
 rit, pellit, incidit, prouocat, at-
 tenuat, & abstergit.

VIRES.

Ea omnia potest, quæ dome- *Idem*.
 stica, & agrestis radix, sed va-
 lentius operatur. Quinetiam
 sinapivires obtinet, vrinam, &
 arenam valentius pellit. Illini-
 tur contra radix ex vino al-
 bo, & recenti butyro calefacta, vtiliter pubi ad ciendam vrinam, siue sit dolor
 ex renum calculis, siue ex crassa, lentaq; pituita vesicæ ceruicem obstruente. In
 quo casu datur quoq; non paruo auxilio, potandum vinum, in quo incisa radix
 fuerit macerata. Germani, Vngari, atq; Poloni hac radice suos condiunt cibos,
 in quibus quanquam appetentiam facit, reuera tamen, & caput lacerat, & nido-
 rosas eructationes mouet.

CENSURA.

Rectius fortasse saperent, qui hanc plantam perperam Armoraciam faci-
 unt, si Crateuæ Thlaspin, de quo in Thlaspi meminert Diol eandem esse scribe-
 rent.

P

SISER,



APHA-

SISER, Græcis, Σίσυρος. Arabibus, Culeas, Fijarum, siue Seisaron. Italis, Sifaro.
Germ. Origelndren.

SISER.

FORMA.

Matth. Folia promithortensi pastinacæ similia, breuiora tamen, atq; minora, caules etiam similes habet, striatos. Semen in umbella pronenit, petroselinimodo: Radicibus nititur numerosis, asphodeli modo, teneris, fragilibus, dulci sapore, & amariufculo, origatis, tenui intus matrice.

LOCVS.


In Germania vbi passim habetur, scribitur in hortis.

QUALITATES.

Gal. 8. Radix excalfacit ordine secundum me. cundo, aperit, digerit, vrinam ciet, adiunctamq; habet amaritudinem, cum leuicula adstrictione.

VIRES.

Diosc. Stomacho haud inutilis est, appetentiam iuuat. Venerem Matth. stimulat.



SISER

legit

NOMINA.

227

SISER alterum, Italis, *Carota bianca*. Germanis, *Sierstin* / *sive* *Sirgellin*. Hispanis, *Chiriuas*. Gallis, *Cheruy*, *sive* *Giroles*, aut *carottes blanches*.

SISER ALTERVM.

FORMA.

Folia caules, umbellas, flo *Idem*. res, & semen habet syluestris pastinacæ. Radix, napi effigiem representat, colore albicante, aut subflauescente, sapore subdulci, ac simul amarulculo.

LOCVS.

Seritur in hortis, ac etiam *Idem*. in agris, in vniuersa Germania, & Boemia.

QUALITATES.

Excalfacit, & humectat, *Idem*. inflat, aperit, vrinas mouet.

VIREs.


Valet radix ad ea omnia, *Idem*. ad quæ Siser primum valere diximus.

APPENDIX.

Tametsi sub Siseris alterius nomine hæc planta posita sit, nihil tamen cum legitimo sifere habet cognationis.

P 2

LAPA-



LAPATHVM, siue Rumex, Græcis, Ῥάπαλον ἢ ὀξύλαπαθον. Officinis, *Lapathum acutum*. Arabibus, *Humad*, siue *Humad*. Ital. *Lapathio*, siue *Rombice*. Ger. *Amppferl*. *Mengelwurk*. *Streiffwurk*. *Bitterwurk*. Hisp. *Labara*. Gallis, *Lapais*, *Pareile*.

GENERA.

Matth.

Quina habentur genera: Oxylapathum, Satiuum, q & Rumex, Sylvestre. Quartū quod quidā Oxalida, alij anaxirida vocant. Et Hippolapathum.

FORMA RVMICIS, ET OXYLAPATHI.

Idem.

Exit Rumex folijs betæ nigre proximis, sed minoribus, plantagini ferè equalibꝰ, humi accubantibus. Caulis illi inest cubitalis, striatus, flore rubescente, semine minuto, pellucido, nigricante. Radicibus nititur longis, flauo colore. Oxylapathum autem folijs prouenit longioribus, in cacumine acutis. cætera Rumici similia sunt.

LOCVS.

Prouenit Rumex sponte in hortis, secus itinera, & incultis locis: Oxylapathum verò, in aquosis, & palustribus.

QUALITATES.

Gal. lib. 7. Lapathum moderate digestum, sortitur facultatem,

at oxylapathum mistum: nam cum eo, quod digerit, non nihil quoq; repercutit. Semen autem eorum, manifestam quandam adstrictionem obtinet.

VIRES.

Gal. lib.

Aetius.

Matth.

Vtriusq; semē, & præsertim oxylapathi dysenterias, diarrhæas, ac cætera alui profluvia colubet potum. Præstat ad canum rabidorū morsus, fori vulneri applicatū, & herba ipsa illita, atq; vna cū radicibus potui data. Vinum in quo oxylapathum decoctum sit, diebus aliquot potum, auriginē pellit. Aqua tota plantilla distillata, vna cum caphuræ momento, pustulas in facie delet. Herba pubi illita, verrinam ciēt. Quin etiā radicem ex vino decoctum potum, calculos renum frangit. Idem præstat radicem siccarum puluis. Earundem decoctum fomentis adhibetur scabiem sanat: Idemq; præstat succus cum sulphure illitus.

* LAPA-



*LAPATHVM rubrum, Cretense, vulgo sanguis Draconis. Græcis Ερυθρολά-
 τας. Germ. Rot Ampffer/Drachenblut.

LAPATHVM RUBRUM.

F O R M A.

Folia & caulis cruento suc-
 co turgent, vt manus infici-
 ant si premantur, radix lutea
 est vt vulgaris lapathi, cui fe-
 rre per omnia respondet, ex-
 cepta magnitudine.

L O C V S.

Frequētius in hortis quam
 alibi nascitur & seipsum serit.

F A C U L T A T E S.

Gustu nitrosiore quā oxy-
 lapathum esse deprahendi-
 tur. Reliqua huic sunt cū eo-
 dem communia. Aluum ciet
 iusculum aut expressus suc-
 cus sanguineus totius plan-
 tæ. Semen eius puluerisatum
 & in aliquo decocto adstrin-
 gente potum singularem ha-
 bet efficacitatem in sistendis
 nimis mensibus & similibus
 fluxibus.*

P 3

O X A L I S



OXALIS, Græcis ὀξύλις. Officinis, & Italis, *Acetosella*. Germanis, *Sauer Ampffer*. Hispanis, *Azedrilla*, *Agrelles* & *Azedas*. Gallis, *Oseille*, *Vincette*, *sive Salicette*.

G E N E R A.

Matth. Duum est generum. Maius & minus.

F O R M A M A I O R I S.

Maior folia promit Lapatho adæo æmula, ut quandoq; oculos fallat: at tamen minora sunt, læviora atq; paulò angustiora. Et ab ipsorum exortu sagittali ferè figura, acido omnino gustu. Radice nititur, ubiq; fibrata, sed non rumicis modo fulva, sapore perinde ac folia, & caules. Semen profert subrubrum, paruum, & acuminatum. caulem cubitalem, & striatum, & succolum.

L O C V S.

Idem. Nascitur spontè in pratis, & seritur etiam à nonnullis in hortis.

Q U A L I T A T E S.

Idem. Refrigerat, & siccatur excessu secundo, digerit, aperit, & nonnihil incidit.

V I R E S.

Matth. Herba ipsa biliosis, ac pestilentibus febribus adversatur. Præstat & ad cordis affectus. Sicim sedat, putredini resistit: *Diosc.* vermes necat, appetentiam excitat. Semen fluentem aluum cohibet, dysentericos, & cæliacos iuvat; stomachi fastidia tollit: Sanat scorpionum ictus, quod si quis in potu præsumat, nihil molesti patietur ex ictu. Hæc omnia præstat non solum semen, sed vniuersa quoq; planta.

OXALIS MAIOR.



OXALIS

OXALIS minor, Acetosa ouillax. Græcis, ὀξυς μικρός. Italis, Acetosella, Saecciola, & sannicciola. Germ. Klein Saurampffer / Schöpffampffer. Gallis, petire o'zeille.

OXALIS MINOR.



FORMA.

Folia promit alteri longè Matth. minora, pinguiuscula, lanceæ cuspidis figura; laeua, minutisque, ac rubentibus venulis exarata acidioraque quàm in maiori. cauliculos edit pedales, tenues, in quibus flosculi numerosi spectantur rubentes, ac foliacei, & semen vt in altera subrubens, sed longè minus.

LOCVS.

Crescit exoluto solo, & in Idem. culto.

QUALITATES.

Refrigerat, ac siccatur perin- Idem. de ac altera: digerit, & incidit.

VIRES.

Omnia belle potest, quæ Idem. maior; nec infirmioribus pollet viribus.

HIPPOLAPATHVM. Græcis, ἵππολαπάθον. Officinis, *Rhubarbarū Monachorum*.
Italica, *Rombice maggiore*. Germ. *Münch Rhabarbaren*. Gallis, *Reubarbe de Maraù*.

HIPPOLAPATHVM.

GENERA.

Marth. Duū est generum, alterum
Hortenſe, alterum ſylueſtre.

FORMA.

Idem. Planta eſt grandis, ac for-
moſa, folijs, ſemine, radicib⁹,
ac cæteris in vniuerſum notis,
minori lapatho ſimilibus; ſed
omnia longè maiora, nam fo-
lia grandia ſunt, helenij ferè
modo, radix pariter grandis,
vegeta, fuluo colore.

LOCVS.

Idem. Alterum ſeritur à pluribus
ſc̃ctaculi cauſa in hortis, &
viridarijs, alterum ſponte na-
ſcitur in paluſtribus.

QUALITATES.

Idem. Digerit, abſtergit, mundat,
aperit, prouocat.

VIREs.

Idem. Radicis ſuccus cum ſulphure illitus ſcabiem ſanat, cum lupinorum verò faci-
na lentigines, alphas, & alias cutis infectiones exterit. Radicis dilutum, ex vino
paratum præſtat, ad pellendos renum calculos. Idem facit ſiccæ radicis puluis:
drachmæ pondere ex mæracio potus: quin etiam ex marrubij decocto hauſtus,
auriginem curat.



LAM.

LAMPSANA, siue Brassica sylvestris. Germanis, Keintöl, Senffhoef. Græcis, Λαμψάνη. Italis, Cauolo saluatico, & rapo fulso, & rapa stella.

LAMPSANA.

FORMA.

Planta est pedalis altitudinis, hirsutis folijs, sinapi non ab similibus; flore melino subalbicante, semine in corniculis erucæ modo sursum spectantibus.

LOCVS.


Nascitur sponte in campis Matth. cultis, & incultis.

QUALITATES.

Semen excoquit, & siccat, Gal. li. 6. absterge di, digerendiq; non simp. me. nullam facultatem possidet.

VIRES.

In cibum sumpta; succos DIOSC. prauos procreat, & plus alit, quam rumex.



P 5

BLITVM,

horum.
Marav.

o faci-
x vino
culuis:
austus,

AM-

BLITVM, Græcis, βαλάνιον Arabib. *Bachala*, *tamenia*, siue *Bachale Aliamanie*. Italis, *Blito*, *Biedone*, & *Bietolone*. Germa. *Wayer*. Hisp. *Bredos*. Gal. *Blette*.

- GENERA.

Matth. Duum est generum, Rubrū & Album, & in rubri genere maius & minus.

FORMA MAIORIS.

Idem. Rubrum maius, crescit ad arbusculæ magnitudinem, folijs & caule alterius longè maioribus: flore grandi, numerosas veluti panniculas fundente, caecuminibus deorsum spectantibus, atque rubentibus amaranthi ferè modo, caule brachiali crassitudine, firmo, lignoso ac striato.

LOCVS.

Seritur in hortis & viridarijs, & habetur etiam fictilibus ad fenestras opacandas.

QUALITATES.

Gal. li. 6. Refrigerat & humectat Blisimp. me. tum ordine secundo.

VIREs.

Gal. 2. de alum. fac. Scorpionum ictus, quinetiam succus idem facit, cum vino potus. Illinitur ex o-
Plin. lib. 20. c. 22. leo, ad lienis, & temporum dolores.

BLITVM



BLITVM rubrum minus, Græcis, Βληττον μικρόν. Italis, Blito, Biedone, aut Bietolone minore, & Gelofia.

BLITVM RUBRVM MINVS.



FORMA.

Folia promit purpurea, Matib. amaranthi proxima, minus tamen rubescentia. Caulem quoque habet purpurascen-tem, striatum, cubitalem-que. Flores edit spicatos, siue in racemi modum, pariter purpureos: Radicem multi- fidam, purpureo succo præ- gnantem.

LOCVS.

Seritur in hortis, ac etiam Idem. in ijs spontè prouenit.

QUALITATES.

Refrigerat, humectat, & Idem. emollit.

VIREs.

Auxiliantur peculiariter Idem. ad mensès remorantes pro- uocandos, molas, & secun- das educendas, si fœminæ vapore decocti calidi suffiantur, adeò, vt vapor ad uterum ascendat.

BLITVM

BLITVM album, Græcis, Βληττον λευκόν. Italis, *Blito*, *Biedone*, & *Bierolone bianco*.

FORMA.

Matth. Folia profert Blito rubro
minori similia, subalbido co-
lore. Flores & semen racema-
tim tenuibus insident ramu-
sculis, ex alarum cauis prode-
untibus, panicularum effigie.

LOCVS.

Matth. Sponte nascitur in agris nō
cultis, secus itinera, ac etiam
in hortis, & areis.

QUALITATES,
ET VIRES.

Idem. Iisdem qualitatibus & viri-
bus pollet, quibus & cætera
genera.

BLITVM ALBVM.



*BLITVM

* *BLITVM* sylvestre. *Poly spermon* Aloysij Anguillare. Græcis, Βαίλον ἀγρίον, aut πολίσπερον. Germanis, Wildt Meier/ Wildt Traubenfrant. Italis, Bledoni, seu Blito saluatico. Hispanis, Bredos saluages. Gallis, Blere sauvage.

BLITVM SYLVESTRE.

FORMA.

Minus est reliquis generibus Bliti, folijsq; ocymi angustioribus, flosculis racemosis, & semine copiosissimo Botryos inftar, nigro splendente, & alix albagracilis.

FACULTATES.

Hac mirè capiuntur pisces, vt experientia confirmati tradunt.*



MALVA,

MALVA, Græcis, *Μαλίζη*. Arabibus, *Chubeze*, seu *Chabazi*. Ital. *Malva*, & *Malua*. Germ. *Pappel*. Hispanis, *Maluas*. Gallis, *Malue*.

MALVA.

G E N E R A.

Matth. Vna hortensis, altera agrestis, & utraq; maior, & minor.

F O R M A.

Idem. Vulgaris adeo notitiæ malua est, ut eâ calamo delineare opus non sit.

L O C V S.

Idem. Prouenit sponte, & saca quoq; in hortis & viridarijs, & vbique.

Q U A L I T A T E S.

Gal. li. 7. Domestica quanto plus habet aqueæ humiditatis, quàm agrestis, tanto minus digerentis est facultatis.

V I R E S.

Diosc. Illinitur vtiliter contra aculeatos apium, & vesparum ictus, nec ab his feriuntur, qui ea trita cum oleo fuerint peruncti. Sanat capitis vlcera, & furfures: medetur sacris ignibus, & ambustis decocta folia, & ex oleo illita. Eius decoctum in fessione vulvas emollit, quinetiam clysmate infusum, vesicæ, & intestinorum erosiones sanat. Ius decoctæ vnâ cum radice, bibitur vtiliter contra omnia venena, si cōtinuò à bibentibus reuomatur. Contra phalangiorum ictus remedio est. Semen ex vino potum, lac euocat, vrinæ cruciatus tollit. Feruefacta folia in cibum apposita raucedines expediunt, ex sale autem, oleo, aut recenti butyro aluum citant. Folia cum porris, & capis illita, præstant ad serpentium venenosorum morsus. Succus auribus instillatus dolorem sedat. Foliorum, & radicum decoctum ad lentorem vsque feruefactum datur potandum ægrè parturientibus magno iuuamento. Idem præstat succus selibræ pondere potus. Semen ex vino rubro potum, nauisem tollit. Cauliculi molles elixi, delibratique comeduntur asparagorum modo, ad citandam aluum. In summa, Malua ad multa vtilis est, ideoque non immeritò antiqui Maluam Omnimorbiam vocauerunt.

Matth.



MALVA

MALVA Arborea, siue Malua maior, Mosceutos Plinio. Græcis, Δένδρομαλάκη.
Italica, Malua, siue Malua maggiore. Germanis, Grosse Pappel/vel Pappel Rosen.
Gallis, Malues de l'arden.

MALVA ARBOREA.

FORMA.



Folia gerit hortensis Mal. Matth.
ua grandiora subhirsuta, per
ambitū hortensis Maluæ mo-
do diuisa, longi que pediculis
appesa. Stolonibus interdum
singulis, interdum pluribus
ab vna radice prodeuntibus,
tricubitalibus, & quandoque
maioribus, subhirsutis, baculi
effigiem referentibus: floribus
in superiore parte caulium se-
pandentibus, rosarum modo
amplis, & quandoque foliorum
multitudine similibus: colore
in quibusdā purpureo, in non
nullis candido. Et in quibus-
dam subpurpurascens. Semē
edit cæteris maluis simile, sed
maius: Radicibus nititur vali-
dis, & multifidis.

LOCVS.

Seritur in hortis, & virida-
rijs, ac etiā in ficilibus, ad opa-
candas in æstate fenestras. Idem.

QUALITATES ET VIRES.

Ea omnia facile præstare potest, quæ & cætera maluarum genera.

Idem.

ATRIPLEX,

ATRIPLEX, Græcis, ἀράδαξις, ἢ χυρολάχανον. Arabibus, Caraf, siue Caraf. Italis, Atriplice, Reppice, & T.eppice. Germanis, Woltzen/ seu Wiltzen. Hisp. Armoles. Gallis, Choux, Arroches, Bonnes, Dames, Folles, seu Femés.

ATRIPLEX.

GENERA.

Matth. Trium est generum, Hortense, Sylvestre, Marinum.

FORMA.

Matth. Hortensis Atriplex folia mitit humotenus lata, in mucronem tamen desinentia, sagittarum instar, pingua, succosa, colore ex viridi in luteum langescente: caulem rubrum, multis vndiq; adnatis ramis, qui ad quatuor cubitorum mensuram adolescit, semine spicato, pressis, tenuibusq; folliculis ocluso.

LOCVS.

Matth. Seritur à ruricolis in hortis, & in campis.

QUALITATES.

Gal. li. 6. Humida & frigida temperie est. Humida quidem secundum ordinis à medijs, frigida vero primi, quam utiq; tepidam esse caliditatem dicimus, cuiusmodi in rosis inest, non tamē adstrictionis est particeps, sed aquea est, & minimè terrena: Hortensis itaq; tum humidior est, tum frigidior sylvestri, & paululum omnino est, quod digerendi vim obrinet. Semen autem abstergendi vim habet.

VIREs.

Diosc. Panos discutit si cruda, siue cocta illinatur. Semen cum aqua mulsa potum, regium morbum sanat. Idem potum vomitiones ciet, & aluum exoluit: Estur herba ceterorum olerum modo.

ATRIPLEX



N O M I N A.

241

ATRIPLEX sylvestris, Græcis, ἀτράραξις ἀγρία. Italis, Reppice saluatico. Germanis, Wild Milten. Gallis, Arroches sauvages.

A T R I P L E X S Y L -
V E S T R I S I.

G E N E R A.

Trium est generum folio- Matth.
rum diuersitate dissimilium.

F O R M A.

Primum genus folia edit
hortensi haud dissimilia, mi-
nora tamen, & quæ ad terram
sunt per ambitum laciniata,
subalbicantriq;: caulem ses-
quicubitalem, ramosum, ac
etiam striatum: semen race-
mosum, & exile: Radicibus
nritur numerosis, ac tenui-
bus.

L O C V S.

Nascitur sponte cum in
hortis, & vineis, tum secus
itinera, & locis incultis, &
campestribus.

Q U A L I T A T E S,
E T V I R E S.

Humida est, & frigida, sed Gal. 6.
minus quàm hortenſis. Itaque aliquantulo plus digerit. simp. me.

Q A T R I -



ATRIPLEX SYL-
VESTRIS II.

FORMA.

Folijs exit latioribus, quer-
cus modo per ambitum inci-
fis, subalbicantibus. cætera
cum altera paria sunt.

LOCVS.

Nascitur prope vrbium
mœnia, & locis quoque alijs
incultis.

QUALITATES,
ET VIRES.

Eædem illi sunt qualitates
& vires, quæ priori.



ATRIPLEX

NOMINA.
ATRIPLEX SYL-
VESTRIS III.

243

FORMA.

Folia habet oblonga, viri-
dia, carnosa, non, vt reliqua
laciniata, in acutum desinen-
tia: semen racemosum, cate-
ris minutius, caule ramofo,
fupino atq; ftriato.

LOCVS.

Nascitur intra, & extra vi-
bium, & oppidorum mœnia,
& in arcis.

QUALITATES,
ET VIRES.

Viribus præstat, quibus, &
præcedentes.



Q 2

ATRIPLEX

ATRIPLEX Marina, Græcis, ἀτράξις θαλασσία. Italis, *Atriplice, siue Reppice marino.*

ATRIPLEX MARINA.

FORMA.

Matth. Caules humi repunt, in quibus folia exeunt albican-
tia, spanachij oleris figura,
minora tamen, falso sapore:
Semen profert in caulium
summitatibus racemosum,
radicem diuariatam, multi-
fidamque.

LOCVS.

Idem. Nascitur sponte mariti-
mis locis, non procul à lito-
re.

QUALITATES.

Matth. Abstergit magis quàm ce-
tera genera, magisq; alium
citrat, & digerit. Incidit, at-
tenuat, liquat, à putredine
vindicat, aperit, & abraden-
do expurgat.

VIRE.

Idem. Humentem ventriculum
siccatur, hydropicos iuuat, pingues extenuat.



SPANACHI-

NOMINA.

245

SPANACHIVM, Græcis, Σπανάκιον. Italis, Spinace. Germanis, Spinat. Arabibus, Spanach. Gallis, Espinoches, siue Espinars.

SPANACHIVM.



FORMA.

Nascitur septem diebus, à *Matth.* satione, folijs primū triquetris, quæ deinde in sagittæ formam exeunt, mox à pediculo intybi sylvestris modo laciniata euadunt. Exigua nititur radice, tenuibus capillamentis fibrata, caule cubitali, & quandoq; maiori, inani tamen flores gerit in vertice rotundos, paruos, herbaceosque, racematim coherentes, semen aculeatum, angulosumque.

LOCVS.

Scratur passim in hortis *Idem.* cæterorum olerum modo.

QUALITATES.

Humidum est, & frigidum *Matth.* ordine primo, nec omnino vacat nitroſa qualitate.

VIREs.

Aluum emollit, sed flatuſ gignit. Succus foliorum potus, præstat ad scor- *Serap.* pionum, & phalangiorum ictus. In cibum deuoratum, lenit exasperatas arterias.

Q 3

KALY

KALI vel Vincenita Mauritanis vocata. Italis, *Seda*, *Salsola*. Gallis, *Soede*.

K A L I.

* G E N E R A.

Plurima eius habentur genera, & quibus quatuor exhibemus.

F O R M A I.

E T I I I I.

I. Multis ramulis fruticat, & stipite lignoso, grandi perpetuo, & interdum ad duos cubitos attollitur, subrubente cortice obducto. Surculi ex folijs ceu granulis, hordei magnitudine, componuntur sapore saluginoso.

IIII. Vel idem genus habetur, vel parū differt à priori, granulis tantum in summitate rotundis ceu seminibus annatis, lenticulas referentibus, aut exiles squamas.

L O C V S.

In maritimis nascitur.

Q U A L I T A T E S.

Calida & sicca est herba, & calidior ex eo confectus cinis, qui ad quartum qualitatis vtriusq; gradum accedit, vrendiq; & causticam vim habet.

V I R E S.

Comburantur in cinerem hæc planta, quo liquefiunt contriti lapides ad parandum vitrum. Lixivium inde percolatum acerrimum & mordacissimum, addito oleo in saponem decoquitur ad abluendas vestes utilissimum. Herba exigua quantitas intro assumpta, urinas & menses potenter euocat, sætum eijcit, aquosos per aluum humores ducit, hydropicos purgat. Eius nidore fugantur serpentes. Misceatur etiam cinis, quæ scabiei & cutis fœditatibus illinuntur, medicamentis, superfluum & excrecentem in malignis vlceribus carnem exest.*

Cal



* Cali 11. & 111. Salicornia. Germanis, Salztraut.

C A L I.



F O R M A.

11. Frequentioribus ramulis prodit è stipite cinereo componiturque tota planta quasi granis in se inuicem confertis, superioribus semper inferiorum osculis cucetabulis insidentibus. 111. Tenerior est herbula, folijs crassiss, pinguibus, carnosiss, teretibus constans, vt reliqua id genus plantæ præcedentes, quæ omnes, vt ex iconibus patet, differentias parui momenti sortitæ sunt, & autumnî tempore rubent.

L O C V S.

Ad maritimas oras crescit & minor illa species in Germania quibusdam in locis circa Salinas & salfos lacus prodire visitur.

Q U A L I T A T E S,
E T V I R E S.

Huc refer quæ paulo ante de reliquis dicta sunt.*

Q 4

BRASSE-

BRASSICA lævis, Plinio Cumana, Græcis, κραιβη λέει, Theop. λεύκωλλο-
Arabibus, Corumb, seu Kayumb. Italis, Cauolo liscio, sine Verza liscia. Germa-
nis, Röl. Gallis, Choux Vers, aut Choils. Hispanis, Colthes, seu Couues.

BRASSICA LÆVIS.

FORMA.

Matib.

Folio exit grandi, ima parte
vtrinq; dissecto, per ambitū
fimbriato, leui, pinguiq; cau-
le breui, firmo, subalbicante,
alba int^o medulla. Flores edit
melinos, & semē rapi simile,
ac similibus quoque siliquis
inclusum subiufo colore, &
subamarum.

LOCVS.

Idem.

Seritur p^lim in hortis.

FACULTATES.

Gal. 7.

simp. me.

Desiccandi vim habet, non
tamē admodum acrem, quin
etiam emolliendi, glutinan-
di, & abstergendi.

VIRES.

nosce.

Cæcutientibus, & tremu-
lis deuorata prodest, Summo
cibo sumpta crapulā discutit,
& vini noxā restinguit. Cru-
dus succus cum nitro, & Irīde
deuoratus, aluū emollit, ex
vino verō potus, viperarum
morsib⁹ auxiliatur. Cum fæ-
nogræci farina, podagris, &
articulorū vitijs cōmodē illinitur. Prodest sordidis, & vetustis vlceribus. Caput
purgat naribus infusus, Menfes trahit cū loliacea farina inditus. Illita folia per
se, aut cum polenta, conferunt inflammationibus, & tumoribus, & ignē sacrum,
lepraq; sanant, carbunculos ex sale rūpunt, fluentes capillos retinent. Ex mel-
le cocta valent ad depascentia vlcera, gangrenasq;. Cruda ex aceto lienosis pro-
sunt. Mansa, & exueto succo retusam vocē instaurant. Decoctū eorum potum
aluū, & menfes ciet. Semen potū tineas ventris pellit: lentigines, alphasq; illitū
in facie purgat, caulū cinis adipe suillo exceptus, illinitur vtiliter ad diuturnos
laterum dolores: Brassica leuiter feruefacta aluum citat deuorata, percocta ve-
rō sistit.

BRASSI-



NOMINA.

249

BRASSICA crispa, seu Sabellica Plinio. Græc. κράμνη ὑλίσφυλλος. Italis, Cagno-
lo crespo, seu Verza crespa. German. Krautköhl.

BRASSICA CRISPA.

FORMA.

Caule exit firmo, nodoso, *Matth.*
è quo folia numerosa exeunt,
lata crispaq; , & quæ in me-
dio sunt, crispiora, albican-
tia, & in orbem conglome-
rata, tenera, & in cibis grata.

LOCVS.

Seritur in hortis, perinde *Idem.*
ac altera.

QUALITATES,
ET VIRES.

Præstat ad ea omnia, quo- *Idem.*
rum in læui Brassica memini-
mus.



Q. BRASSI-

BRASSICA capitata, siue Imperialis, Græcis, Κεράκη κεφαλάδης. Italis, *Coneto* *Cappuccio*, *Cappuzzino*. Germanis, *Rapsfrant*. Gallis, *Choux*, *Cabuz*. Hispanis, *Repolho*, *Colles mortianos*.

BRASSICA CAPITATA.

FORMA.

Matth.

Folia fert primùm ampla subrotunda, à pedamento in girum sese fundentia, quæ deinde in orbem capitatum, ac solidum cōglomerantur, qui in aliquibus rufescit, in quibusdam albicat, in nonnullis virefcit.

LOCVS.

Idem.

Seritur in Germania in campis. In Italia verò in hortis.

QUALITATES,
ET VIRES.

Matth.

Viribus ab alijs brassicis non differt, nisi quod in cibus nocentior habeatur.



*CAVLO-

NOMINA.

257

*CAVLORAPVM, Rapæcaulis. Græcis, κράμβη γογγυλάδης. Germ. Rübenföhl.

CAVLORAPVM.

FORMA.



Lævi brassicæ congruit fo-
liorum figura, quæ tamē non-
nunquam crispantur profun-
dis lacinijs, sed magnitudine
capitatum ferè adæquat, eius
caulis crassescit infra folia iux-
ta radices, extuberatq; in ra-
pi mediocri magnitudinem,
flores & semina veluti aliæ
profert.

LOCVS.

Hortensis est, & amat so-
lum mediocre, pingue, & be-
ne stercoratum, probeq; sub-
actum. Semen aliunde infer-
tur.*

*BRASSI-

*BRASSICA cauliflora, siue Cypria, Plinio Pompeiana. Germanis, *Kaputt*
föl/Blumenföl. Italis, *Caulo flore*. Gallis, *Chous floriz*.

BRASSICA CAULIFLORA.

FORMA.

Caule folijsq; imitatur læ-
 uem brassicam sed albidior
 est, crassiorq; ac in totum ma-
 ior, in medio foliorum in ca-
 put conglomerantur ramuli
 pingues albidi molles, quasi
 asparagi, denso ordine com-
 pacti, Floret ut vulgaris bras-
 sica, cui semen etiam simile
 profert.

LOCVS.

Peregrina est, & instructio
 ribus tantum hortis manci-
 pata. *



BRASSI-

BRASSICA marina, Græcis, Κράμβη θαλασσία. Italis, & Officinis, Soldanella.
Gallis, Chou de mer.

BRASSICA MARINA.



F O R M A.

Facie à sativa prorsus ab- DIOSC.
horret: namque folia fert Ari-
stolochia rotundæ similia, sed
parua, singula à ramis ruben-
tib⁹ exeuntia singulari, vt hæ-
dera, pediculo, lacteo succo
prægnantia, salso iustu, & ali-
quantum amaro. Flores fert Matth.
levis similacis vulgaris haud
ab similes, calathi effigiem re-
ferentes.

L O C V S.

Prouenit sponte locis ma- Matth.
ritimis, & præsertim in litori-
bus Veneris, & Aquileiensibus.

Q U A L I T A T E S.

Cum subsalsa, & subamara Gal. li. 6.
fit, sanè etiâ ad externos cor- simp. me.
poris vsus idonea fuerit, & ad
omnia, ad quæ tales qualita-
tes accommodantur.

V I R E S.

Herba in totum stomacho inimica, acris, ciet alium vehementissimè in ci- DIOSC.
bo cocta, & coquitur propter acrimoniam cum pingui carne. Præstat eius Matth.
decoctū potum, cum Rhabarbaro, ad pellendas hydropicorum aquas. Idem
facit foliorum siccorum puluis, addito Rhabarbaro, & cubebis, pluries ex vi-
no potus.

*SOLDA-

*SOLDANELLA alpina. Italis quibusdam *Lunaria di dinari*.

SOLDANELLA ALPINA.

F O R M A.

Herba elegans est ob flos-
culum cæruleo colore pulcher-
rimo insignem, multipliciter
dissectū campanulæ formam
representantem. Folium est
ipfi crassiusculum vnum atq;
alterum & sæpius plura, Sol-
danellæ marinæ subastringen-
te & amaro nonnihil sapore,
vnde illi nomen.

L O C U S.

In Alpibus colligitur.

Q U A L I T A T E S,
E T V I R E S.

Vipollet glutinandi vulne-
ra, atque ad cicatricem per-
ducenda.*



BETA.

est alb

Suc
decoct
Crudi
lo priu
pulari
exigua
datur
mand
alimen

BETA, Græcis, τεύλον. Arabibus, *Decka*, sine cell. Italis, *Bietola*. Germanis, *Wangolt*, sine *Pieffen*. Hisp. *Aselgas*. Gal. *Porree*.

BETA ALBA.

GENERA.

Trium est generum, alba, *Matth.* nigra, & rubra.

FORMA ALBÆ.

Alba folijs prouenit cæteris grandioribus atriplicis aut hortensis rumicis fere similibus, per ambitum leuiter sinuatis, caulem gerit bicubitalem, striatumq; flores exiguos, sublatei coloris: semine copiosum, inæqualiter rotundum, ac subasperum: radice alba, raphani modo longa, ac etiam tenera.

* Nigra paulo minor est, & colore differt.*

LOCVS.

Seritur passim in hortis. *Idem.*

QUALITATES.

Nitrosa facultatis particeps *Galen. 8.* est, quatum digerit, tum ex-*simp.me.* tergit, & per nares purgat. Cocta nitrositatem omnem exuit, sitque facultatis leuiter digerentis. Porro ad detergendum, digerendumq; validior

est alba, quam nigra. Succus abstergens est.

VIRES.

Succus naribus inditus caput purgat: aurium doloribus auxiliatur radice *Diosc.* decoctum, & foliorum: furfures, lentesque detergit: perniones fori mitigat. Crudis folijs vitilignes nitro antea perfrictas, alopeciarum inanitates, scalpello prius exasperatas, atque depascentia vlcera illini prodest. Eruptionibus papularum, igni sacro, ambustisque cocta medetur. Huius ceterum aliorum olerum *Gal. 2. de ali.fac.* exigua est alimonia, iecoris obstructionibus aptius, quam malua accommodatur: magis autem, ubi cum sinapi, aut aceto estur, lienosos item similiter manducata mirifice iuuat. Iure enim quis ipsam medicamentum potius, quam alimentum dixerit.

BETA



BETA rubra, Græcis, τεύτλον ῥομβόν. Italis, *Bietola rossa*. Germanis, *Rot Mangold* / *Rot Rüben*.

BETA RUBRA.

FORMA.

Matth. Folijs prouenit cæteris angustioribus, duriorib. rubentibusq; radice rapi longimodo crassa, sanguinolenta, adnatis circumquaq; prodeuntibus: caule verd, pariter rubente, semine cæteris simile.

LOCVS.

Idem. Seritur passim in Germania in hortis.

QUALITATES,
ET VIRES.

Matth. Non aded multum differt suis in qualitatibus, ac viribus à cæteris generibus. Hæc Germani hyeme, aut elixant in aqua, aut cineribus calentibus coquunt, & exutis subinde corticibus, incidunt, & in acetarijs, asperfo pipere, concinnant ad esum. Quin etiam semicoctas in aceto, & sale diu asseruant, & cum assis carnibus vorant.



PORTV-

PORTULACA, Græcis, ἀνδράχυν. Arabibus, *Bakleancha*, seu *Bachele Albanicha*. Italis, *Portulaca*, *Procachia*, siue *Porcellana*. Germanis, *Burgeltraut*. Hispanis, *Verdolagas*, & *Baldroegas*. Gallis, *Porcelaine*, *Pourpier*, siue *Pourchaille*.

PORTULACA DOMESTICA.

GENERA.

Dum est generum, sativa, & sylvestris.

FORMA.

Sativa folia infunt latiora, *Matth.* pingua, crassa, splendētia, & a tergo candicātia, gustu acido, & austero: caulē edit crassum, glabrum, erectum, subpurpureū atq; pinguem: semine nigro, exiguo, in herbaceis calyculis incluso. Radice multifida.

LOCVS.

Seritur in hortis passim ab olitoribus.

QUALITATES.

Frigida, & aquea tempera- *Galen. 6.* mento est; refrigerat quidem *simp. me.* ordine tertio, humidat verò secundo, viscosum etiā quiddam obtinet. Succus magis adstringit, quā herba, quæ succum gignit modicū, eumque frigidum, humidum, & glutinosum.



V I R E S.

Portulaca cum hordei farina capitis doloribus, & oculorum inflammatione- *Diosc.* nibus vtiliter imponitur: Quin etiā ventriculi ardoribus, igni sacro, vesicæ doloribus auxilio est, commanducata dentium stuporem sedat: stomachi, & intestinorum aestuationē, fluxionēq; mulcet. Veneris impetus coerct. Succus epotus simili effectu prodest. Contra teretes ventris tineas, cruentam excretionem, dysenteriam, hæmorrhoidas, & profluvia sanguinis, percocta efficax est: ocularibus medicamentis vtilissimè commiscetur. Interaneis fluxione laborantibus, atq; vulvarum erosionibus, infunditur: contra dolores astu exci- *Galen. 6.* tatos, caput ex rosaceo, & oleo fouetur. eruptiones papularum in capite, cum vino emendat: vulnerib. ad syderationē spectantibus vtiliter illinitur. Fluxio- *simp. me.* nes calidas omnes repellit, & in febribus hæcicis totis hypocondrijs illinitur. *Plin. libr.* confert muliebri profluvio tum herba ipsa deuorata, tum eius succus potus. & capite *20.* Præciduo umbilico etiam imponitur. sanat quoq; & mammarum, & podagræ inflammationes.

R

PORTV-

PORTULACA sylvestris. Græce, ἀνδράχην ἀγρία. Italicè, *Prochachia*, & *Portulaca saluatica*, & *parimente grassola*.

PORTULACA SYLVESTRIS.

FORMA.

Matth. Portulaca, quæ sponte nascitur, caulibus exit rotundis, lentis, pinguibus, rufescentibus, humiliter diffundentibus, folia gerit alteri similia. sed minora, oblongiora, numerosioraq; cætera cõsimilia sunt.

80?

LOCVS.

Idem. Prouenit in hortis, vineis, campis, & agris incultis.

QUALITATES,
ET VIRES.

Idem. Non differt à domestica, nisi quod adstringenti vi, paulò sit potentior, atq; etiã non nihil minus humectat. Ruricolæ integras plantas elixant: & deinde in sole siccant. & ad hyemales cibos afferuant.



ASPARA-

Abstr
ditacemHuic
sue co
vino, au
sumpta,
Serunt
lescunt,

NOMINA.

259

ASPARAGVS, Græcis, ἀσπάραξ. Mauritanis, Halion, siue Helium. Italis, Asparago. Germanis, Spargen. Hispanis, Esparagos. Gallis, Esparge.

ASPARAGVS.

GENERA.

Duplex habetur, altilis, & sponte nascens. Huius tria visuntur genera, nempe Palustre, Græcis, ἐλάϊον vocatum, Montanum, & Petreum, corruda, propriè dictum.

FORMA.

Thyrsum is primum, siue Matth. germen à radicibus mittit tenerum, cacumine crassiore in acutum desinente, perinde ac Orobanche, qui tandem, auctus, in ramos sese explicat, in quibus folia sunt capillacea, fœniculo breuiora, tenuioraque. Florem edit exiguum, quo flaccescente, bacce subsequuntur, primum virides, & deinde rufescentes. Radice nititur circa caulem spongiosa, à qua numerosa oriuntur fibræ ellebori modo, albicantes, crassioresq; in rusco.

LOCVS.

Altis passim in hortis colitur. Matth.

QUALITATES.

Abstergendi vim habet, idque citra manifestam, aut caliditatem, aut frigiditatem. Gal. li. 6. simp. me.

VIRE S.

Huius teneri cauliculi triti in vino albo, renum dolores sedant. Assus autem, siue coctus vrinæ stillicidiū, difficultatemq; ac dysenterias mitigat. Radix cum vino, aut aceto cocta, luxatos artus mulcet. Decocta cum ficis, aut ciceribus, sumpta, regium morbum sanat, coxendicis cruciatus, stranguriamque leuat. Seruntur ad esum, nam non ingratus sunt cibus, siue in acetarijs, siue dum calescunt, asperso modico sale, recentiq; butyro, cum pipere deuorentur. Matth.

R 2

ASPARA-



ASPARAGVS sylvestris, Græcis, ἀσπαράγος ἀγρῆ. Italis, *Asparago saluatico*.

ASPARAGVS SYLVESTRIS.

•GENERA.

Tria (vt in altili diximus) huius habentur genera, Palustre, Montanum, & Petreum, Corruda vocatum.

FORMA.

Matth.

Montanus, & Palustris, facie vix ab altili differunt. Corruda verò caule exit lignoso postquam adoleuit, flexiliq; folijs exiguis, præduris, & aculeatis. huius cauliculi prima germinatione etiam in cibis veniunt. sed cæteris renuiiores sũnt, & amariusculi: quo fit, vt etiam ingratiore habentur in cibis.

LOCVS.

Idem.

Montanus, in montib. Palustris, in paludibus, & Petreus, siue Corruda, saxosis locis, & in sepibus, prouenit.

QUALITATES, ET VIRES.

Idem.

Palustris, & Montanus eadem omnia possunt, quæ altilis, nec imbecilliores, nec valentiores vires habent. Cæterum Corruda ob manifestam, quam possidet amaritudinem, longè magis aperit, prouocat, & abstergit, id quod manifestè patet ex fœtida quam ciet vrinam.

APPENDIX.

Idem.

Nascentur tibi Asparagi altiles totius anni decursu. si, vbi fructum legeris, radices, quæ summo cespite vagantur, circumfoderis, ac aperueris.

PLANTA-



PLANTAGO, Græcis, ἀνθ' λωρον. Arabibus, *Lifen*, aut *Lefan alhamel*. Italis, *Piantagine*, seu *Centinerbia*. Germanis, *Weggrich*. Hispanis, *Lhantem*, siue *Tamebagem*. Gallis, *Plantain*.

PLANTAGO MAIOR.



GENERA.

Plantaginis tria obseruauimus genera, nempe maius, medium, & minus, quod quidam longam Plantaginem vocant. sunt etiam, qui aquaticam addant, de quibus omnibus speciatim dicemus.

FORMA.

Maior, latior, virentiorq; cæteris *Diosc.* habetur, latis constans folijs, oleracei generis neruis septem, & quandoque pluribus secundum longitudinem excurrentibus, quo fit, ut à nonnullis septinerua vocetur, Huius caulis cubiti altitudinem petiit, & à medio ad verticem, tenui femine circumdatur, & in quadam specie foliis quibusdā vestitur, quæ primo exortu, antequam penitus adoleſcant, rosæ effigiem præ se ferunt. Radicibus nititur teneris, hirsutis, candidis, digiti crassitudine.

LOCVS.

Nascitur plurimum in lacuosis, & humectis locis, in Plateis, in arvis, & secus itinera, & sepes.

FACULTATES.

Mistæ est temperaturæ: habet enim quiddam aqueum frigidum, quiddam verò, & austerrum, id quod terreum est siccum, frigidum. Itaq; refrigerat simul, & deliceat ordine secundo. Semen eius, & radix similis sunt facultatis, nisi quod siccioris sunt facultatis, nisi quod siccioris sunt facultatis, nisi quod siccioris sunt facultatis.

ris, & minus frigida. Sed semen subtilius etiam est partium: radices verò crassiorum, folia autem exiccata tenuioris, & minus frigida facultatis sunt.

VIRES.

Folia malignis omnibus vlceribus, & fluxioni opportunis, atq; elephantice, fordidiq; illi-*Diosc.* ta profunt: profluvia sanguinis, serpentina vlcera, carbunculos, nomiaq; cohibent: vetera vlcera, & inæqualia cicatrice obducunt: chironia sanant: sinus conglutinant: canum morſibus, ambustis igni, inflammationibus, panis, parotidibus, strumis, ægilopijs illita cū sale profunt. Folia cocta cum aceto & sale dysentericos, cæliacosq; iuuant: Est in Betæ locū olus ipsum, cum lenticula coctum, ad aquam intercutem, quam leucophlegmariam vocant: foliorū succo vtiliter os colluitur ad sananda eius vlcera: gingiuis eruentis, & sanguinis reiectionibus in potu confert. Clyſtere dysentericis infunditur: valet ad vuluæ strangulationes, cum vellere suppositus: semen ex vino potum alui fluxiones, & sanguinis excreationes sistit. mansa radix decantum dolores sedat: eadem cum folijs vtiliter in passo datur ad vlcera, tum renum, tum etiam vesicæ.

R 3

PLANTA-

PLANTAGO media, siue minor, Græcis, ἀνθόλασσον μικρὸν, siue μέσον. Italis,
Plantagine minore.

PLANTAGO MEDIA.

F O R M A.

Matth. Folia habet angustiora, mi-
 nora, molliora, lauiora, & te-
 nuiora, cauliculo est angulo-
 so, in terram inclinato, flori-
 bus spicatis, pallidis, pilosisq;
 femine summis caulibus emi-
 cante: radicibus multifidis, te-
 nuibus, albicantibusque.

L O C V S.

Idem. Nascitur, & hæc perinde,
 ac altera plurimū humectis,
 & vliginosis locis, in hortis,
 & secus vias.

FACULTATES,
ET VIRES.

Isdem pollet facultatibus,
 & viribus, quibus & maior.



PLANTA-

PLANTAGO longa, Græcis, ἀνθέριον μακρόν. Italis, Piantagine longa, siue lanciola.

PLANTAGO LONGA.

FORMA.

Foliagerit longa, cuspidis *Matth.*
lanceæ modo, vnde illi nomē,
striata, neruosaq., humi accu-
bantia: caules, flores, semina,
ac etiam radices mediæ plan-
taginis, omnino similia.

LOCVS.

Nascitur locis incultis, ac
ferè vbique.

QUALITATES,
ET VIRES.

Non differt facultatibus, & *Idem.*
viribus ab alijs generibus, nisi
quòd minus humidas quali-
tates habet.



R 4 PLANTA-

PLANTAGO aquatica ita recentioribus appellata, Græcis, incognita. Officinis, *Barbafyluana*. Italis, *Piantagine aquatica*.

PLANTAGO AQUATICA.

F O R M A.

Matth.

Folij est hæc Planta, cæteris crassioribus, carnosioribus, robustioribus, ac lævioribus ex lata origine in acutū desinentibus, lanceæ cuspidis modo, caulem gerit cubito longiorem, ramosum, ubique flosculis candidis refertum, radicibus nititur numerosis, albicantibus, ellebori modo.

L O C V S.

Idem.

Nascitur tantum in aquis, & palustribus.

Q U A L I T A T E S,
E T V I R E S.

Matth.

Cum neminem antiquorum habeam, neq; apud Græcos, neque apud Mauritanos, aut Latinos, qui huius Plantæ meminerit, nec de eius viribus aliquid scriptum reliquerit, nihil sanè habeo, quod de eius viribus tuto in medium afferre possim.

C E N S V R A.

Idem.

Non desunt, qui hanc Plantam Damosonium, siue Alysinam esse autument. Atqui proculdubio falluntur.

SIVM



Sium Græcis, *Σιον*. Mauritanis, *Rocathalmi*, & *Inhamenella*, seu *Hamenella*.
Italis, *Sio*, & *Gorgolestro*. Germanis, *Wassermerck*. Hispanis, *Rabacas*.
Gallis, *Berle*.

S I U M V E R V M.



F O R M A.

Sium, caule exit recto, ex- *Matth.*
panis folijs, per ambitum
ferratis, smyrnio similibus,
sed minoribus, & odoratis:
umbellas profert in summis
caulibus, floribus albis, semi-
ne odorato, aniso non diffi-
mili.

L O C V S.

In scaturientium fontium *Gal. li. 6.*
riuis, quorum aqua hyeme *simp. me.*
calent, æstate vero frigent,
plurimum nascitur, ferè sem-
per una cum Sifymbrio aqua-
tico.

Q U A L I T A T E S.

Quantum gustu Sium o- *Gal. li. 1.*
doratum est, tantum etiam *simp. me.*
excalfacientis facultatis est *Diosc.*
particeps. Cruda folia co- *Matth.*
ctave esu, calculos rumpunt,
atque excernunt, urinas ci-
ent, menses, & partus extra-
hant, dysentericis in cibo au-

xiliantur. Hepatis obstructions quoque expedit, vniuersæ plantæ decoctum
potum, auriginem tollit, hydropicos iuuat. idem, aut ipsa herba deuorata,
visum acuit.

C E N S V R A.

Errant, qui Plinium secuti, aquaticum Sifymbrium Sium esse censent.

SIVM vulgare. Italis, *Sio falso*.

FORMA.

Matth. Caulem edit striatum, ramosum, inanem, tenerum, fragilemque: foliagerit apij, non insuavia, flosculos in summitate albos, semine corniculis incluso, parvo, minutoque: radice superuacua.

LOCVS.

Idem. Prouenit tantum in aquis decurrentibus, perinde ac Sium verum.

FACULTATES,
ET VIRES.

Idem. Excalfacientis est facultatis, quæ tamen imbecillior illi est, quàm legitimo Sio.

SIVM VVLGARE.



SISYMBRIVM

SISYMBRIUM sativum, siue hortense, Græcis, Σισυμβριον ὀνόμαζον. Italis, Sismbro domestico, Balsamita, seu mentha cresta. Germanis, Ragenbalsam.

SISYMBRIUM HORTENSE.



G E N E R A.

Trium est generum. Hortense, Sylvestre, Aquaticum.

F O R M A H O R T E N S I S.

Folia profert circinnata, *Idem.* vulgaris menthae latiora, rotundioraq; crispa tamē: caulem edit quadrangulū, & flores spicatos: folia menthae acriora, odoratioraq;.

L O C V S.

Seritur in hortis ferè omnibus. *Idem.*

Q U A L I T A T E S.

Tenuium est partium, ex *Idem.* calfaciens, & exiccans in fine secundi ordinis, aut in principio tertij: attenuat, digerit, resoluit, aperit, incidit, & provocat.

V I R E S.

Flatus, & lumbricos pellit, *Idem.* tum herba ipsa in pulverem trita, tum eius decoctum potum:

valet ad vteri inflationes, si vnā cum parthenio in calenti tegula calefactum, & odorato meraco aspersum, imo: entri applicetur: valentius quoq; vterinis doloribus puerperarum subuenit, si cum parthenio, artemisia, & anthemidis floribus, tenuiter concisum: tribus aut quatuor ouis excipiat, & deinde in patella cum oleo lilino ad ignem fiat placenta, & calida ventri medio applicetur. Illinitur tam recens, quam siccum: calefactum, & Cretico vino aspersum, cæliacis, & ventriculi doloribus, & flatu prouenientibus. Succus testibus illitus, nocturnas pollutiones cohibet.

SISYM-

SISYMBRIVM sylvestre, Græcis, Σισυμβριον ἄγριον. Italis, *Sisembro salustico*. Arabibus, *Sisnabarion*, seu *Sisnabar*.

SISYMBRIVM
SYLVESTRE.

FORMA.

DIOSC. Prouenit menthæ hortensis similitudine, odoratius tamen, & folio latiore: caule quadrāgulari, radicibus longè vagantibus, tenuibus, villosis.

Matth.

LOCVS.

DIOSC. Nascitur inculto solo.

QUALITATES.

Gal.li.8. Tenuium est partium, digerentis, excalfacientis, exiccantis facultatis, & temperaturæ in tercio ordine. sed & semen eius tenuium partium est, & calidum.

simp. me.

VIRES.

DIOSC. Bibitur semen eius contra stillicidia vrinæ, calculosque: idem tormina, & singultus sedat: folia in capitis dolore à pituita genito, fronti aut temporibus illinuntur. Item contra vesparum, apiumq; ictus, vomitiones potu quoq; cohibet.



SISYM.

SISYMBRIVM aquaticum, Græcis, Σισυμβριον ὑγρόν. Officinis, & Barbaris, Senecion. Italis, Cressione. Germanis, Brunnkressen/ seu Wasserkressen. Hispanis, Berros, aut Agriris. Gallis, Cresson.

SISYMBRIVM AQUA-
TICVM.



FORMA.

Folia promit primum rotunda, adulta erucæ modo finduntur.

LOCVS.

Riguis gaudet, & iisdem Idem locis, quibus Sium.

QUALITATES.

Nasturtio simile quiddam Gal. li. 3. gustu præfert: cum siccum est, simp. me. tertij enim est ordinis exalfacientium, & desiccantium: cum verò humidum est, & viride, secundi.

VIREs.

Vrinas mouet: esturæ. Diosc. dum. purgat lentigines, cutisque vitia in facie, noctibus impositum, matutinisq; detractum. Cum raphano om. Matth. ni, & petroselini radicibus sectum, & ex albo meraco, & butyro calefactum, calidumq; pubi admodum vrinas educit, ac trahit. Sin-
& præfertim foliorum succus.

SISYMBRIVM

SISYMBRIUM aquaticum minus, Italis, *Crescione minore.*

SISYMBRIUM AQUATICUM ALTERUM.

FORMA.

Matth. Folia, & caules edit longè minores, ramulis numerosis: floribus pusillis, tenuibus albicantibus, in cacumine tantum comantibus.

LOCVS.

Idem. Non solum in riguis, & aquosis prouenit, sed etiam in hortis, & secus itinera.

QUALITATES,
ET VIRES.

Idem. Imbecillius est altero: nanque minus excalfacit, & siccatur: ubi verò alterum non sit ad manus, hoc uti præstabit.



*COCHLE-

* COCHLEARIA. Germanis, *Esselkraut*.

C O C H L E A R I A.



F O R M A.

Herbula est non alta, folijs prædita multis, splendentibus, latiusculis pinguibus, concavis, cochlearia parua referentibus, interdum nonnihil angulosis, in petiolis è radice simul enatis, ex horum medio surgunt caules dodrantes, quibus flosculi albi secundum longitudinem adnascuntur: semina subrusta Nasturtij valvulis clauduntur, radices pusillæ fibrosæ, gustu acri.

L O C V S.

Provenit sponte in Frisia, Hollandia & in maritimis inferioris Germaniæ, Item circa Hamburgum & alibi locis palustribus & riguis. Ex semine Hortis quoque familiaris redditur.

Q U A L I T A T E S.

Calida est & sicca ut virens Nasturtium.

V I R E S.

Scorbuto medetur in acetarijs usurpata, aut cum lacte vinoue cocta & sæpius continuèq; bibita.*

CRITHMUM.

CRITHMUM, Græcis, Κριθμύς. Italis, Crithmo, Finocchio marino, & herba di San Piero. Germanis, Bacillen / & Meer Fenchel. Hispanis, Perexil de la mar, & Vnhas de agnula yerua. Gallis, Basille, & Fenoil marin.

CRITHMUM I.

GENERA.

Marth. Quatuor habetur genera, quorum tria Marina sunt, & quartum terrestre.

FORMA PRIMI.

Diosc. Planta est fruticosa, & vndique foliosa, cubiti altitudinem ferè petens, folijs pinguibus, Portulacæ ferè modo, sed longioribus, latioribus, numerosis, albicantibus, ternis ex vno petiolo dependentibus, falso gustu, flores in umbellis quandoque candidi quandoq; lutei spectantur, è quibus semē oritur, ceu Rosmarini, odoratum, molle, rotundū, in quo nucleus tritici effigie, radices fundit tres, aut quatuor, digiti crassitudine, odoris grati, & iucundi.

LOCVS.

Diosc. Nascitur in maritimis, petrosi locis. Scopulis, & rupibus, in ipsis maris littoribus.

FACULTATES.

Gal. 6. Gustantibus salsum quodammodo est, cum paucula amaritate, quam obrem simp. me. facultas illi est, tum exiccandi, tum abstergerendi: vtraque tamen in eo est imbecillior, quàm in amaris.


VIRES.

Diosc. Radix, semen, & folia in cocta vino, potu vrinæ difficultati, & regio morbo auxiliantur, menses cient, & aluum citant, semen ex vino potum, status pellit.

CENSURA.

Qui credunt Crithamum marinum, esse Empetron, manifesto errore cecutiunt.

CRITH-




NOMINA.

273

CRITHMVM secundum. Italis, *Crithmo* secondo.

CRITHMVM II.

FORMA.



Non valde differt à primo, *Marth.*
nisi quod folijs est angustiori-
bus, mucronatis, atque pun-
gentibus, salso, amariuscule,
& acuto sapore: caulibus verò
pragnatiorib⁹, succosioribus,
vegetioribusque, in quorum
cacumine ramuli exeunt bi-
ni, terni, quaternive, suas sin-
guli umbellas ferentes, albis
flosculis refertas, è quibus se-
men oritur sceniculo quadan-
tenus simile, cui radicem quo-
que non absimilem habet.

LOCVS.

Isdem prouenit locis in *Idem.*
maris littoribus.

FACULTATES
ET VIRES.

Ea omnia prestare potest, *Idem.*
quæ primum Crithmi ge-
nus, nisi quòd vim aliquam in-
cisiuam habere videtur.

S CRITH-

CRITHMUM tertium, vitriaria, Italis, *Crithmoterzo*.

CRITHMUM III.

FORMA.

Matth.

Planta est fruticosa, plures ab vna radice emittens caules, rectos, circa quos totos folia habentur, per intervalla, plura ex vna origine gregatim prodeuntia, longiuscula, crassa, & falso etiam gustu: sub horum exortu peculiare quoddam erumpit foliū cæteris duplo longius, è quo propè caulis cauitatem petiolus exit, ex quo sex septemve folia breviora produntur. flores fert in cacumine orbiculatos, villosq; pallido colore, radice nititur longa, tereti, non sine adnatis.



LOCVS.

Idem.

Nascitur in littore Maris, locis planis, non cliuosis.

FACULTATES ET VIRES.

Idem.

Ea omnia potest, quibus pollere cætera genera diximus.

CENSURA.

Matth.

Subscribam ego illis nunquam, qui hanc quoque plantam Empetron nominant.

CRITH-

CRITHMVM quartum. Italis, *Crithamo terrestre*. Germanis, *Sicheltraut*/Si-
chelsdren.

CRITHMVM IIII.



FORMA.

Folijis prouenit longis, angustis, firmis, ternis ex vno petiolo, ipsoq; lōgo prodeuntibus, vtrinq; denticulatis falcis frumentariae modō. Cæterum quæ in caulium summis partibus habentur, minora, breuiora que sunt. caulem gerit ramosum, alis concavum, geniculatumq; : in cuius summitate ramuli exeunt diuulsi, in quibus floridæ, albican-tesque sunt umbellæ, quæ postremò semen oblongum, acre, & odoratum mittunt: tota planta gustu saluginoso percipitur, atque amariuscule, vt cætera Crithami genera, quanquam non adeo vehementi. Radice cohæret pastinacæ maiore gustanti dulce, atque subacri, odorata.

FORMA.

Nascitur copiosa in Boemia in agro Pragensi, non solum inter segetes, sed in agrorum marginibus, ac etiam alijs in regionibus.

QUALITATES ET VIRES.

Aperit, digerit, exalfacit, siccit, & mediocriter incidit.

S 2

CORO-

CORONOPVS, Græcis, *Koronopos*. Italis, *Herba stella*. Germanis, *Kraenfuß*. Hispanis, *Grabelba*. Gallis, *Corn de Cerf, sine Sanguinaire*.

CORONOPVS.

GENERA.

Matth. Duo pius habentur genera domesticum & sylvestre.

FORMA.

Matth. Domesticum folia fert longa, angusta, per interualla corniculata, crassiuscula, humi accubantia: & in stellæ modum radiantia, caulem, spicam, florem, & semengerit per omnia Plantagini similia, nulla intercedente differentia. Nititur vnica tantum radice, numerosis tamen adnatis capillamentis: foliorum sapor Plantaginis omnino est, quo fit, vt crediderim Coronopum eiusdem esse generis.

Locvs.

Diosc. Seritur passim in hortis, nasciturque sponte in aggeribus, locis incultis, & secus vias.

FACULTATES, ET VIRES.

Diosc. Ipsdem pollet viribus, quibus Plantaginem pollere diximus, peculiariter tamen radix cœliacis auxiliatur.

CENSURA.

Qui Capriolam seu sanguinellam vulgo vocatam Coronopum esse censent, manifesto errore ducuntur, quemadmodum & ij qui ranunculum Coronopum faciunt.

CORO-



CORONOPVS sylvestris, Italis, *Herba stella saluatica*, at peculiariter Goritien-
bus, *Serpentina* vocatur.

CORONOPVS SYLVESTRIS.

FORMA.

Folia fert tenuioria, capil- *Matth.*
laceaque, rariusculè corni-
culata, humi accubantia: cau-
libus, spicis, floribus, femi-
ne, hortensi similibus, sed
longè tenuioribus.

LOCVS.

Prouenit in Goritienfi a-
gro diluto, extenuatoque so- *Idem.*
lo, non longè à Sontij flumi-
nis ripis, & alijs etiam in a-
gris.

FACULTATES, ET
VIRE.

Radix ex vino pota viperarum, aliorumque venenosorum animalium moribus, *Idem.*
mirificè auxiliatur, ita ut ipsa
sola liberet demorsos. præfe-
runt eam quoque ad hydro-
pem, quam Anasarcam vo-
cant, epoto apozemate plu-
ribus diebus, in quo radix
conferbuerit.



SONCHVS, Græcis, Σβυχος. Italis, Soncho, Cicerbita, seu Crespine. Germanis, Wilder-Sassendöl/sive Gänse-distel. Hispanis, Serraya, & Serralba. Gallis, Laiteron, & Palais au lieure.

SONCHVS.

GENERA.

Matth. Duo sonchi habentur genera: sylvestris, siue aspera, & leu-
nis, cuius duæ etiam sunt spe-
cies.

FORMA PRIMI.

Idem. Folia profert Cichorij mo-
do per ambitum laciniata, cri-
spa, aspera, aculeata, & subru-
bentia. Caulem gerit cubita-
lem, inanem, fragilem, lacte
prægnantem, ac etiam quan-
doq; subrufescentem: flores
in summis caulibus melinos,
Senecioni haud absimiles, qui
deinde in pappos euanescent.

LOCVS.

Idem. Pronenit in agris incultis,
in vineis, in hortis, & secus iti-
nera.

QUALITATES.

Gal. lib. 8. Temperamentum eius quo-
sim. me. dammodo mistum est: constat
enim ex aqua, terreaq; essen-
tia, vtraq; leuiter frigida, & est
etiam adstrictionis cuiusdam
particeps.



VIRES.

Diosc. Illinitur vtiliter æstuanti ventriculo, ac eius inflammationibus. Sorbetur
quoque eius succus ad stomachi rosiones: lac elicit: in vellere suppositus, sedis
ac vuluæ collectionibus opitulatur. Tam herba, quam radix illita vibratis à
Matth. scorpione ictibus subuenit. Soncho vtuntur Itali in acetarijs, & præsertim e-
C. le. 8. ius radicibus, quæ cum teneræ sint, & dulces, frequenter hyeme mensis expe-
sim p. me. tuntur. In vino decoctus stomachi fluxionibus medetur, lacteus eius succus po-
tus suspiriosos, & asthmaticos iuuat. idem auribus instillatus, earum dolores
mulcet, & præsertim in malicorio cum oleo decoctus: stranguriam quoque sa-
nat vnciat pondere potus. commanducata folia, oris graue olentiam tollunt.

SON-

SONCHVS lævis, Italis, Cicerbita gentile.

SONCHVS LÆVIS.



GENERA.

Duo habentur genera, quæ *Matth.* tantum folijs aliquatenus differunt.

FORMA.

Alterum læuoribus habetur folijs, minus quoque lacinjatis, & magis extensis, cætera verò (demptis aculeis) sylvestri similia spectantur. *Idem.*

LOCVS.

Nascitur in hortis, invineis, *Idem.* & locis incultis.

QUALITATES ET VIRES.

Non differt à primo genere, siccis in facultatibus.

S +

SON-

SONCHVS lævis altera. Italis, *Cicerbita gentile seconda*.

SONCHVS. LÆVIS. ALTERA.

FACULTATES
ET VIRES.

Huc referas quæ de alijs
generibus dicta sunt.



*SON-

* *SONCHVS Flore Cæruleo. Sonchocichorium.**SONCHVS CÆRVLEVS.*

F O R M A.

Amara est herba, bicubitali caule valde hirsuto pilis rigidis, non tamen pungentibus, rubicundis. Folia sonchi habet lactescencia, sed flores Cichorij à cæruleo ad purpureum inclinantes, interdum etiam magis cæruleos plures in caulis summitate confectos, Radix crassa & valde intricata est, ac multas veterum caulium reliquias ostendit, telluri tenacissime inhærens.

L O C Y S.

Amat loca opaca in Austria frequens & alibi circa alpes.*

S 5 I N T V -

INTYBUS. Græcis, *Σέλις*. Mauritanis, *Dumbebe*, *Aundebe*, seu *Endebe*. Italis, *Endivia*. Germanis, *Endiuen*. Hispanis, *Endiua*. Gallis, *Endiue*.

G E N E R A.

INTYBUS MAIOR.

DIOSC. Duo eius habentur genera, altera quidem hortensis, altera sylvestris. Hortensis itē duæ habentur species, altera maior, altera minor, quam scariolam maiorem, siue (ut officinæ) scariolam vocant. Quin etiam sylvestris duæ species, quarum alterā scariolā minorem, siue Cichoriū sativum, alterā quidē sylvestre Cichorium, & pocrin, ab amaritudine vocant.

Matth. Hortensis maior, folijs provenit latioribus, lactuceq; similib⁹, caule bicubitali brachiato: floribus caeruleis, Cichorij similib⁹, semine parvo, oblongoq; vnicā nititur radice, ipsaq; villosa. * Minor foliagerit longiora & angustiora, caules quoque tenuiores, cætera maiori similis est. *

L O C V S.

Idem. Seritur passim in hortis.

Q U A L I T A T E S.

Gal. li. 3. Domestica magis quàm asimp. me. gressis refrigerat. Sed & humiditatis multæ admixtio siccitatem extinguit, verum adstringentis qualitatis est particeps, subfrigida est, & subamara, ac moderatè adstringens, corroborat, abstergitque.

V I R E S.

DIOSC. Stomacho utilissima est: cocta aluum sistit, si cum aceto edatur. Cardiacis ex hordei farina utiliter illinitur. Quin etiam podagris, & oculorum inflammationibus. Herba cum radice illita, ictis à scorpione subuenit: igni sacro cum farina hordeacea medetur. Succus cum cerusa, & aceto additur utiliter frigidis illitionibus. Verum enimvero vis eius magna quidem est ad calidos iocinoris morbos, oscula venarum eius extergit, & præsertim eius cum radice decoctum. Estur passim cruda, coctave in acetarijs.

INTV-



NOMINA.

223

INTYBUS crispa, Italis, *Endivia crisp.*

INTYBUS CRISPA.



FORMA.

Recensetur, & hæc inter *Matth.* maiora intubi genera, siquidem amplo, foliosoque cespite provenit, folijs magnis, sed in ambitu ubique crispis, ac fimbriatis, caule cæteris maiore: reliqua cum alijs paria sunt.

LOCVS.

Seritur in hortis ab olitoribus, quod admodum in acetarijs in cœnis placeat. *Idem.*

QUALITATES ET VIRES.

Eadem omnia potest, quæ *Idem.* de hortensibus intubis superius dicta sunt.

INTV-

INTYBUS sylvestris, Græcis, Σέβις ἀγρία ἡμερος. Hetruscis, Tornasole. Italis cæteris, *Cichoria domestica*. Germanis, Wegweisse/Wegwurk. Hispanis, Almerones, & *Cichoria*. Gallis, *Cichorea*. Officinis, *Scariola minor*.

CICHORIVM.

GENERA.

Dum est generum, *Pictis* sylvestrior, & *Satiua*, latioribus folijs, & origatior, minusque amara.

FORMA.

Satiua folijs exit minori satiuoque *Intubo* similibus, angustioribus tamen atque brevioribus: minusque per ambitum lacinitatis, sed caule, & flore similibus. Radicem habet pedali longitudine, alba intus pulpa, tene-ram, & subamaram.

LOCVS.

Seritur passim in hortis.

QUALITATES ET VIRES.

Eadem omnia potest, quæ domestica *Intubus*: Ea tamen siccior est, & magis ex-tergens.



SVL-

SYLVESTRIS Intubus, Græcis, *Κρυόγιον ἀγριον*. Italis, *Cichoria saluatica*. Germanis, *Wilde Wegwurtz*.

INTUBVS SYLVESTRIS.

FORMA.



Folia fert longa, sonchi à *Matth.*
speræ modo incisa & in sum-
mitate sagittæ instar acumi-
nata: rubea per mediû excur-
rête costa, amaro sapore: cau-
lis est illi durus, atq; lignosus,
flores à ceteris generib. haud
ab similes, quemadmodum
& semen: Radice nititur do-
mesticæ duriore, amarioreq;.

LOCVS.

Nascitur in agris incultis, *Idem.*
in pratis, & secus itinera.

QUALITATES.

Olus est subamarû, ob id *Gal. lib. 8.*
que picrida ipsum quidâ nun *sim. me.*
cupant: est autem ea frigida,
siccaq; temperaturæ, vtrâq;
secundo excessu, & adstrin-
gêtis qualitatis est particeps.

VIRE.

Isdem pollet viribus, quib. cætera genera pollere diximus: verûm cum plus *Matth.*
amaritudinis habeat, magis quoque abstergit.

CENSURA.

Tiresia caciore sunt, qui Hieracium, & sylvestrem lactucam Intubum syl-
vestrem faciunt.

DENS.

DENS leonis, Græcis, præsertimq; Theophrasto, *δένδρον*. Italis, *Dente di cane*, & *Piscia alletto*. Germanis, *Waffenblatt* & *Münichstoppf*. Officinis, *Taraxacum* & *caput monachi*, ac nonnullis *Rostrum porcinum*, & *Ambubeia*.

DENS LEONIS.

FORMA.

Matth.

E terra prodit ipso statim Veris initio, folijs cichoraceis, frequenter laciniatis in sagittæ modum desinentibus, humi accubantibus, caule spitamæ magnitudine, rotundo, glabro, subrubente, intus concauo, lacteo succo prægnante, flores gerit luteos, foliososque, quibus decidentibus, subcrefcit papposum caput. Radicem habet Cichorio proximam, lacteo succo plenam, sed longè amariorem.

LOCVS.

Idem.

Prouenit in hortis, in campis, prope sepes, & in ruinosis ædificiorum muris, quin etiam in vineis, pratis, & viridarijs.

FACULTATES.

Idem.

Adstringit, roborat, atque abstergit, magis quàm vtrunque Cichorium.

VIRES.

Idem.

Cocta, stomachum dissolutum adstringit, cruda verò aluum sistit. eadem dysentericis auxiliatur, sed magis cum lente decocta. Succus potus prodest, quibus genitura effluit. in aceto decocta, urinæ tormina discutit. Vniuersæ plantæ et coctum potum Ictericam tollit.

ZACIN-



NOMINA.

ZACINTHA, Italis, *Cichoria verrucaria*.
CICHORIUM VERRUCARIUM,
SIVE ZACINTHA.



FORMA.

Folia profert Cichorij, a- *Matth.*
superiora tamen, ac minus la-
ciniata. Caules edit cubita-
les, & quandoq; maiores, te-
nues, asperiusculosque, in
quorum cacumine flores
spectantur aurei cichoracea
specie, quibus flaccescenti-
bus semen remanet subni-
grū, capituli instar, circum-
quaque secundum longitu-
dinem secti, striatīve, radice
niritur rapunculi æmula, te-
nuibus adnatis circumquaq;
fibris.

LOCVS.

Prouenit in campestribus, *Matth.*
& à nonnullis quoque seri-
tur in hortis, & fœdilibus in
medicum vsum.

QUALITATES ET VIRES.

Mira huius plantæ facul- *Idem.*
tas est ad rollendas verru-
cas, siquidem scimus nonnullos, quorum manus verrucis admodum nume-
rosis scatebant, sanatos esse, deuoratis in acetario semel tantum huiusce plan-
tæ folijs. Idem præstat eius semen tribus diebus drachmæ pondere à cœna po-
tum, dum se cubitum recipiunt verrucosi.

CYANVS

CYANVS maior, Græcis, *Klavyos*. Italis, *Fior Campefe*, *fior Aliso*, & *Battifuscera*. Germanis, *Kornblum*. Officinis, *Batiscula*.

CYANVS MAIOR.

GENERA.

Matth. Duum est generum, maius, & minus.

FORMA MAIORIS.

Idem. Maius latioribus prouenit folijs, albicantibus, tomentosis, & nulla in parte diuisis. vegetiores quoq; habet caules, albicantiores, breuiiores tamen, & flores longè maiores, & patentiores quàm minor. Flos cyaneus, cœruleusve spectatur, foliosus, & in cristæ modum extremis oris laciniatus, calyculis, è quibus prodit, squamosis, ac subasperis.

LOCVS.

Idem. Prouenit in montibus frequentius, quàm in campestribus.

QUALITATES, ET VIRES.

Idem. Huiusce plantæ vires nullus antiquorum, quod scierim, scriptis mandauit. non desunt tamen recentiores, qui putent Cyanum propria dote pestilentibus morbis aduersari: maioris pulvis datur vtiliter ab alto deuolutis, & sanguinem reijcientibus, ex aqua Plantaginis, aut portulacæ, aut maioris Symphyti, aut equiseti. Saccus illitus recentia vulnera glutinat, & oris vlcera sanat.

CYANVS



CYANVS minor, perinde ac maior, tam Græcis, quàm Italis, & Germanis vocantur.

CYANVS MINOR.



F O R M A.

Folijs exit longis, pilosis, *Matth.*
albicantibus, barbulis quibusdam dissectis, caules edit plures, bicubitales, lanuginososq; minoribus repletos folijs: flores in cacumine profert cæruleos, in ambitu crenatos, squaroso è calyce prodeuntes.

L O C U S.

Nascitur in campis inter *Idem.*
segetes, & floret Maio, & Iunio mensibus.

Q U A L I T A T E S,
E T V I R E S.

Ea omnia præstare potest, *Idem.*
etiam valentius, quæ de maiori dicta sunt, peculiariter tamen huiusce folia, ac pariter semen ex vino decocta, & hausta, auxiliantur à scorpione, phalangioque iectis, quin etiam venenis omnibus resistunt: præstat quoq; tota planta ad pestilenciales, & pernecabiles febres.

T C O N-

CONDRILLA, Græcis, *γερδίζαν*. Arabicis, *Candavel*, *Cadaron*, & *Amiren*. Italis, *Condrita*, & *Terracrepolo*, Hispanis, *Leugas*, & *Leichugas dentre los plinos*. Gal-
lis, *Leiteren*.

CONDRILLA.

GENERA.

Matth. Duo eius habentur gene-
ra, foliorum diuersitate diffe-
rentia.

FORMA PRIMÆ.

Diosc. Prima, quæ quidem Cicho-
Matth. rij species est, caulem, florem,
& folia habet Cichorio simi-
lia: verum planta tenuior tota
est, in cuius ramulis gummi a-
liquando inueniri solet masti-
ches simillimum: radice nititur
Cichorio breuiore, & lacteo
succo pregnante.

LOCVS.

Matth. Nascitur in agris non cul-
tis, & secus itinera, atq; etiam
in pratis.

FACULTATES.

Gal. 8. Non differt ab alijs Cicho-
simp. me. raceis suis in facultatibus.

VIRES.

Diosc. Tufacum radicibus herba, melleq; excepta, & admisto quoq; nitro, vitiligi-
nes illitu emaculant, gummi quod ab ea resudat subpositum feminarum men-
ses trahit, pilos inordinatos replicat. Quod item tenera radix efficit, ubi acus
succo intincta pilis admoveatur: ex vino pota, viperarum moribus auxiliatur:
succus decoctus in vino, aut per fese potus aluum sistit.

CHON-



NOMINA.

291

CHONDRILLA altera, Græcis *χονδρίλλη ἑτέρα*. Italis, *Chondrilla secunda*.

CHONDRILLA ALTERA.

FORMA.


Folia fert oblonga, circum Dios-
rosa, humi sparsa: caulem la-
cto succo madentem: radice
tenui, rotunda, lævi, vegeta,
flavescente, succosa.

LOCVS.

Nascitur in latis, & cultis *Idem*,
locis.

QUALITATES,
ET VIRES.

Caules, & folia cōeoquen- *Gal.*
divim habent, succus incom- *Diosc.*
modos palpebrarum pilos re-
fleat.



T 2

CVCVA-

CUCURBITA, Græcis, Κολοκύνθη ἐδωδιον. appellatur Arabibus, Hiraba. Nam, seu Carba. Ital. Zucca. Ger. Kürbis. Hisp. Calabassa. Gall. Courge, Courle, sine cause.

G E N E R A.

Matth. Cucurbitę tria recensentur genera, nempe longa, rotunda, & sessilis.

F O R M A.

Idem.

Hederaceis virefcit folijs, sed amplis & subcandicantibus: flagellis sarmentosis, angulosisq; hami repentibus, verū vbi adminiculū nacla fuerit, illud facile clauiculis comprehendit, quibus arbores, & pergulas scandit, & ijs sese implicat. flores profert albos, grádioresq; & in stellę ferē modū diuisos, verū nō omnes frugiferi sunt. Frugiferi. n. facile noscuntur ex conceptu sub ipsis extuberante, fructus edit magnos, q quidem in vno genere longi, in altero rotūdi, & in altero sessiles visuntur, verū omnes in magnam extuberant molem.

L O C V S.

Idem.

Seruntur passim in hortis, & circa sepimenta.

Q U A L I T A T E S.

Gal. 3.

Cucurbita humidę, frigidaq; temperaturę est, vtraq; qualitate secundi ordinis.

simp. me.

V I R E S.

Diosc.

Illita cruda, tumores, & abscessus mitigat. Ramenta eius illinuntur vtiliter sinepiti infantibus, contra capitis ardorem, quem syriacum vocant, oculorum inflammationes, podagrasq; refrigerant. succus ē ramenti per se, aut cum rosaceo infusus, aut ium doloribus auxiliatur. adustiones cutis in ardenti febre illitu adiunat. Totius seruesactę. & expressę cremor, cum melle exiguo, & nitro potus, aluum leniter soluit. Vinum in cucurbitam recentem excavatam infusum, si mistum sub diu teneatur, potum aluum laxigat. Folia recentia iumentis illita, affrictaq; muscas abigunt. eadem niammis puerperarum admota lac siccant. oleum, quod ē cucurbitarum floribus paratur, ijs in eo diutius insolat, renum calores inunctum extinguit, & capitis dolores, præsertim in febribus mulcet: aridę cinis ambusta, & pudendorum vlcera sanat. Estur passim estate in cibis cum iusculis elixa, tum quoq; in oleo, aut butyro frixa, sarnia pritis circumlita, & acerbę vix succo aspersa.

Matth.

CUCUR-

CUCURBITA Indica, Italis, Zucche Indiane, oltra marine.

CUCURBITA INDICA.

GENERA ET
FORMA.

Varia huiusce cucurbitæ *Matth.* habentur genera, magnitudine, facie, & colore differentia. Referunt tamen omnes melopeponum effigiem, sed alia magnæ, imo maximæ, ventricosæq; alia parvæ, aliæ mediocres, & alia oblongæ, alia rotundæ, alia vario colore spectantur: folijs nostratibus longè maioribus, firmioribusq; asperis vitigineis, & rigenti petiolo adnexis, samenta illi crassa, angulosa, aspera, hirsutaq; Ea humi ferunt, longo admodum tractu, atque etiam scandunt, & pergulas, & attegias opacant, flores edit magnos, lilij ferè effigie, aureo colore. Semen in ventre gerunt magnum, album, in quo nucleus concluditur dulcis, & suavis, sapor fructibus subdulcis, non ut nostratibus usq; adeo insipidus.

LOCVS.

Planta est peregrina ex Indijs, & alijs fortasse longinquis regionibus ad nos *Idem.* allata, sed iam diu Italico solo proueniunt.

QUALITATES, ET VIRES.

Cum subdulci sint sapore, crediderim has primo excessu refrigerare, & hu- *Idem.* medare secundo.

T, CUCV-

CUCUMIS sativus, Græcis, *Σίκκος ἡμαρ*. Arabicis, *Chathe*, seu *Chethere*. Ital. *Co-
comero*. Hetruscis, *Cedruolo*. Ger. *Cucumern*. Hisp. *Cogombro*. Gall. *Co-
combre*.

GENERA.

CUCUMIS SATIVVS.

Matth. Duo habentur genera vnū Ci-
trei mali figura, alterum lōgum
anguium formam referens.

FORMA.

Idem. Planta est sarmentosa, humi re-
pēs, folijs vitiginis, asperis, sca-
brisq; , flagellis pariter scabris,
atq; rigentib; , flores edit meli-
nos, fructu sub ipsis exuberāte,
qui tandē in longū protentus ci-
trei mali modo viridi primū fit
colore, & dum maturefcit flauo
cortice verrucis scatente.

LOCVS.

Idem. Seritur passim ab olitoribus
in hortis.

QUALITATES.

Gal. lib. 8. Cucumis esculentus, maturus
simp. me. quidē tenuioris est essentia, qui
verō immaturus est, crassioris:
ambo tamen, abstergerendi facul-
tate participant, superat in eis
humida, frigidaq; tēperies, non
tamen magnopere, sed quasi in
secundo censetur ordine. Atta-
men si quis, aut semen, aut radi-
cem arefaciat, haud etiā humi-
dæ fuerint naturæ, sed iam defic-
cantis, idq; in primo quodammodo ordine, aut in secundo incipiente, est & in
istis maior abstergerendi facultas, quā in fructus ipsius carne.

VIREs.

DIOSCO. Prodest vesicæ morbis: olfactu deliquio animi affectos retuocat. semen vrinam mouet, &
cum lacte, aut passio, vesicæ exulcerationibus subuenit illita cum vino folia morsus canum sa-
nant, epinyctidas cum melle. Veniunt frequenter, in cibis crudi, sed prauos generant succos,
Gal. 2. de nam etsi nonnulli cucumeres recte concoquant in ventriculo, dum tamen in hoc fissi affluunt
alim. fac. ijs se replent, temporis tractu gelidum, & vtcunque crassum humorem in venis acervant qui
non facile in probum sanguinem conuerti potest: proinde abstinere ab illis consulerimus: cum
enim, sensimq; post longum tempus prauus in venis succus ex ipsis accumulatur, qui vel se-
micula putredinis arrepta occasione, febres seuissimas, & mire contumaces excitabit.

CENSURA.

Non est eorum admittenda opinio, qui vulgarem cucumin peponem esse contendunt.

CUCY-



CUCUMIS longus, Italis, Cocomero serpentino. Hetruscis, Cedruolo longo.

CUCUMIS LONGVS.

FORMA.

Non differt tota sua facie ab *Marb.* altero, nisi in fructu, qui longus est, & serpentis modo curuus, strijs per longitudinem protensis.

LOCVS.

Scratur in hortis, & præfer- *Idem.* tim in Apulia.

QUALITATES, ET
VIRE.

Eadem illi sunt facultates, *Idem.* quæ alteri.



T 4

PERON,

PEPON, Græcis Πέπων. Mauritanis, Batecha, seu Batihechi. Italis, Mellone. Hertruscis, Popone. Germanis, Melon. Hispanis, Melon. Gallis, Melons.

FORMA.

PEPON.

Matth.

Serpit Peponum, & Melo-peponum planta lōgis, ac viticulosiſſis ſarmentis, cucumeris modo, ſoliſ vitigineis, minoribus tamē inciliſis, ſcabris, hirtuſiſq; floribus luteis, ſicuti grādi, humani capitis inſtar, & ſæpe maiori, cortice cartilagineo. Sed non omnibus idem eſt color. Namq; alij herbaceo ſunt colore, alij pallido, nonnulli ſtauo, quidā albo, pleriq; cinereo. Sunt etiam qui tota cute textura quadam reticulari magno naturæ artificio, pueſcunt. Striati ſerè ſunt omnes, Toris ſecundum longitudinē circumquaq; prominentib. Interna pulpa guſtatu ſuauiſ eſt, verſi color tamen, in altero. n. genere rubet, in altero albicat, aut in albo ruſceſcit. Qui præſtant (plurimi ſunt, qui nulla cōmendantur gratia) præter odoris incunditatē, dulces, & ſuaues ſunt: Semē intus ingerunt copioſum, oblongum, nucleo intus dulci, albo conteſtum putamine.

LOCVS.

Idem.

Gaudēt læto, & aprico ſolo, ac etiam libertate, qua poſſint vltro vagari: ſeruntur in hortis, & agris.

QUALITATES.

Gal. 8.

Vniuerſa Peponum natura frigidiſ, cum ſarſa humiditate exiſtit, ſed habent quoq; quandam abſtergendi vim: atqui melopepones illius humidius, quā pepones ſunt.

VIRE.

Diosc.

Peponis pulpa in cibis ſumpta, vrinam ciet, & inflammationes oculorū illita ſedat: ramentum eius ſinepiti admodū ſyrtaſin infantium tollit, & oculorū fluxiones auertit. ſuccus cum ſemine ſarſa exceptus, & in ſole ſiccatus, cogitur in ſinegmata, quæ faciem repurgant: radix ſicca ex hydramelite pota drachmæ pondere vomitiones mouet. Gignit pepo in corpore vitiſum humorem, poſſimè, quando non probe coſtum fuerit, tum verò morbum etiam, qui cholera dicitur, inducere conſuevit.

CENSURA.

Gal.

Errant toto cælo, qui pepones vulgares Cucumeres faciunt.

ANGV.



ANGVRIA, Arabibus, *Dullaba*. Italis, *Anguria*. Hetruscis, *Cocomero*. Germanis, *Erdöpfel*. Hispanis, *Cogombro*. Gallis, *Cocombres*.

ANGVRIA.

FORMA.



Folia promit Colocynthi- *Matth.*
dis medicamentosa maiora,
aspera, & per ambitum diuisa.
Caules sarmentosos humi re-
pentes, melopeponis modo.
Flores edit aureos: & fructus
mitum in modum extuberan-
tes, pöderosos, subrotundos-
que: Cortice læui, herbaceo
colore, maculoso tamen: car-
ne intus humida, aquosaq; in
quibusdam prædulci, in non-
nullis verò subacida, insipi-
dave, siliq; extinguendæ per
quam idonea. Semen conclu-
dit latû, cucurbitæ paulò mi-
nus, rufo, nigrove putamine.

LOCVS.

Seritur in hortis & virida- *Idem.*
rijs, ac etiam in agris.

QUALITATES.

Frigida est, & humida ordi- *Idem.*
ne secundo, siliq; arcendæ
idonea.

VIRES.

Succosa eius pulpa confert ardentibus febribus, & linguæ ariditati quam *Matth.*
maximè: acutos humores vincit, & ijs præsertim auxiliatur febrientibus: qui *Serap.*
humorum prauitate, magis, quàm abundantia scatent, illisq; præsertim con-
uenit, qui tenuis, & imbecillis, sunt temperamenti, macri, & exangues, cùm ijs.
alterantibus magis opus sit, quàm ducentibus humores.

T

LACTV-

LACTUCA, Græcis, Θηδαι. Arabibus, Cherbas, seu Chas. Italis, Lattuca. Germanis, Lactucē/Lattich. Hispanis, Lechuga, seu Alfalfa. Gallis, Laitue.

GENERA.

Matth.

Plura ac diversa sunt lactuce genera. Est etiam & sylvestris. Inter sativorum genera habetur, quæ à crispis folijs, Crispa appellatur: quæ admodum & altera à lato caule, Laticanlis dicitur: Est & quæ sessilis vocatur. Nos verò in capitatam, rotundam & crispam, genera diuisimus: Differunt etiam foliorum colore, alia enim saturatè viridis est, alia subviridis, & quæ cruentis maculis sit resperla.

FORMA.

Idem.

Crispa folijs exit crispis, maiori Intybo similibus: Rotunda in orbem spargitur, rotundioribus folijs, tenerioribus, & vnà sese stipantibus, capitata autem parum folijs à rotunda differt, sed in globum folia conglomerantur, brassicæ capitatæ modo, in quo genere & ea quoque recensetur, quæ vulgo Romana nuncupatur; ceteris in cibus gravior, quæ cadidior, teneriorque; habeatur: caule edunt omnes albicantem, brachiaturam, flosculis melinis, & semine tum albo, tum etiam nigro.

LOCVS.

Idem.

Seritur passim ab olitoribus, & ab alijs quibuscunque in hortis.

QUALITATES.

Gal. li. 6.

Humidum, ac frigidum olus lactuca est, non tamen extremè, perinde ac aqua

simp. me.


fontana.

VIRE.

DIOSC.

Stomacho in cibus gratæ omnes habentur: somnum conciliant, alium emolliunt, lac euocant, verum decoctæ magis alunt, stomachicis profunt, si illotæ edantur. Semine assiduus in somno imaginationes libidinosas cõpescit, & venerem repellit. Ipsæ verò frequentius in cibo sumptæ oculorum claritati officiant: inflammationibus & ignibus sacris opitulatur. Earundem succus fronti, & temporibus, illitus, febrientibus tum somnum cõciliat, tum capitis dolores mulcet: testiculis illitus nocturnas pollutiones cõpescit, & seminis profluvium, addito caphura momentum, sed venerem restinguit: Seminis cremor urinæ ardoribus opitulatur; cauendus autem lactucarum usus lussuriosis, sanguinem excreantibus, pituitosisque; sed ijs maxime, qui procreandis liberis dant operam.

LACTV.



LACTYCA florescens. Italis, *Lactuca florita*. Germanis, *Lattich mit der Blüthe*.

LACTYCA FLORESCENS.

FORMA.



Folia, quæ ad terram sunt *Matth.* exoleta paucioraque spectantur, caulis illi brachiatus parvis foliolis, ipsisque acuminatis refertus, floribus melius non magnis, qui in pappos evanescent.

LOCVS.

Scatent ea horti ferè vni- *Matth.* uersi in fine Æstatis.

QUALITATES.

Amaro percipitur gustu: *Matth.* quam ob causam abstergenti facultate non vacat, & præsertim lacteus eius succus.

VIRES.

Lacteus caulium liquor o- *Matth.* culorum argemas, & maculas delet, & vitia cutis emendat.

LACTY-

LACTUCA sylvestris, Græcis, *Θρίδαξ αγρία*. Italis, *Lactuca saluatica*.

LACTUCA SYLVESTRIS.

FORMA.

Matth.

Sylvestris Lactuca folio exit oblongo, hyeracij maioris modo per ambitum laciniato, candidiore, graciliore, asperiore-que quàm domesticæ, quinetiam aculeato, post quam caulē ediderit, amaro gustu. Caulē mittit florescentis domesticæ quadantenus similem, & flores pariter similes.

LOCVS.

Idem.

Nascitur in aruis & incultis locis.

QUALITATES.

Matth.

Abstergit eius lacteus succus, & somnum conciliat, soporiferus etiam est, prouocat, & deijcit.

VIREs.

Diosc.

Lacteus eius liquor aquam per aluum eijcit, si ex mullo bibatur duorum obolorum pondere: argemas, coliginesque repurgat, oculis instillatus: illinitur efficacius cum lacte muliebri adustionibus: somnum allicit, doloris leuamentum præstat, menses trahit, & contra scorpionum, & phalangiorum ictus bibitur: lemen satiuæ modo libidinum imaginationes in somno amolitur, ac Venerem arcet.

CENSURA.

Non desunt Pharmacopæi, qui è sylvestri lactuca aquas per alembicum præparant, quam deinde pro Intybi aqua vendunt, decepti superiorum myropolarum inscitia.

GINGI-




NOMINA.

301

GINGIDIVM, Græcis, Τριγυδιον. Italis, Gingidio.

GINGIDIVM.

FORMA.



Est gingidium pastinacæ syl ^{DIOSC.}
uestri haud ab simile, amarius ^{Matth.}
tamen, caule ramoso, rotun-
do, sesquipedali, striato, subni-
gricante, geniculatoque, um-
bella in cacumine alba, mino-
ribus circumquaq; comanti-
bus folijs, ipsisque laciniatis. E
florib. semen prodit, quo ma-
turefcete, umbella in seie con-
trahitur, vt in pastinacam, &
tactu glutinosa percipitur, ra-
dicem habet candicatem, spi-
thamæ longitudine, subama-
ro sapore.

LOCVS.

Copiosum in Syria nascitur, ^{Matth.}
vnde in Italiam aduectum se-
men, iam seritur in hortis.

QUALITATES.

Sicuti gustu amaritudinem ^{Gal. li. 6.}
& adstrictionem præfert, sic ^{simp. me.}
temperamento quoque ipso

caliditatem, & frigiditatem: secundum verò vtranque qualitatē desiccatorium
est, sed stomacho amicum, vt pote non paruam obtinens adstrictionem, quam-
obrem non admodum conspicuam caliditatem possidet: secundo autem re-
cessu desiccatur.

VIRE.

Olus hoc crudum, coctum, conditumque estur magna stomachi vtilitate, v. ^{DIOSC.}
rinam cit. Decoctum ex vino haustum vesicæ vtilis est. Perspicuum verò est, ^{Gal. 2. de}
quod hæc herba medicamentum potius, quàm alimentum est, quippe quæ ad- ^{alim. fac.}
strictionis & amaritudinis non obseurè, nec exiguè particeps est.

CENSURA.

Eorum sententiæ minimè subscribendum est, qui volūt vulgare cerofolium
legitimum esse gingidium.

CEROFO-

CEROFOLIUM, Græcis, *χαίρεφλλον*. Italis, *Cerofoglio*. Germanis, *Rörsfel/ius*.
Kerbelkraut. Gallis, *Cerfueil*.

F O R M A.

Matth.

Fragilis ac tenera est planta, semis ab vno pediculo emergentibus folijs, vulgaris petrosilini modo per ambitum incisis. Caulibus sesquipedalibus, pinguibus, inbrufcentibus, geniculatis: Umbellam in summis caulibus gignit, flosculis albis stipatam, è quibus tenuia, rectaq; exeunt cornicula in racemi ferè modum, ex vno petiolo emergentia, in quibus semen longiusculum concluditur, pullo colore. Radix illi brevis in plures diuarcata fibras.

L O C V S.

Idem.

Seritur passim in hortis.

Q U A L I T A T E S,
E T V I R E S.

Matth.

Tota planta dulcis est, & odorata acriusculo quodã accedente sapore, vix ferè sensibili: quo fit vt alijs oleribus addita, ea gustui gratiora reddat. Estur cruda in Acetarijs, vnà cum alijs plantis ad hoc idoneis, ac etiam cocta cum beta alijsq; oleribus.

C E N S V R A.

Qui hanc Myrrhim esse autumant, non diligenter eius notas expenderunt.

VISNA-



V I S N A G A, Italis. *visnaga*.

V I S N A G A.

F O R M A.

Facie pastinacam agrestem *Matth.*
eo usque refert, ut rectè dici
possit. Pastinaca sylvestris ma-
ior. Nam caulum crassitudi-
ne, longitudineque: quin et-
iā umbellæ magnitudine, vul-
garem sylvestrem Pastinacam
superat.

L O C V S.

Nascitur copiosa in Syria: *Idem.*
etiam nunc feritur in hortis
in Italia.

Q U A L I T A T E S,
E T V I R E S.

Eadem omnia potest, quæ *Idem.*
sylvestris pastinaca.

C E N S U R A.

Non desunt, qui hanc plan-
tam Gingidium esse credunt:
Sed proculdubio falluntur.

P E C T E N



PECTEN veneris, Italis, *Pettine di Venere*. Germanis, *Wilde Morett*.

F O R M A.

Matth.

Radice nititur candida: cauliculis pedalibus: folijs Anthemidis proximis, exilibus: floribus albis, emergentibus, turmatim ab eodē capitello compluribus acuminatis rostellis, inter se disjunctis, quæ pectines ferè referunt, quibus linum mulieres concinnant, siue pectunt.

Q U A L I T A T E S,
E T V I R E S.

Matth.

Huius radix cum malua tusa, corpori infixa extrahit: Eadem cum herba, & floribus calesfacta, cum albo meraco, & butyro, additis petrosilini folijs pubiq; adhibita, remorantem urinam elicit.

PECTEN VENERIS.



CAYCA-

CAVCALIS, Græcis, Καυκαλῖς. Italis, Petrosello saluatico. Gallis, Persil sauvage.

CAVCALIS.

FORMA.



Caule exit dodrantali, & Diosc. sæpe maiori, dauci. aut pastinacæ simili, subhirsuto, folijs apio similib^{us}. sed quæ in caule, ac ramis sunt, fæniculi modo per extrema multifidis, hispidisq^{ue}; candida in cacumine umbella. Semine odorato, Radice pastinacæ.

LOCVS.

Prouenit in campestribus, Idem. inculto præsertim solo.

QUALITATES.

Gustu ac viribus Dauco si- Gal. 7. milis est: nam excalfacit, vt il simp. me. le, & pariter deficeat. Ape- Matth. rit, prouocat, abstergit, attenuatq^{ue}.

VIRES.

Cruda, coctave oleris modo Diosc. do estur. Vrinam cit. Cor- Matth.

dis affectibus auxiliatur. Epotus succus calculos, & arenas pellit, & iocinoris, lienis, renumq^{ue} pituitas attenuat: Semen haustum oculorum aciem acuit, & menses feminarum trahit. Datur viris contra seminis profluuium cum aspleno, & viticis semine. Steriles prolificas facit, assidue ex vino potum: præstat aduersus Trigonis, Draconis, & Scorpionis marini ictus, vulneri illitus. Herba rota ex aceto mansa, & vomitione reddita aluum purgat, appetitum languentem excitat, nausæ fastidia discutit. Melancholicos iuuat, tum herba ipsa in cibis sumpta, tum eius succus epotus, tum semen, tum totius plantæ decoctum: proinde datur vtiliter quartanarijs, scabiosis, & gallica lue affectis.

V ERVCA,

ERVCA Græcis *ἐνζαυον*. Mauritanis, *Lergir*, seu *Giargir*. Hetruscis, *Ruchetta*.
Cæteris Italis, *Rucola*. Germanis, *Weiß Senff*. Hispanis, *Oruga*, & *Arugua*.
Gallis, *Roquette*.

ERVCA.

G E N E R A.

Matth. Duum est generum, Satiua,
& sponte nascens.

F O R M A S A T I V Æ.

Satiua folijs exit oblongis,
profunde laciniatis, Sisymbrij
aquatici modo: sapore acri, &
amariusculo: caule sesquipe-
dali, floribus in cacumine al-
bicantibus: semine in tenui-
bus corniculis concluso. Ra-
dix illi alba, tenuis, & acri, vt
herba gustu.

L O C V S.

Idem. Seritur passim copiosa in
hortis.


Q U A L I T A T E S.

Gal. 2. de Excalfacit per quàm mani-
alim. fac. festè, adeò, vt nò faciliè, atque
adiunctis lactuca folijs eda-
tur, siccat, attenuat, aperit, in-
cidit, flatus pellit, & extergit.

V I R E S.

Diosc. Eruca in cibis sumpta, genitale semen auget, & venerem excitat: concoctio-
Gal. ibid. ni prodest, alio per quàm accommodata. Semen potum muris aranei morfi-
bus medetur, ventris tineas necat, lientemq; extenuat. Tritum, & ex melle illi-
Matth. tum, nigras vulnerum cicatrices ad candorem reducit. Cum melle verò vitia
cutis in facie emendat, & lentigines emaculat.

ERVCA



ERVCA sylvestris, Græcis, *ἐν ῥομῶν ἀγρίον*. Italis, *Ruchetta gentile*, & *Rucola saluatica*. Germanis, *Wild Weiß Senff*. Gallis, *perite Roquette*, & *Roquette sauvage*.

ERVCA SYLVESTRIS.

FORMA.



Folijs prouenit satiuæ an- *Idem*. gustioribus, ac magis lacinia- tis, gustu acriori lapidiorique: caulibus numerosis: floribus luteis: corniculis in vniuersa ferè planta copiosis, sursum spectantibus: semine sinapi si- mili, acri, & amariusculo.

LOCVS.

Prouenit spontè locis ari- *Idem*. dis, adeo, vt in muris quoque nascatur.

QUALITATES.

Magis excalfacit, siccit, at- *Idem*. tenuat, aperit, incidit, extra- hit, extergit, prouocat, quàm satiuæ.

VIRES.

Ea omnia præstare potest Diosc. quæ satiuæ, valentius tamen, *Matth*. Cocta, & deuorata infantium tussi medetur, addito saccharo. Tradidere qui- dam, tria sylvestris erucæ folia, sinistra manu decerpta, illicoq; deuorata, aurigi- nosos sanare.

O C I M V M, Græcis *ἀνιθον*. Italis, *Basilico*. Mauritanis, *Berendaros*, & *Bedarog*. Germanis, *Basilien* & *Basilgram*. Hispanis, *Albahaca*. Gallis, *Basilic*.

O C I M V M.

G E N E R A.

Matth. Tria ocimi habentur genera omnibus cognita.

F O R M A.

Matth. Primū quod maius vocant, folia mittit Amarantho longè maiora, lata, oblonga, crassaq; Citreæ mali quadantenus æmula; flores spicatos, albo colore, è quibus semen gignitur subnigricans. Tota planta suauiter spirat.

L O C V S.

Idem. Seritur in hortis, & fœtilibus.

Q U A L I T A T E S.

Gal. lib. 3. simp. me. Excalfacit secundo ordine, habet quoq; recrementum humiditatem, quare eius minime idoneum iudicatur: pellit, aperit, prouocat.

V I R E S.

Diosc. Copiosiore cibo oculorum aciem hebetat, aluum emollit, flatu mouet, urinam pellit, lac euocat, ægre tamen conficitur. Illitum cum hordeaceæ farinæ polline, ex aceto, & rosaceo, pulmonum inflammationibus auxilio est. Draconis marini, & scorpionum ictibus per sese prodest, & cum vino albo odorato oculorum doloribus. Succus instillatus, caliginem oculorum abstergit. Semen potum datur utiliter infantiis, ægre mingentibus, inflatisq; Naribus haustum sternutamenta mouet, sed oculos comprimere oportet cum sternutamentum vrget. Additur in Antidotis, quæ ad cordis affectus parantur.

Matth.

O C I M V M



O C I M V M alterum siue medium, Græcis, ὀκίμον ἑτερον. Italis, Basilico mezzano.

O C I M V M SEC V N D V M.

G E N E R A.

Dum est generum, odore Matth.
tantum differentium.

F O R M A.

Folij exeunt maioris simi- *Idem*.
libus, sed duplo minoribus. o-
dore in altero quidē plebei o-
cimi, in altero verò citrei ma-
li, adeo simili, vt nulla sit odo-
ris differentia. Proinde hoc
citratum Arabes vocauere.

L O C V S.

Seritur, & hoc in hortis, & *Idem*.
fistilibus.

Q U A L I T A T E S, E T
V I R E S.

Ea omnia præstare potest, *Idem*.
quæ maior.



V 3

O C I -

OCIMUM minus, siue tertium, Græcis, ὄχιμον μικρότατον. Italis, Basilico gentile.

OCIMUM MINVS.

FORMA.

Serap.

Folij constat paruis, odore cæteris fragrantiore, quare Mauritanis ocimum Caryophyllatum nuncupatur.

LOCVS.

Matth.

Seritur, & hoc in hortis, & ficilibus.

QUALITATES,
ET VIREs.

Idem.

Quanto cæteris est odoratius, tantò quoq; ad omnia efficacius.



ORO-

NOMINA.

311

OROBANCHE, Græcis, ὀροβάνχη. Italis, *Orobanche*. Officinis, *Candaleonis*.

OROBANCHE.

FORMA.

Cauliculum edit asparagi Diosc. instar, sine folijs, in cacumine hypocistis faciem referentem, subrubeum, hirsutum, mollem, pinguem, fistulosum, sesquipedalem. Flos illi subalbicans, hirsutus, è calyculis prodians: Radix fungosa, digitali Matth. crassitudine, breuiq;

LOCVS.

Nascitur in segetibus, inter Idem. legumina, in campestribus, in pratis: secus itinera, & prope sepes.

QUALITATES.

Est frigida, siccaq; naturæ Gal.l.3. In primo ordine. simp. me.

VIREs.

Estur ut olus asparagi mo. Diosc. do, legumentis addita concoctionem accelerare creditur.

Hæc planta à nonnullis herba tora vocatur, quod vacca ea deuorata illico tau- Matth. rum admittere soleant.



V 4

BARBV-

BARBVLA hirci, Græcis, Τραγοπηλον. Italis, Barba di becco. Hetruscis, Saffesfi-
ca. Germanis, Doeksbart, Josephsblumen. Hispanis, Barba de Cabron. Gallis,
Barbe de bouc.

BARBVLA HIRCI.

GENERA.

Matth. Duum est generum, alterum
flore aureo, alterum purpura-
scente.

FORMA.

Primum genus folijs exit
Crocii latioribus, ac longiori-
bus, floribus aureis, magnis, è
calycibus prodeuntibus. Hi se-
reno cælo fatiscunt, nubiloso
autem contrahuntur, occlu-
dunturq; concludo calycis ver-
tice, barba dependet incana,
prolixaq; inde illi nomē. E flo-
ribus papposum oritur caput,
in quo semen continetur ob-
longum. Radice nititur longa,
alba, dulci, iucundaq; qua uti-
mur nos in acetarijs.

LOCVS.

Idem. Prouenit copiosa in pratis
ac etiam saxosis locis.

QUALITATES.

Idem. Radix exalfacit, ac etiam primo ordine humectat.

VIRE.

Idem. Glutinat hæc recentia vulnera si foliorum succus vel etiam stillatitia aqua in
splenijs admoueat. Estur quoq; in cibis.

BARBV-



BARBVLA hirci altera, Græcis, Τραγοπωλίου ἑρμεύς. Italis, *Barba di Beccho por-*
porca.

BARBVLA HIRCI ALTERA.

FORMA.



Prodit hæc folijs alteri si- *Matth.*
milibus, aut paulò latiorib⁹,
& numerosiorib. robustio-
ribusque: caule quoq; simi-
li, geniculato, cōspicuis pro-
pè genicula alis, è quibus ra-
mi prodeunt. Flores mittit
in cacumine purpurascētes,
minores tamen quàm in al-
tera, radiantib. circumqua;
calycis apicibus in stellæ fe-
rè modum. Radice quoque
firmatur grandiore, robu-
stiorēque, lacteo succo re-
ferta, non quidem vt in alte-
ra dulci, sed adstringenti, &
amariufculo.

QUALITATES,
ET VIRES.

Radicis lacteus succus ad- *Idem.*
stringit, cohibet, firmat, &
modicè abstergit, esui tamē
inidonea est.

V 5 SCORZO-

SCORZONERA, siue Scurzonera, seu Viperina. Italís, *Scorzonerà*.

SCORZONERA HISPANICA.

FORMA.

Matth.

Folia fundit hæc plâta Tragopogono (cuius procul dubio species est) longè latiora, & quæ solo ppinquiora sunt per ambitum sinuata, longo, presloque pediculo, à radice prodeuntia, humique accubantia. Caulem edit sesquidrantalem, & sæpe maiorem, teretem, geniculatum, in quo folia angustiora, minoraque spectantur. Flores profert aureos, Tragopogono aded æmulus, ut alteri ab altero vix cognosci possit. Hi flaccescentes in papposum mutantur orbem, in quo semen continetur Tragopogono simile. Radice nititur sesquidrantali pollicari crassitudine, raris adnatis fibris, vegeta, tenera, fractu facili, alba intus pulpa, lacteo succo pragnante, dulci, & gustatu iucunda. Floret æstate.



LOCVS.

Idem.

Nascitur in sylvis, viginoso solo, ac etiam alibi.

QUALITATES ET VIRES.

Matth.

Foliorum, radicūve succus datur præsentanco remedio potandus aduersus viperarum, cæterorumque venenosorum animalium ictus, quinetiam ad quoscunque pestiferos morbos. Radix recens, sicca, aut saccharo cõdita, quotidie deuorata, pestilentie contagia arcer, & venenis quibuscunq; resistit. Datur eadem, aut eius succus vtiliter quoque comitialibus, cardiacis, vertiginosis, animi deliquio, cordisq; tremore, aut pulsu laborantibus: commanducata per se radix, tristitiam discutit. Lacteus radicis succus, oculorum nubeculas delet. In summa tota planta, magni est ad omnia vsus.

ORNITHO-

ORNITHOGALVUM, Græcis, ἐρνιθάριον. Italis, *Ornithogalo*. Gallis, *Chenilles*.

ORNITHOGALVUM.

* G E N E R A.

Habentur plures varietates Ornithogali, ex quibus duas hic depictas exhibem⁹.

F O R M A.



Primū folia habet aliquot tenuia, angusta, longa, mollia, per medium eorū lactea discurrente linea, in terram strata, complectentia inum cauliculi sesquipedalis, & plerunq; brevioris, teneri, cui adnascuntur aliquot ramuli vel pedunculi sustinentes niueos intus flores, foris herbaceos, è quibus vascula sunt sexangula, continentia femina compressa nigri coloris. Radix bulbosa, cādida, bulbulos paruos adhærētes habet. Alterum maius est, & folia longitudine cubiti, latitudine digiti infima parte cingunt caulem vnicum robustum, rotundum, cubitalem aut maiorem, pluribus ornatū florib⁹, qui mediam

ferè partem caulis occupant, & formam spicæ efficiunt, singulis similis iam dicto Ornithogalo, intus albis, foris herbaceis cum apicibus intus luteis. Radix bulbosa similis est Cypæ, magna, candida, vt prioris Ornithogali.

L O C V S.

Abundat his Italia, & prope Monspelium quoq; inter segetes proueniunt.

Q U A L I T A T E S E T V I R E S.

Coquitur cum pane vt Melanthium. Radix cruda coctāve mādatur, est enim DIOSC. dulcis & suavis.*

T R A S I,

TRASI, ita Veronenſibus appellati. Venetis, *Dolzolini*, & *Trasi* dicuntur.

TRASI.

FORMA.

Matth. Folijs exeunt longis, in cacumine mucronatis, Cyperi modo, quem quidem planta tota plurimū emulatur. Caulenim edit cubitales & angulosos, in quorum cacumine folia exiliora, in stellę modum radiantur. Inter quę flores spectantur spicati, subfulvescentesque. Radices habet numerosas, è quibus globuli dependent bulbosi, oblongi, subrufescentes, fabarum magnitudine, ac etiam grandiores, alba, dulciq; intus medulla castanearum sapore, scabro putamine.

LOCVS.

Idem. Nusquam proueniūt sponte in Italia, nisi in agro Veronenſi.

QUALITATES.

Idem. Excalfaciunt, & humectant ordine primo, leniunt, læuigant, emolliunt.

VIRES.


Idem. Radicum bulbosarum cremor lacteus, pectus, & pulmones expurgat haustus, quo fit, vt tussientibus opem non modicam præſter. Tunduntur ergo radices, maceranturque carniū iure, & deinde per linteolum exprimitur cremor, quem etiam recentiorum nonnulli venereis potionibus admiscunt. Præstat idem haustus ad vrinę ardores, & præsertim si melopeponum, cucurbitarum, & cucumerum semen addatur. Veronenſes, pro bellarijs ijs radicibus vescuntur, sed flatus excitant.

TVBERA,



TUBERA, Græcis, *ῥυζα*. Mauritanis, *Ramech*, *Alchamech*, *Tamer*, & *Kema*. Italis, *Tartusi*, & *Tartufole*. Germanis, *Hirschbrunſt*. Hiſpanis, *Turmas de tierra*. Gal-
lis, *Treſſes*, ſive *Treſſes*.

TUBERA.



GENERA.

Duo in agro Romano re- *Matth.*
periuntur genera: quorū al-
teri cādida pulpa, alteri puila
ſubeſt. Habent & alia genera,
ſed ignobilia & eſui ingrata.

FORMA.

Rotūdæ radices (ſi rectè ra *Idem.*
dices appellari debent) tube-
ra ſunt, ſed omnino inæqua-
les, nigro, ac ſcabro, putami-
ne, ſine folijs, ac ſine caule,
nullis quoque adnatis fibris,
inſpida intus pulpa: cū alba
(vt prædiximus) tum etiā ni-
gra. * Ad Tuberæ etiam ſunt
picti iſti fungi qui vocātur fa-
uaginoſi, q in Germania Ver-
no tempore ſunt in delitijs,
vulgo *Merchel* nominantur.*

LOCVS.

Abūdat Tuberib⁹ optimis *Idem.*
Hetruria. Atqui alijs in Italiæ
locis copioſa pueniūt ſicien-
tibus locis, ac labuloſis, fruti-
coſiſque.

QUALITATES.

Nullam euidẽtem habent qualitatem, qui ergo ijs vtuntur ad excipiẽda *Gal. 2. de*
condimenta tanquam materiam habent, ceu alia qualitatis expertia. *alim. fac.*

VIRE.

Terrena magis, quam aquea ſunt, omniq; prorfus ſapore expertia: Atrabi- *Auicē.*
liarios, & craſſos gignunt humores, magis quàm cætera ciborum genera, quo
fit, vt frequenter deuorata apoplexiam, aut paralim excitent. Sunt & conco-
ctu contumacia, & ventriculum agrauant. Expetuntur magnatibus in cœnis, *Matth.*
bellariorum vice: quin etiam ijs, qui putant venerem ijs deuoratis cum pipere
excitari.

APPENDIX.

Tuberæ vera, radices non ſunt. Nullas enim fibras adnatas habent, nec ſa-
ta vnquam proueniunt, nec etiam terræ cohærent, itaque terræ callum potius
ſunt appellanda, & in fungorum potius, quàm radicum genere recenſenda.

SMILAX

SMILAX hortensis, Græcis, Σμίλαξ κηπόσια, ὁ κερπὶς, λόβια. Mauritan. *Lubia*. Italis, *Smilace delli horri*, & *fagiolo Turhesco*. Germanis, *Welsch Bonen*/ *Windbonen*/ *Spreckel Bonen*. Hispanis, *Feyones*. Gallis, *Fasolz de Turquie*, & *Famel peintes*.

SMILAX HORTENSIS.

G E N E R A.

Matth.

Varia *Smilacis hortensis* habentur genera (*Phaseoli hortensis* sunt *seminum diversitate differētes*) quidam enim candidi, alij rubescētes, nonnulli melini, plerique diversis, varijsque maculis infecti, reperiuntur.

F O R M A.

Matth.

Horū planta tota ferè facie vulgaribus fagiolis persimilis visitur, peculiariter autē differt in siliquarum & seminū magnitudine, quæ omnia in hortensibus maiora, latiora que spectantur, differunt etiam caule. Hortensium enim planta arborescendit, *smilacis* asperæ modo, itaq; sequaci sarmentorum, clauicularumq; reptatu, testudines, atregias, pergulas, & tabernacula conuestit.

L O C V S.

Idem.

Seritur passim in hortis, & viridarijs.

Q U A L I T A T E S.

Alicen.

Excalfaciunt semina, & humectant ordine primo.

V I R E S.

Matth.

Semina in cibum sumpta magis inflāt, & ventriculo laborem faciunt, quàm vulgares fagioli, copiosiusque semen generant, & venerem stimulant, præsertimque cum longo pipere, galanga, & saccharo asperguntur, quod quidem longè valentius præstant, si ex lacte bubulo pingui elixentur: cornicula dum tenerima sunt, elixa perbelle in acetarijs veniunt, aluum emolliunt, & pectus dilatant.

ΑΡΗΛ-



NOMINA.

319

APHACA, Græcis, ἀπάκη. Arabibus, Aphaki, Apaki, siue Albikia. Italis, Aphaca.
Germanis, Wilde Bicken & Vogels Bicken. Gallis, Vesse sauvage.

APHACA.

FORMA.

Folij est tenuibus, siliquis Diosc.
lenticulæ maioribus, in quib⁹
terna, quaternæve semina ni-
gra continentur.

LOCVS.

Nascitur non solum spon- Matth.
te inter segetes, sed etiā a qui-
busdam seritur ad columbarū
faginam.

QUALITATES.

Semen viciæ modo amarū Idem.
est, & terrenæ essentiæ, ideo-
que absterforiæ est facultatis,
adstringendi quoque vim ha-
ber.

VIRES.

Seminis farina vino suba- Diosc.
cta, illinitur vtiliter ad serpen-
tium, & quadrupedum quo-
rumcunq; morsum: melle ex-
cepta, & illita, lentigines, va-
riolos, & cetera cutis vitia delet: torrefactum semen, stomachi, aluique fluxiones
sistit, si frefum lentis more decoquatur, sed melancholicos humores gignit.

VICIA,



Lubia. Ita-
m. Wilde
& Fumes

nt, quàm
præfer-
idem lon-
m tener-
tus dila-

ΑΡΗΑ-

VICIA, Græcis, Βίχιον. Italis, *Veccia*. Germanis, *Wicken*. Gallis, *Vesse*.

FORMA.

Match. Folia mittit aphacæ angustiora, in acutum desinentia, corniculis oblongis, teretibus, nigro semine stipatis, Orobi magnitudine: caulem edit bicubitalem, qui clauiculis è ramusculorū summitatibus prodeuntibus, segetibus sese implicat.

LOCVS.

Idem. Oritur sponte in aruis inter segetes, & feritur quoq; ad columbarum, aliorumque volucrum sagineam.

QUALITATES.

Idem. Excalfacit, & siccit, mundat, abstergit, & adstringit.

VIRES.

Non differt ab Aphacæ, peculiariter autem vrinam ciet, & tabidos iuuat, si ex præsana frequenter sumatur.


VICIA.



PORRVM

PORRVM, Græcis, Πρασον. Mauritanis, *Curat*, seu *Kurat*. Italis, *Porro*. Germanis, *lauch*. Hispanis, *Puerro*. Gallis, *Porreau*.

PORRVM.



GENERA.

Duum est generum: capitatum, *Matth.* Græcis, καπλωτόν dicitur, & Scétile.

FORMA CAPITATI.

Capitatum folijs provenit allio *Matth.* latioribus, longioribusque, carinatis, & in acumen desinentibus. Cervix illi longa, bulbofaque, candicans, crassiori capite, numerosis radicibus, ipsisque tenuibus, & capillatis: tunicis quoque numerosis conglomerato. Bimum in caulem prosilit capæ modo, longum, cavumque, floribus in cacumine in orbem congestis, semine nigro, capaceo simili.

LOCVS.

Seritur in hortis.

Idem

QUALITATES.

Corpus exalfacit, crassos humores extenuat, glutinososque incidit. *Gal. 6.* Inflat, noxium succum creat, tumultuosum somnium parit. *de alim. facul.*

VIRE S.

DIOSC.

Vrinam ciet, alium mouet, oculorum aciem hebetat, menses pellit, sed lædit exulceratam vesicam, renisque, cum ptisana verò coctum, *DIOSC.*

esui, pectoris vitia extrahit. Coma in aqua maris, & aceto cocta, in defensionibus ad præclusiones, & duritias vulvæ utilis est. Semen acris est, & quandam adstrictoriam vim habet, quare cum aceto, & thure, sanguinis profluvia sistit. Venerem stimulat. valet contra omnia thoracis vitia: arteriam esui purgat, sed si assidue estur, visus obscuritatem inducit, stomacho aduersatur, succus cum aceto aut thuris polline, lacte, aut rosaceo vtiliter aurium doloribus, & sonitui instillatur. Semen veteres sanguinis reiectiones cohibet, duarum drachmarum pondere cum æquali baccarum myrti quantitate potum. Illinuntur decocta folia ad tumentes, dolorificasque hæmorrhoidas. *Matth.* Eadem melle subacta illinuntur ad venenosorum omnium ictus. caput cum ceruice ex melle delinctum præstat ad omnia pectoris, & arteriæ vitia. sumitur sub cineribus tostum, ad fungorum venena, Idem crapulam, & ebrietatem discutit.

X

PORRVM

Matth. PORRVM sectile, Græcis, Πράσον τρυτὸν. Italis, Porro minore. Germanis, Schnittlauch/ sine Fleischlauch.

PORRVM SECTILE.

FORMA.

Idem. Non differt à Capitato, nisi quod capite sit tenuiore, ac etiam cervice.

LOCVS.

Idem. Seritur in hortis.

QUALITATES,
ET VIRES.

Idem. Ea omnia præstare valet, quibus capitatum pollere diximus.



AMPELO-

AMPELOPRASVM, Græcis, ἀμπελόπρασον. Mauritanis, Nabati. Italis, Porro salustico, & Porandello. Germanis, Wilderlauch. Hispanis, Ayos, & Puerros de las viñas. Gallis, Porree de Chians, siue Porrea sauvage.

AMPELOPRASVM.

FORMA.

Ampeloprasum porri faci- Matrb. em representat, sed folijs, ceruice, capiteq; longè minoribus, & ad mandendum durius, acriusque.

LOCVS.

Oritur sponte in Vinetis, Idem. vnde illi nomen, secus sepes, & in agrorum marginibus.

QUALITATES.

Acrius, & siccius satiuo habetur, attenuat, & crassa incidit, & obstructions aperit, & prouocat vrinam.

VIRES.

Stomacho magis quàm do- DIOSC. mesticum aduertatur, plus autem exalfacit, & vrinas, & menses vehementius ciet. Estur vtiliter, arque etiam illinitur ad serpentium morsus.

Lentos, crassosque humores potentius incidit, valentiùsque infarcta organa Galibid. obstruione liberat.

CAEPA, Græcis Κρόμμυον. Arabibus, Basil, seu Bassal. Italis, Cipolla. Germanis, Zwiebel. Hispanis, Cebolha. Gallis, Fiboule, & Oignons.

GENERA.

CAEPA

Theoph. Ceparum genera plura, diuersaq;
Matth. habentur (vt Theophrastus est au-
tor.) Atqui nos de quatuor tantum
generibus scribemus, nempe vulga-
ri, communique, Scetili, Fissili, &
Afcalonico.

FORMA VVLGARIS.

Matth. Capæ folijs proueniunt longis,
fistulatis, teretib⁹, & acuminatis: cau-
le verò cubitali, maioriq;, tubæ faciē
præferēte, inani ac fragili, in cuius
summitate, flores exeūt in globum
sele stipantes, de quibus semē oritur
nigrum, porraceo simile. Radice ni-
titur bulbosa, fessili, rapi rotūdi in-
star, & inferiori parte fibrata, sed et-
iam in his notantur differentiæ. For-
ma enim aliq; maiores, aliq; minores,
quædam longæ, quædam rotundæ,
quædā verò fessiles proueniunt. Sic-
ut colore rubentes, & subrubētes a-
liæ, quædam virides, & albæ nonnul-
læ. Quin etiam sapore, vel acerrime,
vel mediocriter acres, aut nihil fere
acredinis habentes.

LOCVS.

Idem. Serūtur, trāspantāturq; in hortis.

QUALITATES.

Gal. 7. Cæpa ex calfacit ordine quarto: Ef-
fimp. me. fentia autem eius potius est crassatū
partium Porro si succum eius expri-
mas, quod reliquū est, terrea admo-
dum est substantiæ, eiusq; calidæ, at
succus aquæ, ac teræque caliditatis.

DIOSC. Longa longè acrior est quàm rotunda, item flaua quàm candida, & sicca quàm viridis, & cruda
quàm cocta, omnes tamen mordent, flatus gignunt, appetentiam inuitant, sitim mouent, ex-
tenuant & expurgant.

VIRE.

DIOSC. Cæpa repurgata à putaminibus, & in oleo coniecta, & pro balano subdita, hæmorrhoidas,
reliquoſq; excretionum exitus referat. Succus ex melle illitus, oculorum hebetudinibus, ar-
gemis, nabeculis, & incipientibus suffusionibus auxiliatur, menses suppressos pellit. Naribus
infusus caput purgat, vitilignes sanat, in sole illitus. In auribus sonitum & grauitatem emen-
dat. In alopecijs illitus, capillos reuocat. Largiore cibo deuorata cæpa, capitis dolores excitat,
cocta vehementius vrinam pellit. Elixæ cum vuis pafsis, & fico tubercula admota concoquit,
& celestirimè rumpit: sub cineribus tosta, belleq; macerata, datur vtiliter ex melle aut saccharo
deuoranda anhelosis, asthmaticis, & tussientibus. Eiusdē squama sub feruenti cinere tosta diu-
turnum capitis dolorem sedat, vbi frustulum eius calidum in dolentis lateris aurem introdu-
catur superasperſo roſaceo & laurino oleo, succidatq; addita lana, quæ totam operiat aurem:
Succus cum acerrimo aceto mistus, sanguinem è naribus manantem sistit, ijs immisus.

CAEPA

NOMINA.

325

CÆPA sectilis, Græcis, Κρόμμυον τμητόν. Italis, Cipolla settiuole. Germanis, Matth.
Schwitzwibel.

CÆPA SECTILIS.



FORMA.

Folijis exit, caule, floribus, *Idem.*
& semine, vulgaris cæpæ si-
milibus, sed longè minori-
bus, tenuioribusque. Bul-
bis verò, ac cervice, oblon-
gis, tenuibus, & minimè ca-
pitatis, ob idque germinatio
tota in folijs, sæpiusq; reton-
detur, vt porrum.

LOCVS.

Seritur in hortis ad obso- *Idem.*
nia, & condimenta paranda.

QUALITATES,
ET VIRES.

Iisdem pollet facultatibus, *Idem.*
quibus vulgaris cæpa dota-
tur.

X 3

CÆPA

ΣΑΡΑ fissilis, Græcis, Κρόμμυον ῥιζόν. Hetruscis, Cipolle malige. Germanis, Schleichwibel.

CÆPA FISSILIS.

FORMA.

Math.

Facie tota Ascaloniam refert, nisi quod omnibus suis partibus maior spectatur. Bulbi plures ab una tantum radicum coma oriuntur, longa, tenuique ceruice nitentes, Ascaloniæ modo, sed a credine differentes.

LOCVS.


idem.

Habentur passim in hortis, in Hetruria.

QUALITATES,
ET VIRES.

idem.

Ea omnia possunt, quæ & cætera genera.



CÆPA

N O M I N A.

327

CÆPA Ascalonia, Græcis, Κεράμιον ἀσκαλόνιον. Italis, Scalogna. Germanis, Aschlauch.

CÆPA ASCALONIA.

F O R M A.



Folijis prouenit tenuibus, Matth. longis, teretibus, fistulosis, in acutum desinentibus, ceruice pariter tenui, bulbis numerosis, ab imo radicum cespice prodeuntibus, paulò nucis auellanae maioribus, parui fici faciem representantibus, sapore admodum acri, haud tamen ingrato.

L O C V S.

Seruntur Ascaloniae Cæpæ Idem. in hortis ad ciborum condimenta.

Q U A L I T A T E S.

Excalfaciunt, & siccant: in Idem. cidunt, aperiunt, prouocant, deijciunt.

V I R E S.

Non solum ea omnia præ Idem. stare possunt, quæ cætera cæparum genera, sed cibi appetentiam faciunt, vermes intestinorum necant, & caput non adeo lædunt.

X 4

ALLIUM,

ALLIVM, Græcis, Σκόροδον, Pœnis, Chaum, & Cairin. Italis, Aglio, & Aio. Germanis, Knoblauch. Hispanis, Ajos. Gallis, Ail, & Aux.

ALLIVM.

GENERA.

Matth. Duum est generum, Satiuum, & Sylvestre. Huius plura sunt genera, nēpe Ophioscorodon, Elaphoscorodon: Vrsinum, & Anguinum alterum.

FORMA.

DIOSC. Satiuum folijs prouenit porro similibus, minoribus tamen, ceruice lōga, capite bulbofo, quod pluribus coagmentatur nucleis, siue spicis, sapore acri, sed ori non ingrato, quod autē in Aegypto prouenit singulari, vt porrum capite cōstat, candido, ac minus acre. Sylvestre σκόροδον, Græcis vocatum, singulari capite cōstat nullis diuisum nucleis, satiuoq; longē minus, sed odore, saporeq; non ab simili. folijs angustioribus, gracili caule, in cuius cacumine flos emicat purpureus, & semen subsequitur nigrum. Huic simile ferē est, quod ἐλαφροσκορόδον, Græci vocant, id est ceruinum Allium. De cæteris inferius dicitur.

LOCVS.

Matth. Satiuum in hortis, & campis feritur. Sylvestre verò in collibus, & montibus sponte prouenit.

QUALITATES.

DIOSC. Vis illi acris est, mordet, excernit, digerit, pellit, aperit, incidit, prouocat, excalfacitq; & siccatur ordine quarto.

Gal. 7.

simp. me.

facul.

VIRE S.

Gal. li. 12.

Meth.

DIOSC.

Allium turbat, flatu discutit, coli dolores minuit, vbi à flatu prouenerint. Sicim gignit, oculorum aciem hebetat. Latas ventris tineas esu abigit, vrinam ciet. Prodest, contra viperæ, & peculiariter hæmorrhoidis ictum, ita vt non aliud magis, si cum vino assumatur: præstat quoq; contra rabioforum morsus, tam illitū, quam potum, vocem clarificat, veterem tussim coctum, crudūve lenit: Ex origani decocto potum, pediculus, & lentes necat, vitiligines, lichenas, lentigines, manantia capitis vlcera, lepras, & furfures, cum melle, & thure eximit, cum thure, tædaq; decoctum dentium dolorem malcet in ore detentum. Coma feruefacta, & in defensionibus addita, menses, & secundas extrahit. Hydropicis quoque est vtile, & præfertim Timpanite laborantibus,

ALLIVM

ALLIUM anguinum, alpinum. Græcè, *δρισκήβορον*, vel *δρεσκήβορον*. Italis, *Aglio serpentino*, aliquib. *Victorialis longa*. Germ. *Neunhelm* / *Matterkuoblauch* / *Siegwurz Weible*.

ALLIUM ANGVINVM.

FORMA.



Folia profert lilio conual- *Matth.*
lio serè similia, angustiora ta-
men, & nigris maculis resper-
sa; quin etiam caulis ijsdem
inficitur notis, Dracūculi ma-
ioris modo, quo factum est,
vt à nobis allium Anguinum
fuerit appellatum: Cernice
nititur longa: radice bulbosa,
inuolucris, vt in croco circū-
tecta, numerosis inferna par-
te fibris, vulgaris allij odore,
saporeq; prædita.

LOCVS.

Nascitur in Montibus ex- *Idem.*
cellis.

QUALITATÈS,
ET VIRES.

Excalfacit, & siccit perin- *Idem.*
de ac allium agreste, & suis in
facultatibus illi per omnia si-
mile existit.

* Superstitiosi appendent radicem pecoribus, quocunque casu excæcatis,
& visum hinc ipsi reddi sibi persuasum habent. *

X 5

ALLIUM

Plin. libr. ALLIVM vrsinum, Italis, *Aglio degli Orsi*. Germanis, *Wär/ & Hundes Knob-*
 19. cap. 6.lauch/ Rampen/ Kempfen/ & Ramseren.
in fine.

ALLIVM VRSINVM.

FORMA.

Matth. Folijs exilatis, minoris
 plantaginis ferè æqualibus,
 frequenter striatis, caulibus
 angulosis, in quorum summi-
 tate flores sunt in umbellæ fe-
 rè modū se diffundentes: Ra-
 dice nititur bulbosa, spicata-
 que, lilij albi modo, depen-
 dentibus ima sede capilla-
 mentis.

LOCVS.

Idem. Nascitur in collibus, in syl-
 uis, & aliquando inter sege-
 tes.

QUALITATES,
ET VIRES.

Idem. Ea omnia præstare posse
 creditur, quæ cæteris agre-
 stium alliorum generibus af-
 signantur.



SCORODO

NOMINA.

331

SCORODOPRASVM, Græcis, Σκοροδοπρασον. Italis, Agliporro. Germanis, Abergnolauch. Gallis, Ail porreau.

SCORODOPRASVM.



FORMA.

Magnitudine porrum & Dioscori. quat, folijs, cernice, & capite quoque similibus.

LOCVS.

Nascitur sponte in prato Matthi. rum, agrorumq; marginibus, & propter sepes.

QUALITATES,
ET VIRES.

Scorodoprasum, sicut galen. 7. stu, & odore mediam allij, & simp. me. porri qualitatem possidet, ita & vires. Coctum porri modiosc. do, dulcescit, & in olerum vicem transit.

SINAPI.

SINAPI, Græcis, *Σινάπι*. Hetruscis, *Senape*. Italis quibusdam, *Senauro*. Mauritanis, *Cardel*, & *Chardel*. Germanis, *Senff*. Hispanis, *Mostaza*. Gallis, *Seneue*.

S I N A P I.

G E N E R A.

Matth. Trium est generum, quorum unum rapaceam frödem exprimit: alterum gracili est folio: tertium verò Erucae folio laciniatur.

F O R M A P R I M I.

Plin. 19. cap. 8. Quod rapi folijs provenit cæteris maius, domesticū est: caulem mittit vegetum, subhirsutum, à quo ramusculi superiore parte crescunt, in quibus semē subrufum in corniculis provenit, acerrimo sapore, ac etiam olfactu infestū.

L O C U S.

Matth. Seritur in hortis passim ab olitoribus.

Q U A L I T A T E S.

Gal. lib. 8. simp. me. Calefacit, & siccit ordine quarto.

V I R E S.

Diosc. Ad extenuandum, incidendum, detergendum, extrahendumq; efficax est. Manditur ad eliciendam capitis pituitā, contra veterem, callosamque

arterie scabritiem. Succus ex aqua, & melle vtiliter gargarizatur: tritum, & naribus admotum sternutamenta ciet: fœminas vulvæ strangulatu oppressas excitat; illinitur auxilio magno lethargicis, derafo capite, cum ficis admixtum, donec rubescat locus: quin etiam eodem modo ad ischiadicis dolores. Additur in emplastris extrahentibus, scabiemq; extenuantibus, magno sanè vsu. *Matth.* Seminis farina aceto subacta, illinitur ad serpentium, & scorpionum ictus, pota verò fungorum venenis auxiliatur, illinitur & hydropicis ex impubis pueri vrina, sordities omnes corporis abstergit, cuti nativum conciliat nitorem. Datur quoque vtiliter suspiriosis, & asthmaticis.

S I N A P I



N O M I N A.

333

SINAPI alterum, Græcis, Σίνπι ἑτερον. Italis, Senape, siue Senauro saluatico.
German. Gelber Senff.

SINAPI ALTERVM.

FORMA.



Folia habet tenuiora, plura *Matth.*
ex vno ramusculo prodeun-
tia, caulem rectum, firmum,
asperum, scabrum, hirsutum-
que, à medio ramosum: cot-
niculis numerosis, atque hir-
sutis.

LOCVS.

Nascitur locis incultis, in *Idem.*
campestribus, & inter rude-
ra.

QUALITATES,
ET VIRES.

Ea omnia præstare potest *Idem.*
semen, quæ latino sinapi assi-
gnantur.

SINAPI

SINAPI tertium. Italis, *Senape bianca, siue Rocchetta*. Gallis, *Moustarde blanche & douce*.

SINAPI TERTIVM.

F O R M A.


Matth.

Folij exit sylvestri erucæ
similibus, frequenter lacinia-
tis, ramis tenuibus, in caulis
summitate exētibus, in qui-
bus vtrinq; siliquula spectan-
tur, albo intus semine, non a-
deo, vt in alijs generibus acri.

Q U A L I T A T E S,
E T V I R E S.

Idem.

Cum non sit, vt in cæteris
generibus, eius semen acre,
non adeo, vt illa excoctis, &
siccat. Itaque & si ad omnia
vtilē habeatur, ad quæ cætera
genera, imbecillius tamē est.
Atqui semen peculiariter in
vinum mustum coniectum,
diutius eius dulcedinem tue-
tur, atque eam deficere pro-
hibet.



NASTVR-

NOMINA.

335

NASTURTIVM, Græcis, *Κάδευρον*. Mauritanis, *Norſ*, *Alchif*, ſeu *Narſ*. Italis, *Nafurtio*, & *Agretto*. Germanis, *Gartentrefſ*. Hiſpanis, *Nafurtio*, & *Malpiſa*. Gallis, *Creſſon de ſardini*, & *Nafitorr*.

NASTURTIVM.



FORMA.

Herba eſt tenuis, folijs par-
uis, laciniatis, caule tenui, ſel-
quipedali, flore albo, ſemine
in rubeum nigricante, folli-
culis orbiculatis, ſquamofiſq;
incluſo Thlaſpi modo, acri
ſapore.

LOCVS.

Seritur paſſim in hortis, & *Idem*.
uſurpatur ad ciborum condi-
menta, & intinſtus, & veni-
t quoque alijs cum herbis in a-
cetarijs.

QUALITATES.

Semen adurentis facultas
tis particeps eſt, excaſcit, &
ſiccatur ordine quarto, folia vi-
ridia multò inferiora ſemine
ſunt, adeo ut mordacitas eorū
moderata ſit. Attenuat, mū-
dat, aperit, prouocat, incidit,
vrit, & reſoluit.

VIRE.

Stomacho aduerſatur, al-
uum turbat, ventris tineaſ ex-
cutit, lienem minuit, partus
incoctum pulmonum vitia extrahit: ſerpentium venenis potum reſiſtit, atque
eas ſuſſitu fugat, capillorum deſluvia cohibet, coxendicibus commodè ex ace-
to illinitur. Animum exacuit. Succus dentium dolores mulcet, ſi calidus in
aure dolentis lateris fuerit inſtillatus, ſemen denariorū decem pondo ex aqua
potum, bilem ſubducit, capitis vitia purgat, & viſum acuit.

THLAſPI.

THLASPI, Græcis, Θλάσι. Barbaris, *Nasturtium teſtorum*. Italis, *Thlaſpi*.
Germ. *Deſentraut*. Hiſp. *Paniqueſo de flor blanco*. Gallis, *Senene ſauuage*.

THLASPI.

GENERA.

Matth. Quatuor Thlaſpi obſerua-
uimus genera, vt ex eorum i-
maginibus hic ſeriatim appi-
ctis patebit.

FORMA.

DIOſC. Primum folijs eſt anguſtis,
digitali lōgitudine, in terram
verſis, ſubpinguibus, in cacu-
mine diuiſis, cauliculo tenui
binum dodrantum, non ſine
adnaſcentibus ramis, fructu
circa ipſum totum, ab extre-
mo in latius ſe pendente: ſe-
mine Naſturtij vaſis incluſo,
lenticulę effigie, niſi quod in-
fringitur, vnde nomen acce-
pit. ſos illi albicat.

LOCVS.

Matth. Naſcitur in ſemitis, ſepi-
bus, & ſoſſis, quin etiam inter
rudera, & in vetuſtis ædificio-
rum muris, & tectis.

QUALITATES.

Galen. Semen habet & ipſum facultatem acrem. Excalfacit, exiccat, attenuat, vrit,
Matth. extrahit, prouocat, expurgat, & incidit perinde ac Naſturtij ſemen.

VIRE S.

DIOſC. Semen bilem vtrinque extrahit acetabuli meſura potum: prodeſt iſchia-
dicis infuſum: potum ſanguinem educit: internas ſuppurationes rumpit,
Matth. meſes ciet, ſed fœtum enecat. Additur in antidotis, ideoque in theriacam
ingreditur.

THLASPI



NOMINA.

THLASPI secundum, Scorodorthlaspi, Græcis, Θλάσσι ἑταῖον. Italis, Tlaspì maggiore.

337

THLASPI II. SIVE ALTERVM.

FORMA.

Folij exit alteri maioribus, *Matr.* latioribusque, prope caulem diuisis, & per ambitum serratis, caule firmo, ramosoque, filiquis latioribus in cacumine diuisis, pressisq; in quibus semen minutum continetur, aureo colore.

LOCVS.

Nascitur in agrorum marginibus, & inter segetes. *Idem.*

QUALITATES,
ET VIRES.

Semen minus mordet, minusque longè calefacit, & siccat, atque etiam cetera minus præstat, quàm alterius. *Idem.*

Y

THLASPI



THLASPI tertium, Saxatile. Italis, *Tlaspi della terza specie.*

THLASPI III.

F O R M A.

Folijsprouenit à radice numerosis, oblongis, subalbican-
tibusq; minime gustatu a-
cutis, caulibus, & ramis tenui-
bus, tenuibusque folliculis
circumquaq; stipatis, in qui-
bus semen Thlaspi simile a-
cerriimi gustus.

L O C V S.

Nascitur locis saxosis, &
asperis.

Q U A L I T A T E S,
E T V I R E S.

Excalfacit, & siccit perin-
de ac alia genera, & cætera
quoque prestat, sed non adeo
vehementer.



THLASPI

THLASPI quartum, siue Creticum, Cappadociumue. Italis, *Thlaspi della quarta specie.*

THLASPI IIIII.



FORMA.

Folia profert longa, angusta, raraque in caule ramoso, * nā inferiora latiora sunt & nonnihil crenata. Flosculi in fastigijs ramulorum dilute purpurascens vmbellas cōstituunt, quibus succedunt folliculi parui vt primi thlaspios, in quibus semen. *

LOCVS.

In Pannonia superiore nascitur in incultis locis, & in collibus.

QUALITATES,
ET VIRES.

Semen cum acerrimo habeatur sapore pariter calefacit, & siccatur, & ea omnia praestare potest, quæ primi generis Thlaspi adscribuntur.

Y 2

BVRS A

BURSA pastoris, Italis, & Officinis eodem nomine appellatur, quin etiam sanguinaria aliquibus, non nullis herba cancri, & alijs crispula quoque vocatur. Germanis, *Seckelkraut* & *Tescheikraut*. Gallis, *Bourse à Pasteur*.

BURSA PASTORIS.

FORMA.

Matth.

Caulis edit teretes, sesquidodrantales, ramis tenuibus in summitate emergentibus, folia eius prima verbenacæ proxima spectantur, sed quæ in caule sunt Thlaspi æmula sunt. radicem habet tenuem, candidamque: flores edit in summis ramulis albos, è quibus pressæ oriuntur siliquæ, cordis ferè imaginem referentes, semine intus paruo, ac minuto.



LOCVS.

Idem.

Nascitur ferè vbique, præsertimq; secus vias, in antiquis ædificiorum parietibus, in hortis, & vineis, & inter rudera.

QUALITATES.

Idem.

Est hæc planta ex refrigerantium, & adstringentium genere.

VIREs.

Idem.

Prodest attrita, & illita cum inflammationibus, tū etiam sacris ignibus, decoquitur pluuiæ aqua cum plantagine, & Armenio luto, bibiturq; eius decoctum ad dysenteriam, & cruentas excreationes, herbæ succus recentia vulnera glutinat, & auribus purulentis infusus medetur. sistit mensum abundantiam. si in eius, & persicariæ decocto insideant mulieres. Esturq; ad idem, & contra denique omnes sanguinis fluxiones efficax est, tam deuorata, quam admota. additur in emplastris, quæ ad capitis vulnera parantur. in calceos coniecta, & nudis pedibus pressa auriginem tollit.

ARABIS,

N O M I N A.

341

ARABIS, siue Draba, Græcis, *Ἀραβίς*, & *Δραβή*. Italis, *Draba*. Barbaris, *Nasturtium Orientale*. Germanis, *Türkisch Kress*.

ARABIS, SIVE DRABA.



F O R M A.

Ad cubiti altitudinem as-^{di}osc.
furgit, tenues spargēs ramos,
& ex utroque latere folia, le-
pidij æmula, sed molliora, &
candidiora, in cacumine verò
sambuci umbellam gerit, can-
didos flores habentem.

L O C V S.

Nascitur in campestribus, *Matth.*
& agrorum marginibus.

Q U A L I T A T E S.

Insignis est acrimoniæ, & *Serap.*
Nasturtio per omnia similis,
itaque valenter excalfacit, &
siccat.

V I R E S.

Herba cum ptisana coqui-
tur ad pituitosa pectoris vitia:
semen aridum pro pipere ob-
sonijs admiscetur.


Y 3 . *ARABIS

F O R M A.

Eradice valida, & longissima, colore subalbida & sapore non minus acri quam Nasturtiū, caules promit complures ultra humanam longitudinem, graciles tamen & circa summitates in aliquor ramulos diuicatos, qui non umbellam efformant, sed sine ordine nascuntur sustinentes flosculos copiosos luteolos, ex quaternis folijs compositos, ex quibus semen relinquitur oblongis strictisque siliquis inclusum, tenue, fuluum, acre. Folia vestiunt totam stirpem oblonga, acuminata, crenata per oras, & circa fastigia caulium quæ prodeunt longe inæqualiore ambitu laciniata spectantur.

L O C U S.

Habetur in hortis, & forte alicubi sponte nascitur.



Q U A L I T A T E S , E T V I R E S.

Acredo ipsius manifesta qualitate & viribus cum Arabi conuenire illam cuius prodit.*

IR 10

IRIO Latinis, Græcis verò Ερίσιμον. Italis, *Erisimo*, & *Irione*. Germanis, *Hederich* / & *Wilder Senff* / *Schnödsenff* / *Schluszenff* / & *Steinsenff*. Hispanis, *Rinchaon*. Gallis, *Velar*, sine *Torrelle*.

IRIO, SIVE ERISIMVM.

GENERA.

Duo eius habentur gene- *Matth.*
ra, foliorū magnitudine diffe-
rentia.

FORMA.

Folij exit *Eruca sylvestris*, *Diosc.*
cauliculis in lori modum len-
tis, & obsequiosis: floribus lu-
teis: filiquis in cacumine gra-
cilibus, acuminatisq; in qui-
bus semen reconditur exigu-
um vrentis gustus.

LOCVS.

Oritur iuxta vires, rudera, *Matth.*
arque hortos, quin etiam in
plateis, & ædificiorum arcis.

QUALITATES.

Acrimonia pollet, vt Na- *Galen. 6.*
sturtium, & Sinapi. *simp. me.*

VIREs.

Contra thoracis effluxiones efficax est, & purulenta extussientibus auxilia-
tur, regio morbo, & coxendicibus prodest, bibitur etiam vtiliter contra dele-
teria pharmaca: illinitur ex aqua, aut melle cæcis carcinomatibus, parotidibus,
mammarum duritijs, & testium inflammationibus. In totum extenuat, & ex-
calfacit.



illam

IRIO

VVLGARIS Irio, Italis, *Irio*, o vero *Erisimo commune*.

IRIO ALTER VVLGARIS.

FORMA.

Matth. Folia mittit hortensis Eru-
cæ, caules lentos, flexilesque,
ramis in summitate tenuibus:
rotundis, acutis, tenuibusque
corniculis vndique stipatis,
sursum spectantibus, in qui-
bus semen cōcluditur minu-
tum, flauo colore.

LOCVS.

Idem. Prouenit, vt alter, iuxta vr-
bes, rudera, hortosque.

QUALITATES,
ET VIRES.

Idem præstat eius semen,
quod alteri quoque adscribi-
tur, peculiariter autē sēsqui-
drachmæ pondere, ex ovo sor-
bili, deuoratum tribus conti-
nuis diebus, seminis proflu-
uium cohibet, & ex vino renum calculos pellit.



PIPER,

PIPER, Græcis, Πίπερι. Mauritanis, Fulsel, & Fulsul. Italis, Pepe, & Peuero. Germanis, Pfeffer. Hispanis, Pimienta. Gallis, Poivre.

PIPER.



GENERA.

Plura Piperis sunt genera, nem- *Matth.*
pe nigrum, albū, longum, Aethio-
picum, & quod vocant Itali Indi-
cum.

FORMA.

Seritur Piperis planta, quod re- *Idem.*
pat clematidis alterius modo, pro-
pe proceras plantas, super quas re-
pit ad fastigium vsque, folijs raris,
citrei mali effigie, sed minoribus,
gustu aliquantulum acribus. Fru-
ctum profert racemosum, vuarum
modo, sed minorem, perpetuo vi-
rentem donec siccetur, & plenam
maturitatem consequatur, quæ
conficitur Ianuario mense, radice
nititur pusilla. Huic nigri piperis
plantæ, persimilis omnino est, quæ
Piper album gignit.

LOCVS.

Piperis prouentum maximum *Idem.*
habetur in Maluar locis mariti-
mis, quæ à Comorin ad Cananor
vsq; pertingunt: quin etiam in Ma-
lache maritimis, & in insulis, quæ
circa lauam sunt: vnde per mare
Erythronæum ad nos comporta-
tur.

QUALITATES,

ET VIRES.

Excalfacit, & siccit valenter, in- *Diosc.*
cidit, attenuat, concoquit, prouo- *Matth.*
cat, distrahit, discutit, & abstergit,

februm horroribus tam potum, quàm illitum subuenit: serpentium moribus auxiliatur,
partus extrahit: tussi, omnibûsque pectoris vitijs à pituita exortis, tum in potu, tum in ecle-
gmate succurrit: cum melle vtiliter anginis illinitur: tormina discutit, cum recentibus lauri
folijs haustum: cum yua passa manducatum pituitam à capite elicit: valetudinem tuetur,
dolores finit, appetentiam mouet, concoctionem adiuuat: strumas cum pice discutit, & vi-
tiligines cum nitro emaculat. Integra grana quinq; numero quotidie deuorata, ijs auxili- *Matth.*
antur, qui ventriculi dolore, tum ex flatu, tum cruditatibus exorto, laborant.

CENSURA.

Delusi sunt antiqui omnes, quod crediderint ex eadem planta prouenire nigrum Piper, *Matth.*
& longum, siquidem alia valde diuersa planta piper longum mittit, quod in Begala nasci-
tur.

PIPER Æthiopicum. Italis, *Pepe d'Ethiopia*.

PIPER ÆTHIOPICVM.

FORMA.

Matth. Pronenit hoc Piperis genus in filiquis nigris racematim exeuntibus, pisorum, aut phaseolorum similibus, semine intus, nigri piperis baccis paulo minore, ac pertinaciter filiquis inhærente.

LOCVS.

Idem. Nascitur in Æthiopia, unde nomen inuenit apud Arabes.

QUALITATES.

Idem. Excalfacit, & siccit vehementer, attenuat, incidit, prouocat, aperit, digerit, resoluit.


VIRES.

Vtuntur eo Æthiopes ad dentium dolores.

CENSURA.

Manifestè cæcutiunt, qui Æthiopum Piper Carpesium esse contendunt.

INDICVM



N O M I N A.

347

INDICVM PIPER siue Siliquastrum. Italis, *Pepe cornuto*, aut *Pepe d' India*.
Germanis, *Indianisch Pfeffer* / & *Schottenpfeffer*. Gallis, *Poyure de Inde*.

P I P E R I N D I C V M.



F O R M A.

Folij exit hortensis folani *Matth.*
maioribus, oblongioribusque, caule sesquicubitali, viridi, ramis compluribus brachiato, geniculatoque. Floribus candicantibus, è quibus vaginæ oriuntur corniculorum speciem referentes, viridi primum colore, & deinde coralliorum modo rubescente, pellucido, gustu acerrimo, aded vt piper omne sua ingenti acredine superet. In his semen concluditur minutum, colore subalbicante, eiusdem protinus gustus.

L O C V S.

Seritur in hortis, & ficti. *Idem.* libus.

Q U A L I T A T E S.

Excalfacit, & siccatur excessu. *Idem.*
su quarto. Ideoque valenter vrit, & exulcerat corpus admotum recens.

V I R E S.

Recentia cornicula tusa, & illita Ischiadicos iuuant, siquidem locum exurunt.

C E N S V R A.

Non desunt doctissimi viri, qui hoc piperis genus Cardamomum faciunt, manifesto tamen errore.

* S I L I -

* SILIQVASTRI varietas triplex. * Siliquastrum rotundum. † Cordatum.
° longuin.

SILIQVASTRI TRI-
PLEX VARIETAS.

FORMA.

Non admodum discrepat à precedente nisi fructu. Est enim caule quadrangulo, sesquipedali, folijs Solani aut Perficariae, nigrioribus, floribus candidis, pusillis Solani, exiguis foliolis, quorum centrum tenet asteriscus herbicus exiguus, deinde siliqua succrescit nitido virore & laeuore, per maturitatem rubra & miniata, aut purpurea, quæ in alia planta longior & minus crassa, acuminatioq; spectatur, in alia rursum multo breuior, turbinata, cordis effigie, interdum etiam exacte rotunda. Omnes eodem semine prægnantes deprehenduntur.

LOCVS.

Affertur cum priori ex Goa & Calecutijs oris in Europâ, vbi in hortis fictilibusq; vasis colitur, sic enim commodius transferri & hyeme, quæ huic inimica est, sub rectum deferri potest.



QUALITATES.

Excalfacit vehementer ac pariter resiccat, ad quartum vtriusque qualitatis ordinem accedens.

VIRES.

Vtilitas & vsus vnus & idem sola figura discrepantium huiusmodi generû ad duos & frigidos tumores. Cutis fædationes delere ex melle illita produntur. Insula & condimenta colore croceo & gustu piperis comendat, sed abstinendum à nimio vsu, nam malignû & venenosum quid obrinet, quo iocineri alijsque visceribus incommodat.*

CARYO-

CARYOPHILLVS, Græcis, Καρυόφυλλον. Mauritanis, Persis, Turcis, Indis, *Calasur*. Hetruscis, *Garofani*. Italis verò cæteris, *Garofoli*. Germanis, *Niegelein*. Hispanis, *Clauos de espetia*, siue *Clauellos*. Gallis, *Girophles*.

CARYOPHILLI.

FORMA.



Arbor, quæ Caryophillos pro-
fert, lauri faciem refert, folijs tamē
angustioribus salicis, aut persicæ
mali similibus, sensim per ambitū
sinuatis, multis prædita ramis, flo-
ribus numerosis in primis cædendis,
deinde virefcētibus, postremo ve-
rò rufescentibus, vsq; adeo odora-
tis, vt reliquos flores odoris suavi-
tate superent, è quibus caryophilli
proveniunt, qui nil aliud sunt, quā
rudimentum fructus. Flores enim
qui quaternis foliolis cōstant, huic
fructus rudimento insidet, fibris
numerosis refertus, perinde ferè
ac Myrti flores. Proveniunt caryo-
philli in extremis ramulis Myrti
modo. Ad hæc pediculi, quibus ca-
ryophilli nituntur ij sunt, qui offi-
cinis vulgari idiomate appellantur
Fusti. Nascitur autē arbor ipsa spū-
te ex decidētibus caryophillis. A-
dolescit intra octennium, perdu-
ratq; in centesimum annum vsq;.

LOCVS.

Nascitur magno prouentu tan-
tum in Moluccis Insulis. Nam quā-
uis in Zeilan, & nonnullis alijs In-
diæ locis proveniat arbor, nusquā
tamen fructum edit, præterquā in
Moluccis. Excultantur ibi flagel-
lis, emundato prius circa arborem
solo.

QUALITATES.

Caryophilli calidi, & siccī sunt *Idem*.

ordine propemodum tertio, odorati, acres, subamari, non sine leuicula adstrictione. Itaq; ro-
borant, aperiunt, incidunt, attenuant, digeruntq;.

VIRE S.

In cibis deuorati ventriculi, iocinoris, cordis, & capitis affectibus auxiliantur. In puluerem *Idem*.
hausti ex vino austero & cydoniorum malorū succo, vomitiones cohibent, cœliacos iuuant,
nauseam remouent, & cibi appetentiā reuocant, roborantq; cum ventriculum, tum etiam ca-
pum. Frigefactum iecur belle exalfaciunt, olfacti auxiliantur animi deliquijs, mansiq; anhel-
ant comendant, conferunt comitialibus, resolutis, cōuulsis, stupidis, & veterosis cōcoctio-
nem adiuvant, a sui fluores torrefacti cohibent. Illinuntur quoq; per quā vtiliter cum masti-
ce, rhoe, corallijs, & punicæ arboris floribus, ad ventriculi imbecillitatem. Exacuunt præterea
oculorum aciem, & caligines tollunt, quinetiā nubeculas, & argemas in tenuissimū puluerem
triti, & oculis inditi. Adduntur in Antidotis, & in faccis, qui ventriculo, & capiti roborando
parantur.

CARYO-

CARYOPHILLI flores domestici, nonnullis Veronicum. Italis, *Garofoni*, & *Garofoli*. Germanis, *Grasblum* / *sive* *Reglinblum*. Gallis, *Oeillets*, *sive* *Gros-floes*.

CARYOPHILLI FLORES
DOMESTICI.

GENERA.

Matth.

Varia sunt horum florum genera, colore, & foliorum stipatu differentia. Alij enim maiores sunt, alij minores, alij coccineo colore rutilant, alij saturata purpura nitent, alij candido, alij carneo colore gaudent. Sunt, & versicolores nonnulli albo, rubroque colore mistim respersi, quin etiam spontè nascentes habentur cum rufescentes, tum albicantes.

FORMA.

Idem.

Planta folijs est Tragopogoni modo longis, brevioribus tamen, carnosioribus, pinguioribusque, incurvis, & in acutum desinentibus: Caules edit numerosos, geniculatos, læves, cubitales, tribus, quatuorve in summitate adnatis, in quorum cacumine teres, longiusculusque calyx spectatur superiore parte serræ modo denticulatus, è quo flos speciosissimus oritur caryophyllorum odore præditus. Atqui flores in omni genere omnes ferè stipantur numerosa foliorum serie, perinde ac rosa.

LOCVS.

Idem.

Seruntur à mulieribus, columnæque in fistilibus, aut capsulis ligneis transpositi, sæpiusque irrigati, super fenestras, ac etiam in hortos.

QUALITATES.


Calida, siccaque pollere facultate hosce flores iudicio esse potest odoris fragantia, & lapidis amarulentia quædam.

VIRE S.

Idem.

Qui purpureo colore nitent præstant ad omnes cordis affectus, ad vertiginem, apoplexiam, paralytum, & convulsionem, ex Betonica, aut amaraci decocto poti. Asseruantur saccharo, perinde ac rose, non solum ad prædicta omnia viles, sed etiam aduersus venena, venenosorumque animalium ictus. Dantur contra pestilentia contagia. Id quod valentius operatur succus, ex vniuersa planta expressus. Haustus enim quatuor unciarum pondere, ubi morbus inuaserit, liberat.

CARYO-



NOMINA.

351

CARYOPHILLI sylvestres. Italis, *Garofani*, & *Garofoli saluaticchi*. Germanis,
Donnereglin. Gallis, *Armoiries*, & *Oeillets sauvage*.

CARYOPHILLI FLORES
 SYLVESTRES.

FORMA.

Folijis, caulibus, floribusque *Matth.*
 exeunt altilibus similibus, sed
 longè minoribus, tenuioribuf-
 que, floribus cum rufescenti-
 bus, tum etiam albis, nullo ta-
 men odore præditis.

LOCVS.

Proueniunt spontè locis in-*Idem*.
 cultis, & aridis, atque saxo-
 sis.

QUALITATES,
 ET VIRES.

Præstantij quoque ad ea om-*Idem*.
 nia, ad quæ altiles præstare di-
 ximus, verum longè remissius
 operantur.



HYDRO-

HYDROPIPER Græcis, Ὑδροπέπερι. Italis, *Pepe aquatico*, & *Persicaria*. Germanis, *Wasserpfeffer* / & *Mückenkraut* / & *Schmergen*. Hispanis, *Hierua pexguiera*, seu *manchas*. Gallis, *Curage*.

GENERA.

Matth.

Dum est generum, alterum minus, alterum maius. Item alterum acri admodum sapore. Alterum verò omnis acridinis expers, & aspero tantum stringentiq̃ue gustu præditum.

FORMA MINORIS.

Diosc.

Caulē edit geniculatū, solidū alis multis concavum. Folia mentha maiora, molliora, candidioraq̃; gustu piperis acri, citra tamen vllam odoris gratiam. Fructum acrem, in surculis parvis, prope folia racematim coherentem.

QUALITATES.

Gal. 8.

Calidum est, sed non tantum, vt Piper. Incidit, extenuat, aperit, resoluit, exulcerat, discutit, & digerit.

simp. me.

Matth.

VIRES.

Diosc.

Folia cum semine illita, tumores, veteresq̃; duritias discutunt, saggillata delent, quæ postquam inaruerunt, tusa pro pipere in obsonijs admiscuntur. Herba recens commode thalamis sternitur, pulicibus necandis. Suillæ carnes salte, circumducta herba præseruantur à tinea, & vermibus. Quare succus instillatus vermiculosis auribus, opem mirificam præstat.

Matth.

HYDROPIPER SEV
PERSICARIA.

PERSICA-

NOMINA.

353

PERSICARIA altera. Italis, *Persicaria* maggiore. Germanis, Stöckfräut.

PERSICARIA ALTERA.

FORMA.

Eadem illi facies est, quæ *Matth.* alteri, nisi quod folia maiora sunt, & nigris maculis infecta, caules vegetiores humi accubantes, & racemi grandiores.

LOCVS.

Nascitur hæc non solum *Idem.* humecto solo, sed etiam in sicco, in agrorum marginibus, & secus itinera.

QUALITATES ET VIRES.

Cum gustantibus manifestam relinquit adstrictiorem: nec vlla sit acredine prædita, exalfacere perinde ac altera haudquaquam potest, sed potius refrigerare, ac siccare.

Z PTAR-



PTARMICA, siue Sternutamentaria. Græcis, *Ἰσχυρὰ*. Italis, *Parmica*. Germanis, *Derant*/vel *Weißer spitzer Diefenfagen*.

PTARMICA.

FORMA.

Matth. Surculos habet tenues, scilicet quadrantes, rotundos, & circa eos folia oblonga, oleæ modo atq; multa: & per ambitum ferrata. Flores mittit in cacumine anthemidis figura, minores tamen & umbilico dilutiore. sapore aded acri, ut non desint qui pyrethrum eam faciant.

LOCVS.

Idem. Nascitur spontè in montibus, saxosis locis.

QUALITATES

Parmicæ flores ciendæ sternutationis vim obtinent, est enim temperies eius calida, & sicca, viridis etiamnum ordine secundo, siccata tertio.



VIREs.

Folia cum floribus illita, suffugillationes rapiunt. Flores sternutamenta efficacissime mouent.

PTAR-

s. Ger-

NOMINA.
PTARMICA ALTERA.

355



Sunt qui plantam, cuius hic
imago spectatur, Dioscoridis
Ptarmicam faciunt: sed re vera
falluntur.

Z 2

PSEV-

ra effi-

TAR-

PSEVDOSTRVTHIVM, quidam Theriacariam vocant. Germanis, *Stechfrant*.

PSEVDOSTRVTHIVM.

FORMA.

Matth. Folia profert longa, subpinnata, caules multiplices, foliosque, in quorum summitate spicati prodeunt flores. Radice nititur candida, longa, digitali crassitudine, & raphani modo acris,

LOCVS.

Idem. Nascitur incultis locis, secus itinera, & in agrorum marginibus.

QUALITATES ET VIRE.

Idem. Radix excalfacit, & siccatur ordine tertio. Incidit, attenuat, resoluit, aperit, digerit. Sunt etiam, qui eam praferant contra venenosorum animalium ictus, non modo vulneri admotam, sed etiam in potu sumptam. Quinetiam aduersus pestilentia contagia.



CYCLA

CYCLAMINVS, Græcis, Κυκλάμινος. Mauritanis, Buchomarien. Officinis, Cyclamen. Panis porcinus, & Arthanita. Italis, Pan porcino. Germanis, Schwettebrun & Erdöpfel. Hispanis, Pan de Puerco. Gallis, Cyclamen, seu Pain Porcin.

CYCLAMINVS.

FORMA.

Folia habet hedere aduersa DIOSC. parte purpurea, in quibus supra, infraque, albicant maculae, caules nudos palmari longitudine, floribus in eorum summitate purpureis, coronatis prominente quodam medio apice, odoris iucundi, radice Matth. nigra sessili aliquantum lata, rapi ferè effigie.

LOCVS.

Nascitur vmbrosis locis, & DIOSC. maximè sub arboribus, & in Matth. fructetis, secus itinera.

QUALITATES.

Varias vires obtinet, nam Gal. li. 3. abstergit, incidit, venarum o. simp. me. ra aperit, attrahit, digerit, de- Matth. tergit, & prouocat.

VIRES.

Radix tā hausta, quàm cli. Mesues. stere infusa lentā pituitam mi DIOSC. rificè detrahit. Colicruciatus tollit à pituita progenitos, aut ab induratis excrementis. Succus in errhinis additur ad expurgandū cerebrum. Finit enim diurnos capitis dolores, ac etiā Hemicranios: resolutis opitulatur, ac omnib⁹ Matth.

cerebri, & neruorū affectibus, à frigiditate abortis. Aqua e cyclamini radicib⁹ distillata si naribus sursum trahatur, fluentem inde sanguinem mirū in modum sistit. eadē pota sex vnciarū pondere, admista sacchari vncia, manantē è pectore, aut ventriculo, aut iocinore sanguinē mirificè cohibet. contusæ radices recentes illinuntur vtiliter scyrrhosis, durisq; tumorib. & strumis: additur quoq; succus cōmodè in vnguentis, quæ ad splenis tumorē duritiemq; parant. affricta recens radix hemorrhoidas eiicit, earundē succus aurib. instillat⁹ vnà cū rosaceo, aut vini modico, aurū sonos, & sorditatē tollit. Abdomini illit⁹ vètrē subducit, illita radix serpentū ictib⁹ auxiliatur. Eadē excauata, oleo replet, & addito cere mometo, cineri feruenti imponitur. Coquiturq; vnguentū ad perniones vtile.

Z 3

*CYCLA-



CYCLA-

* CYCLAMINVS longius radicans, Græcis, κυκλάμινος μακρορρίζος.

CYCLAMINVS MACRORRHIZO*

F O R M A.

Folijs prouenit alterius, hederaceis maculosis, & flores quoque similes promit colosinos, radice verò differt, quæ infima parte rotunda quidem est, sed superius gracilescit & in longitudinem mite sursum versus protenditur.

L O C V S.

In monte Saleua Galliæ, & alibi etiam inuenitur. *



DRA-

DRACUNCVLVS maior. Græcis, *Δρακόντιον ἢ δρακοντίνα μεγάλη*. Arabibus, *Luf*,
sive *Alluf*. Officinis, *Serpentaria maior*. Italis, *Dragonea*, & *Serpentaria maggio-*
re. Hispanis, *Turagontia*. Gallis, *Serpentine*.

DRACUNCVLVS MAIOR.

GENERA.

Tria Dracunculi reperiuntur genera: Maior, Minor, Aquaticus.

FORMA MAIORIS.

Maior, caule habet rectum, DIOSC.
bicubitalem, lauem, baculi
crassitudine, verticilloribus,
serpentium maculis, purpu-
reis tamen pluribus, folia ru-
micis sibi inuicem implicita.
Fructum summo caule facit
racemosum coloris primum
cineracci per maturitatem ve-
rò crocci, in purpurā vergen-
tis, radicem habet prægran-
dem, rotundam, candidam,
tenui cortice obductam.

LOCVS.

Gignitur in umbrosis, præ DIOSC.
fertim circum septa.

QUALITATES.

Quiddam Aro persimile Gal. li. 6.
obtinet, tum radice, tum fo-
liis, verum acrius est, & ama-
rius, ac proinde magis calfa-
ctoria, & subtilium partium,
quin etiam leuiter adstringit.

VIREs.

Radix cruda, coactave delingitur ex melle vtiliter anhelosis, astmaticisq; DIOSC.
quin etiam conuulsis, tussientibus & destillationibus obnoxijis: ex vino pota-
venerem stimulari: vlcera, quæ eacoëthe vocantur, & phagadænica expurgat,
præsertim cum bryonia. fiunt collyria ex ea, & melle ad fistulas, & partus euo-
candos: illinitur cum melle efficaciter ad vitilignes: polypos, & carcinomata
absumit. succus præstat ad oculorum nubeculas, albugines, atq; caligines. idem
ex oleo infusus aurium doloribus medetur. à vipera feriri non posse affirmant,
qui folia, aut radicem manibus affricuerit.

* CENSURA.

Peritiores omnes putant hanc Iconem esse fictitiam; & forsitan ex serpen-
taria aliqua conflata. *



DRACUNCVLVS minor, Græcis, *Δρακοντίς μικρά*. Italis, *Dragoneta*, & *Serpentaria minore*. Germanis, *Klein Natterwang*. Gallis, *Petite Serpentaire*.

DRACUNCVLVS MINOR.

FORMA.

Diosc. Folio constat hederaceo magno, candidis maculis insignito, caule recto, bicubitali, versicolore, purpureis maculis resperso, ita ut anguem planè referat, baculi crassitudine. Fructus summo caule è vagina quadam externa parte herbacea, interna verò nigricanti purpura infecta, corniculi speciem præ se ferens exoritur, qui tandem fracto corniculo in racemi, vix modum emergit, feruenti, ac mordaci gustu, radice niritur rotunda, bulbosa, acri, tenui libro obducta.

Matth.

LOCVS.

Diosc. Nascitur in sepibus umbrosis.

QUALITATES
ET VIRES.

Idem.

Iisdem poller viribus, quibus maiorem pollere diximus. Peculiariter autem folia casum à putredine defendunt, qui ijs inuoluitur. Estur radix cruda, coctave placentarum loco in conuiuijs cum multo melle in Balearibus insulis.

* DRA-



* DRACUNCULI folia nouella cum radice.

F O R M A.



Cognosci potest ex hac Icone varietas & mutatio foliorum radicumque Dracunculi. Dum enim plantæ adhuc nouellæ sunt, radicula ipsarum oblongæ aliquantum sunt vt Ari, folia primo exortu conuoluta prodeunt, simplicia, sine adnatis, mox appendices annectuntur geminæ, vbi ipsa pediculo coniunguntur, nec mutantur porro sed æstate subinde flaccidiora redduntur, donec eo ipso anno autumnii initio penitus cōcidant. Sed temporis processu auctæ radices protrudunt vere caules maculatos pluribus folijs donatos, initio quidem complicatis & non in plura diuisis, sed vt plurimum quasi tribus, quorum inferiora bina parua, medium grandius sit, composita, sed paulatim augetur horum numerus, inq; plures partes di-

uiduntur ipsa folia vbi fructus efformari incipit, vt ex præcedenti imagine apparet. Radicum adultiorum quoq; quibus pusilli fetus copiose annascuntur, diuersitas multiplex obseruari potest, interdum enim rotundæ, interdum oblongiores, interdum quadrangulæ propemodum inueniuntur, vel aliter etiam effigiatæ. *

Z S


DRA-

DRACUNCVLVS aquaticus. Italis, *Serpentaria aquatica*. Germanis, Wasser
Natterwurk.

DRACUNCVLVS AQUATICVS.

FORMA.

Folij exit corni arboris si-
milibus, radice arundinacea,
geniculata, longa, & Ari mo-
do feruens. insuper ex geni-
culis ipsis numerose exeunt
fibrae, quibus pertinaciter
humi inhaeret: à radice folia
prodeunt oblonga, è quo-
rum exortu alia exurgunt lon-
gis pediculis nitentia, sed ijs
grandiora, tenuioraque ha-
bentur, è quorum nonnullis,
que conclusa sunt, fructus ra-
cematim enascitur. baccis
per maturitatem rufescenti-
bus, in quibus semen est ni-
grum, paruum, & oblon-
gum, crasso quodam succo
obductum.



Locvs.

Nascitur in montanis lo-
cis, sed humectis, & palu-
dibus.

FACULTATES, ET VIRES.

Non differt viribus ab Aro, & alijs Dracunculi generibus, sed facultate im-
becilliore habetur.

DRA-

DRACUNCVLVS hortensis, Italis, *Dragoncello*, & *Dragone*. Gallis, *Targon*.
Germanis, *Dragum*/oder *Dragoncell*.

DRACUNCVLVS HORTENSIS.



F O R M A.

Caules fundit numerosos, *Mattb.*
tenuis, in quibus folia ex-
unt longa lini modo, acri ad-
modum gustu: radicibus co-
haeret humi repentibus. flo-
ribus pusillis, albicanibus,
racemosis semine superua-
cua.

L O C V S.

Seritur in hortis ferè o- *idem*.
mnibus.

Q U A L I T A T E S E T
V I R E S.

Cum insigni acrimonia *idem*.
planta tota sit praedita, haud
verendum est quin valenter
excalfaciat, atque siccet, in-
cidat, digerat, aperiat, & pro-
uoct: mansa pituitam ciet:
dœrium dolores mulcet: con-
coctionem adiuuat, & vri-
nas mouet, Estur passim in
acerarijs vnâ cum lactucis, a-
lijsq; oleribus.

O P H I O -

OPHIOGLOSSVM, Græcis, ἐφιδάσσοον. Italis, *Lingua serpentina*, Argentina, *fiu⁸ herba Lucciola*. Germanis, *Natter Zünglin*. Gallis, *Herbe sans chousture*, *fiue Lan⁸ gue de serpent*.

OPHIOGLOSSVM.

FORMA.

Matth. Vno tantum provenit folio pingui, plantaginis aquaticæ quadantenus simili, nulla per medium excurrente costa: è cuius inferiore sinu, cauliculus exit, pallidam, serpentis modo, in summitate ligulam gerens, unde illi nomen.

LOCVS.

Idem. Nasceitur in pratis. sed ocys-
simè deperit, cum tantum
mense Maio perduret & ap-
pareat.


QUALITATES

Idem. Exiccat, citra insignem ca-
liditatem.

VIREs.

Idem. Recentia folia vulnera mi-
rifice glutinant, & enterocel-
las sanant. Maceratur in oleo, quo diutius insolato, vtuntur chirurgici com-
modissimè ad prædicta. Datur potanda ex aqua equiseti ad intrinseca vulnera:
auxiliatur sanguinem reiicientibus, pota ex aqua foliorum quercus alba vteri
excrementa sistit: decoquitur in vino austero ad collachrymantes oculos. Illi-
nitur recens cum adipe gallinæ ad vulnerum inflammationes.

ARVM



ARUM, Græcis, *ἀγρον*. Muiritanis, *lauru*, *sive Sora*. Siris, *Lupha*. Officinis, *Aron*
sive serpentaria minor. Hetrulæis, *Gigaro*. Germanis, *Klein Watterburg*/Aron,
 Deutscher Zimter. Hispanis, *Taro*. Gallis, *l'it de chien*.

ARUM.

CENSURA.

Duum est generū: maius, & *Matth.*
 minus.

FORMA.

Hederaceis prouenit folijs, *Idem.*
 sed magnis, dracunculi maio-
 ribus, minimè dissectis, maculo-
 sis: caulem edit dodrantalem,
 è cuius fastigio erumpit folli-
 culus in acutum desinens, in
 quo fructus reconditur soli-
 dus, pistilli faciem referens, au-
 reo colore: in cuius infima par-
 te crocea quædam veluti semi-
 na spectantur: quæ deinde aci-
 nosa fiunt & per maturitatem
 rubescunt, botrūq; circa cau-
 lem efficiunt: frumenti Indici
 modo. Radix subest alba, bul-
 bosa, oblonga, acerrimi gustus.

QUALITATES.

Terrena essentia cōstat, sed *Gale. 8.*
 calida, proinde extergēdi vim *simp. me.*
 possidet, verū nō valentem,
 veluti dracontium: est itaq; in
 exiccando, calefaciendoq; pri-
 mi ordinis. Abstergit, incidit, *Matth.*
 attenuat, digerit, & aperit.

VIRES.

Radix, semē, & folia dracun *Diosc.*
Matth.

culi vires habent. Priuatim autem radix ex fimo bubulo podagris vtiliter illi-
 nitur. Decocta radix, melleque excepta; medetur pituitosis pectoris morbis.
 quare asthmaticos maximè iuuat. Datur elixa, vel seruientibus cineribus tosta
 ex amygdalino oleo vtiliter rufientibus. Id quod commodius præstat lac, in
 quo ipsa fuerit incocta. Elixia subijcitur oleo, & tumentibus hæmorrhoidibus
 vtiliter illinitur. Radicis succus exedentia, & contumacia vlcera sanat: semen
 drachmæ pondere potum, menses, & secundas pellit.


CENSURA.

Nescio sanè qua ratione scripserit Galenus, Arum, quo degustato os totum
 exurit, & acerrimum sentitur, calidū, siccumq; ordine tantum primo haberi.

PISTIL-



PISTILLVM referens Ari flos, & eius radix vegetior.



ARVM

tes: m
ne po
reccm

NOMINA
 ARVM minus, Græcis, *ἄρον μικρόν*. Italis, *Gigaro minore*.
 ARVM MINVS.

367

FORMA.



Folijs exit sagittæ imaginem *Matth.*
 præferentibus, caule recto,
 glabro, dodrantali, botrum in
 cacumine habenti, rubenti-
 bus baccis stipatum, in acu-
 tum desinentem: Radices fun-
 dit tenues, numerosasque, è
 quibus bulbosi quidam glo-
 buli fabarū magnitudine de-
 pendent, gustu per quam acer-
 rimo.

LOCVS.

Nascitur in montibus. *Idem.*

QUALITATES ET
 VIRES.

Excalfacit, & siccit ordine
 quarto: Ideoq; vrit, attenuat,
 incidit, & abstergit. Sunt qui
 radicū farina vtantur ad ar-
 cendos à suis mensis paraliti-
 cos, & voraces lurcones; ean-
 dem delicatis cibis admiscen-
 tes: nam vbi fauces occupauerit, tam vehementi, ac contumaci ardore afficit,
 ne post hac quicquam vorare queant, nisi lacte bubulo diutius gargarizato, aut
 recenti butyro sensim delincto.

BONVS

BONVS Henricus, Italis, *Herba infarinata*. Germ. *Schmerbel* / *sive Gut Henrich*.

BONVS HENRICVS.

FORMA.

Matth.

Planta candicat tota perinde ac si tenuissimo farinæ polline conspersa esset: quin etiam tactu, aded levis percipitur, vt vngue aliquo peruncta videatur: Folia habet Ari quadantenus similia, caules plures, foliosos, in quorum fastigijs racemoli emergunt flores; Radicem habet vegetam, crassam, multifidamque: croceo colore, acuti lapathi modo: cuius speciem esse censemus.



LOCVS.

Idem.

Nascitur sponte ferè vbi- que in pagorum plateis.

QUALITATES.

Idem.

Excalfacit, siccatur, aperit, abstergit, resoluit, & digerit.

VIREs.

Idem.

Præfertur ad venenosorum animalium ictus: Radicis succus illicitus, scabiem sanat, & cutis maculas extergit, præsertim, si cum aceto misceatur.

ARI-

NOMINA.

369

ARISARVM, Græcis, *Agizagov*. Italis, *Arifaro*. Germ. *Klein Krott*.

ARISARVM.

FORMA.

Folijz prouenit Ari, longè *Matth.*
tamen minoribus: cauliculum
edit tenuem, in cuius summi-
tate vaginula quædam oritur,
altera parte diuisa, è qua ligula
tenuis, exigui germinis modo
se se exerit, pallido colore. Ra-
dix illi oliuæ instar magna, ob-
longa, candicans, adnatis plu-
ribus vbiq; emergentibus.

LOCVS.

Nascitur in collibus, & cam- *Idem.*
pestribus.

QUALITATES.

Acrius multò Arifarum, *Gal. 6.*
quàm Arum est. *simp. me.*

VIREs.

Radix illita, nomas sistit: si. *Diosc.*
unt collyria ex ea ad fistulas ef-
ficacia: illitu radicis, genitale
animalis cuiusq; in pernici-
em agitur.

Aa

ARI.

ARISARVM alterum: siue Pseudo arisarum. Italis, *Arisaro falso*.

ARISARVM ALTERVM.

FORMA.

Matth. Folia mitri longa, angusta, longis pediculis nitentia: radicem bulbosam, iuglandis magnitudine, numerosis vbiq; adnatis fibris, gustu etiam acuti.

LOCVS.

Idem. Nasctur frequens in agro Romano.

QUALITATES, ET
VIRE.

Idem. Excalfacit radix, siccatur, incidit, abstergit, digerit, & aperit.

* APPENDIX.

Non omnino segregari potest à speciebus Arisari cum gustata radix satis prodatur acedine suam, id quod ipsemet autor fatetur paulo supra, in descriptione huius plantæ, licet idem pro falso Arisaro habeat.*



HAST.

NOMINA.

371

HASTULA regia, Albucum, Asphodelus mas. Græcis, Ασφodelος. Mauritanis, Cheunce, Biruach, seu Axeras. Italis, Anfidillo. Germanis, Affodillwurz. Hispanis, Gamones, seu Gamonites. Gallis, Aprodiles.

HASTULA REGIA, SEV ASPHODELVS.

FORMA.

Planta est à radicibus folio. *Matth.*
 fa: folijs porraceis, carinatis,
 caulē edit cubitalem, & sæpe
 maiorē, insigniter leuem, flo-
 res in cacumine albicantes, &
 quandoq; melinos, numero-
 sos, in stellę modum; è quibus
 bacca proueniunt subrotun-
 dæ, herbacei coloris, semine
 intus nigro triquetroq;: Ra-
 dicibus nititur numerosis, ni-
 gricantibus, bulbosis, oblon-
 gis, virescēte intus pulpa, ima
 parte vētricosis, & in tenuem
 caudam desinentibus, succo-
 sis: gustu acri, atq; amaro.

LOCVS.

Nascitur in montibus pin- *Idem.*
 gui solo.

QUALITATES.

Radix extergentis, & discu- *Gal. 6.*
 tientis est facultatis; vltæ au- *simp. me.*
 tem cinis calidior, & desicca-
 tior, subtiliorq; est, & ad dige-
 rendum potentior.

VIREs.

Radices epotæ vrinæ, & *Diose.*

menses ducunt: auxiliantur à serpente demorsis trium drachmarum pondere
 haustę, sed tota planta ex vino morsus illinire oportet. valent quoq; ad sordida,
 & depascendi vlceræ; mammarum quoq; & testium inflammationes, tubercu-
 la, forunculosq;. Radicis succus per se, prodest ad purulentas aures: in contrari-
 am aurem infusus, dentium dolorem mitigat: cinis è radice illitus, pilos, capil-
 losq; in alopecijs replicat. oleum in excauatis radicibus feruefactum, pernio-
 nibus, & ambustis medetur: in auribus distillatum, surditati auxiliatur. Semen
 in vino potum scolopendrę & scorpionum venenis mirum in modū resistit. Illi- *Matth.*
 nuntur vtiliter radices in aceto decoctę lichenosis, scabiosisq;: crispantur quoq;
 capilli abrafo capiti affricta sæpe radice, decoctæ & illitæ parotidas sanant.

Aa 2

* ASPHO-

* ASPHODELVS foemina siue luteus, *Iphyum* Theophrasti quorundam sententia, aut aliorum, *Eriophorum* Arabum. Germ. Gelb Affodillkraut.

ASPHODELVS FOEMINA.

FORMA.

Folia multo angustiora quam albus, & Cypero ferè similia, striata saturatè virentia promittè radicibus multiplicib. longis, minus tuberosis, per laterales fibras sese vndiq; propagantibus, colore luteolis, Caulis hinc emergit cubiti altitudine, rectus, rotundus, in quo flores crebri lutei, fastigiati, stelliformes, gignunt semen nigrum triquetrum, subrotundis capitulis inclusum.

LOCVS.

Hortis est familiaris. Spontè natus quod sciam non reperitur.*



BYLEVS

BVLBVS vomitorius, Græcis, Βίλβο-ἐμετικόν, Mauritanis, Zir. Italis, Cipollacina.

BVLBVS VOMITORIVS.

FORMA.

Folia habet esculento bul- Diosc.
bo multò latiora, & longiora,
radicem similem, nigro obdu-
ctam inuolucro.

LOCVS.

Nascitur cliuosis locis. Matth.

QUALITATES.


Calidioris est temperatu- Gal. 8.
ræ, quàm bulbus esculentus. simp. me.

VIRES.

Radix mansa, aut decoctum Diosc.
eius porum, vesicæ malis me-
detur. vomitiones mouet.

* APPENDIX.

Videtur depinxisse autor
Bulbi Vomitorij loco ob odo-
ris, quem spirant flores, præ-
stantiam familiare Turcis di-
ctum Muscari, ideoq; hoc i-
psum hic expressimus.*



Aa 3

SCILLA

SCILLA Græcis, Σκίλλα. Arabibus, Haspel, Hansel, Aschil, siue Alaschi. Italis, Squilla. Germanis Meerzwibel. Hispanis, Cebolla albatrana. Gallis, Squille, carpentaire, siue Oignon marin.

SCILLA.

FORMA.

Math. Bulbo nititur ingenti, subrubro, radicibus inferna sede numerosis: squamis crassis, lento succo prægnantibus, acti, & amaro, folia mittit aloes similia, caulem sesquicubitalem, læuem, & flores in summitate subpurpureos.

LOCVS.

Idem. Nascitur maritimo tractu.

QUALITATES.

Qualitatem admodum incidentem obtinet, non tamen admodum calidam, itaq; secundi ordinis exalfacientium fuerit: præstat autem, aut assam, aut elixam sumere, sic enim virium illius vehementia exoluitur.

VIRE.

Diosc. Interna scillæ pars in oleo seruefacta, rimis pedum vtiliter admouetur. decocta in aceto illinitur ad viperarum morsus: tosta, & odoratis medicamentis admista, hantiaq; urinam ciet, hydropicos, stomachicos, auriginosos, torminibus, & tussi vetere laborantes, suspiriosos, & reuomentes iuuat, tribus obolis ex melle sumpta, quin etiam comitialibus & resolutis auxiliatur. sed cauendus scil-

Pithagoras.

le vsus his, quorum intestina vlcibus afficiuntur. Scillinum quoq; acutum admirabilis est ad multa facultatis, si quis enim quotidie parum ebiberit, illi quidem faucium, orisq; partes nunquam male valebunt: os ventriculi beneualebit: facile spiritum ducet: oculi acutissime cernent: flatus nullus in ventre excitabitur, & bene spirans, beneq; coloratus deget. hoc aceto qui vitur cibum bellè conficiet, etiam si licentiosius edat: nihil superuacui in corpore residebit, non flatus, non bilis, non cruditus, non stercus, non vrina, alius lubrica omnino erit. Morbo comitali diuturno efficaciter profuit, incipiens verò ac nouum per seclè discutit: ad podagras præterea, & ceteros articulares morbos, & ad iccoris, lienisq; duritias efficaciter facit.

CAPPA.



NOMINA.

375

CAPPARIS, Græcis, Κάπρις. Arabibus, Cappar. Italis, Capparo. Germanis, Capren. Hispanis, Alchapparras. Gallis, Cappres.

CAPPARIS.

FORMA.

Aculeatus est frutex, qui in ter Diosc. ra stratus, magis in orbem euagatur: spinas, ut rubus habet in hami modum aduncas: folia mali cotoneæ, rotunda: fructum oleæ similem, qui cum dehiscens panditur, florem candidum promittit: quo excusso, non nihil glandis oblongæ figura inuenitur, quod apertum grana acinis puniceorum similia ostendit, parua, rubicunda. Radices spargit lignolas, grâdes, numerolasq;.

LOCVS.

Tenui solo, asperisq; locis, in Idem. insulis, & iuxta rudera nascitur.

QUALITATES.

Radix cortex vincentem habet Gal. 7. qualitatem amaram, proxima acrem, deinde acerbam: qui simp. me. bus palam est, quod diuersis, & pugnantis constet facultatibus. quippe abstergere, purgare, & incidere potest sua amaritudine, exalfacere verò, incidere, digerere, acrimonia: porro densare, constringere acerbitalis, verum imbecillius operantur.

VIRE.

Fructus drachmis duabus in vino porus quadraginta diebus, lienem absumit, Diosc. & urinam pellit: bibitur vtilissimum Iſchiadicis, resolutis, conuulsisq; mensis ciet, & caput purgat: seminis, aut aridæ radices ex aceto decoctum, colluto ex eo ore, dentium dolores mulcet. radicem cortex, vlcera vetera omnia, & sordida, callosaq; expurgat: lientosis, cum hordei farina vtiliter illinitur: cum aceto trita, albas vitiligines abstergit: Radix foliaq; intrita, strumas, ac duritias discutiant, foliorum succus infusus aurium vermiculos enecat. Fructus in ciborum usum venit, sed pa Matth. rum aliter valet tam ad excitandam cibi appetentiam, & deradendam, deiciendamq; pituitam, quæ ventriculo inhaerit, & ad lienis, & iecoris morbos.

Aa 4

* CAP-



* CAPPARIS Sylvestris seu Fabaginea vel Leguminosa, Pepleos quibusdam dicta, Auicenna *Ardifugi* vel *Ardifrigi*. Rhafi *Andirian*. Alepi in Syria *Morgani*.

CAPPARIS SYLVESTRIS.

F O R M A.


Egregie virent huius plantę folia, Cappari similia sed minora & oblongiora, crassiuscula, bina vnico pediculo cauliculis teretibus, leuibusq; annexa & sibi inuicem opposita. Flores Capparibus conditis forma congruunt antequam aperiantur, foris herbidi, expansi vero albicant & intus rubent, è medio stamina lutea emergunt, his succedunt siliquę oblongę in quibus semina. Radix subest longa lignosaq;.

L O C V S.

Nobis peregrina est planta, nec nisi in hortis inuenienda. Sed Romę inter rudera sponte nasci perhibent.

V I R E S.

Vsurpatur ad vermes, tota enim planta grauis est odoris & saporis amari.*



LEPI-

LEPIDIVM, Græcis, *Λεπιδιον*. Mauritanis, *Saitaregi*, *Hansab*, *Asceitaregi*, *sive Scitharegi*. Italis, *Lepidio*, seu *Iberide*. Germanis, *Wilder Kress*. Hispanis, *Nasturtio montefino*. Gallis, *Passerage sauvage*, *sive Nasturt sauvage*.

LEPIDIVM.

FORMA.



Folia gerit nasturtij: vere *Diosc.* virétiora, caulem cubitalem, *Matth.* aut minorem, florem album, tennemque. Semen circum summos tenuesque cauliculos in siliquis, nasturtij æmulis, sed minoribus, minuto intus semine. Radicem albam, acris sapore.

LOCVS.

Nascitur locis incultis, saxosis: in templorum arcibus, atque sepulchris, secus itinera, in rudibus, & agrorum extremitatibus. *Democr.*

QUALITATES.

Excalfacit & siccatur, magis *Matth.* quàm nasturtiū extrahit, attrahit, incidit, attenuat, aperit, digerit, & vrit.

VIREs.

Præstat mirum in modum Ischiadicis, si cum Helenij radice, quarta parte horum *Diosc.* re illinatur. Idem præstat contusa radix & cum salsa axungia illita, quaternis horum *Democr.* ris. sed deinde in balneum descendere ægrum oportet, & locum cum oleo inungere; addita lana: herba lienosis admodum prodest: eadem lepras eximit.

CENSURA.

Qui Lepidium, & Iberidem duas faciunt plantas, manifestè falluntur.

Aa 5

LEPIDIVM,

LEPIDIVM, Paulo Aeginetæ, & Plinio: posterioribus Græcis, *Λεπιδιον*. Italis, *Piperite*, & *Peperella*. Gallis, *Passerage*, siue *Poyuree*. Germanis, *Pfeffer Kraut*.

FORMA.

Matth.

Caulibus cubitalibus fruticat, subalbicantribus: folijs lauri, maioribus tamē, robustis, floribus in cacumine spicatis, tenuibus, ac albicantibus. Radice alba, acerrimi gustu, perinde, ac folia, quæ dentibus attrita os vniuersum accendunt.

LOCVS.

Idem.

Seritur in hortis, ac etiam quibusdam in locis sponte nascitur.

QUALITATES,
ET VIRES.

Idem.

Excalfacit & siccit vehementer, ac ea omnia potest, quæ lepidium primum, cæterum longè valētius operatur.

LEPIDIVM.




RAMVLVS

Tralis,
caut.

NOMINA.

379

RAMVLVS Lepidij cum flore & semine.



IVLV5

RANVN-

RANUNCULVS, Græcis, Βαρυάχιον. Italis, Ranoncolo, *sive* Pie corbino. Germanis, Hanen Fuß. Hispanis, Terna belida. Gallis, Grenoilette, *sive* Basintz.

RANUNCULVS.

GENERA.

Matth. Sex nobis Ranūculi recensentur genera: de quibus inferius dicitur.

FORMA.

DIOSC. Folijs exit coriandri latioribus, pinguibus, subalbidisq; floribus luteis, & interdū purpureis, caule gracili, cubitali: radice alba, exigua, amara, & ellebori modo fibrata.

LOCVS.

Idem. Nascitur in limitib. humidis.

QUALITATES.

Gal. li. 6. Omnia facultatē vehementer acrem possident, adeo, vt cum dolore exulcerēt. Radix arefacta, sternutatorium est medicamentum, similiter alijs omnibus, quę vehementer desiccant, & vt semel dicam, calida & sicca valde est, tum radix, tum vniuersa herba, adeo vt sua exiccatione, sicca radix dentes quoque frangat.

VIREs.

DIOSC. Folia, flores, & cauliculi recentes cuiuscunque generis, exulcerant illita, & crustas non sine dolore exciunt: quare scabros vngues eximunt: scabiē detrahunt, & stigmata delent: pensiles, & fornicantes verrucas, alopeciasque paulisper illita, tollunt, tepente decocto fouentur vtiliter perniones: sicca radix, tritaque sternutamenta ciet, naribus indita.

CENSURA.

Qui Ranunculum coronopum esse contendunt: ij sanē delirio agitantur.

RANUN-



RANUNCULVS SECVNDVS.

FORMA.



Ranunculus secundus, la-^{DIOSC.}
 ruginosior, hirsutior, quàm
 primus est, longioribus cauli-
 bus, & pluribus foliorum in-
 cisuris.

LOCVS.

Plurimus in Sardinia nasci-^{Idem.}
 tur, quàm acerrimus, quem
 sylvestre apium appellant.

QUALITATES,
ET VIRES.

Apium risus quidā hoc ra-^{Matth.}
 nunculi genus appellauere,
 quòd si herbā hanc, quispiam
 in edulij vorauerit, eius ner-
 ui contrahantur, rictūque os
 diducatur: vt grauissimi testan-
 tur autores, ita vt qui mortem
 oppetunt, veluti ridentium fa-
 cie intereant.

RANUNCV-

F O R M A.

Minoribus prouenit folijs,
floribus melinis: sed tota plan-
tagrauem spirat odorem.



RANUN-

RANUNCULVS QVARTVS.

FORMA.

Non est abſimilis tercio: ſo Dioſc.
lia tamen magis diuſa ſunt: Matth.
florem edit lactei candoris.
Radices numeroſas, fibroſas-
que.

*LOCVS.

Nascitur in montibus, &
in hortis. flores numeroſiore
folio luxuriant. *



RANUNCV-

RANUNCVLVS quintus. Italis, *Pie di Gallo*. Germanis, *Drüſenwurſ*. Gallis, *Piepou*.

RANUNCVLVS QVINTVS.

F O R M A.

Math. Folia mittit ſecundi ferè ſimilia, atque etiam hirtiora, radices albas, numeroſas, elebori modo, inter quas medium occupat locum, tuberoſa radix dependens, veluti ex funiculo, nucis iuglandis magnitudine, albicans rapioſo, ſed acris, & exulcerans.

L O C V S.

Idem. Naſcitur locis ingultis, & ſecus itinera.

Q V A L I T A T E S,
E T V I R E S.

Idem. Excalfacit & ſiccatur ordine quarto: vlcera, extrahit, incidit, digerit. Radix recens tuſa & admota, veſicas excitat, quare iſchiadicis vtiliter illinitur.



RANUNC.

FORMA.

Folia mittit anemonis pri- *Math.*
mi similia: caules cubitales,
striatos, flores in summitate
magnos, aureo colore: radi-
ces numerosas, fibrosasq;.

LOCVS.

Nascitur in riguis, & hu- *Idem.*
meis locis.

QUALITATES, ET
VIRE.

Ceteris minus est acris,
qua re minus excalfacit, &
siccat.



Bb

ANEMO-

ANEMONE, Græcis, *Ανεμώνη*. Italis, *Anemone*. Gallis, *Passe fleur*. Arabibus, *Iackak*, *Alnahamen*, *Sakaik*, seu *Mamira*.

ANEMONE.

G E N E R A.

Matth. Plura habet genera, quorum quinque nos obseruauimus.

F O R M A P R I M I.

Diosc. Folio prouenit coriandro simili, sed frequentioribus incisuris, caulibus lanuginosis,

Matth. tenuibus, striatisq; in quibus tenuiora folia per interualla spectantur: floribus syluestris papaueris magnitudine, purpurascens, prominente umbilicotenus capitulo, nigro colore, nigrisque capillamentis stipato, perinde ac in papauere. Radix illi inest olea magnitudine, subrotunda, fibrataq; ac sapore acri.

L O C V S.

Idem. Oritur in aruis, & alijs cultis locis.

Q U A L I T A T E S.

Gal. 6. Anemone omnes, acrem, *simp. me.* extergendi, attrahendi, & ora vasorum referandi facultatem obtinent.

V I R E S.

Diosc. Succus cum foliorum, tum radice naribus infusus, caput purgat. comman-
ducata radix pituitam trahit: decocta in passo, & illita, sanat oculorum inflam-
mationes, cicatrices eorundem, & hebetudines emendat: sordida ulcera abster-
git. Folia, & caules, si cum ptisana cocti edantur, lactis copiam præbent: & in
vellere folia supposita, menstrua cient, & lepras illita eximunt.

ANEMO-



bibus,

NOMINA.

357

ANEMONE secunda, Italis, *Anemone secundo.*

ANEMONE SECVNDA.

FORMA.

Folijs prouenit maioribus, *Matth.*
frequentius laciniatis, cyno-
ctoni aconiti modo; caulibus
alterius similibus, sed aliquan-
to crassioribus, inanibus, & in
rectum spectantibus, quibus
flores insunt in summitate di-
lutiore purpura nitescentes:
capitulo circumqua; coma-
to: perinde, ac altera. Radicem
habet breuem, rapunculi ferè
figura, fibris adnatis multis: a-
cri gustu.

LOCVS.

Nascitur locis cultis, & præ- *Idem.*
fertim in aruis.

QUALITATES, ET VIRE.

Nihil suis in facultatibus à *Idem.*
priori differt.



Bb 2

ANEMO-

intran-
inflam-
abster-
ar: & in
EMO-

F O R M A.

Matth. Folij est ranunculi primi
similibus, caulibus tenuibus,
sesquipalmatis, rotundis,
in quorum cacumine flores
exerunt albi, ac diluta quadam
purpuranitescentes, inferiori
præsertim sede rosarum ma-
gnitudine, radicem habet fi-
bratam, ac tenuem.

L O C U S.

Idem. Nascitur in collibus.

Q U A L I T A T E S, E T
V I R E S.

Idem. Tota planta cæteris mitior
est, quare minus exalfacit, &
siccatur.



ANEMO-

NOMINA.

389

ANEMONE QVARTA.


FORMA.

Folia profert frequenter la-
ciniata, flores in summitate
caulis purpureos, radicem glo-
bosam, & parvam, fibris nu-
merosis stipatam.

LOCVS.

Prouenit cultis locis.

Idem.



Bb 3

ANEMO-

* F O R M A.

Folijs provenit ranunculi
ferè, sed tenerioribus, floribus
aureis, radice parvæ fabæ ma-
gnitudine.*


L O C V S.

Oritur cultis locis, & in arvis.



* ANEMO.

* ANEMONES diuersi flores.



Plurimæ species Anemones habentur aded vt ferè quibus peculiare depingat ab alio nō obseruatas. Ideo non putauī superuacuum fore, si reliquis, quas coactus fui subdere depictis ab autore nec dum à me cōspectis, adiungerem corollarij vice rariores hosce flores, quorum A. litera insignitus candidus est, & medio luteus, B. Cæruleus, C. aureus, D. Purpureus variegatus venis subrubris, E. Coccineus. Eorum vero stirpes cum radice nondum videri mihi cōtigit.*

Bb 4

PVLGA-

PVLSATILLA. Italis, *Pulsatilla*. Germanis, *Rüchen Schell*/ seu *Hacket Kraut*.
 Gallis, *des coquerelles*.

PVLSATILLA.

F O R M A.

Matth.

Cum primum erumpit folia mittit incana, & admodum hirsuta, minutim laciniata, sapore per quam acris: flores prodeunt anteaquam folia emergant purpurei, nigricantes, atque hirsuti, caule rotundum, tenuem atque incanum. Radix illi subest pedali longitudine, exesa chamæleonis albi modo, sapore potius subdulci, quam acris.

L O C V S.

Idem.

Prouenit locis incultis, aridis, & saxosis.

Q U A L I T A T E S.

Idem.

Folia, caules, & flores cum acerrimo sint gustu, exalfaciunt, & siccant ordine quarto: incidunt, attenuant, attrahunt, digerunt, expurgant, & exulcerant. Radix verò cum subdulcis sit, non longè aberit à temperatis.

V I R E S.

Idem.

Sunt qui radicem maximè præferant contra pestilentia contagia, & pota venena, & virulentorum animalium ictus, si cum vino bibatur, drachmarum duarum pondere, quare in antidotis additur. Aqua è folijs distillata, vulnera sanat, & pota sudorem prouocat.

*PVLSA-



*PULSATILLA lutea. Gölle Ditzvurk.

PULSATILLA LUTEA.

FORMA.

Folijis prouenit minus lacinatis quidem, sed cætera præcedenti similibus, flos Maij medio luteus subrubens summo cauliculo insidet, quem subsequitur semen papposum, barbaturque.

LOCVS.

Gaudet montanis, & in Heluetia frequens est in monte Gothardi.*



Bb 5

ANAGAL

et. Scant.



, & pota
hmarum
lnerala-

PVLSA-

ANAGALLIS, Græcis, *Αναγallis*. Ital. *Anagallo*. Officinis, *Morsus Gallinae*. Germanis, *Chanch-Heil*. Hispanis, *Maruges*. Gallis, *Murgelline*, seu *Mouron*.

ANAGALLIS MAS.

G E N E R A.

Diosc. Duum est generum, Mas alterum, alterum fœmina.

F O R M A M A R I S.

Idem. Planta est parua, humi iacēs, folijs in quadrangulo caule pusillis, subrotundis; floribus phæniceis, & paruo, ac rotundo semine.

L O C V S.


Matth. Nascitur in hortis, culto, ac lato solo.

Q U A L I T A T E S.

Gal. li. 6. Admodum extergentis est fœmp. *me.* cultatis, habet etiam quendam calorem attractorium: vis etiam mitigandi illi inest.

V I R E S.

Inflamationes arcet: adactos corpori aculeos extrahit, nomas cohibet: succus gargarizatus, capitis pituitam purgat: & naribus infusus, dolorem dentium lenit, si in aduersam narem iniiciatur: argemas cum melle emendat: prodest contra viperarum morsus, iocinoris, & renum vitia si ex vino bibatur.



ANAGAL

ANAGALLIS foemina, Græcis, ἀναγallis θήλυς. Italis, Anagallo femi.

ANAGALLIS FOEMINA.



FORMA.

Nihil ab altera differt, nisi flo- DIOSC.
ris colore, qui in hac cæruleus, in
illa phæniceus spectatur.

LOCVS.

Nascitur cultis, & incultis lo- Matth.
cis. Et sæpe in hortis.

QUALITATES,
ET VIRES.

Vt forma similes sunt, ita facul DIOSC.
tatibus, & viribus: peculiariter au-
tem hæc, procidètem sedem ad-
mota reprimat: altera verò euo-
cat, vt quidam volunt.

*ANAGAL-

* ANAGALLIS Aquatica, Germanis, Wasserbungen/ Bachbungen. Gallis, Berle.

ANAGALLIS AQUATICA.

G E N E R A.

Distingui possunt potissim. duo eius genera, quamvis plura sint strictissimis folijs ab hisce differentia.

F O R M A.

Primum genus recto caule attollitur, folijs oblongis, carnosis, & leuiter in ambitu serratis vestito, ex quorum sinibus enascuntur ramuli copiosis flosculis purpurascensibus ornati, quibus succedit semē minutū exiguis folliculis inclusum, radix est fibrosa, ut aliarum herbarum palustrium. Alterum supinū est, & repit, folia habet rotundiora & flosculos eleganter cæruleos.

L O C V S.

Inuenitur in palustribus, & riuis gaudet.

F A C V L T A T E S.

Apud veterinarios magno est in usu discutiendis tumoribus & scabiei equorum sanandæ: in acetarijs sumpta stomachacem emēdat, calculos rumpit, urinam cit, fœtus mortuos pellit, & menses euocat. Cum aceto & butyro tosta & imposita, ac subinde renouata, tumoribus quibusuis & ignibus sacris prodest.*

S V C C I



NOMINA. 397
 SVCCISA, Officinis, *Morsus diaboli*. Italis, *Morso di diavolo*. Germanis, *Teuffels*
 Xbbj.

SVCCISA, SEV MORSVS
 DIABOLI.

FORMA.

Folijs constat plantagini *Matth.*
 angustifolijs similibus, leuio-
 rib. tamen, caulibus sesquicu-
 bitalibus, in quibus minora
 sunt folia per ambitum den-
 ticulata, flores edit scabiosæ
 similes. Radicem habet pol-
 licarem, sed succisam, & vel-
 uti demorsam, à qua complu-
 res oriuntur fibræ, ellebori
 modo.

LOCVS.

Prouenit locis incultis, sal *Idem.*
 ribus, ac dumetis.

QUALITATES,
 ET VIRES.

Herba trita & admota, *Idem.*
 præsentaneo auxilio, carbun-
 culis pestiferis medetur, aut
 si vinum bibatur, in quo in-
 cocta fuerit. Radix per se, aut
 vinum in quo efferbuerit po-
 tum, non modo vteri dolo-
 rum, res mulcet, sed pestilentie contagia superat. Gustu admodum amara est: quare

excoquit & siccat.

HEDI-



HEDERA, Græcis, Kieris. Maurita. Cussus. Ital. Hedera, seu Lella. Germ. Maiver
siue Baum Epheto/siue Ebiß. Hispan. Hedera, seu Eda. Gallis, Lierre.

G E N E R A.

H E D E R A.

Diosc. Hedera differētijs multas in
genere sortiē: summas autē ge-
nere tres, nā altera cādida, alte-
ra nigra, & tertia, q̄ Helix ap-
pellat. Nos autē alterā maiore,
alterā minorem appellamus.

Math.

F O R M A M A I O R I S.

Idem.

Maior, quā arboreā vocant,
nō solū in syluis excelsas arbo-
res scādīt, sed etiā antiqua ēdi-
ficia, vrbū mēia, sepulchraq;
adē occupat, vt tandē suo ar-
diori cōplexu, ea oīa diruat,
& vnā cū ijs collabat: folijs suo
exortu puenit oblōgis, q̄ dein
de tēpotis tractu triquetra e-
uadūt, leuia, crassa, robustaq;
Florere incipit ad finē Autu-
mni, floribus muscosis, palle-
scentibus, ē quibus racemosi
hyeme nascūtur corymbi, bac-
cis ligustrinis maioribus.

L O C V S.

Idem.

Nascit̄ in syluis, in cāpis, in
hortis, & ædificiorum muris.

Q U A L I T A T E S.

Gal. li. 7.

simp. me.

Ex cōtrarijs cōposita est fa-
cultatib⁹, habet. n. quiddā ad-
stringētis substantiē, quā terre-
nā & frigidā esse cōstat: habet & nōnihil acris, quā calidā esse, vel gustus cōpro-
bat: nec deest tertia: aqueā namq; substantiā quandā tepidā detinet, si viridis sit
in sicca enim exhalauit.

V I R E S.

Diosc.

Recētia folia ex aceto decocta, aut cruda, cū pane detrita, lienes sanāt. Folio-
rū, & corymborū succus narib. infusus, cū melle, pituitā deponit: valet idē con-
tra veteres capitis dolores, si cū aceto, & rosaceo perfundat: purulentis, aut do-
lentib. aurib⁹, cū oleo medet: baccę quinq; trite, & in malicorio, cū rosaceo fer-
uefactæ, si instillet oleū in contraria aure, dolorē dentiū mitigāt: corymbi triti,
ac subditi, mēles mouēt. Instillat⁹ succus, putrida tædia nariū, graueolētiāq;
emēdat: Lachryma psilothrū est. Illira pediculos necat. Foliorū succus ex vino
austero potus, lienosos sanat: consuta recētia folia, in pilci formā, papulosi ex-
ulcerat⁹q; infantū capitibus, vtiliter imponuntur.

Math.

H E D E -



NOMINA.
HEDERAMINOR, Græcis, Κισσός ἑλκή. Italis, *Hederaminore*.

399

HEDERA HELIX, SIVE MINOR.

FORMA.

Folio exit triquetro, ac ma *Matth.*
culoso: sarmentis albicanti-
bus, ac lignosis. Hæc humi
repat, & saxis hæret: fructus
nullo neque flore.

LOCVS.

Prouenit aridis & saxosis *Idem.*
locis, circa sepēs, & saxa gran-
diora.

QUALITATES,
ET VIRES.

Potest ea omnia, quæ ma- *Idem.*
ior: sed inefficacior tamen
est.



HEDER-

HEDERA terrestris, Græcis Κιστός *χέσσαι*. Italis, *Hedera terrestris*. Germanis, Grundreben/sive Gundeireben.

HEDERA TERRESTRIS.

FORMA.

Longo hæc reptatu humi serpit, quadrangularibus funiculis, è quibus folia prodeunt rotunda, crispa, subaspera, & per ambitum serrata, flores edit in purpura albicantes, pusillos: Radicibus tenuibus, è funiculorū geniculis prodeuntibus. Plāta tota amara est.

LOCVS.

Nascitur in opacis, circa semitas, vrbium muros, & in hortis.

QUALITATES.

Amaro gustu tota plāta est, quare abstergere, extenuare, aperireq; faciliè poterit.

VIRES.

Additur in potionibus quæ ad viscerum internorum vulnera parantur: succus cum ærurgine mistus, instillatur vtiliter cuniculosis vlceribus: Fit è folijs recentibus oleum, ijs in eo maceratis, diuque æstate insolaçis, admirabilis sanè facultatis ad tormina, & cæteros intestinorum cruciatus, cum potum, tum infusum.

HED



manis,

NOMINA.
• HEDERÆ TERRESTRIS species montana.

401

FORMA.

Viticulos profert vulgari
breuiore : hirsutioresque,
folia circinata rotunditatis,
maiora, flosculi quoque paulu-
lum rubescunt, & grandiores
aliquantum sunt quam in ea
quæ passim nascitur.

LOCVS.

Nascitur in Thuringia le-
cis montosis & opacis.

QUALITATES ET
VIRE.

Esapore odoreque validio-
ribus, conijci potest omnia
valentius prestare posse hanc,
quam quæ in planitie proue-
nit. *



Cc

CHELI-

bus o-
atis ad

EDE-

CHELIDONIUM maius, Græcis, *χελιδονία* Kairo h, seu Memiram. Italis, *Celidonia maggiore*. Germanis, *Echelkraut*. Hispanis, *Celiduena*, siue *Terna delas golundinas*. Gallis, *Chelidoine* seu *eschlere*.

CHELIDONIUM MAIUS.

FORMA.

Diosc. Caule est gracili, cubitali, aut altiore, agnatis foliis; folijs ranunculi, mollioribus tamen, & colore cesijs: flore violæ albæ, secundum singula folia prodeunte, lucco tota planta madet croceo: qui mordax, & actis est, subamarus, & grauter olens. Radix supernè singularis, infernè in multa crocea capillamenta fibratur: filiqua cœu corniculati papaueris, tennis, in merte figuram longa, in qua semen recluditur.

LOCVS.

Mart. Prouenit propter sepes, in serobium ripis, secus vias, inter rudera, & in muris, & parietibus.

QUALITATES.

Gale. 8. Extergentis admodum, & calidæ facultatis est, succus eius, & ad acendum vitum, commodus est: ut quæ in quibus crassum quiddam, quiddam in pupilla colligitur digestionem indigens.

VIRES.

Diosc. Radix cum aniso, & vino albo pota, medetur regio morbo, & vlcerebus, quæ serpunt imposita cum vino. Succus oculorum claritatem affert.

CHE:



CHELIDONIUM minus, Græcis, *Χελιδόνιον μικρόν*. Arabibus, *Memiten*. He-
truscis, *Fanoſcello*, ſeu *Celidonia minore*. German. *Feigwurz/Blatter Kraut/ſeu*
Paffenhöddlin. Hiſp. *Scrofolaria menor*. Gal. *Couilos de Preſtres*, ſeu *petite eſchlere*.

CHELIDONIUM MINVS.



FORMA.

Folijs prouenit hederæ mi- **DIOſc.**
noribus, rotundiorib⁹, tene-
ris ac ſubpinguib⁹, humi ac-
cubantibus, ſine caule: Radi-
ces habet ex eodẽ callo com-
plures, puſillas, in granorum
tritici modũ aceruatim con-
geſtas, quarum tres, aut qua-
tuor in longitudinẽ exeunt.
Flores fundit luteos, tenuib⁹ **Matth.**
pediculis nitentes: Breui de-
perditur tempore: vere enim
& naſcitur, & areſcit.

LOCVS.

Naſcitur vlginoſo ſolo, **DIOſc.**
iuxta aquas, ſtagna, & lacus.

QUALITATES.

Cũ acius ſit maiore, illi- **Gal. ſ.**
tum celeriter cutem exulce- **ſim. me.**
rat, itaque hæc herba quarti
ordinis iam abſoluti, tum in
calfaciendo, tum in ſiccân-
do fuerit.

VIREs.

Succus eius per nares pur- **Gale.**
gat, vtpote admodum acer. **DIOſc.**
Pſoras, & ſcabros vngues eij-

cit: Decoctum eius ex melle gargarizatum, caput purgat. Idem facit ſuccus è
radicibus expreſſus; omnia pectoris vitia decoctum extrahit.

CENSURA.

Amentium cuculla digni ſunt, qui Chelidonium minus, Vergilij Amellum
eſſe contendunt.

APPENDIX.

Chelidonium minus tametiſi Dioſcoridi, & Galeno aded ſit acre, vt admo-
tum corpori celeriter exulceret, quod facile de eo credendũ eſt, quod in Græ-
cia prouenit: cùm tamen Italicum nulla ſit acredine præditum, calidis, ac ſic-
cis qualitatibus penitus deſtituitur.

AQVILINA, siue aquilegia, Italis, *Aquileia*, *Celidonia maggiore*, seu *Celidonia sal-natica*. Germanis, *Äseley*. Gallis, *Ancholies*.

AQVILINA, SEV AQVILEIA.

F O R M A.

Matth.

Planta est fruticosa, folijs maioris Chelidonijs quadantenus similibus, subalbicantibus, per ambitum diuisis: caules edit numerosos, renues, sesquicubitales. Flores in cacumine emicant purpurei, aut candidi, aut lutei, in stellæ modum radiantes, quatuor inferiori sede corniculis, concavis, & sursum reflexis, è quibus capitula suboriuntur melanthij modo, quæ nigrum, pellucidumq; concludunt semen.

L O C V S.

Oritur in montibus, syluosis locis, & feritur in hortis.

Q U A L I T A T E S E T
V I R E S.

Semen drachmæ pondere potum ex Cretico vino, & croci momento iſteriam sanat: sed ægros subinde in lecto su-
mare oportet.



AQV

* A Q V I L E G I Æ flores varij.



Non tantum color diuersi-
tatem parit multifariam in flo-
ribus hisce, sed & figura discre-
pare ijdem quotidie depræ-
henduntur. Nam fœtura non
solum multiplici flores den-
siores & nitidiores stipantur,
aut colorum distinctiones
nonnunquam in diuersis non-
nunquam in vnico flore variz
commendantur, sed & diuer-
sas sortiuntur facies interdum,
siue naturæ lusu siue artificio
quodam, vt inuersi * flores
propemodum videantur, aut
degenerant † sæpiusculæ &
strigiosiores apparent, & tum
quidem aut colore languidio-
re & quasi dilutiore spectan-
tur, aut prorsus virorem in-
duunt. *

Cc 3

CARYO-

CARYOPHILLVS Indicus, Italis, *Carofano Indiano*. Germanis, *Goldfarb Doſten* vel *Indianiſch Neglin*.

CARYOPHILLVS INDICVS.

G E N E R A.

Duo habet genera: Ma-
ius, & Minus.


F O R M A M A I O R I S.

Matth.

Planta eſt fruticoſa, cau-
libus bicubitalibus, & quan-
doq; maioribus ſtriatis, re-
ctis, ſubruſcentibus, è
quibus numeroſa prodeunt
folia, tanacetum amula, ſed
maiora, & magis diuiſa: flo-
res è calice oblongo toroſo-
ſque ac longo pediculo ni-
tentes exeunt aerei, ma-
gni, numeroſis admodum
ſtipatis folijs, odore mi-
nus quam in altero gra-
ueolenti, ſemine tenui, ob-
longo, nigro: Radix illi eſt
brevis, multifiſdaq;

L O C V S.

Seritur in hortis, colitur
in ſtētilibus, & arculis, ſpe-
ctaculi gratia.



Q U A L I T A T E S E T V I R E S.

Idem.

Excalfacit, & ſecat, quo fit, vt in medicum uſum venire poſſit. vbi abſterge-
re, extenuare, digerere, ac reſerare ſit opus.

CARYO.

NOMINA.

407

CARYOPHILLVS Indicus minor: Italis, *Garofano Indiano minore.*

CARYOPHILLVS INDICVS MINOR.



FORMA.

Flore tantum á maiore di- *Matth.*
stat, quippe qui in hoc genere
minorum spectatur bino, ter-
noque foliorum stipamento:
color illi inest aureus, subni-
gricansque, & leni quadam
purpura adumbratus, aspectu
admodum iucundo, adeo
quòd ex oloferico, quod velu-
tum vocamus, à natura facti
videantur: sed odore sunt gra-
ui, & qui caput feriat.

LOCVS.

Visitur passim super fene-
stras in fictilibus, atque etiam
in hortis.

QUALITATES ET
VIRE.

Excalfacit, siccit, attenuat,
incidit, & abstergit, ac aperit
valentius, quàm maior.

Cc 4

AVRI-

AVRICULA muris, Græcis, Μυρς ἀφ' ὧν. Italis, Orecchia di topo. German. Wilde Mangoldt mit blawen Blumen. Hispanis, Oreja de ratton. Gallis, Orelge de ratie.

AVRICULA MVRIS.

FORMA.

DIOSC. Planta est caulibus pluribus ab vna radice, aliquatenus ab imò rubentibus, & concavis, folijs angustis, oblongis, dorso acuto, ac elevato, nigricantibus, per intervalla assidue germinatis, atq; in mucronem desinentibus, & tenuibus cauliculis ex alarum sinu prodeuntibus, flosculo, ut anagallidis, cæruleo. Radix digitali crassitudine, multis capillamentis fibrata.

LOCVS.

Matth. Oritur in pratis, in campis, & hortis.

QUALITATES.

Gale. 7. Desiccat ordine secundo: simp. me. cæterum nullam evidentem caliditatem possidet.

VIRES.

DIOSC. Radix illita ægilopas sanat.



ISATIS.

ISATIS domestica, siue Glastum, Græcis. *ισάνης ή ιεγος*. Italis, *Guado domestico*.
Germanis, *Weid*. Hispanis, *Pastel*. Gallis, *Gueda*, seu *Pajet*.

ISATIS DOMESTICA.

FORMA.

Folia profert plantagini si- *Matth.*
milia, verum pinguiora, ni-
grioraque: caulis illi est bi-
cubitalis, floribus in summi-
tate numerosis, parvis, tenui-
busque, aureo colore.

LOCVS.

Seritur passim in campis ad *Idem*.
lanificia caeruleo colore infi-
cienda.

QUALITATES.

Facultatis est valenter exic- *Gale. 7.*
cantis, nondum tamen mor- *simp. me.*
dentis: est etiam simul ama-
ra, atq; adstringens.

VIRES.

Illita folia tumores omnes *Diosc.*
discutiunt: cruenta vulnera
glutinant: sanguinis proflu-
uia sistunt, ignem sacrum, ex-
cedentia, putrescentia, ac ser-
pentia vlcera sanant.

Cc 5

ISATIS



ISATIS sylvestris, Græcis, *ισόης ἀγρία*. Italis, *Guado salvatico*. Germanis, *Wilde Weidt*. Gallis, *Pastel sauvage*.

ISATIS SYLVESTRIS.

F O R M A.

DIOSC. Folia fert maiora, lactucæ proxima: caules tenuiores, multifidos, quadratenus rubentes, in quorum cacumine folliculi multi dependent, quandam linguarum faciem referentes, in quibus semen: flore luteo, tenui.

L O C U S.

Matth. Nascitur in campestribus, incultis locis, & in pascuis.

Q U A L I T A T E S.

Gale. 7. Manifestè iam acre quid-
simp. me. dam tum gustu tum actione præfert, proinde valentius quàm sariua desiccat. atq; valentius humidis putredinibus resistit.

V I R E S.

DIOSC. Eadem quæ & supradicta præstat, potu, & illi ulienosis auxiliatur.



TELE-

Te
cca fa
inacue

Fab

manis,

NOMINA.

411

TELEPHIUM, Græcis, τηλέφιον. Italis, Fauagrassa. Gallis, Reprise: Ioubarbe des vignes. Germanis, Knabenkraut/Wundkraut/Getihenne/Schmerwurzel.

TELEPHIUM SIVE FABARIA.



FORMA.

Folia promit portulacæ sed dioscoridia, quin etiam caules non dissimiles; alas binas in singulis foliorum geniculis, annexit. Ramuli à radice senescentes prodeunt, folijs referti caeruleis, crassis, lentis, carnosiss, flore luteo, aut candido.

LOCVS.

Nascitur in cultis, & maxime inter vites. Idem. Quin etiam Matth. saxosis locis, in tectis, & antiquis parietibus.

QUALITATES.

Telephium exiccantis, ex Gal. 3. tergentisq; est facultatis, non sim. me. tamè insigniter calida: verum in hoc forsità quispiam ipsum primi esse ordinis censet: de- liccat tamen secundo ordine inteso, aut certe principiis tertij.

VIRE.

Telephij folia senis horis illita, vitiliginem sanant, sed postea locus hordeacea farina illini debet: peruncta ex aceto in sole, idem quoq; præstant. sed vbi inaruerunt, absterguntur. Diosc.

APPENDIX.

Fabaria Telephij notis omnes habet. verum de viribus dubitandum est.

* TELE-

* TELEPHIVM vel Crassula purpureo flore. Germanis, Knabenkraut
Weibk.

TELEPHIVM.

FORMA.

Parum discrepat ab altero; teneriores tamen sunt & magis rubent cauliculi. Folia quoq; non ita cærulea sunt, & folioli suavi purpura rubent. Radice nitur paulo minore quam præcedens.

LOCVS.

Nascitur multis locis in Germania, præsertim montanis & opacis ad Rhenum.*



AGA-

AGARICVM, Græcis, *Agarikon*. Maurit. *Garicum*. Italis, *Agarico*, & *fongo di lario*. Germ. *Dammen* *Schwamm*. Hisp. *Agarico*. Gall. *Agaric*.

AGARICVM.

GENERA.

Duo eius habentur genera, Mas alterum, alterum *Fœmina*.

FORMA.

Fungus est in Larice nascens, non *Dioscor.* tamen vna & eadem semper mole *Matth.* proueniens. Qui autem *fœmina* vocatur rotundior, cãdidiior, friabiliior, leuiorq; habetur, quin etiam primo gustu dulcis, mox amarus percipitur, & facie summa rimosus spectatur. Mas verò, qui rotundior habetur, cum compactior, durior, villosior, lignosiorq; sit, inutilis putatur.

LOCVS.

Nascitur plurimum in Tridenti- *Matth.* norum montium syluis, vbi larices arbores crescunt.

QUALITATES.

Is primo quidem gustu (vt prædi- *Gal. li. 6.* ximus) dulcis, sed paulo post subamarus percipitur, acrimoniæ ac leuicula adstrictionis particeps, quin etiam laxa cõsistentia præditus, quibus omnibus palam est, quodd compositum sit ex aërea ac terrea substantiâ caliditate extenuata. Hac itaque ratione & digerendi & calfaciendi vim habet, & crassitudinem incidendi, tum viscerum infarctus expurgandi.

VIRE.

Efficax est contra tormina & cruditates: prodest contusis & ab alto deuolutis: ictericis, hydropicis, su-

spiriosis, iecinorosis, nephriticis mi-

strangulatus vrgeat, si pallor in corpore

Man datur ac postea deuoratur siccus vbi ventriculus cibi tenax non sit, & acidos mittat ru-

ctus: sanguinis reiectiones sistit tribus obolis ex aqua haustus: menses ciet, & veri inflatio-

nibus medetur. Aluum purgat, & veramque bilem, & pituitam pellit: venenorum antido-

tum est. Serpentium venenosorum morsibus mirificè auxiliatur, tribus obolis ex vino sum-

ptum. Verum agarici proprium est, cerebrum, neruos, & omnium sensuum organa expurga-

re, pulmones & pectus, a lentis, crassisq; & putrescentibus excrementis detergere, atq; con-

tumacem materiam omnem in articulis existentem exoluere. Resolutis, stupidis, comitiali-

factu prouenientibus, mirum in modum auxiliatur. Recensetur quoque inter medicamen-

ta, quæ ad cordis affectus prestare dicuntur.

RHA-



RHABARBARVM, Italis, *Reobarbaro*.

RHABARBARVM.

FORMA.

Caule prouenit à radice breui, sed crasso, è quo circumquaque folia numerosa exeunt, ex angusta origine, in amplum definitia, deorsumq; spectantia, lanugine quadam per ambitum obducta. Hæc dum adolefcunt viridia, adulta verò lutea spectantur. E medio foliorum stipatu cauliculus assurgit, qui summo fastigio flores mittit cæruleos: odore acuto simul, & graui. Radix pedale longitudinem superat, colore ex rufo nigricante. Crassitudo radices non omnibus plantis eadem inest: verum quæ ad summam crassitudinem excreuerunt, humani cruris molem equare solent: numerosis adnatis vndiq; fibris. Interna pulpa aureo colore nitet, rubris quam plurimis intercurrentibus venis: succo madet copioso tum croceo, tū purpureo, qui suo lentore manus implicat, & colore inficit.

LOCVS.

Oritur in Tragodytica regione, quæ propriè Barbaria appellatur, vnde illi nomen: quinetiam, in Catai regno, eminentibus quibusdam montibus & saxosis, sunt qui scribant Rhabarbarum in India oriri.

QUALITATES.

Constat tum aqueis, tum terrenis qualitatibus, quæ adstringentem illi facultatem tribuunt, quin etiam aëreis & igneis.

VIRE.

Omnis penitus noxa vacat: aded, vt quouis tempore dari possit non solum pueris ætate reuellis, sed & vtero gerentibus. Sinceri macerati dilutum, vbi abstersione, deiectione, & infarctus liberatione sit opus, mirificè confert. Atqui vbi adstringere ac roborare oporteat, ipsum quidem in puluerem contritū exhiberi debet. Id quod vehemētius operatur, quod igni prius fuerit tostum: Deijcit Rhabarbarum cum bilem, tum pituitam: eique propria facultas est abstergerendi, roborandi; cum ventriculum, tum etiam iecur: atq; eorum punitiones amouendi. Sanguinem pellucidum reddit, obstructions aperit, & qui ab his proueniunt morbos, sanat. Idcirco ictericos, hydropicos, lienosos, ac diuturna febre laborantes iuuat. Datur vtiliter ab alto deuolutis drachmæ pondere addito Mumie, & rubiæ radices momento ex vino austero. Opitulatur singultientibus, ac dysentericis, præsertim illud, quod igni fuerit tostum.

* APPENDIX.

De pictura Rhabarbari ab autore expressa tanquam adhuc incerta, nihil habeo quod affirmare queam. *

GEN.



NOMINA.

415

GENTIANA, Græcis, Γεντιανή. Arabibus, Gentiana, seu Genthiana. Italis, Gentiana. Germanis, Gentianwur. Hispanis, Gentiana. Gallis, Gentianne.

GENTIANA.

GENERA.

Trium est generum. Maior. **Diosc.**
Minor. Minima.

FORMA.

Maior folijs provenit partim proximè radicem plantaginis similibus, subrubris, partim à medio caule, & præsertim iuxta cacumen paulum dissectis: caule cauo, ac lævi, digiti crassitudine, geniculato, bicubitali: semine in calicibus lato, lævi, glumoso, satis ad sphondilij semen accedente. Radice longa, crassa, amara, subluteo colore.

LOCVS.

Nascitur in sublimium montium iugis, vmbrosis, & vliginosis locis. Ac etiam in eorundem montium pratis, ac pascuis.

QUALITATES.

Radix efficax est, ubi extensione, purgatione, abster-
sione, obstructionis liberatione opus sit. Nec mirum si hæc possit, cum impense sit amara. Exaltat ordine tertio, & sic
cat secundo.



VIRE.

Radix datur vtiliter drachmarum duarum pondere cum vino, pipere, & Ruta à serpente demorsis. Eiusdem succi drachma, laterum dolore affectis, e sublimi deturbatis, ruptis, & conuulsis prodest: Epaticis, & stomachicis ex acrimonia porta subuenit. Radix collyrij modo subdita partus eiecit. Imposita, vt Lycium, vulneraria est: & ad cuniculosa vlcera vtilis. Id quod etiam facit succus. Radix vitiliginem abstergit. Aqua à radicibus distillata febres ab infarctu prouenientes, mirifice pellit. ventris tinea necat, maculas qualescunque in facie delet.

* GEN-

F O R M A.

Puniccos gerit flores, folijs
à priore parum differens nisi
acuminatiora essent. radix in-
uenitur nonnunquam bra-
chiali crassitudine, duos pe-
des longa in summo diuisa in
caules prodeuntes, quorum
aliquando tres, quatuor, quin-
que vel sex etiam enascuntur.

L O C V S.

Prodit in alpium iugis.

F A C U L T A T E S.

AIunt soluere & purgare
vehementius priore.*



GENTI-

NOMINA.

417

GENTIANA minor, Græcis, Γεντιανή μικρά, siue γαυρίτις. Italis, Gentiana minore. Officinis, Ciliata. Germ Creuzwurk/Sperenstich/seu Madelgeer.

GENTIANA MINOR.

FORMA.



Caule exiit rotundo, genicu- Matth.
lato, dodrantali, ac etiam maio-
re, in cacumine rufescente. fo-
lia in caule prodeunt è genicu-
lorum alis bina, paribus inter-
uallis distincta, oblonga, sub-
pinguia, vulgaris saponaria æ-
mula, superioribusq; gentianæ
folijs similia. Flores, qui purpu-
reo sunt colore, summo caule
in orbem exeunt. Radix illi al-
ba, longa, locis pluribus in cru-
cis modum secta, amaro admo-
dum gustu.

LOCVS.

Nascitur secus itinera in mō-
tibus & locis non cultis.

QUALITATES, ET VIRES.

Radix præstat contra pesti-
lentiæ contagia in antidotis ad-
dita. Eaque omnia potest, quæ
Gentiana maior.

Dd

GEN-

GENTIANA minima, Italis, Gentianella, & Pettimborfa. Germ. Lungenblum.

GENTIANA MINIMA.

FORMA.

Radicibus, prouenit numerosis, tenuibus, albicantibus, per quam amaris. cauliculis lētis, humi accubantibus. floribus ex cæruleo purpurascētib; minoris Gentianæ similib; per inde ac folijs.

LOCVS.

Nascitur in collibus, locis incultis, & in campestribus.

QUALITATES, ET
VIREs.

Parum viribus à Gentiana differt. Contusa radix, & ventri adhibita, teretes tineas necat. Exulceratas strumas sanat radicem siccata pulvis inspersus: Cum melle autem illitus, cutis vitia quæcunque, & maculas abstergit.



ARISTO.

ARISTOLOCHIA, malum terræ & venenum terræ, Plinio referente, Græcis, *Αριστοχία*. Arabibus, *Zaraud*, *Mafnocra*, seu *Zaraud*. Hispanis, *Astronomia*. Gallis, *Sarrasine*, siue *Aristologie*.

ARISTOLOCHIA.



GENERA.

Trium est generum, Rotunda quæ *εργαλίη*, longa, quæ *μακρά*, & tertia, quæ *κληματίτις* dicitur.

FORMA ROTUNDÆ.

Rotunda, quæ *σέμινά* vocatur, Diosc. folijs crescit hederaceis, præstanti odore, cum acrimonia quadā, molibus subrotundis: multis ab vna radice germinibus, per longis que palmatibus. Floribus subalbicantibus, Matth. oblongis, ex paruo capitulo in auriculæ modum defluentibus, graucolentibusque, colore intus ex atro purpurascente, fructu viridi, rotundo, iuglandis magnitudine: Radice rotunda, tuberola, mali quantitate, vegeta, ponderosa, buxo intus colore, graui autem & amaro sapore.

LOCVS.

Nascitur in campetribus, in pratis, & in Apulia Monte Gargano.

QUALITATES.

Omniū generum subtilissima Gal. 6. est rotunda, & ad omnia efficacior. simp. me. Itaque in quibus crassum humorem validius extenuare oportet, illic vsus est rotundæ. Excalciscit ordine tertio inchoante, & siccac secundo. Mesue.

VIRES.

Rotunda omnibus venenis resistit, & venenosorum animalium moribus: eadem cum vino, piperis, & cetera vuluarum onera

re, & myrrha pota drachmæ pondere mensis, secundas, partus & cetera vuluarum onera eiecit: idem quoque subtilia facit: singultibus, suspirijs, horroribus, laterum doloribus, lienosis ac conuulsis ex aqua pota singulariter auxiliatur. Aculeos & spicula extrahit, osium pleth: gingiuas & dentes extergit. Dolores ab infarctu, aut crassitie crudorum humorum, flammæ exortos curat: præstat & ad asthmaticos, comitiales, podagricosq; Radix drachmæ pondere pota, pituitam deiecit, quare humidæ tussi, & asthmatis etiam antiquo nō solum hausta, sed suspirio prodest: Ad hoc enim parantur ex ea pastilli hoc modo. Sumuntur aristolochiæ rotundæ, auripigmenti eiusque partes æquales, & excipiuntur oui vitello, & formantur inde pastilli. E quibus vnus incenditur. Et si vnus per infundibulum per os sumitur.

CENSURA.

Errant, qui maiorem Fumariam Aristolochiæ rotundæ vice in vsu trahunt.

Dd 2

ARISTO.

ARISTOLOCHIA longa, Græcis, ἀριστολόχεια μακρά. Italis, *Aristológia longa*.

ARISTOLOCHIA LONGA.

F O R M A.

Diosc. Longa, quæ mascula & dactylitis appellatur, folia mittit rotundæ latiora, longiora quæ caulibus tenuibus, sesquido drantalibus: Floribus, ut in rotunda auricularem formam referentib⁹. aliquanto tamen maioribus. è quibus fructus enascuntur virides piri similitudinem referentes: in quibus semen: Radice nititur digiti crassitudine, dodrantis longitudine: buxæ intus colore, & amaro gustu.

L O C V S.

Matth. Vera provenit in Italia: sed tantum in Apulia & Calabria.


Q U A L I T A T E S.

Gal. 6. Minus tenuitatis obtinet, **simp. me.** quam rotunda, sed nec ipsa inefficax est, verum abstergendi, utq; excalfaciendi vim possidet, minus quidem, quam rotunda abstergit, & digerit, sed non minus calefacit, imo forsân plus quoq;. Itaque in quibus usus est modicæ absterfionis commodior est longa, nempe in carnum exulcerationibus, & fermentationibus vteri. At in quibus crassum humorem validius extenuare oportet, illic rotundæ usus esse debet.

V I R E S.

Ad ea omnia præstat, ad quæ rotunda, peculiariter autem aduersus anguium venenosorum morsus, & venena, tum ex vino drachmæ pondere pota, tum quoq; exterius illita, Menses, partus, & secundas eiicit, pota cum pipere, & myrrha. Id quod etiam præstat subdita.

* ARISTO-



*ARISTOLOCHIA longa vulgaris vel maior, quibusdam Saracenica vel Clematis. Aristolochia tertia apud Plinium. Gallis, *Saragine*. Germ. *Dsterluecy*.

ARISTOLOCHIA LONGA VULGARIS.

FORMA.

Caules huius omnes rectè assurgunt ad cubiti altitudinem & altius nonnunquam in quibus lutei flores, & fructus turbinati, parui omni magnitudine, semine intus lato, ad exortus foliorum accrescunt, quæ pediculo annectuntur longiore, quam in reliquis speciebus fieri solet, hederæ aut asari folijs non absimilia, ampla, venosa. radix quam cæterorum exilior, flaua odorata, amara, aromatica, acris, multipliciter sese sub terra serpendo propagans.

LOCVS.

Passim nascitur in Italia & Germania, copiose vero in vineis Asiae.

FACULTATES.

Eosdem usus creditur præstare, quæ rotunda quamquam ignauius. Nec desunt qui tradant ea grauem febrem finire, sed nido re suditis carbonibus febricitantem suffire præcipiunt & ita febri promittunt liberari. Addunt vulneribus illitu mederi: cum cypero aut dracunculi semine, adiecto melle narium carcinomatis resistere, in oleo decoctam & suillo adipe algentium horrores discutere.*

Dd 3

PISTO-

* *PISTOLOCHIA*, *Aristolochiæ* quartum genus apud Plinium, vel *Polyrrhizos*.

PISTOLOCHIA.

FORMA.

Plin.

Tenuior est quam proxime dicta, densis radicis capillamentis, iunci plenioris crassitudine. Quæ tam in rectum quam obliquum sparguntur. ipsa herba penè humi sternitur, foliaq; habet partim nullis partim brevissimis petiolis annexa. flos similis est prioribus, minor tamen est, & nigrior, vel potius magis rubens, interdum etiam ex herbaceo flavescent, Semen fuscum in vasculis ceu lagenulis continetur.

LOCVS.

Prouenit locis siccioribus, saxosis & apricis.

FACULTATES.

Plin.

Conuulsis, ex alto præcipitatis, radice pota ex aqua utilissima esse traditur. Semine pleuriticis auxiliari, nervos confirmare & excalfacere putatur.*



DYLCIS

DVLcis radix, Glycyrrhiza. Græcis, Γλυκύριζα. Mauritanis, *Sis*. Italis, Regolitia. Officinis *Liquiritia*. Germanis, *Ecktritz* sive *Eissholz*. Hispanis, *Regalíz*. Gallis, *Reclisse*, sive *Regalisse*, seu *Heulisse*.

DVLcis RADIX.



FORMA.

Surculis fruticat bicubitali. *Diosc.*
 bus: folijs lentitici, densis, pinguibus, ac gummosis: floribus hyacinthinis: fructu platani ferè simili, asperiore tamen, qui siliquas lentium modo habet, easq; fulvas & paruas. Radicibus est longis, sarmentosisq; buxo colore, gustu dulci ac subacerbo.

LOCVS.

Nascitur sponte in monte *Matth.*
 Gargano Apuliæ, & feritur in hortis, & viridarijs.

QUALITATES.

Familiaris est radicis natura *Gal. 6.*
 nostræ temperaturæ, sed cum *simp. me.*
 adstrictio quædam adiuncta sit, vniuersum eius temperamentum quantum ex caliditate, & adstrictione est, tepida potissimum caliditatis fuerit, quam proximè accedens ad temperamentum. Abstergit, *mun. Matth.*

dat, leuigat, mulcetq; humorum acrimoniam.

VIREs.

Radicis succus in arteriæ scabritia efficax est, si linguæ subditus eliquefeat: *Diosc.*
 æstuantî stomacho, iocinori, thoraciq; conuenit. Sanat vesicæ scabiem, & renum dolores, cum passo potus. Idem sitim sedat, vulnera conglutinat illitus. Eiusdem farina pterygijs vtiliter adhibetur. Ardoribus vrinæ mixticæ auxiliatur. Mansa radix, præsertimq; recentè effossa, non solum sitim sedat, sed etiam famem, seruatq; vires diebus pluribus. Idem præstat concretus succus in ore contentus. Pectus, & pulmones iuuat, quare datur vtiliter suspensio, phthisicis, pleuriticis, & tussientibus.

Dd 4

*GLY-

* GLYCYRRHIZA vulgaris. forte Radix Scytica apud Theophrastum. Germ.
Gemein Süßholz.

GLYCYRRHIZA VULGARIS.

FORMA.

Suffrutex est præcedenti
Dioscorideo similis, virgas e-
mittens bicubitales & altio-
res, lignosas, semestres, folia
quoq; in pediculo seriatim si-
bi inuicem opponuntur sub-
rotunda, glutinosaq;. Floscu-
li in summitate purpurascen-
tes post se relinquunt semina
siliquis maiusculis inclusa,
quæ non tam dense stipantur
vt platani pillulam efformet,
sed singulæ singulis pediculis
adhærentia aliquanto spacio
à se inuicem distant, radicibus
propagatur sarmentosis, præ-
longis, dulci succo præditis,
intus flavescentibus, & mire
vinacibus.

LOCVS.

Seritur in hortis & alicubi
sponte nascitur. Imprimis ve-
ro hac radice nobilis est ager
Bampergensis.


QUALITATES.

Calore temperato humentiq;, recens potissimum & sicco abundans & mo-
derata quadam abstersione naturæ conueniens & amica est, viscerumq; obstru-
ctiones expedit.

FACULTATES.

Præstat omnia & potiora in super, quam suæ Glycyrrhizæ tribuunt Diosco-
rides & Galenus. Acres & salios humores retundendo thoracis & trachæ vi-
tia sanat, asperitates lenit & concoctionem iuuat.*

CEN-



CENTAVRIVM magnum, Græcis, Κενταύριον μέγα. Aphris, Chentaurion kibir. seu Saurion habre. Italis, Centaurea maggiore. Germanis, Neupentick. Hispanis, Ruipontic. Gallis, Rheapontico.

CENTAVRIVM MAGNUM.

FORMA.

Folia pmit iuglâdis, oblonga, viridi brassicarû colore, in ambitu serrata. Caulē ceu rumicis bicubitalē tricubitalēve, multis ab radice adnatis: in quib. capita sunt oblōga, papaveris magnitudine, Cnici figuratē quib. flos exit cæruleus, & semē Cnico simile, papposa lanugine circūstante. Radix est illi crassa, pôderosa, solida, tripedalis, rubeo succo pregnâs, cū adstrictione aliqua, & dulcedine acris, & rufescens.

LOCVS.

Plurimū provenit, idq; præstas in Gargano Apulię mōte, quin etiā in Monte Baldo in Veronensi agro, ac etiā in alijs nonnullis Italiae mōtibus, sed Apulo longē infirmius.

QUALITATES.

Radix sicut gustu cōtrarias Gal. li. 7. qualitates, ita in vsu cōtrarios simp. me. effec^o demonstrat. Gustu itaq; acris, simulq; adstringēs apparet, cū lenicula quadam dulcedine. Lenit, trahit, aperit, roborat, adstringit, puocat, vul-

VIREs.

Radix medetur ruptis, cōuulsis, pleuriticis, ægrē spirantibus, diurnæ tussis, sanguinemq; expuentib. duarum drachmarū pondere in aqua pota, si febris sit: sin aut in vino. Præstat & ad tormina, & vteri dolores: subdita, menses & partus extrahit. Tusa recens, aut arida ante madefacta vulnera glutinat & coniungit. Carnes in ollis coalescūt, si tusa simul decoquatur. Datur vtiliter hydropicis, Ictericis, & Iecinorosis, tū vino macerata, tū in puluerē pota: Eiuldē succus vnicuique pondere haustus, ac etiam vulnere illitus, auxiliatur à serpente demorsis.

CENSURA.

Qui putât Centaurij magni radicem legitimam esse Rhaponticū, magno in errore versantur.

Dd 5 CENTAV-



CENTAVRIVM minus, Græcis, Κενταύριον μινύον. Arabibus, Chantaurion sege, & segir, seu kutarion seges. Italis, Centaurea minore. Hetruscis, Biondella. Germanis, Taufent gülden Kraut/ Sieberkraut/ Erdgall/ siue Diberkraut. Hispanis, Fel de tierra. Gallis, Repeyeret, siue Centaure poulet.

CENTAVRIVM MINVS.

FORMA.

DIOSC. Herba est hyperico, aut Origano similis, caule anguloso, palmum excedere: floribus in umbellæ ferè modum comantibus, è puniceo in purpuram vergentibus, folijs oblongis ac parvis: semine tritico simili: radice pusilla, læui, & superuacua.

LOCVS.

Nascitur in pratis, pascuis, & campestribus.

QUALITATES.

Gal. li. 7. Radix prorsus inefficax est, simp. me. sed ramuli eius, & potissimum folia, & flores, vtilissima sunt. Vincit in eis qualitas amara, paululum habes adstrictionis, atque ob huiusmodi temperamentum, admodum exiccatorium est medicamen, expers mordacitatis.

VIREs.

DIOSC. Herba recens rufa, vulnera glutinat, vetera vlcera purgat, & cicatrice obducit: bile, crassosq; humores per aluū ducit, si decocta deuoretur. Ius decocti conuenientissimè ischiadicis infunditur. Siccus cum melle mistus caliginem oculorum purgat. In vellere subditus, menses, & partus extrahit, haustus verdè neruorum vitij medetur. Datur foliorum, & flosrum decoctum vtiliter potandum tertianarijs, quòd bilem per inferna deijciat. Idem, pariter que succus iocinoris, ac lienis, obstructiones, & duricias tollit: alui tinea pellit, cum potus ex melle drachmæ pondere, tum umbilico illitus. Herba, comaq; decoctum, varos, albos, lentigines, ac cæteras cutis infectiones exterit. Instillatur succus vermiculosis auribus, quin etiā illinitur contra papulas. & manantia capitis vlcera.

*CENTAV-



*CENTAURIUM luteum, perfoliatum, vel diaphyllum. Germanis, Gelb Tausentguldener.

CENTAURIUM LUTEUM.

GENERA.

Duo sunt Centaurei lutei genera, hoc potiss. differentia, quod alterum angustiora & non perfoliata folia habeat, alterum latiora & caulem undique ambientia.

FORMA.

Herbula est pusilla, alterius Centaurij minoris magnitudine, folijs rotundis eleganter vestito cauliculo, qui per medium ipsorum traiecitur. Flores lutei sunt interdum pallidiores, interdum crocei magis, semina profert pusilla, in rotundis capsulis.

LOCVS.

Nascitur in aruis, & nonnunquam in vetustis muris, praesertim in agro Bononiensi.

QUALITATES,
ET VIRES.

Quamuis eam amaritudinem non habeat quam Centaureum minus, amara tamen est euidenter, & ad vulnera valet.*

CHAMÆ-



CHAMÆLEON albus, Græcis, Καμαλέον λευκός. Mauritanis, Chameleon lenté, seu Chamalium. Italis, Carlina, & Chameleone bianco. Hispan. Cardopinto. Gal-
lis, Carlina, siue Chameleon blanc.

F O R M A.

C H A M Æ L E O N A L B U S.

DIOSC. Planta habet sylibo, aut sco-
nilia, asperiora tamē,
ra, ac nigro Chamæleo
nolidiora. Caulē non pro-
mit, verū ex medio spinas
Echini marini, aut Cinaræ
modo erigit. Flores emittit
purpureos veluti papparum
lanugines: semen cnico simi-
le: radicem in latis collibus,
crassam, in montosis verò gra-
ciliorem, in profundo albā,
aliquatenus odoratam, dul-
cem, & odore graui.

L O C U S.

Matth. Nascitur in collibus, cum
in latis, tum in montosis lo-
cis, quin etiam in incultis, a-
rido solo.

Q U A L I T A T E S.

Gal. li. 3. Excalfacit ordine secundo
simp. me. absoluto, siccatur verò tertio.

V I R E S.

DIOSC. Pota radix acetabuli mensuralatas interaneorum tineas pellit. Hydropicis
datur commodissimè drachmæ pondere ex vino albo. Eiusdem decoctum po-
tum urinæ difficultatibus subuenit. Hausta in vino serpentium venenis resistit.
Matth. Enecat tamen canes, fues, & mures. Vulgus radicem magnificat contra pesti-
lentiæ contagia, si quotidie drachma deuoretur.

CHAMÆ.



NOMINA.

429

CHAMÆLEON niger, Græcis, Καμυλέων μέλας. Arabibus, Chamæleon melanos. Italis, Chameleone nero. Germanis, Eberwurk. Hispanis, Cardo pinto. Gallis, Chiardonette.

CHAMÆLEON NIGER.

FORMA.



Folij exit scolymo mino- DIOSC.
ribus, tenuioribus, & rubro
colore distinctis, caule do-
drantali, digitali crassitudine,
subrubro, & in umbella flo-
res spinosos, tenues, hyacin-
tino colore, versicolorésve.
Radice crassa, nigra, dēsa, in-
terdum exesa: quæ dissecta fla-
uescit, & cōmanducata mor-
det.

LOCVS.

Prouenit in campestribus, *Idem.*
& in maritimis, siccis, & cli-
uosis locis.

QUALITATES.

Radix lethale quiddā ob- Gal. li. 8.
tinet, detergit, digerit, & e- simp. me.
mollit, siccāt ordine tercio,
& exalfacit secūdo absoluto.

VIREs.

Trita radix cum chalcanti exiguo, & axungia scabiem abigit: cocta in aceto,
addito sulphure, & bitumine impetigines, vitilignesque sanat. Decoctum in
ore detentum, dentium dolorem mitigat, phagedænas tetraq; vlcera illitu sa-
nat.

CHAMÆ-

Matth. Non defunt qui hanc plantam legitimum nigrum Chamæleonem esse contendunt, verum cum plures in ea (quantum video) desiderentur notæ, ego quidem, eorū sententiæ haud ita faciliē subscribam.

* APPENDIX.

Non differt à Chamæleonte albo, nisi quod in caulem creuerit.*



LABRUM

NOMINA.

431

LABRVM Veneris, Græcis, *Διλαξ*. Aphris, *Dilfacos*. Italis, *Cardo papani*, & *Diffo*. Germanis, *Kartendistil*. Hispanis, *Cardencha*, seu *Cardo pentecador*. Gal-
lis, *Cardon*, & *Carder*.

LABRVM VENERIS.

GENERA.

Duum est generum. Sati- *Matth.*
uum, & sylvestre.

FORMA.



Satium caulem habet al- *Diosc.*
tum, spinis horridum, folijs
lactucæ, spinosis, binis, geni-
cula singula complectentib.
prælongis, bullisq; quibusdā
refertis, ipsisq; pariter acu-
leatis, coracuo alarum sinu è
foliorum cōnexu, in quo im-
ber aut ros asseruetur. In ca-
cumine caulium singula sur-
culis capitula insunt oblōga,
echinata spinis, quæ arefacta
candida spectantur, dissecta-
que medullatenus vermicu-
los ostendunt.

LOCVS.

Seruntur in campis ab Ita- *Matth.*
lis multis in locis ad lanificia,
quin etiā & spontè nascuntur,
nonnullis in regionibus.

QUALITATES.

Radix exicat ordine secundo, atque nonnihil abstergit.

VIRE.

Tusa radix & viño decocta, vsq; dum sit ceræ crassitudo, sedis rimas & si-
nas curat: sed aenea pyxide recondenda, per silibus verrucis, & formicantibus
vtiliter adhibetur. Capitulorū vermiculi in folliculo collo suspensi, produntur
quartanis febribus remedio esse. Expetuntur piscatoribus, quod ijs hamis im-
positis, pisces hac esca mirum in modum alliciantur.

Gal. 6.
simp. me.

LABRVM

LABRVM Veneris alterum, iisdem appellatur nominibus, quibus primum ap-
pellari diximus.

LABRVM VENERIS ALTERVM.

F O R M A.

Matth.

Facie à priori parum admo-
dum differt, sylvestrius tamē
est, & spinis longè horridius.
Echinata capitula setis quoq;
compluribus scatent, aculeis
non adeò firmis, atque adun-
cis, vt in altero genere.



L O C V S.

Idem.

Nascitur sponte in campe-
stribus, in agrorum, & scro-
bium aggeribus, secus itine-
ra, & prope sepes.

Q U A L I T A T E S,
E T V I R E S.*Idem.*

Non differt suis omnibus
in facultatibus ab altero.



VIRGA

NOMINA.

Virga pastoris, Italis, Virga di pastore, & dissaco minore.

433

Marth.

VIRGA PASTORIS.

FORMA.



Folijs caule echinatis capi- *Idem.*
tulis, ac cæteris suis partibus
Veneris labrū æmulatur, sed
omnibus gracilioribus, mino-
ribus, & infirmioribus capi-
tulis adeo parvis ut oliuæ ma-
gnitudinem vix æquent, te-
nuibus capillamentis refer-
tis.

LOCVS.

Prouenit umbrosis, & vli- *Idem.*
ginosis locis. * In hortis se-
mel sata vix potest iterum ex-
tirpari, ita è semine hinc inde
sparsa repullulat.*

QUALITATES, ET VIRES.

Non crediderim ego hanc *Idem.*
plantam à Veneris labro ad-
modum distare, imbecillioris
tamè esse facultatis haud ne-
gauerim.

Ec

SPI-

SPINA alba Græcis, *αἰγάρθρα λευκή*. Arabibus, *Bedeguar*. Italis, *Spina bianca*.

SPINA ALBA.

F O R M A.

Diosc. Folia fert albi Chamæleonis, angustiora tamen, candidiora, aliquantum hispida, & aculeata, caulē bicubitalem, & maiorem, pollicari, aut ampliore crassitudine, albicantem, intus cauum. In cacumine capitulum inest spinosum, echini marini æmulum, sed minus & oblongū: flores purpurei, ex quibus semen gignitur Cnici modo, sed rotundius.

L O C V S.

Idem. Nasçitur in montibus, & syluosis.

Q U A L I T A T E S.

Gal. 6. Radix desiccatoria est, &
simp. me. modicè adstringens: semen vero tenuis essentis, & calidæ facultatis habetur.

V I R E S

Diosc. Pota radix celiacis, stomachicis, & ijs, qui cruenta extussunt, efficax est: vltimam cit: tumoribus illinitur: Decoctum eius in ore detentum, & in collutionibus adhibitum, dentium dolores mulcet. Epotum semen cor: uulsi infantibus, & à serpente demorsis auxiliatur.

*Spē



*SPINA alba putata, alijs Echinopus, nonnullis Acanthium, vulgo Sphærocephalus, quibusdam Chamæleon niger, alijs Crocodilium, Ger. Wismuthpfl.

GENERA.

Plurimum est generum, è quibus duo vulgatiora.

FORMA.

Prior Sphærocephalus echinatum gerit capitulum flosculis candidis ceu stellulis è quorum singulis apices extant cærulei pulcre exornatum. Caulis altus folijs vestitur latis, aculeato ambitu horrentibus prona superficie ex albidis, supina ex atro virentibus. Radice nititur oblonga alba, quæ altero à satù anno lignescit. Semina in capitulis villosa dense stipantur, & ventorum flatu decussa passim se propagant.

LOCVS.

Habetur in hortis, & sponte nascitur saxosis & fluuijs imminuentibus collibus.

VIREs.

Decoctum echinati capitis vna cum caule & seminibus, quæ admodum sunt amara, mirifice prodest in doloribus dentium.*

Ec 2

*SPINA



* SPINA alba putata flore cæruleo.

F O R M A.

Differt à priore, quod humilior sit, & candidiora proferat folia, quæ angustiora magisq; laciniata esse observantur. Flores in globulis cærulei elegantissimi disponuntur, summo cauli insidentibus, è quibus semen relinquatur ut in præcedente hirsutum, sed grandius.

L O C V S.

Peregrina cum sit planta non nisi in hortis quærenda erit.*



CAR-

NOMINA.

437

CARDVVS, Scolimus. Græcè, Σκόλιμος. Arabibus, *Raxos*, *Harxos*, *sive* *Sacolomas*.
Italīs, *Cardo*, *Cardioph*, & *Archichiocco*. Germ. *Strobildorn*. Hispanis, *Cardo de*
comer, seu *Cardos*. Gallis, *Artechault*, *sive* *Carciophe*.

CARDVVS NON ACULEATVS.

GENERA.

Plura habentur genera. sed *Matth.*
dum tantum hic meminisse
sat fuerit, nepe satini & spon-
tè nascentis. satini duo sunt
genera: alterum aculeatum,
& alterum sine aculeis.

FORMA.

Qui aculeis caret, folia pro *Idem*.
mit grandia per ambitum la-
ciniata, auersa parte subalbi-
cantia numerosaq; : caulem
edit longum, foliosum, capite
echinato, sine aculeis tamen.
Et quadantenus pini cono si-
mile.

LOCVS.

Seritur passim in hortis, & *Idem*.
viridarijs.

QUALITATES.

Excalfacit ordine secundo *Gal. 8.*
completo, aut tertio incipi- *simp. me.*
ente, & exiccat secundo.

VIREs.

Radix contusa, & illita, cum alarum graueolentiam, tum corporis totius e- *Diosc.*
mendat. Eadem decocta in vino bibita copiosam, fetidamq; vrinam ducit.
Herbacum recens tenerefcit, in olera asparagi modo transit. Melancholicum *Gal. lib. 2.*
succum gignit carduus pro obsonio sumptus. Non solum foliorum carinas *de alis. fac.*
mangonio elaboratas, albicantes tenerasq; , sed etiam caules vorant Itali cum
sale, & pipere secundis mensis, sed fructus quoque tum crudos tum in sculis in-
coctos.

Ec 3

CAR-



CAR-

CARDVVS aculeatus, Græcis Σκλήμυς ἀκανθώδης. Italis, Cardo, & Carciofo spinoso.

CARDVVS ACVLEATVS.

FORMA.

Matth.

Folia gerit alterius magis
dilita, magisq; laciniata, te-
nuibus circumdata spinis: cau-
lem quoque alteri similem,
striatum subalbicantem, in
cuius summitate echinatum,
aculeatumq; extuberat ca-
put, flore hyacinthino: semi-
ne Cnici minore. Radice niti-
tur crassa, firma, non insuavi.

LOCVS.

Idem.

Colitur in hortis ad men-
sarum bellaria.

VIRES.

Idem.

Idem præstare potest, quod
alter.



*SCOLY.

NOMINA.

439

*SCOLYMVS sylvestris. Germanis Schönhaule.

CARDVVS SYLVESTRIS.

FORMA.



Sylvestris Scolymus non alte assurgit, folijs aculeatis, caulibus duorum dodrantum altitudine, colore atro rubente, odore vinoso, in summitate crescunt capitula, in quibus semen & pappi albid.

LOCVS.

In Bohemia & alibi sponte nascitur.

VIRES.

A fœminis vsurpatur in lixiuo ad abluendos capillos qui flavescent inde & pulcrio res efficiuntur, & à pediculis & lendibus immunes redduntur.*

Ec 4

POTE-

POTERIVM, Græcis, Ποτέριον. Italis, *Poterio*.

POTERIVM.

FORMA.

Diosc. Largè fruticat, cortice obductū tenui, spinis horridum, lanugine spissa, ramulis longis, tenuib⁹, tragacanthæ proximis, folijs parvis, rotundis, flore exiguo, candidi coloris, semine superuacuo, sed gustu acuto, & odorato. Radices mittit binum, ternumve cubitorum, nervosas, & firmas, quæ proximè terram incisæ, succum fundunt gummi similem.

LOCVS.

Idem. Nascitur in aquosis, & collibus.

QUALITATES.

Gal. 3. simp. me. Desiccandi absq; morfu facultatem possidet, adeo, ut & nervos incisos glutinare credatur. Radices eius potissimum sunt eiusmodi.

VIRES.

Radices tussæ præcis nervis, & vulneribus glutinandis illinuntur. **Deco-**
ctum quoq; earum, nervorum affectibus prodest.

ACAN-



NOMINA.

441

ACANTHIVM, Græcis, ἀκάνθιον. Italis, Acanthio.

ACANTHIVM.

FORMA.

Planta est albæ spinæ simi- Diosc.
lis, folijs extremo ambitu acu-
leatis, & araneosa lanugine
obductis, ex qua collecta, &
neta telas bombycinis similes
texunt.

LOCVS.

Nascitur in montibus, & Matth.
locis incultis.

QUALITATES,
ET VIRES.

Folia & radices ad remedia Diosc.
opisthotoni vsurpantur in po-
tu.



Ec 5 ACAN-

ACANTHVS, Græcis, *ἄκανθα*. Italis, *Acantho*, siue *Branca Orfina*. Germanis *Wö-
ren-Kraut*. Hispanis, *Terua giguante*, & *Branqua Vrsina*. Gallis, *Branze Orfin*.

ACANTHVS.

FORMA.

DIOSC. Folia habet multò lactuca-
cis latiora, & longiora, eru-
cæ dinifura, nigricantia, pin-
guia, læuia, caulem bicubita-
lem, digitali crassitudine, læ-
uem, prope verticē ex inter-
uallis circumdatū foliolis, ceu
nucamenta quædam oblon-
ga referentibus, spinosis, è
quibus flos prodit albus; se-
men oblongum, luteum. Ca-
put thyrsi specie. Radicibus
nititur longis, mucosis, ru-
bris, & glutinosis.

LOCVS.

Idem:

Nascitur in hortis, petro-
lis, & riuis.

QUALITATES.

Gal. li. 6.

simp. me.

Folia quidem mediocriter
digerentem facultatem obti-
nēt. At radix exiccatoria est,
& leuiter incisoria, & tenuiū
partium.



VIRES.

Radices vstis igni, & luxatis artubus illitæ subueniūt: potæ vrinam cient, sed
aluum cohibent: ruptis, cōnuulsis, tabidis mirè profunt.

APPENDIX.

Tametsi Acanthus, qui nostris in hortis feritur, folia spinosa non habeat,
non tamen ob id spurium id esse fuerit credendum. Siquidem (vt Plinius est
autor lib. & cap. 22.) duo Acanthi habentur genera, alterum crispum aculea-
tumque, alterum læue.

ANONIS

NOMINA.

443

ANONIS siue Ononis, Græcis, *ἄνωϊς*, siue *ἀνωϊς*. Officinis, & Herbarijs, *Resa-
boul.* I. Iis, *Onoride*, & *Bonag.* Germa. *Stallkraut*/sen *Hawbchedel*. Hispanis,
Gatilibs, & *Gatthines*. Gallis, *Bugrânes*, siue *Burgundes*.

ANONIS, siue ONONIS.

FORMA.



Ramos habet fruticosos, **Diosc.**
dodrantales, aut maiores, fre-
quentibus geniculis cinctos,
cauis alarū multis: folijs len-
ticulæ tenuibus, pusillis: ad
pratēsis lori folia accedenti-
bus, subhirsutis, non iniucun-
dè olentibus. Rami acutiori-
bus spinis, & veluti spiculis
firmioribus, horrent. Radi-
cem mittit candidam.

LOCVS.

Nascitur plurima in pratis, **Matth.**
quin etiam in incultis locis.

QUALITATES.

Radix exalfacit tertio qua **Gal. li. 7.**
dantenus ordine: cortex eius **simp. me.**
maximè est vtilis, habēs quip-
piam & absterforium, & in-
cisorium, proinde non tan-
tum vrinas prouocat, sed &
lapides confringit.

VIRE'S.

Radicis cortex ex vino potus, vrinas ciet, calculos comminuit, & vlcera **Diosc.**
margines erodit. Radicis ex posca decoctum collutione dentium dolores mul-
cet. Decoctum eius potum hæmorrhoidas sanare creditur.

*ONONIS

*ONONIS lutea, montana, Natrrix alijs.


ONONIS LUTEA.

F O R M A.

Er radice singulari, simplici, parua, lignosa, cauliculi furculosi oriuntur, dodrantes, albicantes, ab imo vsq; ad summum folijs paruis, crassiusculis, ternis plerunq; oblongis, saluuginosis vestiti. Flores in summis coliculis lutei pallescentes leguminum specie, è quibus siliquæ fiunt semine plenis, colore pullo. Herba tota est hirsuta & pinguis, odorata, sed hircinum quiddam olet.

L O C V S.

Frequens Monspelij inter segetes & prope mare.*



CARDVVS

CARDVVS lacteus. Italis, *Scardacio bianco*, seu *Cardo del latte*. Germanorum *Oelheinis*, *Cardus diue Maria*, & *Cardus lactarius*. Germanis verd ipsi, *Unser Frauen Distel*. Gallis, *Chiardon de nostre Dame*.

CARDVVS LACTEVS.

FORMA.



Folia fundit magna, pingua, per *Matth.* ambitum laciniata, ac tenuibus, acutisq; aculeis circumqua; stipata: albicantibus vbiq; maculis: caulem profert bicubitalē, & sæpe maiorem, spinis horrentem, brachiatum. Echinatis, aculeatisq; in summitate capitibus, qui æstate media florent cinaræ modo, floribus purpureis capillaceis. Semine Cnici minore, papposa lanugine obducta. Radice nititur, valida alte descendente, amaro sapore.

LOCVS.

Nascitur sponte in campestribus, *Matth.* incultis locis, secus itinera, & agrorum marginibus.

QUALITATES.

Radix excalfacit, abstergit, aperit, prouocat, & attenuat. *Idem.*

VIRES.

Radicis decoctum datur vtiliter potandū ad iocinoris, & vasorum infarctus, & remorautes vrinas, quare confert hydropicis, ictericis, ac nephriticis. Idem menses elicit, tum porum, tum in deflectionibus additum: Radicum siccatū puluis: propinatur ex prillana cum fœniculi semine, & longo pipere ad lac augendum. Stillatitia foliorum aqua vtuntur quidam ad lateris dolorem, valentiusq; id præstare aiunt, si cum seminis drachma propinetur.

TRAGA-

TRAGACANTHA, Græcis, Τραγάκανθα. Italis, Tragacantha. Arabibus, Chitira Chatech, seu Alchatad. Germ. Dragant. Hispan. Alquetira.

TRAGACANTHA.

FORMA.

Diosc. Radice nititur lata, & summo cespice lignola, vnde furculos humiles, frequētes, robustos latissimè fundit, in quibus minuta folia, multa, & tenuia exoriūtur, quæ sub se spinas albas, rectas, & firmas occultant. Est etiam Tragacantha lachryma, quæ vulnerata radice manat.

LOCVS.

Matth. Nasctur in Apulia in monte Gargano, ac etiam in alijs longinquis meridianisq; regionibus, vnde ad nos comportatur lachryma.


QUALITATES.

Gal. 6. Tragacanthæ lachryma similem gummi vim obtinet simp. me. emplasticam quandam, quæ humorum acrimoniam obtundit, & sanè similiter illi desiccatur.

VIRES.

Lachryma cutis spiracula obstruit: additur in oculorum medicamentis: præstat & contra tussim, exasperatas fauces, retusas voces, & cæteras destillationes, cum melle in delinctu: subdita quoque linguæ liquecit: in passo madefacta drachmæ pondere bibitur contra renum dolores, & vesicæ rosiones, misto cornu cerui vsto, & eloto, aut scissi aluminis momento: quæ tosta fuerit dysentericis auxiliatur ex cydoniorum vino hausta. In summa vbi læuigare, obtundere, & reprimere opus est, præstantissimum semper fuerit medicamentum.

ERYN-



ERYNGIVM, Græcis. ἑρύνγιον. Italis, *Iryngo*. Germ. *Drachen Distel* / *sive Mannes-
treiv*. Hispanis, *Cardo corredor*. Gallis, *Paracault*.

ERYNGIVM.

G E N E R A.

Tria eius habentur genera. *Matth.*
Montanū, sive campestre. Ma-
rinum & planum.

F O R M A.

Montanum folia fert Car-
dioidia, lata, per ambirum lacinia-
ta, aspera, gustu aromatica, sed
ubi adolevit circa complures
caulium eminentias in spinas
aculeatur, in quorum summi-
tatibus globosa capitula dura-
rum, acutissimarumq; spina-
rum ambitu stellatim circum-
uallantur; quorum colos alias
virides, alias albus inter dū cæ-
ruleus inuenitur. Radix oblon-
ga, lata, foris nigra, internè cā-
dida, pollicis crassitudine, &
odorata.

L O C V S.

Nascitur in asperis, campe-
stribus & in sabulosis pratis. *Matth.*

Q U A L I T A T E S.


Caliditate quidem aut parū
aut nihil, quæ temperata sunt
superat, siccitatem verò in te-
nui essentia consistentem, nō
paruam obtinet.

V I R E S.

Pota radix, menses & vrinas pellit, tormina inflationesq; discutit, contra iocinoris vitia,
serpentium morsus, & hausta venena, vino pota prodest. Bibitur aduersus plurima cum semi-
nis pastinacæ drachma. Appensa illitave tubercula discutere proditur. Pota cum hydromelite
sarcitis: valet aduersus rubetas, toxica, & aconita ex ranarum comestibulum iure pota, vel ex
anferino, ubi rana non sine ad manus, valet & contra cordis affectus. Præstat quoque contra
stranguriam, obstruos renes, & vuluarum præclusiones. Illita ex melle infixa corpori extra-
hit. Præsumpta crapulam arcet, & aluum sistit: Fit & tenellis Iryngij folijs stillatitia aqua, ijs
quæ maxime vtilis, qui morbi Gallici vlcerebus laborant, si diutius quotidie ea vtantur in
pocu.

C E N S V R A.

Magno admodum tenentur errore, qui Eryngium Mauritanorum seculum esse contendunt,
ERYN-



ERYNGIVM marinum. Italis, *Irungio marino*.

ERYNGIVM MARINVM.

FORMA.

Matth.

Folia edit alterius longè
latiora, circinata, & in am-
bitu aculeata, & cæcis resper-
sa colore. Caulem carnosio-
rem, crassio rem, atque stria-
tum, capitulis cæruleis, ma-
ioribusque. Radices habet
prælongas, teneras, ac mol-
les digitali crassitudine.

LOCVS.

Idem.

Nascitur in maritimis, nō
longè à littoribus.

QUALITATES,
ET VIRES.

Radix minus siccatur, quàm
altera, sed eandem possidet
vires.



ERYN-

ERYNGIVM planum, siue læue. Italis, *Iringoliscio*, & *Iringosenza spine*.

NOMINA.

449

ERYNGIVM PLANVM.



FORMA.

Folijs exit latis, oblongis, minimè laciniatis, in ambitu tamen serratis caulibus compluribus, ramosis: oblongis in summitate capitulis, ipsisque subasperis. Radice vegeta cæteris crassiore.

LOCVS.

Prouenit in Austria in Viennensi agro, campestribus locis.

QUALITATES,
ET VIRES.

Radix minus quàm cætera præscripta siccatur, minùsque ad omnia præstat.

Ff

ALOE,

ALOE, Græcis, Ἀλὼν. Aphris, *Saber, Paber, siue Subar.* Italis, *Aloe.* Germanis, *Alepatick / & Bitter Aloes.* Hispanis, *Hierua babosa.* Gallis, *Aloes.*

FORMA.

DIOSC. Folijs provenit scillæ similibus, pingibus, modicè latis, rotundis retrorsum pandis, quæ vtrinq; ex obliquo longioribus intervallis striantur, & in mutas spinas desinunt, caule antherico non dissimili, flore albo, ac purpureo, fructu hastulæ regię cognato: Tota planta grauter olet, & gustu est amarissima. Radice vnica ecu palo, in terram depacta.

LOCVS.

DIOSC. Plurima præpinguisq; in India gignitur, ex qua coactus succus affertur. Nascitur, & in Asia, & Arabia in locis quibusdam maritimis & Insulis. vt in Andro.

QUALITATES.

Gal. 6. simp. me. Est Aloe non simplicis naturæ, sed vt iudicio est gustus, adstringit simul, & amara est: adstringit quidem mediocriter, sed vehementer est: mara: subducit & aluum: Exiccet quoq; ordine tertio, excalfacit verò aut primo intenso, aut secundo exoluto. Repellit, digerit, extergit.

VIRES.

DIOSC. Sanguinis reiectiones sistit: regium morbum purgat drachmæ pondere ex aqua frigida. Deuorata cum resina, vel melle cocto, aluum soluit. cæteris medicamentis admista præstat vt minus stomachum lædant: sicca & inspersa vulnera glutinat, & vlcera ad cicatricem perducit cohibetq;. Eadem peculiariter pudendorum vlceribus medetur. Condylomata, & sedis rimas ex passo sanat: hæmorrhoidum abundantiam & sanguinis fluxiones sistit. Priuatim scabras lippitudines, pruriginésq; in oculorum angulis permulcet: temporibus, & fronti ex aceto, & rosaceo illita, capitis dolorem sedat: cum vino autem capillum fluentem continet. Vtile stomacho est medicamentum, vt si quid aliud. Infestissima est his, qui

Gal. li. 6. simp. me. & 8. de com. me. sec. locos. Matth. citra vitiatos humores, ex calida, siccaq; intemperie affliguntur: proximam ab his lætionem percipiunt, qui siccam intemperiem habent, etiam cum frigidityate coniunctam. Deijcit aloë non modo bilem, sed pituitam ipsam. Quotidianus eius vsus à mortiferis morbis tuctur: sen inflammationibus nocet (scilicet pota, non tamen exterius admota) ex aceto & felle bubulo vmbilico, ventriq; illita, intestinorum animalia necat.

* ALOE



N O M I N A.

451

* *ALOE AMERICA.* Italis, *Aloe americana.* Hispanis, *Cardon,* & *Maguay dellas Indias.* Valentinis, *Fily agulla.* Indis, *Magne y* & *Meil.*

A L O E A M E R I C A.

F O R M A.



Folia promit alterius, multo maiora, quorum ambitum duri muniunt aculei, nigricantes, & fibris intus albis firmisque tota substantia plantæ contextitur, ut si euellatur aculeus qui in summo est, filamenta quædam robusta veluti acui appensa simul extrahantur: radices sparguntur in obliquam summa tellure in multam longitudinem, vnde soboles enascitur viuacissima, quæ paucis annis crescit in arboream amplitudinem, ut palmæ caudex, non tamen apud nos attollitur, neque floret. Scribunt tamen aliqui in hortis Pisani vere, ex medio foliorum scapum elatum fuisse breuius folijs & raris qui paucis diebus ad altitudinem vndecim cubitorum adoleuerit, & sparserit in cacumine circumquaque ramos veluti latam vmbellam constituentes, in qua flores in æstate sursum spectantes, digiti longitudine, exterius herbacei intus pallidi, explicati in sex foliola, sine fructu deciderint, (hunc autem in India ferre Cytinis Mali Punici similem indicant quidam) caulibus vero aduentante hyeme exaruerit instar Ferulæ.

L O C V S.

Nascitur copiose in Mexico, & nostri quoque horti ea participes facti sunt.

Q U A L I T A T E S E T V I R E S.

Folia abundant succo amaro & acrimonia tamen in Italia & apud nos tanta illi amaritudo, quanta in America regione, qui vlcera sanat, & contra viperarum morsus utilis est. Eorumdem fumus per os ac nares haustus morbo Gallico medetur, sed ad eum vehementer sudores mouet ut vires admodum debilitet. Præterea tradunt in India arborescere hanc plantam, ut ex ea trabes fiant, succum radici melleum inesse, ex folijs contusis & maceratis extrahi linum, quo lineæ texunt molliissima candidissimaque, & huiusmodi plura alia, quæ ex varijs autoribus passim cognosci possunt, *

F f 2

A B S I N -

vlcera ad
Conditi-
ones li-
tempo-
allani flu-
est his qui
lesionem
eijcit aloe
etur: sen-
teris sedis
de bubulo

* ALOS

ABSINTHIUM Græcis, *Ἀψίνθιον*. Mauritanis, *Absynthium*. Italis, *Assenza*, & *Assentio*. Germanis, *Wermut*. Hispanis, *Assentios* sive *Alofina*. Gallis, *Aluys*, sive *Abfince*.

ABSINTHIUM.

G E N E R A.

Matth.

Quatuor Absynthij nominantur genera: vulgare, Ponticū, Marinum, sive Scirphium, & Santonicum: Ponticum tamen à vulgari non diuidit Dioscorides. * Plura etiam habentur quæ apud alios Auctores picta & descripta inueniuntur. *

F O R M A V U L G A R I S.

Matth.

Caule exit ramoso, folijs incanis, amaris, multipliciter sectis artemisiæ modo, floribus melinis parvis, semine rotundo racematim dependente: radice diuulsa, duraq;

L O C V S.

Idem.

Prouenit ferè ubiq;: & feritur, & per se quoq; in hortis nascitur.

Q U A L I T A T E S.

Gal. 6.
simp. me.

Adstringentiam, amaram, & acrem simul qualitatem possidet, exaltans pariter & extergens, & roborans, & desiccans, ex acrimonia quoque constat, quod maiori portione calidum sit magis, quàm frigidum. Itaq; calidum fuerit excessu primo, & siccum tertio. Atqui succus longè quam herba calidior est.

V I R E S.

Diosc.

Bilem expurgat, urinam cit, crapulam præsumptum arcet: cum fefeli, & Celtica nardo potū, inflationibus ventris, & stomachi doloribus auxiliatur: fastidia discutit & arquatos sanat, epoto quotidie eius diluto, aut decocto: Menses elicit tum haustum, tum ex melle suppositum. Bibitur vtiliter contra fungorum strangulationes ex aceto: ex vino sumptum aduersatur Ixiæ, cicutæ, muris aranei, & marini draconis venenis. illinitur ex melle ad fugillata, & oculorum caligines, quin etiam & ad purulentas aures. Adnoscitur iocinori præcordijsq; cum cerato ciprino, stomacho quoque diuturna valetudine laboranti, cum rosaceo: aquæ intercutem cum fisis, loliacea farina, & aceto, subuenit & lienosis. Præstat ad ea omnia vinum, quod ex eo paratur. Contentam in ventre pituitam oblatum nihil adiuuat, nec eam, quæ in thorace, & pulmone continetur,

* ABSIN-



NOMINA.

453

* ABSINTHIUM Montanum. Germanis, *Bergwermtut*. Italis, *Assenzo mon-*
tano. Hispanis, *Alofenamontesina*. Gallis, *Aluyne montaigne*.

ABSINTHIUM MON- TANUM.



FORMA.

Vulgari absinthio tam ra-
dice, quam caulibus, nec
non folijs floribúsque prorsus
simile est, sed exilius, ad sum-
mum duorum dodrantum al-
titudinem attingens, amari-
tudo illi, quæ priori, sed gra-
rior, & minus tetro abomina-
biliq̃ odore saporeq̃ com-
mendatur.

LOCVS.

Nascitur in montibus, plu-
ribus in locis.*

Ff 3

ABSIN-

ABSINTHIUM Ponticum, Græcis, Αψίνθιον πόντικον. Italis, *Assenzo Pontico*.

ABSINTHIUM PON-
TICVM.

FORMA.

Matth. Folijs, caulibus, floribus, se-
mine, ac cæteris suis partibus,
prouenit vulgari absinthio
longè minoribus, vt ex appi-
cta hic imagine constat.

LOCVS.

Idem. Nascitur plurimum in Pon-
to, vnde illi nomen: quineti-
am in Vngaria, & Bohemia.

QUALITATES.

Gal. li. 11. Quum duplex in omni ab-
cap. 16. sinthio facultas, & qualitas sit:
Metb. vtique in Pontico adstringen-
med. di qualitas non parua est, in re-
liquis omnibus amara quidem
qualitas est vehementissima,
adstrictio verò, aut planè obscura, aut prorsus nulla sentitur. Proinde Pon-
ticum ad iocinoris, & ventriculi inflammationes eligi præstat. Id autem est
tum folio tum flore longè quam cætera absinthia minore. Odor quoque
illi non modo non insuauis, verum etiam aromatum quid præferens, ac reli-
quis omnibus est sædus, quare hæc fugere conueniet, & Pontico semper
vti.

VIRES.

Fit è recentibus floribus, & saccharo simul contusis Antidorum ad hydro-
pem præstantissimum, cuius longo vsu per plures sanatos vidimus. Parant-
di ratio hæc est. Sumito florum vncias tres. Sacchari albi libram vnã,
contundantur in mortario diligenter. Et deinde pyxide vitrea recondita in-
solentur per mensem.

ABSINTHI-



NOMINA.

455

ABSINTHIUM marinum, siue Seriphium. Græcis, Ἀψίνθιον θαλάσσιον. Italis, *Assenzo marino*. Aquileiensibus, *Santonio*.

ABSINTHIUM MARINUM.



FORMA.

Folijs exit, quæ ad terram *Matth.* sunt, vulgari absinthio similibus, sed quæ in caulibus habentur, longè minoribus, caulibus gracilibus, minuto semine refertis, gustu amaro & odore graui.

LOCVS.

Nascitur in maritimis. *Idem.*

QUALITATES.

Specie, & gustu absinthio *Gal. 6.* simile est. *sim. med.*

VIRES.

Folia per se, aut cum orizæ *Diosc.* cocta interaneorum anira-
lia, & teretes tineas adiecto
melle enecant: aluum leui-
ter laxigant. Id quod cum
lenticula decocta pariter præ-

stant. Eius pabulo pecora maximè pinguescunt.

FF 4

* ABSIN-

* ABSINTHII marini genera

A. Absinthij marini Autoris, flosculi, quos in summo gerit, sublutei tenues, è quibus minutum semen. B. C. Folia eiusdem. D. E. Alia species folijs magis albis, simplicibus, indivisis. F. Aliud, cum Autoris absinthio marino conueniens, sed magis dissectis folijs. G. aliud à perito rei herbariæ pharmacopæo Veronenfî, Francifco Calceolari missum minoribus folijs, serè quanta hic pinguntur. H. aliud, Bononiæ marinum dictum, folijs minus candidis, fusciginosis cum amaritudine, abundat seminibus parvis, cubitalis est planta, multos ramulos habens. Folia primum nascentia succulenta sunt & viridia vt solet marinis stirpibus euenire. *



† A. ABSIN-

† A. ABSINTHIUM Seriphium, Ægyptium & Semen sanctum, Schcha Arabum. * Santonici species maiuscula, & longiusculis foliolis.

FORMA ET
LOCVS.



† Ægyptium pumila est *Matth.* planta in Ægypto proveniens, folijs minutis Abrotani feminae ferè similibus: furculis compluribus gracilibus, breuibus ac foliosis, A. minuto semine gustu amaro non tamen vehementer.

Semen sanctum planta est admodum fruticosa, caulibus & ramis numerosis refertis minuto semine, oblongoq; racematim prodeunte amariusculo gustu, odoreq; non ingrato. * Folia pusilla sunt, colore cinereo nostri Absinthij amula. Nascitur in terra sancta. * Affertur ex Alexandria Ægypti, ac alijs meridionalibus locis. *Matth.*

QUALITATES,
ET VIRES.

Ægypti ijs omnibus præditum est facultatibus quibus & Italicum. Semen sanctum oblinitur passim Saccharo à pharmacopæis, daturque vtiliter infantibus & pueris ad intestinorum vermes.

ff 5


* ABSIN-

F O R M A.

Herba est fruticosa Absinthio pontico similis, maioribus tamen folijs candida lanugine pubescentibus, flosculos promit croceo rubore variegatos, è quibys semen paruum amarum acre oritur. tota planta amara est, & cum aromatica qualitate aliqua odorata.

L O C V S.

Nascitur Massiliæ in maritimis, petrosis, apud nos vero culturæ assuetum in hortis habetur.*



ABROTO.

NOMINA.

459

ABROTONVM, Græcis, ἀβρότον. Mauritanis, Catsum, Kesum, seu Gaissum.
 Italis, Abrotano. Germanis, Stabwurtz/ sine Schoßwurtz/ sine Gertwurtz. Hisp.
 Abrotano, & Hierua Lombiguera. Gallis, Auren, & Garderobe.

ABROTONVM MAS.



GENERA.

Duum est generum, alterū Matth.
 mas, alterum fœmina.

FORMA MARIS.

Sarmentosa est planta, cau- DIOSC.
 libus gracilibus veluti absin-
 thium. Folia habet tenuia Matth.
 numerosa, longiusculaq; o-
 dore graui sed medicato: Flo-
 res mittit exiguos. Semen mi-
 nutum, rotundum, copiosum-
 que, ramulos fere totos com-
 prehensens.

LOCVS.

Nascitur sponte in colli- Idem.
 bus arido solo, ac etiam pas-
 sim in hortis colitur.

QUALITATES.

Calidum & siccum est or- Galen. 6.
 dine terrio. Digerendi etiam, simp. me.
 ac incidēdi vim quandam ha-
 bet, rarefaciendi, & morden-
 di: renuium enim est partium.

VIREs.

Semen crudum tritum, &
 ex aqua feruefactum in potu
 auxiliatur orthopnoicis, con-
 tem potum exitialibus venenis, antidotum est. Horroribus ex oleo illinitur.
 Serpentes cum substratum nidore fugat: quin etiam cōtra eorum ictus po-
 tum ex vino prodest: priuatim efficax est contra scorpionum & phalangiorum
 ictus: oculorum inflammationibus cum pane aut ootoneo cocto commodè
 illinitur. Tritum & cum hordeacea farina coctum, tubercula discutit.

*ABROTA-

* ABROTANVM fœmina, Chamæcyparissus. Germ. Garten Cypress. Italis, Abrotano femina, herba Camphorata, Santolina, Cipressina, Creffolina.

ABROTANVM FOEMINA.

F O R M A.


Herba est fruticosa, lignosis ramis, folijs albis tenuibus minutissime diuisis, & quadruplici ordine, veluti paruis apicibus compositis, odore medicato, sapore amaro, flore aureo corymbacco, in fastigijs furculorum longis pediculis insidente.

L O C V S.

Nascitur in campis & vineis, apud nos verò hortensis est.

Q U A L I T A T E S,
E T V I R E S.

Easdem qualitates ac vires habet, quas Abrotanum mas, Ipsius semen in vñ est ad necandos vermes, si intra corpus sumatur.*



V E R O.

VERONICA ita Germanorum Officinis vocata, Italis, *Veronica*. Germanis,
Ehrenpreis aut *Grundheyl*.

VERONICA.



GENERA.

Duum est generum: *Mas*, *Matth*,
 & *femina*.

FORMA MARIS.

Mas caule exit dodrantali,
 aut minore, rubefcente, lanu-
 ginosoq; folijs oblongis, hu-
 mi accubantibus, nigricanti-
 bus, hirsutis, & in ambitu ser-
 ratis: flores edit summis cau-
 libus dilate purpurascens,
 & semen in siliquis loculi fa-
 ciem referentibus. Radice ni-
 titur tenui, quæ in plures di-
 uaricatur fibras.

LOCVS.

Nascitur locis incultis.

QUALITATES.

Cum gustu amara adstrin- *Idem*.
 gensque manifestè appareat,
 calidæ & siccæ facultatis om-
 nino fuerit.

VIRES.

Medetur cruentis vulneri- *Idem*.
 bus, quin etiam diurnis vl-
 ceribus, tumores præterea in

viuerit discit, præcipueque quæ in ceruice oriuntur. Datur vtiliter po-
 tandus foliorum pulvis drachmæ pondere cum ad pestilentes febres, tum ipsa
 pestilentia affectos cum theriacæ tribus obolis ex vino meraco; sed illico affe-
 ctos sudare oportet. Datur eadem potanda ex sua ipsius stillatitia aqua contra
 tussim, & omnia pectoris, & pulmonum vitia; quin etiam tabidis, & suppura-
 tis: aperit quoque iocinoris, & lienis obstructions: vterum, renes, & velicam
 expurgat.

VERONICA

VERONICA foemina, Italis, *Veronica femina*. Germanis, Ehrenpreis Wäble.

VERONICA FOEMINA.

F O R M A.

Caulem edit lanuginosum, folia rotundiora minime denticulata, subpinguia, flores ex luteo purpurascens, semen orbiculatis vasculis conclusum: radicem maris similem.

L O C V S.

Nascitur in inculto solo & asperis tractibus.

Q U A L I T A T E S,
E T V I R E S.


Non differt à mari, sed ad omnia imbecillior habetur.



HYSSO-

HYSSOPVM, Græcis, *ἵσσοπος*. Arabibus, *Cyfe*, seu *Tabes*. Italis, *Hissopo*. Germ. *Eysop*/sive *Hyssop*. Hispanis, *Hissopo hierua*. Gallis, *Hissope*.

HYSSOPVM.



GENERA.

Duum est generum: *Hortensense*, & *Montanum*.

FORMA.

Hortense frutex est surcu- *Matth.*
lis numerosis ex vna radice p-
deuntibus, lignosis, sesquipe-
dalibus, folijs in vniuerso cau-
le oblōgis duriusculis odora-
tis feruido, & amaro gustu:
Flores edit spicatos in sum-
mis caulium partibus cæruleo
colore: Radicem multifidam
ac lignosam. *Montanum* sur-
culis folijs floribus, & cæteris
in vniuersum partib⁹ nihil ab
hortensi differt, nisi quod hir-
sutius syluestriusque apparet,
rudioribus folijs & asperiori-
bus, & gustu amarioribus, nec
vsq; adeo acrib. mitescit tamē
in hortos translātū, sitq; hor-
tensi per quā similitimum.

LOCVS.

Hortense seritur passim in *Matth.*
hortis, & viridarijs. *Montanū*
sponte in montib. provenit.

QUALITATES.

Deliccat, & ex calfacit ordine ter- *Galen. 8.*
simp. me.

Matth.

VIRE S.

Decoctum eius cum ficis, mellē, & ruta potum peripneumoniciis, diuturna tussi laboranti-
bus, suspensiois, de stillationibus, & orthopnoicis: ventris tineas enecat, cum ficis detritis viri-
ne: Crassum enim aluū subducit, sed vehementius addita iridis radice, cardamomo, aut irio-
re fouet. Minuitur lienosis, & hydropicis cum sicu & nitro: cum feruenti aqua impositum su-
pillata discutit. Decoctum cum aceto dentium dolorem in collutione mulect. Aduersatur *Matth.*
serpentium moribus, cum sale & cumino admotum: Ex oleo illitum pediculos necat, & ca-
pitis pruriginem tollit: comitiales iuuat quouis modo sumptum. Discutit eius vsus contu- *Mesue.*
maes inflationes, cibi appetentiam inuitat menses, & vrinas ciet, & febrium horrores excu-
tit, visum acuit. Præstat hæc omnia quoque *montanum* etiam efficacius.

GRATIO-

GRATIOLA, quibusdam Gratia dei. Italis, *Gratiola*. Foroiulienſibus, *Stancacaullo*.

GRATIOLA.

FORMA.

Matth. Planta eſt dodrantalis, caulibus quadrangularibus, folijs hyſſopi paulò latioribus, ac longioribus: floribus in purpura albicantibus, amaro admodum guſtu: quadam cū obſcura adſtriſione.

LOCVS.

Idem. Naſcitur in pratis vliginoſis, & paluſtribus.

QUALITATES.

Idem. Excalfacit, ſiccit, incidit, attenuat, aperit, deijcit, abſtergit, vulnera glutinat.

VIRES.

Aluum vehementer purgat, bilem pituitamq; deijcit: vulnera celeriter ſanat, ſi triſta ſuperponatur.

CENSURA.

Qui hanc plantam Meſuiſ Eupatorium eſſe contendunt, omnino errant.

STOECHAS



NOMINA.

465

STOECHAS, Diosc. *σιγῆς*. Galeno *Στοιχάς*. Mauritanis, *Astochados*, *Astuchados*, *sive Astuchudes*. Italis, *Stechade*, seu *Steca*. Officinis, *Stichados*. Germanis, *Stichasfrant*. Hisp. *Tomani*, *Cantuello*, *Cantuesfo*. Gallis, *Stechados*.

STOECHAS.

FORMA.



Planta est Lauendulae haud *Matth.* ab similibus, folijs oblongis, crassius incanis, acervatim in uniuerso caule exeuntibus, surculis pluribus, ab vno caule fructuibus: lignosis, flores edit in spicatis, oblongisq; capitulis thymi modo, subcaeruleis, in quib. semen oritur melissophylli non ab simile. Radix est illi lignosa ac multifida.

LOCVS.

Prouenit in Stæcadibus in *Diosc.* Iulis, & Massiliæ regione.

QUALITATES.

Stæchadis quidem qualitas amara est. *Gal. lib. 3.* Et mediocriter *simp. me.* subadstringens. Cæterum temperies composita, nempe ex terrena essentia frigida exigua, unde sanè adstringit: & ex attenuata altera terrena copiosiore. à qua utique amara est: Ob utrorumque verò convenientiam, & coitum, refert, extenuat, extergit, roboratq; tum viscera omnia, tum totius corporis habitum.

VIRES.

Foliorum & capitulorum decoctum hyssopi modo ad pectoris vitia efficax *Diosc.* est. Antidotis vtiliter miscetur. Deijcit tum pituitam, tum atram bilem. *Cere. Matth.* brum, nervos, & sensum meatus mundat, ac roborat. Datur vtiliter contra qualescunq; frigidos morbos. Itaq; comitialibus. cõueniens fuerit auxilium, addita scilla, aut eius aceto. Balnea, fomenta, ac Laconica, quæ ex ipsius decocto, aut vapore fiunt, oculos narium meatus aperiunt, nervorum, & articularum cruciatibus leniunt, ac interna viscera frigido humore affecta roborant. Abstinentum tamen ab ea biliosis est, præsertim, si eorum ventriculus sit bile refertus.

Gg

ORIGA-

ORIGANVM, Græcis, *ἐσθλαρόν*. Mauritanis, *Fandenigi*, *sive Fandenigi*, *sive Fandenigi*. Italis, *Organo*. Germanis, *Fremde Wolgemut*. Hispanis, *Oregano*. Gallis, *Organ*, *seu Mariolaine bastarde*.

ORIGANVM.

GENERA.

Diosc. Duo eius habentur genera, Heracleoticum, & Onitis.

FORMA PRIMI.

Diosc. Folium habet hyssopo non dissimile, umbellam autem non in rotæ speciem orbiculatam, sed veluti multifidam: semine in summis virgis haud quaquam denso, amaracimodo spicato.

LOCVS.

Matth. Prouenit in Creta, & Cypro: & alijs Aegæi maris insulis.

QUALITATES.

Galen. 3. Heracleoticum efficacius simp. me. est onitide, omnes verò incidendi, extenuandi, calefaciendi facultatem possidet, hacq; tertio excessu, obtinent.



VIRES.

Decoctum cum vino potum demorsos à serpente sanat: Qui autem cicutam aut maconium hauserunt, ijs ex passo: si verò gypsum, aut ephemerum, ex aceto mulso propinatur: ruptis, conuulsis, hydropicis cum sicu esui datur. Aridum acetabuli mensura potum, in aqua multa, atros humores per aluum extrahit, menses ciet & rufi cum melle delinctum medetur. ad pruriginem, psozam, regiumque morbum, decocti ius in balneis prodest: herba autem substratu serpentes fugat.

ORIGA-

N O M I N A.

467

ORIGANVM onitis, Græcis, ὀρίζανος ὀνίτις. Italis, Origano onite.

ORIGANVM ONITIS.



FORMA.

Câdidiore est folio, & hyf. ^{Diosc.}
fopo similis: semen veluti
coniunctos corymbos habet.

LOCVS.

Nascitur in Creta, & alijs ^{Matth.}
nonnullis Ægei maris insulis.

QUALITATES,
ET VIRES.

Vis ei origani Heracleoti. ^{Diosc.}
ci, sed ad omnia minus effi-
cax.

Gg 2

*ORIGA-

F O R M A.

Similimum est Oniti ab
Autore depicto, sed nō idem.
ab Origano vulgari, cui⁹ icon
sequitur, nō multum differt,
nisi quod habeat multas, pul-
cras & oblongas quasi spicas,
purpureas. caulis etiam torus
purpurascit, semē gignit ruf-
fum, pusillum, vt reliqua Ori-
gani genera.

L O C U S.

Crescit in Gallia, prope
Monspellium.*



ORIGA-

cen-
didi fun

ORIGANVM vulgare, Italis, *Origano nostrano*. Germanis, *Wolgemut*.

ORIGANVM VVLGARE.



FORMA.

Folia mittit amaraci maio- *Matth.*
ra, subhirsutaq; , caules com-
plures pilosos, flores in sum-
mitate purpureos in umbellæ
multifidæ modū, radice sum-
ma tellure vagante.

LOCVS.

Nascitur inculto solo secus *Idem.*
itineræ, in collibus, & apricis.

QUALITATES,
ET VIRES.

Excalfacit quidē, quòd gu- *Idem.*
stu subacris sentiatur, & siccat
quoque similiter, sed haud
strenuè. Aperit, digerit, inci-
dit, & resoluit, sed longè mi-
tius quàm præscripta origani
genera.

CENSURA.

Hanc plantam Pseudoori-
ganum magis appellandum
didi sunt, non purpurei.

Gg 3 TRAGORI.

TRAGORIGANVM, Græcis, τραγορίαν. Italis, Tragorigano.

T R A G O R I G A N V M.

F O R M A.

DIOSC. Tenuis est frutex folio & ramulis sylvestri serpyllo simili, quanquam in lætiori solo latioribus folijs inueniatur. atque glutinosis: floribus in summis caulibus subpurpureis.

L O C V S.

Idem. Prouenit copiosum in Cilicia, in Creta, in Chio, Cooque, & apud Smyrnas.

Q U A L I T A T E S.

Idem. Excalfacit, aperit, attenuat, urinam ciet.

V I R E S.

Idem. Decoctum potum bilem eijcit. Bibitur ex acetovtiliter lienosis, & ex vino contra ixiæ venena. Mēses trahit, peripneumonicis, tussientibus, ex melle in eclegmate datur. Grata, ac mitis eius potio est: quare cibum fastidientibus & stomacho acida ructanti imbecilloque præbetur: item si maritima iactatione nausea, & æstus præcordiorum exciteretur. Tumores verò cum hordeacea farina illita discutit.



P V L E-

Potum
potum
permutum
facti
vtiliter
corrigi
Decoctum
uorum

NOMINA.

471

PVLEGIUM, Græcis, Πύλεγιον. Mauritanis, *Alnam, Alnegem, seu Alnegem*. Italis, *Puleggio*. Germanis, *Pölcy*. Hispanis, *Poleo*. Gallis, *Pulege, & Poulter*.

PVLEGIUM.

FORMA.

Herba est humi repēs, ser-
pylli modo: caulibus dodran-
talibus gracilibus, folijs ama-
raci æmulis, pauld tamē maio-
rib⁹ oblōgiorib⁹q;: flores in
toto caule ad summum vsq;
per intervalla propē foliorū
exortū, verticillatim enascun-
tur, colore purpureo langue-
scēte. Radix illi gracilis, & ca-
pilloſa summo cespite vagāte.

LOCVS.

Nascitur humectis, & vli-
ginosis locis. *Matth.*

QUALITATES.

Cū acre, & subamarum *Galen. 6.*
sit, valde tum excalfacit, tum *simp. me.*
extenuat. Porrd quod abūdē
excalfaciat, magnū est signū,
quōd illitum rubificat, & ex-
ulcerat quoq;: si diutius tole-
retur. Quōd verō extenuet
satis indicat, cū humida, cras-
sa, & lenta ex thorace & pul-
mone excreatu facili reddat,
mensēsq; moueat.

VIRES.

Potum menstrua, secundas, ac partus eijcit, pulmonis vitia ex melle, & aloe
potum extrahit, & conuulsis auxiliatur: Nauseas, stomachi erosiones ex posca
permulcet: atram bilem per aluum exigit. Bibitur in vino vtilissimē contra ser-
pentium morsus, deſectos animo recreat cum aceto naribus admotum. Are-
facti cinis gingiuas corroborat. cum cerato varos extinguit. Lienosis cum sale
corrigit, ac eiusdem inflationes, duritiasq; in deſſionibus mirificē iuuat.
Decoctum potum vrinas ciet: ictericos, & hydropicos curat: capitis, & ner-
uorum affectibus ex frigidityte prognatis succurrit: visum acuit.

Gg 4

Dicta-



DICTAMNVM, Græcis, Δίκταμνος. Arabib. *Mescatremfir*, *Anegen araba*, sine
Bari. Italis, *Dittamo di Candia*. Germanis, *Wilder Poley*. Hispanis, *Dittamo*.
Gallis, *Ditamo Real*.

DICTAMNVM CRETENSE.

FORMA.

DIOSC. Cretensis herba est pule-
Theoph. gio similis, maioribus tamen
libr. 9. de folijs, quæ tomento quodam
histo. 1. spissa lanugine pubescunt. Ra-
Vir. 1. 12. mulis tenuioribus, in quorū
Aeneid. summis partibus flores exeunt
purpurei. Et deinde semen.
Rara hæc herba est.

LOCVS.

Theoph. Nascitur in Creta Insula in
ibidem. vno tantum loco, ipsoque ad-
modum exiguo.

QUALITATES.

Galen. 6. Tenuiore essentia constat,
simp. me. quam pulegiū. cætera illi si-
diosc. mile. Sed efficacius multo.

VIRES.


DIOSC. Defunctos partus extrahit,
non modò potum, sed appo-
situm quoque aut fustitum:
succus per se illitus, aut cum
hordeacea farina, purgandi vim habet. Herba impactos pedibus, reliquorū
corpore aculeos illitu extrahit: valet ad lienis dolorem. Radix eius gustu cale-
facit, partus accelerat. Succus ex vino potus, auxiliatur à serpente demorsis.
Tanta herbæ facultas est, ut olfacta abigat feras, quæ venenato ictu seuiant, ap-
pensaq; conceptum exanimet: vulneribus ferro illatis, & venenatis ictibus in-
fusus succus, præsentaneum est auxilium.



DICTA-

DICTAMNVM album, Italis, *Dittamo bianco*. Germanis, Gemeiner Diptam.
Gallis, *Diptam bastarde*.

D I C T A M N V M A L B V M :



F O R M A.

Planta est insignis, spectatē *Matth.*
que pulchritudinis, folijs fra-
xini adeo similibus, ut à qui-
busdam chamæmelia: hoc est
infima fraxinus appellari so-
leat. Caulem gerit sesquicu-
bitalem, rotundum, in cuius
cacumine flores exeunt pur-
purei, citrei mali æmulos. O-
dore quadã cum graueolen-
tia, acuto, nō tamen iniuncun-
do. Radice nititur diuaticata
& sæpè singulari, albicante
tenui intus matrice, dum re-
cens est hircum olente, flores
in triquetras siliquas abeunt,
scabro exterius cortice, in
quibus semen.

L O C V S.

Nascitur in collibus, cliuo- *Idem.*
sis, & saxosis.

Q U A L I T A T E S.

Radix cuius est vsus amara
est: excalfacit: attenuat, ape-
rit & abstergit.

V I R E S.

Valet radix aduersus vene- *Idem.*
na, & venenosorum animalium

ictus. Necat interaneorum vermes drachmæ pondere hausta: datur contra
frigidos vteri morbos, nam & menses, & secundas, & emortuum fœtū educit,
tum supposita, tum cum pulegio suffita, tum ex vino meraco duarū drachma-
rum pondere pota. valet quoq; ad alui torsiones, & ad eiiciendos renū calcu-
los. Additur quoq; vtiliter in potionibus internorū vulnerum. Datur comitia-
libus, & in alijs cerebri affectibus. Præstat contra pestilentia contagia, quo quo
modo sumatur. In summa ad multa radix utilis est: Siliquæ & flores contactu
pruritum faciunt, & in calidioribus regionibus cutem exulcerant.

C E N S V R A.

Qui album Dictamnium Dioscoridis Tragium esse contendunt, delirio pro-
culdubio afficiuntur.

G g 5

PSEUDO-

PSEVDODICTAMNVM, Græcis, *ψευδοδίκταμνον*. Italis, *Dittamo falso*.

PSEVDODICTAMNVM.

FORMA.

Matth.

Caulibus exit dodrantalibus, lanuginosis albicantibusque, è quibus folia erumpunt ex interuallis bina, subrotunda, dictamni tomento pubescentia, è quorum omnium exortu flores exeunt purpurei verticillatique vt in apiaſtro, & marrubio: ſapore pulegij, ſed minus acri.

LOCVS.

Idem.

Nascitur in Creta exoluto ſolo.

QUALITATES.

Gal. 6.

ſemp. me.

Pſeudodictamnũ ad omnia imbecillius dictamno habetur.

VIRES.

Minus dictamno acre gultu ſentitur: eoſdem tamen effectus præbet, ſed inefficacius multo.



SALVIA

NOMINA.

473

SALVIA Græcis, *ἑλισσαῖος*. Mauritanis, *Aelüsacos*, seu *Elisacos*. Italis, *Salvia*. Germanis, *Salbey*. Hispanis, *Salvia*, & *salua*. Gallis, *Sauvages*.

SALVIA.



GENERA.

Duum est generum, *Alte* - *Theoph.*
rum quidē vrbānum, alterum *li. 6. ca. 2.*
sylvestre, quod *sphacelus ap- de histo.*
pellatur. *plant.*

FORMA VRBANÆ.

Frutex est ramosus, longus, *Diosc.*
virgas habens quadrangulas *Matth.*
& canas, folia menthæ, maio-
ra, longioraq; asperiora, cras-
siora, & quæ sensim attrito-
rum quasi indumentorum sca-
britiem referant, hirsuta, sub-
albida, odore per quā iucun-
do sed graui. Flores gignit in *Diosc.*
summis caulibus purpureos,
sylvestris homini æmulus, &
semen quoq; simile. Radice
nititur lignosa, fibrosa q;.

LOCVS.

Colitur passim in hortis, & *Diosc.*
sponte quoq; per se nascitur, *Matth.*
arido, & aspero solo.

QUALITATES.

Euidenter calefacit, & *le. Gal. 6.*
uiter adstringit. *simp. me.*

VIRE S.

Menses cit, & vrinas, decoctum foliorum, ramorumq; potum, & partus ex- *Diosc.*
trahit. Auxiliatur quoq; *passinacæ* marinæ ictibus: capillos denigrat: vulne- *Matth.*
rum sanguinem cohibet, tetra vlcera purgat. Foliorum ramorumq; ex vino
decoctum fori testium pruritum tollit. Folia ab vtero gerentibus deuora- *Aetius.*
ta, conceptum roborant ac retinent, si eadem finidæ, laxaq; fuerint, succi he-
mina cum sale pota, prolificas reddit mulieres, si quarto à secubito die biba-
tur, & viris deinde se misceant. Datur succus cyathorum duorum mensura
vtiliter potandus sanguinem expuentibus. Præstat salvia ad omnes capitis pi-
tuitosos affectus, omnesq; articuloꝝ dolores, tam in potionibus, quàm in
fomentis.

SALVIA

SALVIA minor, Græcis, Σάλας. Italis, *Salvia minore*.

SALVIA MINOR.

FORMA.

Folia habet alterius angustiora, & postrema parte auriculata, caules quoque tenuiores, cætera verò similia sunt.

LOCVS.

Nascitur spontè in Hispania, & Gallia Narbonensi, exolutis locis. Et feritur quoque in hortis.

QUALITATES,
ET VIRES.

Ea omnia præstare valet, quæ Salvia maior.

*SALVIA CRETICA
BACCIFERA.

In Creta nascitur Salvia quædam longe tenerior nostrate, lanuginosiorque & candidior, odore quoque præstat & facultatibus, denique hoc peculiare habet ut globuli quidam rotundi gallarum instar illi adnascantur, quibus vesci solent incolæ cum pane. *



MENTHA,

MENTHA, Græcis, ἡδύσμη. Arabibus, *Nahanaha*. Germanis, *Mintz*. Hispanis, *Hierua buena*, & *Ortelana*. Gallis, *Mente*.

MENTHA.

GENERA.

Duum est generum sativa, *Matth.* & sylvestris. Atqui sativa dum quoq; generum est, alterum maius, alterum minus.

FORMA MAIORIS.

Planta est odorata, folijs salvia minoribus, per ambitum denticulatis, caulibus numerosis, floribus in summitate spicatis, subpurpureis, pilosisque, vivax admodum est, namque in hortis semel tantum sata, tam vestibuli fertilitate durat, ut vix in posterum extirpari possit.

LOCVS.

Seritur passim in hortis. *Idem.*

QUALITATES.

Gustu est acris, calidaq; *Gal. 6.* cultate prædita, ex tertio *simp. me.* dantenus excalfacientium ordine, sed minus excalfacit quam calamintha. Haber & in se quiddam amarum, & acerbum: substantia est tenuium partium. Adstringit quoque *Diosc.* ac siccit.

VIREs.

Succus ex aceto potus sanguinem sistit: teretes ventris tinea necat: venem stimulat. Terni rami cum acidi mali punici succo poti, singultus, vomitiones, choleraq; sedant: Folia cum farina hordeacea illita, suppuraciones discutunt. Mammæ item tensas, aut lacte turgentes compescit. Cum sale canum moribus illinitur: vulvæ ante coitum admota, conceptionem impedit. Lactis coire non patitur in ventriculo, si folia lacti immergantur. In summa stomacho utilis est, & in condimentis peculiarè gratiam habet. Aqua stillantia è tota menthæ planta puerperarum mammis cum linteolis admota lactis concretionem inhibet, animum olfactu excitat, vlcera manantia in infantium capitibus mirè sanat.

MENTHA



MENTHA altera, Italis, *Menta minore*, siue *Menta gentile*.

MENTHA ALTERA.

FORMA.

Menth. Folijs exit breuioribus angustioribusque: caulibus rubentibus, floribus quoque rubentioribus: eximio odore.

LOCVS.

Idem. Seritur passim in hortis, & viridarijs.

QUALITATES,
ET VIRES.

Idem. Ea omnia potest, quibus alteram præstare diximus.



MENTHA.

MENTHASTRUM, siue *Mentha sylvestris*, Græcis, *ῥόδον αἰθέριον*. Italis, *Mentastro*. Germanis, *Wilde Minze*. Gallis, *Mente chevahne*.

MENTHASTRUM, SIVE
MENTHA SYL-
VESTRIS.



FORMA.

Folia profert menthæ longè maiora, hirsutiora, ac candidiora: caules cubitales, & flores spicatos, colore subpurpureo, tenuibus undequaque pilis: bene quoque olet.

LOCVS.

Nascitur plerunque vligi- *Idem*. no solo: & propè riuos aquarum.

QUALITATES.

Excalfacit, attenuat, ad- *Matth*. stringit, incidit, & aperit.

VIRES.

Suffiti vapor scæminas à *Idem*. partu purgat. Datur eius decoctum vtiliter anhelosis, & agrè spirantibus, quin etiam mulcendis torminibus qui à flatu oriuntur. Substratū, vel accensum serpentes fugat.

Infillatur succus vermiculosis auribus. Item tum potus, tum testibus illitus nocturnas pollutiones prohibet. Auxiliatur potus, regio morbo affectis: strumosos illitus inuat: ex aceto potus ventris animalia pellit: Folia tam pota quàm illita, præstant aduersus venenosorum ictus.

MENTHA

MENTHA Græca, Italis, *Menta Greca*, siue *Salvia Romana*, siue *Herba di Santa Maria*: Nonnullis *Lassulata*. Gallis, *Coch*. Germanis, *Büser Bräwen Wünn*.

MENTHA GRÆCA.

F O R M A.

Matth.

Folij exit saluæ longioribus latioribusque betonica faciem quadatenus referentibus, circumquaq; serratis: caulibus cubitalibus: nonnunquam maioribus in quorum cacumine flores exeunt corymbacei, melino colore. Planta est in vniuersum amara, non tamen vehementer, subadstringens, & grauiter odorata.

L O C V S.

Idem.

Habetur satis copiosa in hortis.

Q U A L I T A T E S.


Excalfacit, siccat, aperit, roborat, abstergit, & prouocat.

V I R E S.

Idem.

Auxiliatur vterinis affectibus: frigefacit, iecur excalfacit, & vasorum obstructions aperit: illinitur ex irino, aut nardino oleo lienosis, & ex vino feruescitur vrinæ suppressionibus: Lentigines, alphas, & alias cutis fæditates emaculat, illitus noctibus succus: idem Lumbricos enecat: ventriculum roborat tam haultus, quam illitus, & vomitiones compescit. Tota planta tam substrata, quam suffitu serpentes abigit, & eorum venenis resistit, quin etiam infarctus expedit, & caput roborat.

CALAMIN-



CALAMINTHA, Græcis, Καλαμίνθα. Arabibus, & Officinis, Calamentum. Ita-
lis, Calamento. Etruscis, Nipotella. Germanis, Widerdoley. Hispanis, Neue-
da. Gallis, Poullio sauvage.

CALAMINTHA.



G E N E R A.

Trium est generum: Prima DIOSC.
quam nepetâ Latini vocant,
Montana altera, & altera
menthastro cognata.

F O R M A P R I M Æ.

Folij oritur pulegio maio- *Match.*
ribus, subrotundis, hirsutis,
per ambitum leviter serratis,
caulibus cubitalibus, angulo-
sis, foliosisq; atq; pilosis. Flo-
res edit exiguos, purpurascen-
tes, qui à medio caule vsq; ad
sumum, vt in pulegio erum-
punt, at in cacumine copio-
siores habentur. Radices te-
nues, multifidasq;.

L O C U S.

Nascitur in inculto solo, in *Idem.*
apricis, collibus, secus itinera
& scpes.

Q U A L I T A T E S.

Essentia est tenui, & calida, *Gal. li. 7.*
siccaq; tēperie, ex tertio quo- *sim. me.*
dāmodo ordine. Horum ma-
nifesta sunt inditia partim gu-
stu apparentia, partim experi-
entia cognita: Gustu siquidē
acris, & palam calida est, ac
paululum omnino subamari-
quidē valde excalfacit, & mor-

habet. corpori autem exterius admota, primum
dicit, cutemq; laniat, postremo etiam exulcerat.

V I R E S.

Foliorum, florumq; decoctū potum: menses, & vrinas pellit, ruptis, conuul- *DIOSC.*
sis, egre spirantibus, torminibus, horribusq; auxiliatur. Regium morbū expur-
gat: ex vino præsumpta venenis resistit. Tineas, cæteraq; interiorū animalia, cū
sale, & melle pota enecat. Elephāticos esitata adiuuat, si postea serum lactis ebi-
batur. folia detrita, & ex vellerē supposita, menses eliciunt: partus enecant: Ac-
censa aut substrata, serpentes fugant: Ex vino cocta, & illita, nigris cicatricibus
candorem reddunt: succus vtiliter instillatur vermiculosis auribus.

Hh

CALA.

CALAMINTHA montana, Græcis, Καλαμίνθα ὄρειν. Italis, Calamento, *sive* Niporella montana. Officinis, Calamentum montanum. Germanis, Bergminth.

CALAMINTHA MONTANA.

F O R M A.

DIOSC. Folia habet ocimi, incana, furculos, & caules angulosos, & purpureum florem.

L O C V S.

DIOSC. Nascitur in Montibus.

Q U A L I T A T E S , E T
V I R E S.

DIOSC. Paribus cum nepeta tum qualitatibus, tum viribus præstat.



CALA-

CALAMINTHA aquatica. Italis, *Calamento aquatico*. Græcis, *Καλαμίνθα ὕ-
δρεα*. Germanis, *Wassermintz* / *Wasserpoley* / *Troschminz*.

CALAMINTHA AQUATICA.



FORMA.

Menthastrō cognata est, fo- DIOSC.
lijs oblongioribus hirsutisq;
caule, & ramis maioribus,
quam superior.

LOCVS.

Nascitur in campestribus, *Idem*.
asperis, & aquosis locis.

FACULTATES, ET
VIRE.

Suis in viribus, & faculta-
tibus, ceteris inefficacior est.

CENSURA.

Decipiuntur, qui Gatta-
riam herbam tertiam cala-
minthę speciem esse contem-
dunt.

HERBA gattaria, Italis, *Herba gatta*. Germanis, *Nept/Zam Rosenkraut*.

HERBA GATTARIA.

FORMA.

Math.

Planta est vulgaris notitiæ, folia mittens apialtri, aut vriticæ æmula, sed incana, & minora, caules edit quadrangulos, bicubitales, ramos numerosos, & pariter in canos, flores albos circa caules, at qui in summitatibus exeunt, spicati spectantur: Radices habet multifidas: odor vniuersæ plantæ acutus, caput feriens.

LOCVS.

Idem.

Nascitur in campestribus & in agrorum marginibus.

QUALITATES.

Feruido quidem gustu herba est, cum amaritudine haud obscura, exalfacit, & siccacalaminthæ modo.



VIRES.

Valet ad omnes capitis, pectoris, ventriculi, ac vteri morbos, à pituita gentos, menses elicit tam pota, quàm in deflusionibus addita. herba vsus steriles prolificas facit, vbi causa fuerit ab humida frigidaq; intemperie: succus natus inditus, pituitam valenter trahit, & visum acuit: In summa vbi exalfacere opus sit, Gattaria plurimum præstat.


Tur.

NOMINA.

485

THYMVM, Græcis, Θύμος. Mauritanis, *Hæct*. Italis, *Timo*. Germanis, *Römt-
scher Quendel*. Hispanis, *Tomilho salero*. Gallis, *Tim*, seu *Mariolaine de Angle-
terre*.

THYMVM.



GENERA.

Duum est generum: Can- *Theoph.*
didum & nigrum. *lib. 6. c. 2.*

FORMA.

de plant.
hist.

Surculosus est frutex, ex- *Diosc.*
libus folijs, multis, & angu-
stis circumdatus: capitulis in
cacumine flore purpurascen-
te refertis.

LOCVS.

Gracili solo & petroso pro- *Idem.*
uenit.

QUALITATES.

Thymum incidit, & excal- *Gale. 6.*
facit manifestè. *simp. me.*

VIRES.

Cum sale, & aceto, pitui- *Diosc.*
tam per alium detrahit. De-
cocti ius prodest Orthopnoi-
cis, & anhelatoribus: tineas
faciles reddit excreationes. Recentis tumores discutit cum aceto illitum: con-
cretum sanguinem dissolvit: peniles verrucas tollit. Ischiadicis illitum cum
vino, & polenta subuenit: hebetibus oculis in cibo prodest.

Hh ;

SATV-

SATVREIA, Græcis, Θύμρα. Italis, Coniella, Sauroreggia, seu Satvreia.

SATVREIA.

G E N E R A.

Matth. Duo eius sunt genera, Alterum quidem thymo cognatum, Alterum vero fruticosius, & maioribus folijs.

F O R M A P R I O R I S.

Diosc. Thymo tota ferè facie similis est, minoribus tamen folijs, & caulibus, & tota planta tenerior, spicam defert florum plenam coloris herbacei. Aut in purpuram languescens.

Matth.

L O C V S.

Idem. Gignitur in apricis, aspero, & arido solo, & feritur in hortis.

Q U A L I T A T E S.

Paulus. Tymbra sylvestris eadem, quæ thymum præstat: Hortensis autem altera quidem imbecillior est, sed ad ciborum usum gravior, & accommodatior habetur.

V I R E S.

Diosc. Eadem potest, quæ thymum, si modo consimili sumptetur.


SATV-



SATVREIA altera. Italis, Coniella, seu Sauoreggia maggiore, seu Peuerella. Germanis, Pfefferkraut. Kloster Ysop/ Saturon.

SATVREIA ALTERA.

FORMA.



Ramis multis fruticat, rotundis, atque lignosis, folijs thymo maioribus, subspiculis, quæ circum surculos plura simul per intervalla erumpunt: è quorum exortu spicati quidam processus, foliolis quibusdam cæteris longè minoribus stipati prodeunt, è quibus flores exeunt parvi, ac subpurpurei. Radice nititur multifida.

LOCVS.

Non solum feritur in hortis, sed sponte per se nascitur in apricis collibus, & in torrentium alueis.

QUALITATES.

Thymo suis in qualitatibus Idem. similis est, proinde exaltescit, attenuat, aperit, incidit, digerit, & aperit.

VIRES.

Viribus ab altera non differt, Thymi enim facultatibus omnibus referta est. Idem.

Hh 4

SER-

SERPILLVM, Græcis, Ερπιαλδς. Maurit. Hemen. Italis, Serpillo, seu serpollo.
Germanis, Quendel. Hispanis, Serpollio seu serpan. Gallis, Serpuler.

SERPILLVM.

GENERA.

DIOSC. Duum est generum, Hortense alterum: Alterum sylvestre, & huius quoque duo sunt genera.

FORMA HORTENSIS.

DIOSC. Folia & ramulos origani habet, sed candidiores, odore sampsuchi, floribus subpurpureis in spicatis capitulis: gustu admodum acri. Non serpit humi, sed ad palmi altitudinem increscit.

Plinius.

LOCVS.

Matth. Seritur in hortis non solum ad coronas, sed ad ciborum quoque usum.

QUALITATES.

Gale. 6. Vsq̃ue aded exalfacit, vt &
simp. me. menses, & vrinas moueat: est
Matth. autem & gustu admodum acre. Exalfacit, exiecat, digerit, incidit, & aperit.



VIRE S.

Menses potu, & vrinam ciet: Torminibus, ruptis, vulsisque auxiliatur: aduersus serpentes, potu illitūve prodest. Diurnos capitis dolores mulcerum rosaceo, & aceto sincipiti illitum, veteranos iuuat: succus cruentos vomitus sedat, drachmarum quatuor pondere ex aceto potus. Additur bellè in ciborum condimentis.

SER

SERPILLVM sylvestre, Græcis, Ερπυλλος ἄρριος. Italis, Serpollo, seu Serpillo salu-
tico.

SERPILLVM ALTERVM.

GENERA.

Aliud satureiatum, hoc est *Theoph.*
satureiæ odore: aliud citrea- *lib. 6. c. 7.*
tum, quod citrei mali odorem *de plant.*
resipiat. *hijl.*

FORMA.

Ramulos, quod zigis appel- *Diosc.*
latur, edit tenues, furculosos, *Matth.*
folijs refertos longioribus,
durioribus, angustis. Flores
iucundè olent. Quod verò ci-
treum malum resipit, latius
prouenit, humi repens, leuioribus
folijs in girum sese vnà
cum ramusculis diffundenti-
bus.

LOCVS.

Nascitur in collibus, & mon- *Idem.*
tibus apricis.

QUALITATES, ET
VIRES.

Omnia genera paribus pol- *Idem.*
lent facultatibus, verum ta-
men sylvestre ad omnia valen-
tius habetur.

Hh 5

AMA-



AMARACVS, Græcis, Σάμυλον, ἄμαρακος. Italis, & Officinis, *Maïorana*. Etruscis, *Perfa*. Arabibus, *Merzenius*, seu *Morsanguis*. Germanis, *Weycran*. Hispanis, *Maïorana*. Gallis, *Marone*, siue *Mariolaine*.

G E N E R A.

Matth. Duum est generū maius, q̄ vulgò cognitū est: & minus, quod tenuifolium vocatur.

F O R M A M A I O R I S.

Idem. Herba est ramosa: caulibus tenuibus obsequiosis, folijs oblōgis incanis, pilosisq; cauliculos circūquaq; vestientibus, flores edit in summis caulibus spicatos, herbacei coloris, compactili squamarum congerie, vt in origano: è quibus minutum oritur semen. Radicem habet lignosam, ac multifidam, scitur semine, furculo ac viuiracide.

L O C V S.

Idem. Colitur in hortis, & scitilibus: In Ægypto autē, Cipro, & Cizico sponte prouenit.

Q U A L I T A T E S.

Gale. 6. Tenuium est partium, ac
simp. me. digerentis facultatis. Desic-
Matth. cat enim & exalfacit ordine tertio. Planta est odorata tota, & in medicamentis ad plura admodum vtilis. Digerit, attenuat, aperit, & roborat.

A M A R A C V S.



V I R E S.

Diosc. Succus decocti potus conuenit hydropicis iam incipientibus, & ijs, quos vrinæ difficultas, & tormina excruciant: folia ex melle illita suggillata delēt. Men-
Matth. ses trahunt ex pello subdita: illinuntur scorpionum ictibus, additis sale, & aceto. luxatis, tumoribusq; cerato excepta imponuntur: profunt ad oculorum inflammationes cum hordeaceæ farina polline illita. Præstat amaracus ad omnes frigidos capitis, & neruorum affectus, tam illita, quam pota: foliorum succus naribus infusus pituitam à capite trahit, & cerebrum roborat: valet ad pectoris vitia. stomacho vtilis est, tum pota tum illita herba: iocinorosos, & lie-
uolos iuuat: confert ad vteri flatus ac ceteros eiusdem frigidos morbos.

ANA-

AMARACVS tenuifolia, Græcis, Σάμψυκος, ἡ ἀμάρακος λεπτοφυλλος. Italis,
Maïorana gentile. Etruscis, *Perfa gentile*.

• AMARACVS TENVIFOLIA.

FORMA.

Amaracus tenuifolia, folijs, *Matth.*
 cauliculis, floribusq; exit te-
 nuioribus, & odore longè præ-
 stantiori.

LOCVS.

Colitur à mulieribus Italis *idem*.
 in fictilibus, & in hortis.

FACULTATES, ET
 VIRES.

Ea omnia præstare potest, *idem*.
 de quibus in altero diximus
 genere.



SER-

SERTVLA Campana, Græcis, *Μελίλotos*. Arabibus, *Alchimel melueh*. Italis, *Meliloto*. Hispanis, *Corona de Rei*. Germanis, *Ziger Kraut*.

MELILOTVS SIVE SERTVLA CAMPANA.

FORMA.

DIOSC. Planta est cubitalis, statim à radice fruticosa, ramis exilibus, folio trifolio proximis, floribus melinis, parvis, siliquis repandis, numerosis, pluribus, è ramusculorum cacuminibus dependentibus, in quibus semen concluditur minutum, subrufum, odoris non ingrati, cuius est vsus.

LOCVS.

DIOSC. Nascitur in Campania circa Nola, quin etiam in Cizico, & Calcedone.

QUALITATES.

Galen. 6. Mistæ facultatis est: habet enim quiddam adstringens, sed & digerit, & concoquit. Copiosior enim in ea est substantia calida quam frigida.

VIRE.

DIOSC. Inflammationem omnem emollit, præsertim, quæ in oculis, vtero, sede, & testibus erumpunt, si ex passo cocta illinatur, addito oui luteo assato. Recentes meliceridas per se cum aqua & vlcera in capite manantia, illita cum cretacia, vino aut galla sanat: Stomachi dolores, & cruda & cocta cum aliquo ex antedictis leuat: Doloribus aurium mitigandis, cruda ex passo instillatur: In aceto aut rosaceo calefacta capitis dolorem lenit.

CENSURA.

Cum veræ legitimæq; meliloti semen, cuius debet esse vsus, ad nos non deferatur: nonnullis sylvestris lori flores, quidam cuiusdam aurei Trifolij ipsius vice usurpant, sed neuter tamen meliloti vim possidet.

MARTIN.



NOMINA.

493

MARVM, Græcis, Μαργαρίτα. Italis, *Maro*.

MARVM.

FORMA.

Surculosa est planta: flore DIOSC.
origani, odoratiore, folijs
multo candidioribus.

LOCVS.

Nascitur in Cizico; & iuxta DIOSC.
Magnesiam copiosissima. Gale.


QUALITATES.

Herba est parùm acris, a-Galen. i.
maraverò plurimum. de Anti.

VIRES.

Vim habet sisymbrio con- DIOSC.
similem: substringit enim &
modicè calefacit: qua de cau-
sa illita serpentia vlcera sistit,
& in calidas illitiones addi-
tur.

RVTA,



RUTA, Græcis. *Πήρων*. Mauritanis, *Sedeb*, seu *Sedab*. Italis, *Ruta*. Germanis, *Rauten*, seu *Weinraut*. Hispanis, *Aruda*. Gallis, *Rut*.

RUTA.

GENERA.

Matth. Satiua altera, altera verò sylvestris, quæ duplex habetur. Montana, & quæ peculiariter Harmola dicitur.

FORMA SATIVÆ.

Idem. Planta est perpetuè virens, folijs crassiusculis, subpinguibus, ex angusta origine in latitudinem sese pandentibus; colore saturate viridi. Ramos mittit copiosos, furculosque, flores in summitate luteos, hyperici æmulos, è quibus capitula oriuntur quadruplici apice coronata, in quibus pusillum continetur semen nigro colore.

LOCVS.

Matth. Seritur in hortis, apricis
Plin. gaudet, & siccis, terraq; maximè lateritia.

QUALITATES.

Gale. 8. Excalfacit ordine tertio. est
simp. me. autem non solum gustu acrised amaro. itaq; digerit atque incidit crassos lentosque humores. Est & tenuium partium.



VIRES.

Diosc. Vrinam ciet: menstrua pellit. Lethalium medicamentorum antidorum est, & præsertim semen potum: folia cum iuglande, & ficu præsumpta, inefficaces venenorum vires reddunt, & pestilentie contagia superant. Contra serpentes, eodem modo sumere conuenit. Sumpta genituram extinguit, cum anetho sicco decocta tormina sedat: Pota ex oleo feruefacta, ventris tineas excutit: Hydropicis vtiliter cum ficu illinitur: Deuorata visum acuit. Succus in malicorio calefactus aurium doloribus efficaciter infunditur. Trita, & indita sanguinem è naribus fluentem sistit: Mansa ceparum & alliorum acrimoniam domat.

RUTA

RUTA sylvestris, Græcis, *Πύραρον ἄγριον*. Italis, *Ruta saluatica*. Germanis, *Wild-
rauten*.

RUTA SYLVESTRIS.

FORMA.

Folijs, caulibus, ramis, floribus *Matth.*
& capitulis hortensi similis est, sed
folijs gracilioribus, caudice verò
crassiori, lignoso, ac firmo, acriori
quidem, & amariori gustu.

LOCVS.

Nascitur in montibus saxosis, & *Idem*.
apricis.

QUALITATES.

Ex quarto est ordine ex calfacien- *Gal. 8.*
tium. Itaq; hortensi valentius admo *sim. me.*
dum operatur.

VIRES.

Si copiosius estur interficit: si colligatur dum florem promit, cutem inflat, *Diosc.*
& rubore cum pruritu vehementi inficit. Itaque perunctis manibus, & facie,
eam colligere oportet. Semen eius potum contra intestina vitia efficax est. In
antidota commodè additur. Prodest comitialibus & coxendicum doloribus:
menstrua mouet, partus enecat, & utpote noxia herba cibis abdicatur.

RUTA

RUTA sylvestris altera, Græcis, Πήγανον ἄγριον, ἢ ἄγριον. Arabibus, Harmel.
Italīs, Ruta saluatica secunda.

RUTA SYLVESTRIS HARMOLA.

FORMA.


DIOSC. Frutex est, qui ab radice plu-
res emittit caules folijs mul-
to, quàm alterius rutæ longio-
ribus, tenerioribusque, odo-
re graui, floribus candidis, è
quibus capitula summis ramis
oriuntur, satina rutæ maiora,
tenuibus quibusdam foliolis,
ipsisque acutis circumqua;
stipata. in quibus triangulum
occluditur semen; subrufo
colore & amaro gustu.

LOCVS.

DIOSC. Prouenit in Cappadocia,
& Galatia Asiæ finitima, in
collibus, & læto solo.

QUALITATES.

Gale. 7. Vis eius tenuium est parti-
simp. me. um, & calida terrio abscessu:
Ideo crassos humores secat,
& digerit, & urinam ciet.



VIRE.

DIOSC. Semen cum melle, vino, croco, & fœniculi succo, ac gallinaceo felle, teritur
Matth. contra retusam oculorum aciem: cætera cum sylvestri ruta paria habet.

GALE.

GALEGA, siue Ruta capraria. Ethruscis, *Lauanese*. Germ. *Beißkraut*.

GALEGA SIVE RUTA CAPRARIA.

FORMA.

Caulem mittit sesquicubi- *Matth.*
talem, ramosum, folia è ramis
vtrinque prodeunt dena vnde-
nave ab vno pediculo emer-
gentia, oblonga, subpinguiaque;
flores in summitate purpu-
rascentes, è quibus siliquæ o-
riuntur semen continentes.

LOCVS.


Prouenit passim secus iti- *Matth.*
nera, in scrobium aggeribus,
& lato solo.

QUALITATES, ET
VIRE.

Vis illi maxima contra pe- *Idem.*
stilètiā: plurimos enim hu-
iusce plantæ vsu præseruatos
scimus: mirificè quoque valet
aduersus lethalia venena o-
mnia, & contra ferarum o-
mnium venenosos ictus, in
quem vsu succum biben-
dum iubent. & herbam ipsam

vulnere admovent. Datur succus ad cochlearis mensuram necandis intestino-
rum vermibus. Datur idem vtiliter in principio pestilentia affectis, aut eius de-
coctum, ex aceto paratum, addita theriaca, & Armenio bolo. verum à potu su-
dare ægrum oportet. idem præstat ad pestilentes febres in quibus exanthema-
ta, siue maculæ cutaneæ quas pestechias vocant, emerferint. Quæ quidem o-
mnia, sua ipsius speciali dote planta hæc præstat.

Ii Moly,



MOLY, Græcis, Μόλυ. Italis, Moli.

FORMA.

Diosc. Folia habet graminis latiora, humi sparsa: florem albæ violæ similem, sed minorem, magnitudine violæ purpureæ æmulum lactei coloris: caulem cæcidum quaternum cubitorum, in cuius cacumine inest aliquid, quod allij speciem referat: Radix parva bulbosa.


LOCVS.

Pēn. Nascitur circa Pheneum, & in Cillene Archadiæ.

QUALITATES, ET
VIRE.

Contrahentis est facultatis. Mirum in modum valet ad vuluæ apertiones, si tritum Irino vnguento in passo subijciatur.

MOLY.



PANA-

NOMINA.

499

PANACES Heracleum, Græcis, πένανς ἡρακλείου. Arabibus, *Steusir* sive *Ieusir*.
 Italis, *Panace Heracleo*. Huius lachryma, Græcis, δάκρυον πέναντος. Latinis, *Opopanax*.
 Officinis, *Opopanacum*. Italis, *Opopanaco*. Hispanis, *Opoponague*.

PANACES HERACLEVM.



FORMA.

Folijs est asperis ad terram ia- **Diosc.**
 cētibus, herbacei coloris, mul-
 tum ad ficulnea accedentibus,
 in ambitu quinq; partito diui-
 sis. caule vt ferula altissimo, la-
 nugine quadam canescente.
 folijs etiam minoribus re-
 fertus: muscarijs ceu anethi in
 cacumine: luteis floribus, & se-
 mine subamari gustus.

LOCVS.

Nascitur in Cyrene Lybiæ, *Idem.*
 & Macedonia.

QUALITATES.

Opopanax ipse ad plurimos
 est vsus aptissimus, vtpotè ex- **Galen. 8.**
 calfaciens, emolliens, digerēs: *simp. me.*
 exalfacit ordine tertio, & sic-
 cat secundo. Cortex radice,
 exiccatorium simul & exalfac-
 torium est medicamentum,
 sed minus quàm succus; quin
 & nonnullam habet extergen-
 di facultatem: fructus calidus
 & ipse est, ac mensibus mouen-
 dis accommodum.

VIRES.

Opopanax conuenit febrium horroribus, vulsis, ruptis, laterum doloribus, **Diosc.**
 torminibus, & vrinx stillicidijs: bibitur ex vino aut aqua multa contra vesicæ
 scabiem: Menses trahit, vteri inflationes, duritiasq; ex melle dilutus discutit.
 Ischiadicis vtiliter illinitur. carbunculos rumpit: cauis dentium inditus dolo-
 rem mulcet. Illinitur commodissimè vnà cum pice mistum rabidarum bestia-
 rum morsibus: concisa radix, subpositaq; partus extrahit: Ad vetera vlcera effi-
 cax est. Ex melle illita nudata ossa carne circumuestit. Semen cum Absinthio
 potum menses pellit, cum aristolochia præstat ad venenosorum animalium i-
 ctus: & bibitur in vino contra vuluæ strangulatus.

Ii 2

PANA-

PANACES Asclepium, Græcis, *πάνακι ἀσκληπείου*. Italis, *Panace Asclepio*.

PANACES ASCLEPIVM.

FORMA.

Diosc. Caulem emittit tenuem, geniculatum, circa quem folia funduntur fœniculo similia, maiora tamen, & hirsutiora, odorata: in cacumine umbella habetur, vbi flores emicant aurei, acris gustus, & odorati. Radix parua est, tenuis, & amara.

LOCVS.

Matth. Prouenit in montibus apri-
cis.

QUALITATES.

Gals. Minus est calidum, quàm
simp. me. heracleum.

VIRE S.

Diosc. Flores & semina ex melle illita, contra vlcera, phagedenas, & tubercula auxiliarem vim habent: bibuntur aduersus serpentium morsus ex vino, & illinuntur ex oleo.




PANAX

NOMINA.

301

PANAX chironium, Græcis *πανάξ*, siue *πανάξ χειρώριον*. Italis, *Panace chironio*.
Herbarijs quibusdam flos solis. Germ. Heyden Ysep.

PANAX CHIRONIVM SIVE FLOS SOLIS.



FORMA.

Folium habet amaraco si. Diosc.
mle. flos aureus, radix parua,
siue tenuis, quæ non altè de-
mittitur: gustu acri. Flos au- *Matth.*
tem solis, quem panacem chi-
ronium nonnulli faciunt, sur-
culos mittit ab radice nume-
rosos, tenues lignososque, in
quibus folia sunt oblonga hyl-
sopi ferè æmula, concomitan-
tibus minoribus foliolis cu-
mulatim prodeuntibus: flo-
rem pentaphylli, aureum, sed
maiores. Radicem item li-
gnosam adstringenti gustu, mi-
nimè acri.

LOCVS.

Nascitur flos solis in mon- *Matth.*
tibus, & collibus apricis. Chi- *Diosc.*
ronium verò panax in Pelio
monte.

FACULTATES.

Panaces chironium, facul- *Gal. 8.*
tatem Asclepio similem ha- *simp. me.*
bet.

VIRES.

Pota panacis chironij radix serpentium venenis resistit: illita coma eadem *Diosc.*
præstat. Solaris verò floris vis conglutinandis vulneribus ac sanguinis fluxioni *Matth.*
cohibendæ admodum efficax est. sanat quoq; tum oris, tum pudendorum vlce-
ra. Datur quoq; vtiliter ad cruenta sputa, & ad dysenteriam, cum radicibus con-
tritis. In summa, vbi agglutinare, cohibere, roborare sit opus, ea omnia perin-
de præstat, ac omnia symphitorum genera.

CENSURA.

Falluntur qui solis florem chironium esse panacem putant, cum autem pa-
naces chironium, Asclepij vires habeat, & exaltat, & radicem habeat acrem
non video cur ijs subscribere queam.

li 3

*PANAX

*PANAX chironium minus, Flos solis minor, Græcis ἡλιάδινθιον λεπτέφυλλον.


PANAX CHIRONIUM MINUS.

F O R M A.

Non discrepat forma à præcedente, sed magnitudine sola, & foliorum angustia.

L O C U S.

Nascitur in locis incultis apricis, omnemque cultum respuit ut prior.*



*HELL-

*HELIANTHEMON Peruvianum. Flos Solis. Sol Indicus. Germanis, Sonnenblum.

HELIANTHEMON PERUVIANVM.

F O R M A.



Semestrium herbarum omnium facile maxima est, si excipias, quæ pedamento egent. Caulis fere brachium æquat crassitudine, pedes vero vicenos longitudine superat. Huic folia lata, crenata, in mucronem collecta vegeti ad iungunt pediculi. Fastigio insidet capitulum strobilo simile. Sed rotundius latiusque quod in florem tandem explicatur amplissimum, stellato umbone, folijs oblongis aurei coloris ceu radijs cincto, quæ ubi decidere post se relinquunt semen ordine dispositum in alveolis ceu apum fauis.

L O C V S.

Nascitur in Peru & nunc in multis hortis etiam apud nos inuenitur.

Q U A L I T A T E S.

In secundi gradus sine calida putatur & sicca in eiusdem principio.

V I R E S.

Multa æstimationis est ad glutinanda vulnera eius gummi & vniuersa plantam diureticam sortita est, atq; ad expellendos calculos efficacem.*

*HELIANTHEMON PERUVIANVM Proliferum.

Differt à priori multitudine florum. Maximus enim in fastigio summo flos expansus, numerosa sobole inferius annata circumdatur, id quod interdum naturæ luxu, interdum industria fieri solet.*




LIGSTR.

NOMINA.

505

LIGVSTICVM, Græcis, *Αιγυσιον*. Italis, *Ligustico*. Germanorum vulgo, *Wilder Diptam* & *Koskummich*; alijs *wilder Galsan*.

LIGVSTICVM.



FORMA.

Cauliculum fert anethige- *Diosc.*
niculatum, tenuem, & in cir-
cuitu folia fertulæ campanæ
molliora, odorata propè ver-
ticem graciliora, & longè ma-
gis diuisa: in cacumine musca-
rium, in quo semen dependet
nigrum, solidum, & oblon-
gum, fœniculo proximum, a-
cre, & aroma olēs. Radix can-
dida, & odorata, Heracleotici
panacis similis.

LOCVS.

Gignitur in altissimis, aspe- *Idem.*
risq; montibus, ac umbrosis,
maximè circa fluentia.

QUALITATES.

Radix & semen ex genere *Gal. li. 7.*
excalfacientium sunt, aded vt *simp. me.*
vrinas cieant, menses prouo-
cent, & flatus discutiant.

VIRES.

Radicis, seminisque vis, excalfactoria est, & concoquens: prodest ad intesti- *Diosc.*
nos dolores, & ventriculi inflationes, præstat contra serpentium ictus, vrinas
& menses potu trahit. *Idem* præstat apposita radix.

li 5

LIGVSTI-

LIGUSTICVM alterum, Italis, *Ligustico falso*.

LIGUSTICVM ALTERVM.

FORMA.

Mattb.

Caule exit ferulaceo, alis
frequentibus, è quibus rami
disparibus exeunt interuallis:
folijs quinque ex vno petiolo
prodeuntibus, per ambitum
ferratis, Muscarijs fœniculi
similibus: semine quoq; simi-
li, sed longiore, crassioreque:
Radice nititur vegetiore, ex-
terius subnigra, acuto simul,
& subamaro gustu, odoris nō
iniucundi.

LOCVS.

Idem.

Gignitur in altis montibus:
apricis tractibus.

QUALITATES,
ET VIRES.

Idem.

Radicis & seminis vis ex-
calfactoria est: flatus pellit,
frigefacta viscera iuuat, & v-
rinam mirificè ciet.



PASTI-

PASTINACA domestica, Græcis, Σταφυλινθου. Arabib. *Iezar, Gezav, sen Giezar.*
 Italis, *Pastinaca domestica.* Germanis, *Pastenei* seu *Pastinachen.* Hispanis, *Ca-*
naeria blanca. Gallis, *Pasténades.*

PASTINACA DOMESTICA.



GENERA.

Duum est generum, alterum domesticum, alterum agreste.

FORMA.

Domestica caule exit crasso, striato, folijs Elaphobosci maioribus, pluribus utrinque ex vno pediculo prodeuntibus, terebinthi modo, subasperis, & per ambitum denticulatis, umbellas magnas in summitate gerit, floribus melinis, semine fœniculi maiore, acuto, & amariuscule gustu, odoratoq; Radicem habet crassam, teneram, albam, odoratamq; non sine adnatis.

LOCVS.

Seritur passim ab olitoribus in hortis, sumiturque frequenter in cibis.

QUALITATES.

Pastinaca sativa imbecillior, sylvestris ad omnia potentior est; vrinas mouet, & menses prouocat, tum herba quidem tota, tum maximè semen ac radix. Habet porro etiam absterforium quippiam.

VIRES.

Semen potum vel admotum, menstrua mouet, atque eos iuuat, quos vrinæ difficultas torquet, aut lateris dolor excruciat, aut si aqua iucem subiit. Prodest & serpentium moribus, nam id præsumentes serpentium ictu non affici tradunt. Conceptus adiunat. Radix vrinam pellit, venerè stimulat, partus admoti eiicit, folia trita, & cum melle inposita, phagedenas vlcera purgant. Atqui ad hæc omnia sylvestris inefficacior, & in cibo aptior.

PASTI-

PASTINACA sylvestris, Græcis, Σταφυλινὸν ἄγριον. Italis, *Pastinaca saluatica*. Germanis, Wild Möhren.

PASTINACA SYLVESTRIS.

F O R M A.

Diosc. Folia habet gingidij latiora subamara, caulem rectum, scabrum, umbellam similem anethi, in qua flores insunt candidi, & in medio purpureum quiddam. Radix illi est dodrantalis digiti crassitudine odorata, quæ cocta manditur. Semē habet pilosum, acre, & odoratum.

Matth.

L O C U S.


Matth. Prouenit campestri, ac læto solo, locis præsertim incultis, & in collibus amœnis.

Q U A L I T A T E S.

Gal. li. 3. Ad omnia potentior est, **simp. me.** quàm fatiua, magis enim aperit, & magis abstergit.

V I R E S.

Diosc. Præstat omnia quæ domestica, sed longè quidem valentius operatur.



CARO

CAROTA, Italis, Carota, & Carotola. Germanis, Rot und weisse Möhren.

CAROTA.



GENERA.

Duum est generum, alterū *Matth.* radice rubra, alterum alba.

FORMA.

Folia, caules, rami, umbel- *Diosc.* lae, flores, ac semen, sylvestris Pastinacæ per omnia similia sunt. Radix in vno genere purpurea, ac cruenta habetur, in altero alba, napi ferè similis, sapore subdulci, odore nō insuavi.

LOCVS.

Seruntur ab olitoribus pas- *Matth.* sim in hortis in ciborum vsu.

QUALITATES.

Semen & radices, pares cū *Idem.* domestica pastinaca facultates habent.

VIRES.

Non valde distant suis in viribus à domestica Pastinaca. In cibis sumpta radix inflat, & concoctu non adeò facilis est. Rubra coquitur in aqua, & deinde tefellatim inciditur, & in acetarijs cum pipere estur. Alba verò rapi, aut napi modo in carniū iure coquitur.

SESELI

SESELI Massiliense, Græcis, *Σέσελι*. Arabibus, *Sesalios*. Barbaris, *Sifleos*. Officinis, *Siler montanum*. Germanis, *Steinbrech*. Gallis, *Sermontain*.

SESELI MASSILIENSE.

GENERA.

Diosc. Quatuor Seseli genera numerantur, Massiliense, Creticum, Æthiopicum, Peloponense.

FORMA MASSILIENSIS.

Diosc. Folia habet fœniculi similia, crassiora tamē, caulem vegetiorem, umbellam anethi, in qua semen provenit oblongum, angulosum, degustanti statim acre. Radicē gerit longam, iucundi odoris.

LOCVS.

Matth. Nascitur in altis montibus.


QUALITATES.

Galen. 8. Radix, atque etiam semen
simp. me. vsq; aded exalfacit, vt admodum vrinā mouere queat, sed & medicamētum est tenuium partium.

VIREs.

Diosc. Semen & Radix potu stranguriæ & orthopneæ medetur, suffocationib. mulierum, & comitialibus profunt, menses, & pertus trahunt; tussim vererem sanant. Semen cum vino potum concoquit, & tormina discutit. Epialis febribus vtile, contra perfrictiones in itineribus cum pipere, & vino bibitur. Datur in potu capris, ac ceteris pecudibus, quo facilius suos fetus enitantur.

*SESELI



NOMINA.

511

*SESELI Massiliense nonnullorum. Gallis herbarijs Fœniculum tortuosum vocatum.

SESELI MASSILIENSE
NONNVLLORVM.

FORMA.

Tota ferè candida est herba, folia cinerea sunt, exigua & valde diuisa, flores singuli folijs quinis constant, & coniuncti umbellam purpurascens efficiunt, radice nititur longa admodum, sapore tamen ignauo præditam. Semen gignit subamarum, calidum manifestè.

LOCVS.

Crescit in agro Monspe-
sulano.

QUALITATES, ET VIRES.

Nò inepte pro Sesele Mas-
siliense vsurpatur.*



SESELI

SESELI Æthiopicum, Græcis, Σέσλη αἰθιοπικόν. Italis, Sefeli Æthiopico.

SESELI ÆTHIOPICVM.

F O R M A.

DIOSC. Folia habet hederæ maiora, & ad periclymeni modum oblonga. Frutex nigricat, palmitibus in bina cubita extensis, ramis sesquipedalibus (seu spitamæ longitudine) capitulo anethi, semine tritici modo denso, nigro, amaro, Massiliensi odoratio- re, & acriore, multum suavi.

L O C V S.

Matth. Nascitur in apricis montibus.

Q U A L I T A T E S,
E T V I R E S.

Idem.

Nulla qualitarum & virium cum altero intercedit differentia, nisi quodd cum Æthiopicum acrius sit, valentius sua expedit munia.



*SESLI

*SESELI Æthiopicum vulgare, Ceruicellum, Ceruaria, Elaphoboscus, Germanis, Weiß Hirschwurzel.

SESELI ÆTHIOPICVM VVLGARE.

FORMA.



Folia habet oblonga magis quam rotunda, crenata sub-
tus cæcia, annexa pediculis su-
is vni costæ nervosæ infima
parte circumdante caulem è
radice crassa pilosâque, intus
candida, amari saporis, pro-
deuntem diuisumq; in ramos
plurimos umbellas albis flo-
ribus sustinentes, è quibus o-
ritur semen cartilagineum, al-
bum, amarum.

LOCVS.

Nascitur in frutetis mon-
tium.

QUALITATES, ET
VIRES.

Eadem illi ascribunt qui-
dam, quæ Diosc. Æthiopico
suo. Imprimis vero ad colicos
dolores ipsius radix commen-
datur.*

Kk

SESELI

SESELI Peloponnense, Græcis, Σεσέλη πελοποννήσου. Italis, Sefeli Peloponense.

SESELI PELOPONNENSE.

FORMA.

Diosc. Folia mittit cicutæ latiora,
& crassiora, caulē supra Maf-
siliensis magnitudinem feru-
laceum, & latam in cacumine
umbellam, in qua semen lati-
us odoratū & carnosius pen-
det.

LOCVS.

Diosc. Nascitur in asperis, riguis,
& collibus, & in Ida monte,
& etiamnum in Insulis.

QUALITATES, ET
VIRE.

Eadem præstare potest, quæ
& cætera genera.



ANI-

di-
adue
Lac
tum
pani
ctus
culos

N O M I N A.

515

ANISVM, Græcis, ἀνισον. Mauritanis, *Aneisum*, siue *Anexissum*. Italis, *Aneiso*, & *Aniso*. Germanis, *Anis*, & *Enis*. Hispanis, *Matabalua*, & *Terna dulce*. Gallis, *Anis*.

ANISVM.

F O R M A.



Caulem edit rotundum, *Matth.*
cubitalem, ramosum, umbel-
lam candidam mellis odore,
semen oblongum, iucunde
odoratum, sapore sanè misto
ex dulci, acriq; ac etiam ama-
riusculo, ad multa utile.

L O C V S.

Seritur in campis, hortis, *Diosc.*
& viridarijs. Sed optimum *Matth.*
est quod in Creta, & Aegypto
nascitur.

Q U A L I T A T E S.

Semen maximè utile est, *Gal. 6.*
acre, subamarum, vt propè *simp. me.*
adurentium accedat calidi-
tatem. Est autem in siccando
tertij ordinis, sicut in calefa-
ciendo. Aperit, concoquit, *Matth.*
digerit, incidit; prouocat, &
flatus pellit.

V I R E S.

Oris halitum iucundiorem facit, doloris leuamentum præstat, vrinam ciet, *Diosc.*
diluendi vim habet. Hydropicis potum, sitim extinguit. Animalium venenis
aduersatur. Valet, & ad inflationes. Aluum, & alba fœminatum profluvia sistit.
Lac ad mammas elicit. Venerem stimulat, capitis dolores leuat, naribus suffi-
tum, cum rosaceo tritum instillatumq; fractis auribus medetur. Inspergitur *Matth.*
panibus odoris, saporisq; gratia; Datur tostum cum mentha ad cœliacos affe-
ctus. Singultum sedat, tam haustum, quàm olfactum; somnum conciliat, & cal-
culos pellit.

Kk 2

CARVM,

CARVM, Græcis, Καρόδ. Arabibus, Corei, Karavia, seu Carui. Italis, Caro, & Caruo. Germanis, Matt Rümich, Wiesensümmel. Hispanis, Alcaranea. Gallis, Carui.

CARVM.

FORMA.

Matth. Planta est Pastinacæ sylvestris non ab similibus, caulibus ab vna radice pluribus, quadrangulis, cubitalibus, umbellula floribus candidis referta, semine autem longiore, anguloso, subnigricante, radice longa, sapore amariuscule simul & acri.

LOCVS.

idem. Nascitur in pratis, & præsertim in montibus, & conuallibus.

QUALITATES.

Gal. 7. Carui semine excalfacit, & sic
simp. me. cat tertio quodammodo ordine, moderatè acrem qualitatem possidens.

Matth. Aperit, incidit, digerit, concoquit, prouocat, & flatus pellit.

VIRE S.

Diosc. Vrinam concitat, stomacho vtile, os commendat, concoctionem adiuuat, vtiliter miscetur antidotis: Radix cocta pastinacæ modo manditur. Herba pro odore estur. Seminis farina admiscetur vtiliter cataplasmatibus, quæ ad fugillata parantur.

CENSURA.

Ridendus sanè error eorum est, qui rubram carotam, carum legitimum esse contendunt.

ANE




NOMINA.

517

ANETHVM, Græcis, *ἀνθον*. Mauritanis, *Xebet, lebet, seu Sebet*. Italis, *Aneto*. Germanis, *Dillen* seu *Hochkraut*. Hispanis, *Heneldo*. Gallis, *Anet*.

ANETHVM.

FORMA.



Adeo ex omni parte scæni- *Matth.*
culum æmulatur; vt sæpius le-
gentes fallat, nisi gustum con-
sulant. confurgit itaque cauli-
bus sesquicubitalibus, ramo-
sis, folijs capillorum speciem
referentibus, floribus luteis,
flore, & umbella scæniculi, Ra-
dice neq; adeo longa: neque
multis subnixa fibris.

LOCVS.

Seritur in hortis ad cibo- *Idem.*
rum obsonia, & in medicum
quoq; vsum.

QUALITATES.

Adeo excalfacit, vt haben- *Gal. 6.*
dum sit, aut secundi ordinis in *simp. me.*
tensi, aut tertij remissi; exic-
cantium verò ordinis est se-
cundi incipientis, aut primi
finitis. ideoq; meritò in o-
leo decoctum digerit; dolo-
rem sedat, somnum conciliat,

& crudos humores concoquit.

VIRE.

Aridi comæ, feminisq; decoctum potu lacuocat, inflationes, & tormina se- *Diosc.*
dat, aluum, vomitionesque sistit, vrinas ciet, singultum leuat, oculorum aciem
hebetat, genituram restinguit assidue sumptum; vteri affectibus in deflectioni-
bus vtile est. cremati feminis cinis illicus condylomata tollit.

Kk 3

CvMI-

CVMINVM sativum, Græcis, *Kéuivov*. Arabibus, *Camium*, seu *Kemam*. Italis, *Comino*, & *Cimino*. Germanis, *Kümmel*. Hispanis, *Comino*. Gallis, *Comin*.

CVMINVM SATIVVM.

G E N E R A.

Diosc. Duum est generum, sativum alterum, alterum silvestre.

F O R M A S A T I V I.

Matth. Exit caule sceniculaceo, folijs quoq; ferè similibus, sed rarioribus, semine in umbella subflavo, cum grandine quadà odorato, sceniculi maiore.

L O C V S.

Diosc. Seritur passim in Italia in campis, sed sponte quoq; se provenit in Æthiopia, Egypto, Galatia, Cilicia, & Terentia. Tractu gaudet calido, & putrescibili. Quare frequentissimum in maritimis nascitur.


Q U A L I T A T E S.

Galen. 7. Semen qualitatibus est exco-
simp. me. facientis, perinde ac anisi, ligustici, & cari, ex tertio ordine excofacientium.

V I R E S.

Diosc. Excofacit, adstringit, exiccat. Ad tormina, inflationesq; convenit coctum, & cum oleo inditum, aut cum hordeacea farina illitum. Orthopnoicis datur in posca: Demotisis a serpente in vino. Auxiliatur impositum testum collectionibus, impositum cum vva passa, aut loliacea farina, ceratove mensium abundantiam inhibet. Contritum in aceto, & naribus obiectum sanguinis profluvia sistit. colorem bibentium aut perunctorum mutat in pallorem.

CVMINVM



CVMINVM sylvestre, Græcis, Κύνινον ἄγριον. Italis, Comino, seu Cinino saluatico.

CVMINVM SYLVESTRE.

GENERA.

Duosylvestris cumini affi. Diosc.
gnantur genera, primum, &
secundum.

FORMA PRIMI.

Frutice assurgit paruo, cau- Diosc.
le dodrantali, ac tenui, qua-
ternis, aut quinis folijs, tenui
bus veluti serratis, & gingidij
diuisura, in cacumine capitu-
la quina, aut sena habet, mol-
lia, rotunda, in quibus semen
est acerosum gustu satiuo a-
criore.

LOCVS.

Nascitur in collibus, in Ly. Diosc.
cia, & Galatia Asia, atq, Car-
thagine Hispaniæ.

QUALITATES.

Calefacit, exiccat, aperit, Matth.
digerit, incidit, resoluit, &
prouocat.

VIREs.

Bibitur semen ex aqua aduersus tormina, inflationesq;. Item ex vino contra Diosc.
venenatas bestias. Singultus ex aceto sedat, stomacho vtile quem humor vexat.
Sugillata tollit, si manducatum cum melle, & yua passa illinatur. Idem præstat
ijsdem adicetis ad testium inflammationes.

CVMINVM sylvestre alterum, Græcis, κύμινον ἄγριον ἕτερον. Italis, Cimino s' a' uati-
co secondo.

CVMINVM SYLVESTRE ALTERVM.

F O R M A.

Diosc. Planta est satini non dissimi-
lis, quod à singulis floribus ela-
ta promit cornicula, in quibus
semen est melanthio simile.

L O C V S.

Matth. Nascitur in collibus apricis.

Q U A L I T A T E S.

Matth. Semen exalfacit, siccit, ape-
rit, prouocat.

V I R E S.

Diosc. Epotum semen omnium ser-
pentium moribus præsidio est,
calculosis, & ijs qui vrinæ stilli-
cidio vexantur, aut cōcretum
sanguinem cum lotio reddunt
auxiliatur. Sed apij semen fer-
uesfactum postea bibendum est.




CONSO-

CONSOLIDA Regalis. Italis, *Consolida Reale*, seu *ſperone da cavaliere*. Germanis, *Ditterſporen*. Gallis, *Pie d' Allouette*, seu *consolida royalle*.

CONSOLIDA REGALIS.

F O R M A.



Caulem gerit vnicum, ramu
lis multis, tenuibus, longis, di-
uisis, sylvestris melanthij mo-
do. Flores edit purpureos cor-
niculatosque, corniculis ipsis
sursum spectantibus, semē fert
melanthio simile in parvis cor-
niculis, siliquisve conclusum.

L O C U S.

Nascitur plurimum in cam-
pis inter segetes. *Matth.*

Q U A L I T A T E S,
E T V I R E S.

Auxiliatur oculorū Epipho- *Idem.*
ris, inflammationibusq; per se
recens admotum, & eorūdem
tumorib. ex melle. Datur quo-
que iſtericis vtiliter illico à bal-
neo, & ex dulci vino ad vrinae
ardores, calculos eicit, vulne-
ra recentia glutinat, & vlcera
sanat.

Kk 5

AMM,

AMMI, Græcis, *ἀμμή*. Arabibus, *Hanochab*, *Anazaue*, *Nacachau*, seu *Nacachane*.
 Officinis, *Ameos*. Italis, *ammi*. Hispanis, *ammi*. Germanis, *Amrei*.

A M M I.

F O R M A.

Matth. Caulem emittit fœniculaceum, folijs agrestis pastinacæ, semine in umbellis exili, & cumino minutiore, Originum respiciente, odoratum, & acutum.

L O C V S.

Idem. Nascitur in monte Gargano, quod Italum est, quod verò peregrinum ex Alexandria apportatur, Arabicum est.

Q U A L I T A T E S.

Gal. li. 6. Maximè est vtile, facultatis est exaltatorig & desiccatorig, tenuium partium, gustu subamaro, & acri: & clarum est, quodd & digerit, & urinam moueat, fuerit autem in calefaciendo, desiccandoque ex ordine tertio intenso.

V I R E S.

Diosc. Semen facit ad tormina, urinæ difficultatem, serpentium ictus, si cum vino bibatur. Menses prouocat. Miscetur derodontibus cantharidum medicamentis, ut inde exortis urinæ difficultatibus resistat: suggillata cum melle tollit colorem potu aut illitu mutat in pallorem: suffitu cum vna passa aut resina vulvas purgat. Quod ex Alexandria Egypti ad nos confertur, steriles prolificas reddit, si à purgato prius corpore, sumatur tritum in puluere drachmæ pondere diebus aliquot continuis mane ex vino meraco, aut carni iure.

Matth.

C E N S V R A.

Rarò admodum legitimum Ammi in myropolijs habetur.

CORIAN-



NOMINA.

CORIANDRUM. Græcis, *κωνία*. Mauritanis, *Ras*
sen Kuzibara. Italis, *Coriandro* seu *Coriandolo*. Germanis, *Coriander*.
Culantro, seu *Cilandro*. Gallis, *Coriandre*.

CORIANDRUM.



FORMA.

Tenui proaeuit caule, ses- *Matth.*
 quicubitali longitudine, ramis
 numerosis, folijs interne par-
 thenio proximis, quæ veid in
 caulib. habentur, & tenuiora
 sunt, & magis diuisa, flores in
 caulium summitatibus candi-
 cant, è quibus racematim ori-
 tur semen rotundum, ac stria-
 tum. Plâta virefcens grauius
 spirat fætido cimicum odore.
 At semen siccū exuta graueo-
 lentia odoratum euadit, & ad
 multa vrile.

LOCVS.

Nascitur sponte in campis, *Matth.*
 & inter segetes, seriturque in
 campis, & hortis.

QUALITATES.

Ex contrarijs componitur *Galen. 8.*
 facultatibus, plurimum habēs *simp. me.*
 essentia amara, q̄ tenuiū par-
 tiū est, & terrena, nec parū ē
 humiditatis aqueę obtinet, q̄
 tepentis est facultatis. Habet
 autē & adstrictionis paxillū.
Dioscor. in frigidæ facultatis Diosc.
 Coriandrū existimat, cui iustia
 gatur Auicenna, Archigenes,

VIRE.

& Rufus.
 Illitum cum pane, & polenta, ignib. sacris, & vlceribus, quæ serpunt, medet. *Diosc.*
 Epynictidas cū melle, & vna passā testiu inflammationes, carbunculosq; sanat
 cū faba fresa, strumas, & tubercula discutit, sumptū mentem non sine periculo
 mouet, quare continuo, & copioso vsu abstinendū: succus cū cerula, argen-
 tiq; spuma ex rosaceo, & aceto illitus arduentes summe cutis inflammationes e-
 mendat. Semen datur cochlearij mensura vtiliter ad acidus ructus, stomachū
 corroborat, & caput, defluxionibus ventris accommodè administratur; con-
 coctionem cibi adiuvat. Tritū recentibusq; carnib. aspersum prohibet, ne tam
 cito ætatis tēpore putrescant. Ex aqua aut potū, celiacos & dysentericos iuuat.

HERA-

HIERACIVM, Græcis, *Ἱεράκλειον*. Italis, *Hieracio*. Germanis, *Habichtskraut*.

HIERACIVM.

G E N E R A.

DIOSC. Duo Hieracij recensentur genera, maius, & minus.

F O R M A M A I O R I S.

Idem. Magnum caulem emittit, asperum, subrubrum, spinosum, cauum, folia ex intervalis rariuscule diuisa per ambitum soncho similia, luteos flores in oblongis capitulis.

Matth. Vnica nititur radice, recta, lacteo succo prægnante, in summa herba est lactucae sylvestri similis.

L O C V S.

Matth. Nasceitur in campestribus, & collibus incultis locis, & aliquando inter segetes.

Q U A L I T A T E S.

DIOSC. Vim refrigerandi habet, & modicè subltirgendi.



V I R E S.

Idem. Stomacho æstuanti, inflammationibusque illitum prodest. Succus eporus ventriculi erosiones mitigat. Herba cum radice illita vibratis à scorpione ictibus auxiliatur. Succus cum lacte mulierum sanat omnia oculorum vitia, ad id edoctis ab accipitre medicis, aiunt enim eos herbam pede scalpere, & emanantem lachrymam in oculos transferre ad nubeculas abstergendas. Idem in posca potus, alium citat. In vino verò medetur serpentium ictibus: vrinæ difficultatibus succurrit haustus.

HIERA-


NOMINA.

525

HIERACTIVM minus, Græcis, *Ιεράκιον*. Italis, *Hieracio minore*. Germanis, *Ha-*
senstrauch.

HIERACTIVM MINVS.

FORMA.



Herba Cichorio ferè simi- **DIOSC.**
lis est, sed asperiora ei folia *Matth.*
sunt, cauliculi tenues, viren-
tes, subasperi, in quorum ca-
cumine flores exeunt lutei
cichoreæ figura, qui mature-
scentes in pappos euadūt. Ra-
dix illi multifida tenuisque.

LOCVS.

Nascitur in pratis in cam- *Matth.*
pestribus secus itinera, locis-
que incultis.

QUALITATES,
ET VIRES.

Vim suam ad eadem ad quæ
superior impendit.

APIVM,

notus
cichi-
ad id
anan-
posca
cultu-

ERA-

APIVM, Græcis, Σέλινον κηπεύειν. Arabibus, Charfi, Charfi seu Cheres. Italis, Petrosimolo, sed Thusi u Petrosello. Germanis Peterfilien seu Peterfin. Hispanis, Perexil. Gallis, Persil de Iardin.

APIVM HORTENSE.

FORMA HORTENSIS.

Matth.

Notissima planta vulgare nostrum Petroselinum est: exit enim folijs Coriandri amul-
lis compluribus ex vno ramu-
lo prodeuntibus, per ambi-
tum frequenter laciniatis, sed
quæ in caule sunt mutata for-
ma, longa angustaque spectan-
tur. Flores habet exiguos can-
dicantes, & semen Aniso simi-
le. Radice nititur digitali, do-
drantali longitudine, albican-
te, dura intus matrice, raro di-
uaticata, quæ carniū iuribus
passim incoquitur.

LOCVS.

Idem.

Seritur ubiq; ab olitoribus
passim in hortis.

QUALITATES.

Gal. li. 8.

simp. me.

Vsq; adeo calidum est, vt
vrinam & menses cieat. Flatus
quoque discutit, & magis se-
men quàm herba ipsa.

VIRE S.

Diosc.

Illinitur cum panē, aut hor-
deacea farina vtiliter oculo-
rū inflammationibus, astuan-
tem stomachū mulcet. Mam-
marum duritiā ex lacte concreto contractam reprimi: vrinam cieat, siue cru-
dum, siue coctum edatur. Foliorum & radicum decoctum venenorum noxæ
resistit, cum vomitiones excitet: aluum cohibet. Semen vehementius vrinam
impellit. Auxiliatur contra serpentium venena, aut epotam argenti spumam. In-
flammationes discutit. Admiscetur medicamentis, quæ dolorum leuamenta præ-
stant. Thoracis quoque & tussis remedijs. Folia concisa, & cum vino, & oleo
de scorpionibus in patella feruefacta, pubique calida admota remorantem v-
rinam cient.

Matth.



APIVM

NOMINA.

527

APIVM palustre, Græcis, Ελεοσέλινον. Mauritanis, Asarū. Italis, Apio, & Apio aquatico. Germanis, Eppich/ seu Eppich. Hispanis, Perexil daga, & Apio. Gal-
lis, Persil de leau.

APIVM PALVSTRE.

FORMA.

Folia gerit hortensis maio- *Match.*
ra, solidioraque; caulem quo-
que vegetiorem, odore etiam
acutiore, grauiorēve, & qui ca-
put feriat. Radice tamen, flo-
ribus, & semine ferè similibus.

LOCVS.

Prouenit palustribus, & v- *Idem.*
lignosis locis, & feritur quo-
que in hortis.

QUALITATES, ET VIRES.

Eadem illi sunt vires, quæ Diosc.
hortensi inesse diximus.



PETRO-

PETROSELINVM Macedonicum, Græcis, Πετροσέλινον. Italis, Petrofelino Macedonico. Hetruscis, Pittosello Macedonico.

PETROSELINVM MACEDONICVM.

FORMA.

Diosc. Planta est ramosa, vulgari
Matth. petroselino folijs, pxiima, cau-
le crasso, frequentibus alarum
cauitatibus, floribus albis, se-
mine ammi simile, odoratio-
re, sapore acris, & amaro, aro-
ma olente.

LOCVS.

Gal. li. 8. Prouenit optimum in Ma-
simp. me. cedonia in præruptis locis.
& lib. 1. de Nascitur & in Epiro, & Cicla
Anti. dibus insulis, feritur etiã nũc
Matth. in hortis in Italia.

QUALITATES.

Gal. li. 8. Semen maximè vsui est, cum
simp. me. tota etiam herba, vnà cum ra-
dice similem, sed imbecillio-
rem facultatem sortiatur. Est
autem vt gustu acre cum ama-
ritudine, sic & in operibus ca-
lidum, vnà cum incidendi ef-
fectu. Fuerit itaq; ipsum ter-
tij ordinis, tũ calefacientium,
tũ exiccantium.



VIREs.

Diosc. Semen vrinam cit, & menstrua. Prodest contra stomachi, & coli inflationes.
Laterum, renum, & vesicæ doloribus in potu subuenit: admiscetur antidotis v-
rinam cientibus & in theriacis.

LEVISTO

LEVISTICVM vulgare, Græcis, *ἰσσοσέλινον*, Italis, *Leuistico*. Germanis, *Siebstockel*. Gallis, *Ache*, & *Achelarge*.

LEVISTICVM VULGARE, SEV
HIPPOSELINVM.



FORMA.

Caulibus exit crassis bicu- *Matth.*
bitalibus, fruticosisque, ra-
mis multis, multisque alarum
cauitatibus, folijs palustris a-
pij, sed longè maioribus, mu-
scarijs in cacumine grandiori-
bus, albis refertis floribus, se-
mine oblongo fœniculi ma-
iore, tota planta grauius o-
let.

LOCVS.

Seritur in hortis.

Idem.

QUALITATES.

Excalfacit, & siccatur ordine *Idem.*
tertio. quo fit, vt aperire, in-
cidere, digerere, & prouoca-
re valenter possit: perinde ac
cætera selinorum genera.

VIREs.

Ea omnia præstare valet, *Idem.*
quæ de palustri apio dicta
sunt: sed eo imbecillius est.

APPENDIX.

Tametsi vulgare Leuisticum Hipposelinum legitimum non sit, quod co- *Idem.*
ma, & semine illi non respondeat, cum tamen cæteris selinis grandius sit, &
totafacie simile, nemo nobis facessere debet, si hanc plantam Hipposelinum
appellauimus.

SMYRNIVM, Græcis, *Σμύρνιον*. Latinis, *Olus atrum*. Arabibus, *Smirnon*. Italis, *Smirnio*, seu *Macerone*. Hispanis, *Apio Macedonico*. Gallis, *Maccron*.

S M Y R N I V M.

F O R M A.

DIOSC. Caulem habet, & stolones multos, folia latoria, subpinnata, robusta, ad terram infracta, odore medicato, cum quadam acrimonia iucundo. colore in luteum languescente. capitibus caulium orbiculatis ut anethi. semine brassicæ rotundo, nigro, acri, myrrha sapore, ita ut alterum alterius loco cedat. Radix quoque odorata, gustu acri, fauces mordet, succosa, mollis. cortex eius foris niger, intus viridis, aut subalbidus.

L O C V S.

Idem. Nascitur in saxosis, & collibus, atque squallidis, & limitibus, terrenis. Acetiam in hortis feritur.

Q U A L I T A T E S.

Gal. li. 8. Ex eodem genere & ipsum cum apio est, & petroselinum: fueritque apio calidius, petroselino vero imbecillius, calidum siccumque tertio ordine.

V I R E S.

DIOSC. Folij in muria maceratis ad obsonia utuntur, aluum sistunt. Radix potest præstare aduersus serpentium ictus, tussis, & Orthopneas mitigat, vrinæ difficultati medetur: illita recens tumores, collectiones duritiâsq; dissecat, vulnera ad cicatricem perducit. partus abortu vitiat, si feruefacta subijciatur, semini lenis, venum, & vesicæ vitij prodest. Menses, & secundas pellit. Commodè datur Ischiadicis in vino. Inflationes stomachi lenit, sudores ciuit, & ruet. Peculiariter datur hydropicis in potu, & contra febrium circuitus.

SMYR-



SMYRNIUM Creticum, Italis, Smirnio di Candia.

SMYRNIUM CRETICVM.

FORMA.



Folia fert nostrate Smyr. *Matth.*
 nio crassiora, quina ab vno
 pediculo exeuntia, & per am-
 bitum serrata, præter quàm
 in altera parte propè pedicu-
 lum, quo in loco succisa spe-
 ctantur. Longè autem diuer-
 sa habentur, quæ in caule sunt.
 Ea enim rotunda visuntur,
 caulibus per medium transe-
 untibus perfoliata vocatæ
 modo, nullis in ambitu den-
 ticulis. Caulem edit firmum,
 striatum, & subter folia geni-
 culatum. Umbellas in sum-
 mis caulibus gerit, floribus
 albicantibus, semine rotun-
 do, anguloso, & in acutum
 desinente, sapore acuto, &
 amariuscule. * Radix est prio-
 ris Smyrni sed minor.*

LOCVS.

Nascitur in Creta Insula, & *Idem.*
 feritur nunc in Italia.

QUALITATES,
 ET VIRES.

Non differt suis in qualitatibus, & viribus ab Italico Smyrnio.

Idem.

LI 2

IMPE-

pota
 dif-
 vul-
 r, se-
 lom-
 & ru-
 IYR-

IMPERATORIA, Italis, *Imperatoria*. Germanis, *Meisterwurk*. Officinis Germanorum, *Magistrantia*. Gallis, *Orrube*, seu *Imperatorie*.

IMPERATORIA.

FORMA.

Matth.

Folij exit Sphondylii, minoribus tamen, solo accubantibus, robustis, hirsutis, asperisque: caule bicubitali, purpurascente, rotundo, hirsutoque, in cuius cacumine umbella floribus candidis ornatur, è quibus postea semen prodit acutum, ac odoratum. Radix inest ei non longa, mediocriter crassa, rugosa, dura, quæ foris nigricat, intus verò virescit, gultu admodum acri, mordax, subamara, & odorata.

LOCVS.

Idem.

Nascitur in altis montibus.

QUALITATES.

Idem.

Excalfacit ordine tertio completo, aut quarto inchoante. Incidit, trahit, aperit, digerit, attenuat, prouocat, resoluit, venena dissipat. Zedoariæque facultatibus pollet.

Idem.

VIRE.

Discutit mirificè tum intestinorum, tum ventriculi flatus. Cit menfes, atque vrinam. Fouentur eius decocto vtiliter in dolore dentes, præsertim si in vino austero radix decoquatur. Eadem ex vino pota vteri stragulationibus prodest, conceptus adiuuat, quos frigiditas intercipit, concoctionem roborat. Comanducata cerebri pituitam trahit. Pulvis radice ex saluæ decocto haustus, auxiliatur resolutis, comitialibus, veteriosis, conuulsisq; Oris halitum commendat, & omnes roborat sensus. Præstat ferè ad venena omnia, omniumque venenofarum ferarum morsus, ac idus. Asthmaticos, anhelososq; iuuat, obstructions aperit. Hydropicos, ac lienosos curat. In summa excalfacit vniuersas corporis partes, quas frigus occupat.

* IMPE-



NOMINA.

533

* IMPERATORIA Alpina, vel Aстранtia Alpina. Germanis, Bergstrenk.

IMPERATORIA ALPINA.

FORMA.

Minor est quam præcedens, omnibus suis partibus, nam & angustiora folia & pedicillos teneriores profert ex radice non abfimili nostræ Imperatoriæ, & æquali etiam, gustu acriori & magis virente.

LOCVS.

Prouenit in alpihus apud Heluetios.

QUALITATES.

Calida est & sicca, vt vulgaris Imperatoria, qua superior esse facultatibus omnibus videtur, & ad agendum promptior.

VIRES.

Vtuntur hac planta ad quartanas, partus eruendos & cerebrum expurgandum, flatus discutiendos, colicisq; dolores sedandos, id quod vulgaris nostra quoq; prætare potest.*

LI 3

FOENI-



FOENICVLVM, Græcis, *Μάραθρον*. Arabibus, *Raïenigi*. Italis, *Finocchio*. Germanis, *Fenchel*. Hispanis, *Hinoio*, *sive Funco*. Gallis, *Fenoul*.

F O E N I C V L V M.

F O R M A.

Matth.

Caulem edit anethi, sed crassiorē, nec proceriorem, striatum, geniculatumque, folijs numerosis, capillaceis, caulis alarum multis. Umbellis cacumina occupantibus, anethi æmulis, melinis floribus, & semine oblongo, gustu acuto, quadam cum leniuscula amaritudine, odorato. In quodam verò genere hortis Italicis familiare, semen dulce percipitur, & crassiori quoque mole spectatur. Radice nititur longa, digitali crassitudine, acuto, ac amariusculo sapore, cum dulcedine quadam.



L O C V S.

Idem.

Seritur in hortis, vineis, & apricis locis.

Q U A L I T A T E S.

*Gale. 7.
simp. me.*

Tam valenter excofacit, ut ex tertio excofacientium ordine censei possit, desiccatur verò non æquē. Sed ipsum quispiam in hoc primi esse ordinis posuerit: sylvestris verò cum semine, tum radix, valentius calefacit, & siccat.

V I R E S.

Diosc.

Herba deuorata, aut semen cum Ptilana potum mammas lacte replet. co-mæ decoctum in renum doloribus infusum prodest. Bibitur ex vino contra serpentium ictus. Menses ciet, contritæ radices, & cum melle illitæ canum moribus medentur: Succus caulium, & foliorum præstat instillatum ad excitandam oculorum aciem. Erratici autem potæ stranguriæ medentur. Menses suppositæ ciet, aluum sistunt. Radice, aut semine potio calculos committit, regium morbum expurgat, lactis abundantiam facit. Decoctum foliorum hauftum puerperas purgat.


DAVCVM

NOMINA.

335

DAUCUM, Græcis, Δαύκον. Mauritanis, Ducu Glezar, siue Gezar. Italis, Dau-
co. Germanis, Dertwurh. Hispanis, Dauco. Gallis, Carote sauvages.

DAUCUM.



GENERA.

Trium est generum, Cre- DIOSC.
ticum, Aliud Apio simile, &
Terrium Coriandro.

FORMA CRE- TICI.

Creticum folijs est fœnicu- DIOSC.
lo simile, minoribus tamen,
& tenuioribus, caule dodran-
tali, umbella coriandri, flore
albo, candido, hirsuto, sua-
uissimi manducando odoris.
Radix digitali crassitudine, & Matth.
dodrantali longitudine ado-
lescit.

LOCVS.

In saxosis nascitur, & locis DIOSC.
sole illustratis.

QUALITATES.

Agrestis quidem domesti- Gal. 6.
co minus est esui idoneus. sim. med.
Ceterum in omnibus vehe-
mentior. At domesticus co-
mestibilis quidem sed imbe-
cillior. Acrem & calefacien-

di facultatem obtinet, ac proinde etiam extenuandi. Certè radix præter iam
comprehensa flatuosum quiddam obtinet, ac venereum. Id quod Domestici
quoque semen præstare potest.

VIRE.

Creticum omnium probatissimum, Semen omnium potum vrinas, & men- DIOSC.
ses, atque partus extrahit. Torminibus liberat, vetorem tussim mitigat. Ex vino
potum auxiliatur Phalangiorum ictibus, tumores illi discutit, cretici pecu-
liatiter radix maxime præstat contra venenatorum ictus ex vino pota.

Ll 4

*DAUCVS

FORMA.

Quæ apud nos habetur pro Daucio Cretico, planta est folijs ferè fœniculi, nigrioribus & minoribus, femine oblongo acuminato subalbido hirsuto aromatici saporis cum manditur & odorato. Flores in summitate cauliculorum palmi altitudinem raro excedentium, nisi soli luxuria adiuuentur, umbellam candidam constituunt. Radice nititur crassa, & longa.

LOCVS.

In montibus Vicentinis hic Daucus plurimus prouenit.

FACULTATES.

Huc refer quæ suo ascribit Autor, nam figura non differt à vero Cretico qui ad nos afferri solet, viribus tantum eo paulo inferior. *



DAVCVM


NOMINA.

337

DAUCVM alterum, Græcis, Δαῦκον ἑτέρον. Italis, Dauco d'altra specie. Germanis, Schwarze Hirschwurzel.

DAUCVM ALTERVM.

FORMA.



Folij est coriandri, floribus in umbella albis, capite, & semine anethi, muscario pastinacæ, semine oblongo ceu cumini, acri. Radice pastinacæ sylvestris, superiore parte villosa.

LOCVS.

Nascitur in maritimis, pro-
montorijs, & montibus, &
collibus.

QUALITATES,
ET VIRES.

Viribus iisdem refertus est, Galen.
quibus & Creticum, sed non Diosc.
adeo efficacibus.

LI S. SENA,

SENA, posterioribus Græcis, *Σένα*. Arabibus, *Sene*. Italis, *Sena*. Germanis, *Senet*. Gallis, *Sene*.

F O R M A.

S E N A.

Matth. Folij est Glycyrrhizæ proximis, crassis, subpinguibus, fabarum recentium sapore, caule cubitali, à quo ramuli exeunt flexiles. Flores ei emicant aurei, veluti brassicæ, purpureis intercurrentibus venulis, quibus succedunt folliculi falcati, adeoque sui naturæ compressi, ut superior membrana inferiori cohæreat, in quibus semine continetur subuirescens, vinaceorum nucleis simile. Folliculi è ramusculis prominent tenui pediculo nitentes. Planta est frigoris impatiens.

L O C U S.

Idem. Seritur in Hetruria, in agro præsertim Florentino in campis.


Q U A L I T A T E S.

Idem. Aperit, aluum citat, digerit, concoquit, exalfacit, attenuat.

V I R E S.

Idem. Educit bilem tum atram, tum flavam, ac etiã pituitam, quod sanè experientia comprobatur. Mundat cerebrum, iecur, lienem, pulmonem, atque omnes corporis sensus, viscerum obstructions aperit. Auget iuuentutem, seniumque retardat, & animum hilarem facit. folia in capitis perfusionibus vtiliter decoquantur, addita præsertim Anthemide. Roborat enim hoc modo cerebrum, nervos, oculorum aciem, & auditoriam facultatem. Optima demum in vniuersum est Medicina morbis omnibus diuturnis, & melancholicis. Ideoque delirij, amentie, resolutioni neruorum, phthiriasi, cephalalgia, scabiei, pustulis, pruritu, & Epilepsia. Cor etiam roborat præsertim ubi eis commisceatur medicamentis, quæ ad cordis affectus sunt idonea. Est præterea Sena clemens, & nullius incommodi medicamentum, adeo ut tuto dari possit cum pueris ætate tenellis, tum etiam vterogentibus. Fit ex folijs vinum vindemiæ tempore, quod ea omnia præstat potum.

* S E N A



manis,
 NOMINA.
 *SENA Alexandrina, Gallis, *Sene de Leuant.* Hispanis, *Sen de Alexandria.* 339

SENA ALEXANDRINA.

FORMA.


Oblongiora & in acumen
 vergentia habet folia, omni-
 bus suis partibus tenerior est:
 vulgari.

LOCVS.

Ex Alexandria Ægypti ad
 nos conuehitur.

FACULTATES.

Valentius præstat ea vni-
 uersa quæ vulgo vsitata.*



COLLY-

COLLVTEA, Græcis, Κολλυτῆα. Italis, Collutea. Germanis, Schaffinsien.

C O L L V T E A.

F O R M A.

Theoph.
lib. 3. c. 11.

Arbor est magnitudine præstans, fructum in Siliqua ferens magnitudine lentis, quo oves mirum in modum pinguescunt; Folium habet non absimile fœnogræco.

L O C V S.


Matth

Nascitur plurima sponte in Ananienſium, & Tridentinorum agro.

Q U A L I T A T E S,
E T V I R E S.

Idem.

Semen potum vomitiones ciet, perinde ac genistæ, & alium quoque citat, non sine incommodo tamen, quam pecudibus nihil tale efficiat.



* COLV.

*COLUTEA Scorpioides. Græcis, Κολοῦτεια σκορπιόειδης.



FORMA.

Sic vocata est hæc planta, quoniam folio coluteæ & penè flore proueniat. Caule quoque lignoso simili eidem sed graciliore, siliquis verò Scorpioidi perquam respondentes. Radix buxea subdulcis amaritudinem habet admixtam, ingrato sapore.

LOCVS.

Nascitur in syluis, & prope fluminum carpidines. Inuenitur etiam in montibus.

QUALITATES.

Gustata astringit, & linguã vrit.*

PYRE-

PYRETHRVM, Græcis, Πύρεθρον. Arabibus, Macharcaraba, seu Hacharcharba. Italis, Piretro. Germanis, Bertram. Hispanis, Pelitre. Gallis, Pyethre.

PYRETHRVM VERVM.

F O R M A.

DIOSC. Folia caulemq; mittit perinde ac sylvestre daucum & feniculum, umbellam anethi circinnatæ rotunditatis. Radicem longam pollicis crassitudine, feruidissimo gustu.

L O C V S.

Matth. Prouenit in montibus.

Q U A L I T A T E S.

Gal. lib. 8. Pyrethri radice potissimè
simp. me. vtimur, causticam, vrentem-
ve facultatem obtinente, qua
vtique dentium refrigerato-
rum dolores lenit, & ad rigo-
res ante periodos ex oleo cō-
fricatur.

V I R E S.

DIOSC. Mansa pituitam elicit, ideo
in dentium dolore cocta in
aceto, & colluto inde ore au-
xiliatur. sudores ciet perun-
da ex oleo corpori, diuturnis horroribus efficax est, stupidis quoque ac reso-
lutis mirifice confert.



PYRE-

NOMINA.

343

PYRETHRVM alterum, seu PseudoPyrethrum. Italis, *Piretro secondo*, sine
Piretro falso. Germ. *Beinein Vertram*.

PYRETHRVM ALTERVM.

FORMA.

Folia fert Libanotidis, seu *Matth.*
Anthemidis crassiora, cau-
lem ramosum, foliosumque,
florem maioris Bellis gradio-
rem, colore intus aureo, &
per ambitum candido, Radi-
cem pollice crassiore, mul-
tifidamque.

LOCVS.

Nascitur in Boemæ mon- *Idem.*
tibus, ac etiam inibi in hortis
feritur.

QUALITATES.

Radix vrentis est faculta- *Idem.*
tis, quadam cum lenicula ama-
ritudine. Ideoque fuerit ex
quarto excalfacientium or-
dine.

VIREs.

Et si viribus videatur altero infirmioribus, potest tamen eius vicem com- *Idem.*
modè explere.

ROSMA-



ROSMARINVM, Libanotis. Græcis, Λιβανωτίς. Mauritanis, Xaier almerium, Alpinalfach, seu Cachola. Italis, Rosmarino.

G E N E R A.

ROSMARINVM.

DIOSC. Duo eius habentur genera, vnum fecundum, quod duplex est, alterum sterile.

F O R M A.

DIOSC. Folia habet fœniculi, crassiora, & latiora in rotæ speciei humi sparsa, iucundè olentia, caule cubitalem aut maiorem, multis concavum alis. In cacumine umbellam, in qua semen copiosum, candidum, Sphondylion simile, acre, resinaceum, & quod in mandendo linguam exurat. Radix Thus redolet, candida, prægrandis. Alterum omnino cõsimile. Semen ferens latum nigrum, vti Sphondylion, odoratum minime exurès. Radice foris nigra, intus si frangatur alba. Quod autem sterile dicitur, illorum planè similitudinem refert, sed neq; caule, neq; florem neq; semen profert.

L O C V S.

DIOSC. Nascitur in saxosis & asperis.

Q U A L I T A T E S.

Galen. 8. Omnes eiusdem sunt facultatis, emollientis, & digerentis, & incidentis.

DIOSC. Trita omnium herba communiter hemorrhoidum profluvia sistit. sed inflammationes, & condylomata mitigat. Cõcoquit strumas, & abscessus, qui ad maturationem ægrè perducuntur. Sicca radices cum melle vlcera purgant cum vino potæ torminibus medetur, & serpentium moribus opè ferunt. Vrinæ cient, & menses. Veteres tumores illi discutiunt. Succus cum herba, tum etiam radicibus, ex melle illitus oculos exacuit. Idè præstat epotum semè. Valet ad comitiales, diuturnaq; pectoris vitia. Datur cõmodè Ictericis cum vino, & pipere. Sudores mouet ex oleo perunctum. Illinitur podagris cum aceto, & Loliacea farina, Vitilignes purgat, addito quâ acerrimo aceto. Semine secundi generis vtendo, nam primi quod cachrym appellant, sua acrimonia arteriam exasperat.

R O S M A -



NOMINA.

545

ROSMARINVM coronarium, Græcis, *Λιβανὸς στεφανώμακκὸν*. Arabibus, *Elkialgeber*. Italis, *Rosmarino coronario*. Hetruscis, *Ramerino*. Germanis, *Rosmarin*. Hispanis, *Romero*. Gallis, *Rosmarin*.

ROSMARINVM CORONARIVM.

FORMA.



Rosmarinū, quo coronarij **Diosc.** vtūtur, ramos mittit tenues, & circa eos folia oblonga, angusta, densa, subter incana, superne virētia, & odorata. Flo- **Matth.** ret bis in anno, vere videlicet & Autumno, floribus odoratis, in purpura albicantibus.

LOCVS.

Nascitur sponte nōnullis in **Matth.** regionibus, vtpote in prouincia Narbonēsi, & seritur passim in hortis, & viridarijs.

QUALITATES.

Excalfacit, attenuat, dige- **Idem.** rit, resoluit, aperit, roborat, incidit, abstergit.

VIREs.

Ictericos sanat, si decoctum **Diosc.** eius ante exercitationes bibatur. Prodest ad frigidos ven- **Matth.** triculi affectus, ad celiacas passiones, & vomitum cibi, si cum pane deuoretur, aut sicci puluis ex vino meraco bibatur. Prodest tum lienosis, tum iocinerosis, non solum enim

sed sua adstringenti vi etiam roborat. Valer ad capitis defluxiones, ac etiam ad eius frigidos morbos, nempe ad comitiales, stupidos, veterinosos, resolutosq; Additur vtiliter in capitis lotionibus, & articulorum fomentis. Cohibet alba veri profluvia diutius sumptum, visum acuit, si eius folia, & flores cum pane, & sale dum floret quotidie edantur. Mansum oris halitum commendat. Sistit hoc decocto calido os colluatur. Sicci farina inspersa, vulnera glutinat, quæ prius vino, in quo decoctum fuerit, fuerint elota. Parantur è virgis dentiscalpia, & carbones ad piēcturas delineandas. Flores saccharo asseruati valent ad omnia prædicta. Præstat etiam admodum in obsoniorum vsu.

Mm

ROsMA-

ROSMARINVM sylvestre, Italis, *Rosmarino saluatico*. Germ. Wild Rosmarin.

ROSMARINVM SYLVESTRE.

FORMA.

Matth.

Crescit hæc planta cubitali altitudine, fruticosa, virgis tenuibus, lignosis, rufescentibus, fragili tamē materie. Folia in his erumpunt numerosa, coronarij rosmarini æmula. prona parte viridia, supina verò rufescentia, rubroque nitentia pediculo. In surculorū summitatibus corymbacea coma visitur rubro colore, è qua flores prodeunt sublucci. Radice est infirma, & superuacua, planta est odorata.

LOCVS.


Idem.

Nascitur in Boemia, & Polonia vlginosis locis.

QUALITATES.

Idem.

Excalfacit, attenuat, aperit, roborat, concoquit, resoluit, incidit, & digerit.



VIRES.

Idem.

Præfertur Boemis contra tineas, & blattas, quæ vestes lacerant, quare ijs interponunt. Sed ad ea omnia efficax est, ad quæ coronarium Rosmarinum præstare diximus, præterquam ad ciborum condimenta.


*ROSMARINUM

N O M I N A.

*ROSMARINVM sylvestre minus.

547

F O R M A.



Multo minor & tenerior est priore, lignosis atque tenuibus virgis ultra palmi altitudinem paululum assurgēs, vel ad plurimum dodrantem æquans. Folia acuminatiora sunt, & inferiore parte cæsia. In furculorum summitatibus flosculi prodeunt rubelli, è quibus semen, prioris plantæ semini simile. Odor ipsius vix percipi potest.

L O C V S.

Nascitur in Borussia in sylvis umbrosis vliginoso solo prope priorem, quæ ibi humanam staturam pene superat.*

Mm 2 SPHONDY-

SPHONDYLIVM, Græcis, Σφονδύλιον. Italis, *Sfondilio*. Germ. *Werenflau*.

SPHONDYLIVM.

FORMA.

DIOSC. Folia quadam tenus platani, & panacis habet, caules fœniculaceos, cubitales, aut maiores, in quorum cacumine semen duplex, seseli simile, sed latius, candidius, & magis paleaceum, gravis odoris, flores eius albi, aut pallētes. Radice Raphani candida.

LOCVS.

Idem. Nasclitur in palustribus, & aquosis.

QUALITATES.

Galen. 8. Semen acre est, & siccantis simp. me. facultatis, & radix nimirum similis est.

VIRES.


DIOSC. Eporum semen pituitam per aluum extrahit. Medetur iocinoris vitij, regio morbo, comitialibus, orthopnoicis, vteri strangulationibus, & veterinosos sufficit uocat. Infunditur commodè cum oleo capitibus lethargicorum. Item capitis doloribus, cum ruta illitum serpentia vlcera cohibet. Radix eadem præstat peculiariter autem circumrasi & iniecta callos fistularum derodit. Recentium florum succus infunditur purulentis auribus.

FERVLA,



FERULA, Græcis, Νάρθηξ, Italis, Ferola. Hispanis, Cananbeia. Gallis, Ferule.

FERULA.



FORMA.

Ferula grandis admodum *Theoph.* surgit, vnico tantum caule ac *li. 6. ca. 2.* geniculato, folia, & cauliculi *de hist.* quidam erumpunt, ac alter- *plant.* natim exeunt folia, quæ grandia, mollia, multifida sunt, adeo vt capillamenti modò ferè spectetur, præsertim quæ terræ proxima sunt. Flos melinus, semen obscurum, anetho simile sed maius. Finditur cacumine, & in stipites haud magnos disperditur, quibus flos, semenq; insidet. Annuo caule constat. Radice altè descendit, eademq; singulari innititur.

LOCVS.

Æstuosis nascitur locis, qua- *Matth.* re Apuliæ solum maximè ferularum est ferax.

QUALITATES.

Ferulæ semen excalfacit, & *Galen. 8.* attenuat. At interna eius pars *simp. m.e.* recens adhuc, quam medullam vocant, adstringenti pollet facultate.

VIRES.

E viridi caule medulla pota valet ad cruentas excretiones. Datur ex vino *Diosc.* contra viperarum morsus. Erumpentem è naribus sanguinem indita sistit. Semen potum torminosi auxiliatur, sudores ciet vncto ex oleo corpore. Caulis si edantur capitis dolores faciunt. Asinis gratissimæ sunt in pabulo feru- *Plin.* læ, cæteris verò iumentis præsentaneo veneno. Murenis infestissima ferula est, tacta siquidem ea moriuntur.

Mm 3

PEVCE-

PEUCEDANVM, Græcis, Πευκέδανος. Arabib. Herbatum. Italis, Peucedano.
Germanis, Harstrang.

PEUCEDANVM.

FORMA.

DIOSC. Caulem emitit tenuem, gracilentum, fœniculo similem, comam habet statim à terra copiosam, spissamq; flore luteo. Radice nigra, crassa, succosa, graui odore.

LOCVS.

Matth. Prouenit in montibus.


QUALITATES.

Galen. 8. Peucedani radice quidem
simp. me. maximè, sed & succo, & liquore utimur. Sunt enim hæc omnia eiusdem specie facultatis, sed valētior succus admodum exalfaciens, & digerēs; incidit quoque, & extenuat.

VIRE S.

DIOSC. Ex aceto, & rosaceo illitum veteriosis, phreneticis, comitialibus, & diuturnis capitis doloribus, resolutis, ischiadicis, conuulsis, & omnibus in vniuersum neruorum vitijs ex oleo, & aceto illitum prodest, eius olfactu respirant vuluæ strangulatus, & veteriosi reuocantur. Incensum serpentes abigit. Aurium doloribus conueniēter ex rosaceo instillatur. Dentium dolorem mulcet eorum cauis inditum. Contra tussim efficacissimè ex ovo assumitur, suspirijs, torminibus, & inflacionibus subuenit. Ventrem leuiter emollit. Lienem absūmit, difficiles partus mirè adiuuat. Facit ad vesicæ cruciatus, & renum distentiones potum, vuluam aperit. Radix ad eadē vtilis est, sed inefficacior. Farina eius sordida vlcera purgat, & vetera cicatrice obducit, squamas ossium detrahit.

MELAN-



NOMINA.

551

MELANTHIVM, siue Git, Græcis, *Μελάνθιον*. Mauritanis, *Xamin*, *Sunis*. seu *Sunici*. Italis, *Melanthio*, seu *Niella*. Germ. *Schwarz Kümnel* / siue *Schwarz Coriander*. Hispanis, *Negulla*, & *Alipiure*. Gallis, *Barbue poyurette*, siue *Nielle*. Officinis, *Nigella*.

MELANTHIVM SATIVVM.



GENERA.

Duum est generum, satiuū, *Matth.* & sylvestre, quod duorum pariter generum est.

FORMA SATIVI.

Surculis exit exilibus, cubitalibus, folijs Senecionis, sed magis diuisis. Floribus in cacumine ceruleis, & in stellæ modum radiantibus, è quibus capitula oriuntur parua, oblonga, pluribus coronata apicibus in internam partem reflexis, intercurrentibus intus membranis, vt in papaueris capitibus. Semen intus cõtinetur paruū, nigrū, & quandoq; subflauū, odore eximio, sapore amariusculo, simul & acuto.

LOCVS.

Seritur in hortis.

Idem.

QUALITATES.

Exalfaciatq; desiccatur dine tertio, videtur et tenuiū esse partium, in summa vbi incisione, extersione, desiccatione, & exalfectione est opus, præstantissimū id remediū est.

VIRES.

Illitum fronti capitis doloribus subuenit, discentit recentes oculorum suffusiones, tritum, & naribus infusum, cum aceto illitū lepras, lentigines, duritias, tumoresq; vetustos tollit, circūscarificatos clauos excutit, cū veteri vrina impositum, teretes vëtris tinea expellit, peruncto ex aqua vmbilico. Destillationis laborantes adiunat tritū in linteo, & olfactum, vrinā, & menstrua ciet, multis diebus sumptum, & lac extrahit. Ex vino potum aufert spirandi difficultatem. In censum serpentes fugat, & phalangiorum ictibus auxiliatur.

Mm 4

MELAN-

MELANTHIVM sylvestre, Græcis, *Μελάνθιον ἀγρίον*. Italis, *Melanthio saluatico*,
& *Niella saluatica*.

MELANTHIVM SYLVESTRE.

F O R M A.

Matth. Folijs exit satiuo tenuiori-
bus, multifidis, & capillaceis,
caulibus ferè similib⁹, quem-
admodum & floribus, capitu-
la gerit satiuo maiora, sed fa-
cie haud longè dissimilia, se-
mine intus nigro, acuto, ama-
riusculo, & odorato.

L O C V S.


Idem. Nascitur in campestribus,
in incultis præsertim agris.

Q U A L I T A T E S.

Idem. Semen excalfacit, incidit,
aperit, attenuat, extergit.

V I R E S.

Idem. Ad omnia efficax habetur,
perinde ac satium.



MELAN-

NOMINA.

553

MELANTHIVM sylvestre alterum, Italis, *Melanthio saluatico secondo*. Germanis, Wilder Schwarß Kümme! / Hornkümme!

MELANTHIVM SYLVE-
STRE ALTERVM.



FORMA.

Nullis prorsus foliorum, Matth. caulium, ac florum notis ab altero differt. Solùm itaque capitula disparia sunt. In hoc enim genere longiora sunt, & in quinque sexve diuicata cornibus.

LOCVS.

Nascitur in inculto solo, Idem. & in agris.

FACULTATES,
ET VIRES.

Præstat eadem, quæ alte- Idem. rum.

M m f

PSEUDO-

PSEUDO Melanthium, Italis, *Melanthio falso*, *Ruosola*, seu *Gittone*. Germanis, *Kornneglin* / *Naden*.

PSEUDO MELANTHIUM.

FORMA.

Matth.

Caulem edit bicubitalem, pilosum, in quo utrinque per intervalla bina exeunt folia oblonga, hirsutaque. In cacumine flores exeunt purpurei, roseique. semen in calycibus oblongis concluditur, nigrum, melanthio simile, sed amarum, nulloque odore præditum.



LOCVS.

Idem.

Nascitur in arvis inter segetes.

FACULTATES.

Idem.

Excalfacit, attenuat, aperit, abstergit, & resoluit.

VIREs.


Idem.

Farina eius melle excepta, & illita, lentigines, albos, & cæteras cutis fæditates extergit, lumbricos pota interimit, urinam ciet, & menses.

VISCVM,

VISCUM, Græcis, ἰξός. Arabibus, *Dabach*. Italis, *Vischio*, seu *Pania*. Germanis, *Bogelleim* / seu *Wistel*. Hispanis, *Visco*. Gallis, *Guy*.

VISCUM.



FORMA.

Viscum planta est brevis, *Matthi.* ramusculis in crucis modum prodeuntibus, folijs binis in ramusculorum summitatibus vtrinq; emergentibus, oblongis linguarum instar, crassis, solidisq; , colore submelino. Baccas fert copiosas pisorum magnitudine, albicantes, tenui tunica obductas, substantia intus tenaci, glutinosasq; , ac molli, in qua semen est paruum.

LOCVS.

Nascitur tantum in arboribus, nempe quercu, castanea, Ilice, Pino, pyro, maloq; , syluestri pruno, terebintho, ac fortasse alijs in arborib; , ijsq; praesertim in quibus maiores turdi stabulantur. Ex eorum enim fimo Viscum gignitur, quodd baccas eius edant, & semen vna cum stercore ibi relinquant.

QUALITATES.

Viscum ex plurima aërea, *Gal. 6.* & aquea calida, paucissima *simp. med.* terrena substantia constat, nã

acrimonia in eo amaritudinem excellit. Itaque etiam effectus substantiae respondent, si quidem valenter ex alto humores extrahit, nec tenues tantum, sed crassiores, eolq; diffundit, ac digerit.

VIRES.

Emollit, discutit, extrahit, parotidas, tubercula, cæterasq; collectiones ad *Diosc.* maturitatē perducit, cum resina, & pari cera mistum, vetera vlcera, abscessusq; quos cacoethes vocant, ex thure molli. Lienem cum calce, gagate, aut Asio lapide absumit. Cum Sandaraca, aut Auripigmento illitum vngues extrahit. *Li. Matth.* gnum verò caudicis eius, quod in quercu nascitur (vt quidã scribunt) si in puluerem contritū potandum exhibeatur maximum est Epilepticis auxilium. Sed in quadragesimū diem vsq; potandū est. Idem collo suspensum, aut brachio ad alligatū cum suo cortice grauidatum conceptū adiunat.

*VISCUM

FORMA.

Differt à vulgari visco bacca-
rum racematim coherentium
copia, cæteris partibus cum eo-
dem prorsus conuenit.

LOCVS.

Rarum est, & in Heluetia re-
pertum.*



APARINE,

APARINE, Græcis, *Ασπρίν*. Italis, *Aparine*, seu *Speronella*. Germanis, *Klebe-
kraut*.

FORMA.

Ramis multis, & parvis fru- **DIO SC.**
ticat, asperis, quadrangulis,
per interualla orbiculato fo-
liorum ambitu, vt in rubia.
flos albus, semen durum, ro-
tundum, concauum, album,
vmbilici figura, asperitate,
vestium tenaci.

LOCVS.

Nascitur plurimum in agris *Matth.*
inter lentes, secus itinera, & *Theoph.*
propè sepes.

QUALITATES.

Modicè tum abstergit, tum *Gal. 6.*
desiccat, habetque nonnihil *simp. ms.*
subtilium partium.

VIRE S.

Seminis, caulium, & folio- **DIO SC.**
rum succus ex vino potus,
auxiliatur contra viperarum,
axungia trita strumas discutit, ea pro colo pastores vtuntur ad eximendos ex
lacte pilos,

ALYSSVM,



ALYSSVM, Græcis, Ἀλυσσον. Italis, Alisso.

ALYSSVM.

VIREs.

Diosc. Exiguus est frutex, vnicaulis, subasper, rotundis folijs, fructu duplicium scutorum effigie, in quo est semen quadantenus latum.

Locvs.

Idem. In montibus, & asperis locis emicat.

QUALITATES.

Gal. 6. simp. me. Non solum mirificè iuvat demorsos à cane rabido, sed & rabienti quoq; data sæpè in totum sanauit, atque hoc ex totius similitudine substantiæ effecit. Dictumque prius est talem facultatem ex sola excipi experientia, & planè nulla constare methodo. Quod si quis ad multa experiat, cognoscat facultatem habere mediocriter siccificam, & digerentem, cum absterforij non nihil.

VIREs.

Diosc. Eius decoctum singultum sine febre potu discutit. Idem efficit si quis eam teneat, aut odoretur. Cum melle trita, vitia cutis in facie, & lentigines emendat, contusa in edulio rabiei canis mederi putatur. Domibus appensa salutaris esse creditur. & hominibus, atq; brutis fascini amuletum.

* APPENDIX.

An Veterum Autorum hoc sit Alysson, cum alijs adhuc subdubito.*

VINCE-



VINCETOXICVM, Asclepias, Hirundinaria, Italis, *Vincetostico*. Germanis, *Schwalbenwurz*.

VINCETOXICVM.



FORMA.

Folij prouenit Laurinis in *Marib.* cacumine acutioribus, virgis compluribus fruticat, exilibus, obsequiosisque, circa quas folia per intervalla vtrinque bina spectantur. Flores editi tenues, subalbidis, & quibus acutæ, tenuisq; proueniunt siliquæ, candida intus lanugine, & semine, ut in nerio. Radicibus nititur numerosis, exilibus, longis, albicantibus, & in girum se diffundentibus mansu subdolicibus, sed inodoris.

LOCVS.

Nascitur in incultis locis, *Idem.* secus itinera, in montibus, & collibus, & saxosis tractibus.

QUALITATES.

Radices excalfaciunt, & *Idem.* siccant ordine primo, digerunt, aperiunt, & resoluunt, atque ex totius similitudine substantiæ venenis resistunt.

VIRES.

Dantur radices ex vino potandæ magno auxilio ad venenosorum animalium ictus, demorsus quoque à serpentibus, & cane rabido vtiliter præbentur. Bibuntur quoque, quotidie aduersus pestilentie contagia. Dantur vtiliter vnâ cum citrei mali semine ad omnes cordis affectus. Ex vino meraco potæ torridius pluribus hydropicos iuuat. verum statim à potu sudor prouocandus est, ictericos ad bonum colorem restituunt, vrinam cient, & tussi, & cæteris pectoris vitij opitulatur. Non desunt qui has radices laudibus efferant ad fractos, & ab alto deuolutos, vbi dentur potandæ ex vino aut maioris symphiti decocto.

* VINCE-

FORMA.

Folijis conspicitur alterius
nigrioribus, virgisque lon-
gioribus non consistentibus
sine pedamento, quo nixa in-
terdum sex cubitorum altitu-
dinem attingunt. Flores edit
quoque similes figura, sed co-
lore purpureo nigricante. Si-
liquis & radicibus non longè
abest à vulgari.*



ATRA-

ATRACYLIS, Græcis, Ατράκτυλις. Italis, *Attratile*, & *Cartamo saluatico*.

ATRACYLIS.



FORMA.

Atractylis, vel Cnicus syl-
uestris, spina est Cnico simi-
lis, folia longiora ferens in
summis virgis, magna parte
nuda asperaque, qua feminae
profusis vtuntur, capitula in
cacumine spinis horrent. Flos
luteus, quibusdam in locis
purpureus inuenitur. Radix
tenuis, superuacua.

LOCVS.

Prouenit inculto solo in *Matth.*
collibus, & asperis.

QUALITATES, ET
VIRE S.

Coma, semen, & folia te-
runtur cum pipere, & vino v-
tilissimè contra scorpionum
ictus. Percussos tradit quàm
diu ea teneantur herba, nul-
lum experiri dolorè, ipsumq;
deposita statim recrudescere.

Nn

CAR-

CARDVVS benedictus, Italis, *Cardo benedetto*, *Cardo santo*, *sive herba Turca* Germanis, *Kardobenedict*.

CARDVVS BENEDICTVS.

F O R M A.

Matth.

Caulibus est rotundis, flexilibus, lentis, spinosis, humi accubantibus, folijs longis, vtrinque lacinitatis, hirsutis, & cum adoleuerint per ambitū aculeatis, capitula summis caulibus gerit longis, ac pungentibus aculeis rigentibus folijs circumquaque stipatis, è quibus melius flos emicat, pappo intus semine cinare simili, & albicante. Radice nititur alba multifidaque.



L O C V S.

Idem.

Colitur diligenter in hortis.

Q U A L I T A T E S.

Idem.

Herba est vehementer amara. Ideoque exalfacit, siccatur, aperit, abstergit, & digerit. magni nominis, magnæque existimationis planta est apud omnes nationes.

V I R E S.

Idem.

Præstat maximè contra pestilentiam, item aduersus venena lethalia, tam interius sumpta, quàm venenosorum animalium moribus illita. Sanantur hac herba quartana, aut alijs febris laborantes, quarum circuitus cum frigore, & horrore adueniunt. Idem præstat aut epoto herba decocto, aut stillatitia aqua, aut foliorum pulueris drachma. Præstat eadem ad Epilepticos infantes. Alui tinea necat, & vteri vitij auxiliatur. Herba ipsa tam recens, quàm sicca pota, & exterius admota, contumacia vlcera sanat, quamobrem decoctis miscetur, quæ è ligno Guaiaco parantur aduersus Gallicam luem.

CLINO

CLINOPODIUM, Græcis, κλινopόδιον. Italis, *Clinopodio*. Germ. *Wirbel Dost*.

CLINOPODIUM.

FORMA.

Frutex est folijs serpyllo simi **Diosc.**
lis, furculosus duum dodran-
tum altitudine. Flores marru-
bij modo ex interuallis distin-
cti, speciem lecti pedum præ-
bent.

LOCVS.

Nascitur in petrosis.

Diosc.

QUALITATES.

Calefaciendi vim obtinet, *Gale. 7.*
nondum adurendi, est verò *simp. me.*
essentia tenuium partium. ita-
que exiccare, ac excalfacere
poterit ordine tertio.

VIREs.

Bibitur herba, & succi eius **Diosc.**
decoctum ad conuulsa, rupta,
strangurias, serpentium ictus.
Menses, & partus pellit, &
pensiles verrucas, quas acro-
chordonas vocant eiecit, ali-
quot diebus potum. Alium
sistit decoctum ad tertias po-
rumque, si febrim sentiunt ex
aqua, alioquin ex vino.



APPENDIX.

Cum Clinopodium adeo tenuium esse partium (vt scribit Galenus) vt ex
tertio excalfacientium, siccantiumque ordine habeatur, atque opere pretium
esse, vt quæ in huius censu sunt plantæ, aut gustu acres, aut admodum amare
percipiantur. Cumque neutra qualitas in clinopodio, cuius hic imaginem de-
dimus, reperiatur, non ausim ego ipsum legitimum facere Clinopodium. Sed
potius alterum statim sequens, cui præter acredinem & odoris fragrantiam,
cæteræ astipulantur notæ.

CLINOPODIUM alterum, Italis, *Clinopodio*.

CLINOPODIUM ALTERUM.

FORMA.


Matth. Folij est serpylli modo oblongis in cacumine mucronatis, floribus inter folia subpurpureis balaufti effigie, caulibus exilibus, angulosis, è quibus folia per intervalla exeunt utrinque bina: sapor illi acutus.

LOCVS.

Idem. Nascitur in campestribus. inculto solo, & saxosis locis.

QUALITATES, ET
VIRES.

Idem. Cum non dubitem, quin hæc planta legitimi Clinopodij faciem referat, fateri ac affirmare cogor id ijs viribus esse præditum, de quibus in præcedenti capite diximus, de Clinopodij viribus.



LEON.

NOMINA.

365

LEONTOPETALVM, Græcis, λεοντοπέταλον. Italis, *Leontopetalon*. Germanis, Löwentap.

LEONTOPETALVM.



FORMA.

Caulem emittit dodranta- DIOSC.
lem, aut altiore, plurimis
alis concavum, & in cacumi-
ne semina parua duo, aut tria
in siliquis ciceris modo. Flo-
res anemonæ similes, * Lutei
instar centaurei lutei. * folia
brassicæ, sed papaveris diui-
fura, radicibus nigris, rapæ si-
milibus, strumolis.

LOCVS.

Nascitur in aruis, & segeti- Idem.
bus.

QUALITATES.

Digerendi facultatem, & Gale. 7.
exiccandi, calefaciendique in *simp. me.*
tertio ordine possidet.

VIRES.

Radix auxiliatur serpen- DIOSC.
tium ictibus, ex vino pota, nec
alia res celerius dolorem fi-
nit, miscetur & ischiadico-
rum clysteribus.

Nn 3

TEV-

TEVCRIVM, Græcis, Τεύκριν. Italis, Teucris. Germanis, Batengel/oder Rump
marroff.

TEVCRIVM.

FORMA.

DIOSC. Herba est virgæ referens
effigiem, trissaginis similitu-
dine, tenui folio, non mul-
tum à cicere alieno.

LOCVS.

DIOSC. Nascitur vbertim in Cili-
cia iuxta Gentiadem, aut Cif-
sadem.

QUALITATES.

Gal. 3. Incidentis & tenuium par-
tium facultatis est, quare lie-
nes sanat. Ponatque ipsum
quispiam in tertio exiccanti-
um, secundo verò calefacien-
tium ordine.

VIRES.

DIOSC. Recens cum posca, aut ari-
dorum foliorum decoctum,
potu lienem potenter abso-
mit. Lienosis cum aceto, &
ficis illinitur. Itē serpentium
moribus ex aceto solo.



TRIS-

mnes
cos, fl
drach
tur po
tur id
tum, i
diebu

TRISSAGO, Græcis, *Χαμῆδρις*. Arabibus, *Damederios*, *Camadrins*, *sive Kemadrins*. Hetruscis, *Querciola*, & *Chamedrio*. Italis cæteris, *Calamandrina*. Germ. *Gamanderle* *sive* *Klein Bathengel*. Hispa. *Chamedreos*. Gallis, *Germandree*.

TRISSAGO, SEV CHAMEDRYS.

FORMA.

Herba est dodrantalis, folia *Diosc.* habes exigua, & amara, quere⁹ effigie, & diuisura. Flore paruo, penè purpureo. Odoris *Matth.* non ingrati. Carpitur semine prægnans.

LOCVS.

Nascitur in petrosis, & asperis, *Diosc.*

QUALITATES.

Vincentem habet qualita- *Gale. 8.* tem amaram, & est quodam- *simp. me.* modo acris. Ponaturqueam quispam in tertio ordine excalficientium, & desiccantium, plus tamè desiccat, quàm calefacit.

VIRE.

Recentis decoctum bibitur *Diosc.* in tussi, in durato lieni, vrinae difficultate, & incipiente hydrope. Cit menses, partus extrahit. Lienem ex aceto pota consumit. Aduersus serpentium venena ex vino pota, illitaque efficacissima. Vetera vlcera purgat ex melle illita, cum oleo illita caliginè oculorum discutit. Præstat quoque ad o- *Matth.*

mnes frigidos capitis morbos, nempe ad comitiales, veteranos, melancholicos, stupidos, resolutos, conuulsosque, & ad diurnos capitis dolores. Semen drachma pondere potum bilem per vrinas ducit. Ideoque conuenienter datur potandum icteris. Instillatur foliorum succus ad vermiculosas aures. Datur idem aduersus intestinorum vermes. Id quod etiam præstat vinum bibitum, in quo florescens herba die ac nocte fuerit macerata. Decoctum aliquot diebus potum mirificè tertianis febribus medetur.



CHAMEDRYS altera, Italis, *Calamandrina seconda*, & *Querciola seconda*. Germanis, *Feldt Cypressen*.

CHAMEDRYS ALTERA.

F O R M A.

Matth.

Folij exit quercus effigie, sed magis quam in altera lacinariis, tenuibus, subnigricantibus, copiosioribusque, caules edit quadrangulos, tenues, lignosos, sesquidodrantales, surculosis ramis refferos, in quibus flosculi purpurei inter folia rutilant, & caules ipsos ambiunt, alterius chamedrys modo. Radicem habet multifidam albicantem. est autem planta aspectu iucundo, & eleganti, amara tamen, odore non iniucundo resinam olente.

Q U A L I T A T E S, E T
V I R E S.

Cum aded amara non sit ut altera, ea quidem minus calida, siccaque fuerit, itaque ad omnia munia imbecillior, non tamen multo.



C E N S U R A.

Quod hanc planta (ut credo) resinam respiciat, non desunt scriptores, qui putent eam legitimam esse Dioscoridis Chamæpitum: sed hallucinantur.

LYCHNIS.

LYCHNIS, Græcis, *Λύχνης*. Italis, *Lichnide corenaria*. Germanis, *Margenvrösch*.
lin.

LYCHNIS.



FORMA.

Coronaria Lychnis flore *Diosc.*
est albæ violæ simili, sed pur-
pureo, quo corollæ factitan-
tur. Folijs longis, tomento-
sis, albicantibusque, caule
lanuginoso, incano, cubito
maiore, flore inodoro, sed
pulchro. Sylvestris per *O-diosc.*
omnia urbanæ similis.

LOCVS.

Seritur in hortis, ac etiam *Matth.*
spôte per se provenit, quam
sylvestrem appellant.

QUALITATES.

Semen calidum est secun- *Galen. 7.*
do quodam modo ordine, aut iam etiam tertio, siccum sanè eodem quoque *sim. me.*
modo.

VIREs.

Semen duarum drachmarum pondere potum, bilem per alium detrahit. *Diosc.*
Ictus à Scorpione subuenit. Aiunt huius herbæ appositu Scorpiones torpescere, & inertes prorsus reddi.

CENSURA.

Sunt qui *Pseudomelanthium* in segetibus nascens sylvestrem Lychnidem
faciant. Atqui cum *Dioscorides* agrestem Lychnidem urbanæ per omnia simi-
lem esse scribat, eamque sæpius viderim in inculto solo, non possum horum
placitis subscribere.

Nn 5

LILIVM,

LILIVM, Græcis, *Κελύων*. Italis, *Giglio bianco*. Arabibus, *Sufen*. Germa. *Silgen* /
seu Silgen. Hispanis, *Azucena*, seu *Lirio blanco*. Gallis, *Lis*.

FORMA.

LILIVM.

Matth. Folia fert longa, nunquā non virentia, læuia, pingua, Pancratio similia, caulem profert bicubitalem, rotundum, rectum, læuem, pinguem, firmum, minoribus folijs ab imo ad summum circumuestitum, è cuius cacumine terni, quaternive ramuli ex-
 eunt, è quibus oblonga prodeunt capitula herbaceo colore, quæ tractu tēporis lilia fiunt eximij cādoris calathi figura, extrinsecus striata, resupinis per ambitū labris, luteis aliquot ligulis ex calathi fundo (vt in croco) sursum spectantib. è quorum medio longum producitur germen, rotundo in cacumine capitulo, herbacei coloris. Radice nititur bulbosa albicante, compactili squamarum serie.

LOCVS.

Idem. Seritur passim in hortis, & viridarijs.

QUALITATES.

Gale. 7. Lilij flos temperaturam mistam obtinet, partim ex tenui, partim ex terrena essentia, ex qua utiq; amaritudinem habet, partim ex aquea, caque temperata. Quod autem ex eo conficitur oleum, citra morsum digerendi, simulq; emolliendi facultatem obtinet. Porro Radix foliaque desiccant, abstergunt, & digerunt moderatè. in radice plus abstergetis facultatis est, quàm in folijs.

VIRE S.

Diosc. Folia herbq; illita auxiliantur contra serpentium ictus, seruata ambustis proficiunt. Aceto condita vulneribus opitulantur. Inassata radix, & ex rosaceo trita igni ambusta sanat. Vulnam emollit, menses ciet. vlcera cicatrice obducit. Cum melle detrita neruis præcis luxatisque medetur. Vitilignes, fursures, lepraque emendat, & vlcera in capite manantia expurgat. Faciem abstergit, & erugat. teritur in aceto cum hyoscyami folijs, & farina tritici mulcendis testium inflammationibus. Semen potum aduersatur serpentium moribus, ignibus sacris. Semen, & folia, cum vino illinuntur. Oleum quod è floribus paratur vteri duritias commodissime emollit: valet quoque ad omnes frigidos neruorum affectus, ad emollienda articulorum impedimenta, & scyrrhosos tumores. Illinitur vtiliter puerperis in vteri doloribus. Additur in clysmatibus emollientibus. Elixir radix ex vetere axungia illita pedum clauos cicat. Eadem ex adipe, & oleo imposita defluxos pilos replicat,

MAR.



MARTAGVM chymistis, Italis, Marragon, & Giglio saluatico. Germanis, Golde-
wurz.

MARTAGVM.



F O R M A.

Folia promit vulgaris saponariae æmula, quæ ex interval-
lis orbiculariter caulem am-
biunt, in cuius cacumine flo-
res emicant tenui pediculo
nitentes liliorum effigie, sed
minores, quorum folia quo-
que retroflexa cernuntur, pur-
pureo colore, punctis qui-
busdam rufescentibus resper-
sa. Ipsique flores odorati sunt,
& aspectu iucundi. Radicem
habet lilio similem, sed luteo
colore.

L O C V S.

Prouenit in montibus, & *idem*.
clinosis locis.

Q U A L I T A T E S , E T
V I R E S.

Radix ad ea omnia commo-
da est, ad quæ Lilij.

B A L L O-

BALLOTE, Græcis, Βαλλοτῆ. Italis, *Marroliobastardo*. Germanis, *Schwartz Andorn*. Hispanis, *Marrois negro*. Gallis, *Marrubin noir*.

BALLOTE.

FORMA.

Diosc. Caules edit quadrangulos, nigros, subhirsutos, complures ex vna radice, folijs maioribus, quam marrubij, hispidis, & per intervalla in caule dispositis, subrotundis, graueolentibus. Candidi flores, verticillato ambitu caulem coronant.

LOCVS.

Matth. Nascitur in agrorum marginibus, & secus vias.

QUALITATES.

Paulus. Planta est acris, & absterforia facultatis.

VIRES.

Diosc. Vis eius efficax aduersus canis morsus, folijs ex sale illitis, eadem feruenti cinere calefacta quousque flaccescant, illita condylomata reprimunt, purgant cum melle etiam sordida vlcera.



MAR-

MARRUBIUM, Græcis, *Πεδάσιον*. Mauritanis. *Farfusio*, sive *Frasium*. Italis. *Marrubio*. German. *Andern* sive *Eungenkraut*. Hispan. *Maroio*. Gallis, *Marrubin*.

MARRUBIUM.

FORMA.



Frutex est ab radice ramosus, Diosc.
candicans, subhirsutus, quadrangularib⁹ ramis, folium pollicem equat, subrotundum, hispidum, rugosum, amaro gustu, semen in caulibus, & ex interuallis, flores verticillato ambitu, asperi.

LOCVS.

Nascitur propter edificia, ruinas, & rudera. Et in arcibus viarum. Diosc. Matth.

QUALITATES.

Marrubium vt gustu amarū est Gale. 8.
ita vt si quis vtatur, consentientem huic saporis actionē reperiet. Iecur, ac lienem obstructione liberans, & thoracem, pulmonemq; expurgans, ac mēses prouocans: sed & illitum detergit, ac digerit. excalfacit quidem iecur do ordine iam completo, & tertio siccat. simp. me.

VIRE S.

Folia sicca cum semine in aqua Diosc.
decocta, aut viridium succus datur cum melle suspiriosis, tussientibus, & ad tabitudinē redactis, crassam ē pectore pituitam, cum

sicca Irīde eijcit. Mulieribus à partu non purgatis datur, vt menstrua, & secundas extrahat. Item in difficili partu, & his qui venena hauserunt, aut à serpentibus demorsi sunt. Vesicam, renesq; laedit. Folia ex melle illinuntur sordidis vlceribus purgandis. Præterea, nomasq; sistunt. Laterum dolores mitigat. Succus folijs contusis expressus, soleq; coactus, ad eadem pollet. Cum vino, & melle illitus, oculorum claritatem adiuvat. Naribus regium morbum expurgat, & dolentibus auribus instillatur per se, & cum rosaceo. Decoquantur marrubij Matth.
binæ vnciæ vnā cum buglossi, helenij, & eupatorij radicum sesquidrachma, Rhabarbari drachma, & agallici pari pondere ex vini albi generosi libris 3. ad lictitiam. Nam vbi diebus decem continuis huiusce decocti binas vncias affecti porauerint, præstantissimum reperient medicamentum, vbi tamen morbus ab obstructione prouenerit.

MELIS-

MELISSOPHYLLVM, Melissa siue melitena, aut Apiastrum, Græcis, *Μελισση*, Arabibus, *Bederangie*, siue *Bederangi*, siue *Marmacor*. Italis, *Melissa*, *Cedronella*, & *Aranciata*. Germanis, *Melissen*, *Mutterkraut*. Hispanis, *Torongil*, seu *Hierua Cidreira*. Gallis, *Melisse*, & *Pom cirade*.

APIASTRV, SIVE MELISSOPHYLLVM.

F O R M A.

DIOSC. Cauliculi, & folia essent Balote similia, nisi maiora tenuioraque, nec ita hirsuta spectarentur. Citreum malum olent.

L O C V S.

Matth. Seritur passim in hortis, ac etiam sponte per se nascitur in collibus, & montibus.

Q U A L I T A T E S.

Auc. lib. Excalfacit, siccaturque ordine viribus ne secundo.
cordis.

V I R E S.

DIOSC. Folia cum vino pota, aut illita profunt contra phalangiorum, & scorpionum ictus, & canis quoque morsum. Folia auxiliantur fungorum stragulationibus in potu addito nitro. Illita cum sale strumas discutunt, vlcera purgant, articulares dolores illita sedant.

Scrapio. Melissophylli proprium est animum hilarem reddere, humenti ac frigido ventriculo auxiliari, concoctionem adiuuare, cerebri obstructions referare, deficientem

Auc. lib. dem. animum reuocare, cordis imbecillitatem roborare, quin etiam eius pulsum reprimere, animi sollicitudines fugare, ac sollicitas imaginationes tollere, quæ & ab atra bile, & ab exusta pituita gignuntur. Vires deiectionas possidet. nec adeo imbecilles, quin atrabiliarios vapores à spiritibus, & à sanguine, qui cordi, & arterijs inest educere queat. quod in cæteris corporis partibus efficere nequit.

MOLV.



NOMINA.

575

MOLVCA, Italis, *Melissa Constantinopolitana*.
MELISSA MOLVCA, SIVE CONSTAN-
TINOPOLITANA.

GENERA.

Duum est generum, altera *Matth.*
levis, altera aculeata.

FORMA.

Vtraque folio est *melyllo- Idem.*
phylli quadantenus simili, bre-
uiore tamen, & minus denti-
culato, sed in altero genere cir-
cumquaque aculeato, amaro
sapore, nec vilo citrei mali o-
dore, profert calyces quosdam
tintinnabuli effigie herbaceo
colore, in quibus semen ori-
tur.

QUALITATES, ET
VIRE.

Aperit, attenuat, excalfacit, *Idem.*
abstergit, venenis resistit, & a-
nimalium venenosorum icti-
bus mirifice auxiliatur, tum po-
ta, tum quoque illita. Ictericos
iuuat, interaneorum animalia
necat. Datur vtiliter succus pe-
stilentibus febribus affectis.

MELIS-



MELISSA Moldauica, Italis, *Cedronella di Moldauica*. Germanis, *Eurckisch Melissen*.

MELISSA MOLDAVICA.

FORMA.

Matth.

Caules edit bicubitales, quadrangulos, subrufescentes, ramososq; folia in ramis ipsis verticæ figura, sed longe minora. flores in summitate purpureos, saluia æmulos, verticillatimque inter folia emergentes. Tota planta citrei mali odore quàm belle spirat. Radice nititur vnica, sed fibrata.

LOCVS.

Idem.

Seritur in hortis, sed ex Muldauia primum ad nos delata est, vbi spontè per se provenit.

QUALITATES.

Idem.

Excalfacit, siccaturque ordine secundo, aperit, attenuat, & incidit.

VIRES.

Idem.

Vires habet Apiastro per omnia similes.



STACHYS, Græcis, Σταχὺς. Italis, Stachi.

STACHYS.



FORMA.

Frutex est Marrubio simi- Diosc.
lis, sed lōgior, folia ferens nu-
merosa, hirsuta, rara, prædura,
cana, odoris iucundi, & com-
plures virgas, ex vna radice ex-
euntes Marrubio candidio-
res. Flores spicatos, subpur- Matth.
pureosq; * & plerumq; sub-
luteos. *

LOCVS.

Nascitur in montibus aspe- Diosc.
ris.

QUALITATES.

Frutex est stachys gustu acri, Galen. s.
& amaro, tertij ordinis excal- simp. me.
facientium.

VIRES.

Foliorum decoctum potu Diosc.
pellit menstrua, & secundas.

Oo

PSEYDO-

PSEVDOSTACHYS, Germanis. Niechender Andorn / Fels Andorn.

PSEVDOSTACHYS.

Pseudostachys hanc plantam appellare libuit, quod & ipsa stachym in multis notis referat.

* Planta est caule quadrato, folijs hirsutis, albis, maioris saluæ figura, verbasci folia colore referentibus. flores gerit Marrubij purpureos, semen rotundū vasculis inclusum.*



PHYLL

xilia
E
Vtu
atq
col
refe

NOMINA.

579

PHYLLITIS, Græcis, Φυλλίτις. Italis, *Lingua ceruina*. ac pariter *Fillite*. Officinis, *Falso, Scolopendria*. Germanis, *Hirschzungen*. Hispanis, *Lingua ceruina*. Gallis, *Lang de Cerf*.

PHYLLITIS.

FORMA.



Folia promit Rumici simi. Diosc. lia, longiora, & viridiora, sena, aut septena, quæ parte inferiore læuia cernuntur, à tergo autem penfiles quasi vermiculos tenues ostēdunt, gustu acerbo. Neq; caulem, neq; semen profert.

LOCVS.

In vmbrosis, & opacis hor. Diosc. torum locis emicat.

QUALITATES, ET VIRES.

Cum qualitatis sit acerba, Galen. 3. non absurdè diarrheas, siue *simp. me.* profluua, & dysenterias pota iuuat.

Folia in vino pota serpenti. Diosc. um morib⁹ aduersantur, quadrupe dibus per os infusa auxilio sunt, & si dysenteria aut resoluta alius exercet potui datur.

Expertum quoque est à compluribus valere phyllitim ad splenis affectus. Matth. Vtuntur quoq; quidam stillatitia eius aqua contra singultum, & cordis pulsuum, atq; in animi deliquijs, eandem gargarisandam quoque præbent ad prolapsam columellam. Siccorum foliorum farina ex earundem aqua excepta, & adinota refrigerat ventriculi, & iocinoris ardores.

CENSURA.

Aberrant qui phyllitim Asplenium, siue scolopendrium esse censent.

Oo 2

PHA-

PHALANGIVM, Græcis, Φαλάγγιον. Italis, Falangio. Germanis, Weißer Weiden/Grasgilgen.

PHALANGIVM.

FORMA.

- Diosc.** Ramuli sunt illi duo, aut tres, pluresve, in diversa tendentes. flos candidus, lilio similis multas incisuras habes, semine nigro (postea enim contrahitur) lato ad lenticulae dimidia figuram, multo tenuiore. Radice parua, tenui, herbacei coloris, dum à terra eruitur. Folliculi in quibus semen concluditur phalangij formam referunt, unde illi nomen.
- Matth.**

LOCVS.

- Diosc.** Prouenit in collibus. Et in
- Matth.** montibus.

QUALITATES.

- Galen. 8.** Est autem facultatis tenuissimae, um partium, desiccantis.

VIRES.

- Diosc.** Huius folia, semē, flos cum vino pota auxiliantur contra scorpionum, phalangiorumq; ictus, tormina quoq; discutunt.
- Galen.**



TRIFO-

NOMINA.

381

TRIFOLIUM, Græcis, Τριφυλλον. Italis, Trifoglio bituminoso. Germ. Hartflee.

TRIFOLIUM ASPHALTITE.

GENERA.

Plura sanè habentur gene- Matth.
ra, nempe Asphaltite, Pra-
tense, Acetosumq;.

FORMA ASPHAL- TITIS.



Frutex est qui supra cubiti Diosc.
altitudinem attollitur, virgas
habens tenues, iunceas, & ni-
gras, unde ramulares ena-
scuntur appendiculæ, in qui-
bus terna singulis germina-
tionibus exeunt folia, loto ar-
bori similia. ijs recenter ena-
tis eruca odor inest, vbi au-
tem adoleuerunt bitumen
olent. Florem edit purpure-
um, semen quadantenus la-
tum, subhirsutum, ex altera
extremitate exertum anten-
næ modo corniculû gerens.
Radix tenuis, longa, valida.

LOCVS.

Nascitur in Sicilia, & in I- Scriboni-
talia circa Lunæ portum. usLargus.

QUALITATES.

Vis plantæ est calida, & sicca, vt bitumen cui odore est similis, vtrinque ter- Galen. 3.
tio ordine. simp. me.

VIREs.

Semen & folia in aqua pota pleuriticis, urinæ difficultati, comitialibus, & ijs Diosc.
qui aquæ intercutem principia sentiunt, foeminis quoq; vuluæ vitijs oportu-
nis, auxiliantur. Menles ciunt. Ternæ drachmæ è semine dari debent, è folijs
verò quaternæ, contra serpentium ictus trita folia ex oximelite pota præsidio
sunt. Quidam terna folia, aut semina in tertianis cum vino potui dedere, & in
quartanis quaternæ. Radix antidotis inferitur.

Oo 3

TRIFO-

TRIFOLIUM Pratenſe, Italis, *Trifoglio*. Germanis, *Wiesenſtee*.

TRIFOLIUM PRATENſE.

GENERA.

Matth. Trium eſt generum, foliorum, & florum diuerſitate differentium.

FORMA PRIMI.


Matth. Primum folijs eſt ſubrotundis, maculoſis, longo pediculo nitētib; obſequioſo, flexilique; floribus in capitulis ſubpurpureis, aut albicantibus, in cauliculorum ſummis emicantibus.

LOCVS.

Idem. Naſcitur in pratis, & herboſo ſolo.

FACULTATES, ET
VIRE

Idem. Sunt qui Trifolij pratenſis ſuccum miris laudibus efferrant ad oculorum nubeculas, vulnera, & cicatrices. Idem tempeſtates pronunciat, inhorreſcit enim & folia contra tempeſtates ſubrigit. Vniuerſa florentis plantæ decoctum potum, alba veri profluuia cohibet. Semen, & flores ex aqua decocti, & ex oleo admoti, duros emolliunt abſceſſus.



TRIFO-

TRIFOLIUM pratense alterum, Italis, *Trifoglio indifferenter dicitur*. Germanis, *Epistlee*.

TRIFOLIUM PRATENSE ALTERVM.

F O R M A.



Cauliculis assurgit lentis, *Matth.*
obsequiosisque, folijs in vno-
quoq; pediculo ternis, varia
tamen facie perinde ac bitu-
minosum. Namque quædam
quæ ad radicem sunt Acetosi
trifolij modo quod oxym vo-
catur trina ex vnico pediculo
emergunt, cordis faciem qua-
damtenus imitantur, cætera
verò longa sunt, & in cacumi-
ne acuminata, vt in Asphalti-
te. flores in capitulis sunt illi
purpurei in flocci modum.

L O C V S.

Prouenit sponte in pratis, *Idem.*
& viridarijs, & herbosis locis.

F A C U L T A T E S, E T
V I R E S.

Idem præstare potest, quod *Idem.*
alterum.

TRIFOLIUM acetosum, Græcis, *Ξυρ. Barbaris, Alleinia, sine Liniola, sine Paniculi.* Italis, *Trifoglio acetoso.* Germ *Gauchbrodt, Saurfleec.*

TRIFOLIUM ACETOSVM.

*GENVS.

Differt primo sexu, Fœmina enim flore albo conspicitur, venis purpurascētibus distincto. Mas totus purpureus, rarus inuentu. Deinde habetur quoddam genus totum supernū & repens luteis flosculis. *

FORMA.

Matth.

Vulgaris Oxys cauliculis exit ab una radice pluribus, exiguis, rotundis, ac tenuibus, quorum singulis ternis in summitate sunt folia, cordis figura, mollia, acido gustu. flores edit albos, stellæ figura. Radicem habet subrusam, compacti squamarum serie obductam. *Alterum genus quod serpit & flosculos habet flavos, eosdem paruos itidem stellatos, foliolis non differt à vulgari nisi quod hirsutiora sint & breviori pediculo annexa, semen gerit in corniculis oblongis, quæ attracta semen expuunt. Sed adeo concidunt rimulæ ut non appareat dissimulasse siliquas. *



LOCVS.

Idem.

Nascitur opacis locis, propter sepes, & itinera.

FACULTATES, ET VIRE.

Idem.


Tota planta refrigerat Oxalidis modo, proinde deuorata sitim extinguit, iecur refrigerat, & cor corroborat. Stillatitia eius aqua datur utiliter potanda acuta pestilentiq; febre laborantibus. atqui longè præstat herbæ succus ex saccharo potus. Illinitur idem per se Erysipelatis, & inflammatis locis, colluiturq; ex eo os ubi lingua, palatum, faucēsve calida fluxione laborent. In summa ad ea omnia censetur utilis Oxys, quibus Oxalis auxiliari valeat. Datur ad stomachum dissolutum. edunt & qui enterocellem habent.

Plin.

TRIN-

TRINITAS, Italis, *Herba Trinita*. Germanis, *Gilden Leberkraut*.

TRINITAS.



FORMA.

Folia fert triquetra, æderæ minoris magnitudine, quæ aduersa parte cyclamini modo subpurpurea sunt, superiore verò parte maculis quibusdam albicantibus resperguntur. Caules habet tenues, in quorū cacumine primo statim vere flos emicat caruleus in stellæ modum, è quo capitulum oritur echinata quadantenus specie, in quo semen oblongum subcæruleumque. Radicibus est numerosis, tenuibus, subrubentibusque.

LOCVS.

Prouenit locis opacis, & in frutetis. *Idem.*

FACULTATES, ET VIRES.

Vulneraria est herba, tam admota, quàm in potionibus sumpta, quin etiam ad eterocelas mirificè præstat, epota foliorū farina ex vino austero diebus pluribus continuis cochlearij mensura. Decoquitur tota herba ex eodem vino ad columellæ, fauciumque inflammationes.

Oo 5

POLIVM,

POLIVM, Græcis, Πόλιον. Mauritanis, *Cahade*, sine *Iahade*. Italis, *Polio*. Gallis, *lue muscate*.

P'OLIVM.

GENERA.

Matth. Duo Polij extant genera, montanum, & alterum fruticosius, non usque adeo valens odore.

FORMA MONTANI.

Matth. Planta est candicans, folijs oblongis, & per intervalla caules ab imo ad summum vestientibus, pluribus etiam minoribus inter maiora subnascentibus; caules habet copiosos, rectos, rotundos, lignososque, albicantes, & qui in cacumine capitula edant florida, candicantia, thymi figura: tota planta odorata est, sed non sine odoris granitate, acuitateque.

LOCVS.

Matth. Prouenit in montibus, exoluto solo.

QUALITATES.

Galen. 8. Amarum est gustantibus, & modicè acre. Vis quoque Polio inest refrigerans, simp. me. di, incidendi, attenuandi, & abstergendi.

Matth.

VIRES.

Diosc. Foliorum decoctum potu auxiliatur serpentium moribus, hydropicis, morbo regio, & lienosis cum aceto: stomachum verò malè habet, caput doloribus afficit. Alium & menses cit: substratum, suffitumve serpentes abigit. Illic vul-
Gal. ibid. nera conglutinat. Omnia viscera obstructione liberat, aridum eum fuerit, maligna vlcera sanat, viride verò magna vulnera. Adalligatur fronti contra oculorum suffusiones, protinus ubi inuentum sit, nec alia herba magis conuenit.

POLIVM



POLIVM alterum, Græcis, Πέλιον ἔταρον. Italis, Polio secondo. Herbarijs nonnul-
lis, *luna muscata*. Germanis, Marienfraut/wild Eaucendel.

POLIVM ALTERVM.

FORMA.

Folijs, caulibus, capitulis, ac *Matth.*
floribus altero similis est.

LOCVS.

Nascitur in campestribus, *Idem.*
saxosis, & ex cultis locis.

FACULTATES,
ET VIRES.

Ab altero facultatibus non *Idem.*
differt.

APPENDIX.

Tametsi hæc plantam sciam *Idem.*
non esse secundum Polij genus
à Dioscoride conscriptum, cum
tamen omnibus suis partibus,
sapore, odoreque montanum
polium referat, non quidem
temerè factum putavi, eam in-
ter Polij genera fore recensenden-
dam, & præsertim, cum omni-
bus Polij facultatibus sit præ-
dita.

SCORDIVM,



SCORDIVM, siue Trissago palustris, Græcis, *Σκώδιον*. Arabibus *Scordeon*, siue *Scordeum*. Italis, *Scordio*. Germanis, *Wasserbatenig*/ seu *Knoblochstrauch*. Hispanis, *Scordio*. Gallis, *Chamaraz*.

SCORDIVM.

FORMA.

DIOSC. Folij erūpit trissaginis maioribus, nec sic in ambitu diuisis, aliquantum allia redolentibus, gustu amaris, & adstringentibus, caulibus quadrangulis, subrubro flore.

LOCVS.

Idem. Nascitur in mōtibz, & palustribus.

QUALITATES.

Galen. 8. simp. me. Ex multiformibus id tum fa-
cultatibus, tum saporibus constat, nam & amarum quid obtinet, & acerbum, & acre, & maxime allio assimilis eius est acrimonia, vnde mea sentētia, nomenclaturam obtinuit: expurgat igitur, simulque exalfacit viscera.

VIRES.

Matth.

Herba vim exalfactoriam habet, vrinam ciet, cocta recens, aridave cum vino bibitur ad venenatos serpentium morsus, ad stomachi quoq; rosiones, dysenteriam, & vrinæ difficultatem binis drachmis ex aqua mulla. Crassamen purulentum ē pectore expellit. Aridæ farina facit ad veterem tussim, rupta, conuulsq; si cū nasturtio, melle, & resina misceatur in eclegmate. Inflammata modicē præcordia cerato excepta recreat. Menfes imposita mouet, vulnera conglutinat, vetera vlcera purgat, & ex melle ad cicatricem perducit. Sicca excrementis in carne cohibet. Succus ad eadem vitia bibitur. Laterum dolores ab

Gal. li. 8.

simp. me.

obstructione, & frigore natos sanat epotum.

ALLIA



ALLIARIA, It. l's, *Alliaria*. Germanis, *Knoblauchstrauch* / *Leuchel* / *Esftraut*. Gal-
lis, *Alliaire*.

ALLIARIA.



FORMA.

Huius folia cum primùm erum- *Match.*
punt, ferè rotunda spectantur, viola-
ria similitudine, postquam verò ad-
oleuerint, per ambitum serrata eua-
dunt, ut quadantenus apiastrum faciem
repræsentent, leuiora tamen sunt, &
prope caulem latiora, quæ digitis at-
trita, gustataque allij odorem, sapor-
emque reddunt. Caulem profert bi-
cubitalem, rotundumque, flores al-
bos, & semen nigrum tenuibus sili-
quis inclusum. Radix, quæ longius-
cula est, eundem cum folijs odorem
retinet.

LOCVS.

Iuxta sepes, & in agrorum margi- *Idem.*
nibus nascitur.

QUALITATES.

Excalfacit, attenuat, aperit, inci- *Idem.*
dit, digerit, prouocat.

VIREs.

Semen emplastri modo vuluæ admotum, mulieres vteri strangulatu oppressæ *Idem.*
liberat, & excitat.

TVSSI-

TVSSILAGO, Græcis, Βήχιορ. Officinis, Farfara, seu Vngula caballina. Italis, Farfara, seu Farfarella, & Vnghia di Cavallo. Germ. Nosshub/ Eselschuss/ siue Brandelattich. Hispanis, Vnha de Asno. Gallis, Pas de Asne. siue Tacconner.

TVSSILAGO.

GENERA.

Matth. Tria Bechij numeratur genera, quamvis Dioscoridi vnum tantum sit genus.

FORMA PRIMI.

Diosc. Folia promit maiuscula, quam hedere, sex aut septem, à radice à terra subalbida, superne virentia, in plures angulos exētia. Cāulis dodrantalis, flos luteus, vere prodit, quo vnà cum caule confestim exuitur. Inde nonnulli his vacare existimarunt. Radix tenuis est.

LOCVS.

Diosc. Nascitur in amœnis & riguis.

QUALITATES.

Gal. li. 6. Modicè est actis.
simp. me.

VIRES.

Diosc. Folia ex melle trita, igni sacro, & omnibus inflammationibus, illitu medentur. Arida suffitu ita vt fumus per infundibulum hianti ore rapiatur, hos sanat, qui sicca tussi, atque orthopnea infestantur. Pectoris vomicas rumpunt. Eundem effectum præbet suffita radix. Eadem decoctā in hydromelite, & pota emortuos partus eijcit.



*TVSSIL-

*TVSSILAGINIS FLORES.



Malè pinguntur flores in-
ter folia iam grandia prode-
unt. Primo vere namq; ori-
untur nudi, & in pappos ab-
eunt nudi pereunt.*

TVSSILA-

TVSSILAGO maior, Petasites, Græcis, Πήχυν μέγα. Italis, Farsara maggiore.
Germanis, Pestilenzwur. Germanis, Pestilenzwur.

TVSSILAGO MAIOR.

Matth.

FORMA.

Caulem edit, antequam folia emergant in ipso Veris principio, concavum, dodrantalem, pinguem, purpurascens, parvis & oblongis circum vestitum folijs. In cuius cacumine flores exeunt spicati, subpurpurei, qui vna cum caule paulo post contabescunt, & in pappos dissoluuntur. Eodem fere tempore folia ex terra emergunt, altera parte incana, quæ antequam adolevant Tusilagini ante scriptæ similia spectantur. Verum posthac in tam magnam crescunt amplitudinem, ut personatæ folijs longè maiora habeantur. Horum singula pediculo nituntur purpureo, alba lanugine obducto. Radicem edit longam, brachij quandoque humani crassitudine, intus candidam, amaram, atque odoratam.



Matth.

LOCVS.

Crescit humectis & vliginosis locis, & præsertim prope rivum aquarum, perinde ac altera.

Idem.

QUALITATES.

Radix excalfacit, attenuat, incidit, & abstergit, ut eius enidens indicat amaritudo.

VIRE.

Constat radicem multis experimentis præstare contra pestilentiam, & pestilentes febres, ubi eadem in pulverem contrita duarum drachmarum pondere ex vino propinetur, & deinde sudare cogantur ægri. Quamobrem Germanis pestilentiæ radix appellatur. Præstat eadem ad vteri præfociones, & cruciatus, eodem modo sumpta. Propinatur item veterinarijs, & pastoribus contra quadripedum vermes, & equis qui anhelandi difficultate laborant. Reliquæ cum Tusilagine communia habet.

*PETAS-

NOMINA.

*PETASITES FLORE ALBO.

593

FORMA.



Mense Februario suos pro-
mit flores nondum emortis fo-
lijs, denfos, pusillos, multos, ra-
cemosos, minores quā in vul-
gari, similes tamen, sed albos
totos, qui in pappos similiter
abscunt. Folia oblongis pedicu-
lis insident, Tussilaginis folijs
æqualia. Radix intra terram
quoquo versum reptat, & sin-
gulis annis, annatis nouellis se
propagat.*

Pp

Tvssi-

TVSSILAGO altera, siue Farfugium, aut Farratum, aut Chameleuce. Calcha palustris. Italis, *Farfugio*. Germanis, *Dotter Blumen*.

TVSSILAGO ALTERA, SIVE
FARFUCIVM.

FORMA.

Matth. Folijs exit nigre populi amplioribus ad tussilaginis faciem inclinantibus, atqui non tot exsertis in ambitu angulis, nec à terra tam albicantibus. Caulem edit sesquidodrantalem, à quo plures egrediuntur rami, in quorum summitate flores exeunt aurei, magni, rosarum figura. Radicem habet albam, & subamaram, floret vere, Aprili præsertim mense, & Maio quoq;.

LOCVS.

Idem. Nascitur circa riuos aquarum in conuallibus, & pratis.

QUALITATES, ET
VIRES.

Vbi vulgaris, ac vera Tussilago non fuerit ad manus, Farfugium eius loco bellè substitui potest, nam ijs ferè viribus præstat.




ARTE-

ARTEMISIA, Græcis, *Apyuloria*. Italis, *Artemisia*. Germanis, *Weyfuss* / & *S.*
Johannis Gfirtel. Hispanis, *Artemisia*. Gallis, *Armise*.

ARTEMISIA.

F O R M A.



Artemisia exit caulib⁹ plu- *Matth.*
ribus, rectis, sesquicubitalib⁹,
interdum rubentibus, rotun-
dis, striatisq;. Folia gerit absin-
thio leniora, pinguiora, supi-
na parte albicantia, sed quæ in
caule sunt longè minora spe-
ctantur. Flores copiosissimi in
caulium ramusculis racema-
tim exeunt, parui, pilosi, odo-
rati, albicantes, è quibus mi-
nutum oritur semen. Radi-
cem habet lignosam, multifi-
dam minimi digiti crassitudi-
ne. Tota planta odore spirat
haud ingrato.

L O C U S.

Magna ex parte in monti. *Diosc.*
bus nascitur. Imo ferè ubiq; *Matth.*
locorum.

Q U A L I T A T E S.

Excalfacit, & modicè desic. *Gal. 6.*
cat. quodd autem ad calefactoriam attinet, excessus est secundi. quod verò ad re- *simp. me.*
siccationem, aut primi intensi, aut secundi incipientis, est quoq; & modicè te-
nuum partium.

V I R E S.

Conuenienter adijcitur seruefacta in muliebres desessus ad detrahendos *Diosc.*
menses, partus, secundasq;. Item ad præclusiones vuluæ, & eiusdem inflamma-
tiones. calculos comminuit, remoratam vrinam ciet. Et menses publi illita pel-
lit. succus vuluæ inditus ex myrrha, eadem quæ infessio trahit. Coma tribus
drachmis eorundem eiiciendorum gratia sumitur.

Pp 2

AMBRO-

AMBROSIA, Græcis, *Ἀμβροσία*. Italis, *Ambrosia*.

F O R M A.

Diosc. Pusillus est frutex, ramosus trium palmorum altitudine, folijs rutæ circa inum caulem exiguis, cauliculi feminibus, perinde quasi racemulis grauidi, qui nunquam florem patiunt, odore vinoso, suau. Radice tenui, sesquipedali.

L O C V S.

Matth. Prouenit in montibus, & collibus, amænis locis.

Q U A L I T A T E S.

Cataplasmate imposita vim habet adstringentem, & repellentem.

V I R E S

Gal. 6. Vis eius reprimere, ac repellere, & illitæ adstringere humores, qui in aliquam partem incumbunt.

P S E V D A M B R O S I A.



* A P P E N D I X.

Missa est Autori hæc planta, quam quidam Nasturtium verrucarium appellant, pro Ambrosia, pro qua etiam alij, vnde idem accepit, sibi hanc missam fatentur, id quod monendum censui lectorem, ne turbaretur si in hanc iconem incideret. Nec desunt qui pro Coronopo habeant, sed non astringit ipse radix odore & sapore Nasturtium referens, & Psyllij nihil habet, nec graminis. Sed folia Nasturtio pene similia sunt, maioribus tamen diuisuris, pluribusque: depressa rotunda asperaq; promit semina racematim coherencia, luteis intus granulis referta. Prouenit passim secus itinera, odore destituitur, sola acredine nares feriens.*

AMBR-

AMBROSIA altera. Germ. Klein Draubentraut.

AMBROSIA ALTERA.



Hanc plantam Ambrosi- Matth.
am quoq; nobis vocari libu-
it, quod omnibus ferè notis
Ambrosiam referat.

Pp 3

BOTRYS,

BOTRYS, Græcis, Βίτρυς. Italis, Botri. Germ. Traubenkraut / Mattenkraut / Tüpfelischer Beysfuß. Gallis, Pijment, Migraine, Millegraine, seu Paxience.

BOTRYS.

FORMA.

Matth. Folijs prouenit Cichorij, aut quercus modo laciniatis, sinuosisq; ramis numerosis, tenuibus, semine copiosissimo, racemosoq; refertis. Plāra tota rufescit, & resinoso quodam succo madet, adeo ut comprehēsa manibus hæreat, odorem quidem acrem spirat, & qui graueolētia quadam nares afficiat. non tamen sine aliqua suauitate.

LOCVS.

Diosc. Inuenitur in conuallibus, & in torrentium alueis.

QUALITATES.

Matth. Excalfacit, & siccit, aperit, incidit, abstergit, & crassa excrementa expectorat.

VIREs.

Diosc. Pota orthopneas mulcet.

Matth. Præstat eadem ad omnes pe-
ctoris, & thoracis affectus pi-
tuitosos, quinimo etiam sup-
puratos adiuuat, quin etiam
asthmaticos, & suspitiosos tū
herba ipsa ex decocto dulcis
radicis pota, tum ipsius herbæ decoctum pluribus diebus haustum, addito vio-
laceo melle, aut saccharo. Purulenta expuentibus mirificè auxiliatur. Herba i-
psa facit quoque ad vteri cruciatus si in calenti tegula vino irrorata calefiat, &
ventri imponatur. Puerperarum à partu dolores mulcet. Concisa, & in patella
ex oleo lini, & ouorum vitellis calefacta, vnà cum parthenij, & anthemidis
floribus, adeo ut placenta formam recipiat, & deinde calida ventri illinatur.
Suffiuntur eiusdem herbæ vapore vtiliter feminae ad menses ciendos, & emor-
tuos fetus eijciendos. Herba ipsa arida vestib⁹ interposita à tincis, & blattis eas
tuctur, & odoratas reddit.

GERA-



NOMINA.

599

GERANIVM, Græcis, *Τεράριον*. Italis, *Geranio*. Officinis, *Rosrum Ciconia*, vel *Rosrum grus*, vel *Acus muscata*. Germanis, *Welscher Storchschnabel*. Hispanis, *Pico de cinguenta*. Gallis, *Bec de Ciconne*.

GERANIVM.

GENERA.

Sex Geranij genera nobis *Matth.* reperta sunt, ut inferius patebit. Dioscoridi duo tantum habentur, Plinio tria.

FORMA PRIMI.



Geranium folijs est anemo *Matth.* nes, diuisuris longioribus in vnoquoq; folio senis. Caulem mittit ab ipsa radice rectum, tenuem, geniculatumq;. Flores è geniculis in caule prodeunt punicei rosarum sylvestrium ferè figura, sed longè minores, & quinq; tantum folijs referti, è quibus rostellum oriuntur inferna parte lunati. Radice nititur rotunda, nuce pontica maiore, subnigricante, & dulci sapore prædita.

LOCVS.

Nascitur copiosum in Dal. *Idem.* maria incultis locis.

QUALITATES, ET VIRES.

Radix drachmæ pondere in vino pota vuluæ inflationes discutit. Reficiens *Idem.* tibus se ab imbecillitate utilissima est. Bibitur contra phthisim drachma in vini cyathis tribus bis in die. Succus radice auribus medetur, Epystotonicis semen drachmis quatuor cum pipere & myrrha potum, auxiliatur.

Pp 4

GERA-

GERANIVM secundum. Italis, *Geranio secundo*. Germanis, *Tauben Fuß*.

GERANIVM II.

F O R M A.

Matth. Folijs est malvæ minoribus, pediculis tenuibus, longis, & subrubentibus: caulibus gracilibus, flexilibus, floribus puniceis, è quibus acuminati apices oriuntur, gruinis capitulis similes Radicem habet tenuem, dorsantalem, & fibrosam.

L O C U S.

Matth. Nascitur secus itinera, locis incultis, & in hortis.

Q U A L I T A T E S, E T
V I R E S.

Idem. Additur à Chirurgicis in potionibus intrinsecorum vulnorum, & fistularum, quinetiam radicibus, & folijs ad recentia vulnera, & vlcera sananda, vruntur. Fotu quoq; vsurpantur ad articulorum dolores.



GERA-

GERANIUM tertium. Italis, *Geranio terzo*. Germanis, *Storchschnabel*.

GERANIUM III.

FORMA.



Folijis vires cicutæ minori- *Matth.*
bus, seu Myrrhidis proximis,
minus tamen laciniatis, humi
accubantibus, quæ senescētia
rubescunt: caules habet bre-
ues, rotundos, pilolos, ruben-
tesque: in quorum summitati-
bus spectantur flores punicei,
parui, stellæ figura, è quibus a-
cuti oriuntur apices gruinis ro-
stris similes, sursum spectan-
tes, capitulis balauftij effigie:
radice nititur candida tereti,
ac dulci.

LOCVS.

Nascitur in ruderibus, circa *idem*.
sepēs, secus itinera, & saxoso,
& extenuato solo.

QUALITATES,
ET VIRES.

Iisdem cum secundo gene-
re viribus pollet.

Pp 5 GERA-

GERANIVM quartum. Italis, *Geranio quarto*. Germanis, *Gottes gnad* / *Wlad*
Hancsfuß.

F O R M A.

Matth.

Folijs assurgit cæteris gran-
dioribus, ranunculi æmulis,
octonis, circumquaq; diuisu-
ris, numerosis, humi accuban-
tibus, prælongis, ac firmiori-
bus pediculis, nitentibus: cau-
les edit pinguiusculos, & ar-
ticulatos, ramis copiosis, in
quorum cacuminibus, flores
emicant in cæruleo purpurei,
cæterorum maiores. Quibus
flaccescentibus græna (ut in
cæteris) prodeunt capita, pro-
no in summitate rostro, tri-
plici apice in coronæ modum
rescisso. Radicē quoq; cæte-
ris longiorem habet, crassiorē,
robustiorēq; colore rufe-
scēte, & lignosa int^o matrice.

L O C V S.

Idem.

Prouenit in pratis in Ger-
mania & Boëmia.

F A C V L T A T E S,
E T V I R E S.

Vulneraria est herba, & præsertim radix tam in potionibus addita, quàm ex-
terius admota.

GERANIVM IIII.



GERA-

NOMINA.

GERANIVM quintum. Italis, *Geranio quinto*. Germanis, *Rupprechtskraut*.

GERANIVM V.

FORMA.



Folia promit pentaphylli *Matth.* modo diuisa, magis tamē per ambitum serrata: subhirsuta, & praelongis pediculis, ipsiq; pilosis nitentia: caules habet dodrantes, tenues, & lanuginosos. Flores ex purpura rufescentes, è quibus parua, acutaque oriuntur siliquulae, hirsutae, ac subasperae, in quibus semen concluditur. Radicem habet dodrantalem, sed tenuem.

LOCVS.

Nascitur arido solo.

Idem.

QUALITATES,
ET VIRES.

Germanorum medici hanc *Idem.* tritam recentemq; peculiari-
ter commendant ad Erysipe-
las, ad inflammationes mam-
illarum, & oris, & pudendo-
rum vlcera.

GERA-

GERANIVM sextum, Italis, *Geranio festo*.

GERANIVM VI.

FORMA.

Matth.

Folia profert Altheæ proxima, caules plures, lentos, geniculatos, hirsutos, flores paruos, rubêres, balauftij effigie, è quibus rostrata prodeunt capirula. Radix illi est sesquidrandantis, digiti crassitudine, quæ humoretenus rubescit.

LOCVS.

Idem.

Nascitur in montibus, & præsertim in Baldo monte in agro Veronensi.

QUALITATES,
ET VIRES.*Idem.*

Viribus præstat vulnerarijs, & ijs omnibus, quibus & cætera genera.



GNAPHA-

NOMINA.
GNAPHALIUM, Græcis, Γναφάλιον. Italis, *Gnafalio*.

605

GNAPHALIUM.

FORMA.



Gnaphalium planta est inca- *Matth.*
na tota, tomentosaque, cauli-
bus compluribus fruticans, cir-
ca quos totos folia insunt cras-
siuscula, oblonga, lanuginosa,
ac mollia: quæ verò in caulium
summitate spectantur in rosæ
modum orbiculata sunt. Radi-
cem habet multifidâ, ac ligno-
sam.

LOCVS.

Prouenit raris in locis in Ita- *Idem.*
lia, & gaudet apricis, & siticu-
losis.

QUALITATES.

Gnaphalium, ideo sic nomi- *Gal. li. 6.*
natum est, quòd folijs eius mollibus, *ἐν τῇ γναφάλιον*, hoc est, pro tomentis vran- *simp. me.*
tur: sunt autem candida, & mediocriter adstringunt, proindeq; sunt, qui ex vi-
no austero dysentericis propinent.

VIREs.

Bibuntur efficaciter folia ex vino austero ad dysenteriam. Quinetiam ad *DIOSC.*
diarrheam & cæliacas passiones. Profunt quoque enterocellis in puluerem *Matth.*
hausta.

GNAPHA-

*GNAPHALIVM vulgare, Impia Plinij, Herba torminalis. Germa. *Xhurtraut*.

GNAPHALIVM VVLGARE.

F O R M A.

Incana tota est, vt prior, & quæ tomenti vicem præstare possit, caules pmit exuccos, mollibus, lanuginosisque folijs refferos, diuicatos in ramos complures, quorum nouelli superât longitudine vetustiores, & rotunda florû capitula quæ modo nata sunt altius surgentia despiciunt inferius relictâ ortu priora. Semine pusillo seipsam ferit quotannis, radice namque pusilla non diuturna nititur.

L O C V S.

Nascitur in locis sabulosis apricisque aggeribus.

Q U A L I T A T E S,
E T V I R E S.

Eadem huic ascribuntur, quæ priori.*



ТУРНА,

NOMINA.

607

TYPHA, Græcis, Τύφη. Italis, *Mazza fonda*. Germanis, *Wostolben* seu *Narren-
folben*. Hispanis, *Bohordo*, seu *lunco Amacorocado*. Gallis, *Mache* seu *Masse de tunc*.

TYPHA.



FORMA.

Folium edit Cyperidi si- *Diosc.*
mile, caulem album, leuem,
æquabilem, florem in cacu-
mine ambientem, densum,
qui in pappos soluitur, quod
paniculam aliqui vocant.

LOCVS.

Gignitur in palustribus, & *Idem*,
aquis stagnantibus.

FACULTATES,
ET VIRES.

Huius herbæ flos suillo *Idem*,
adipe eloto exceptus, am-
bustis medetur.

FILI-

FILIPENDULA, Italis, *Filipendula*, Quibusdam *Oenanthe*, sed falsa. Germanis, *Nerter* *Steinbrech*, Erde *Eicheln*.

F O R M A.

Matth. Folij est numerosis ab vno pediculo vtrinque seriatim dependentibus, pimpinellæ siue sanguisorbæ modo, magis tamen se se stipantibus, oblongis, & per ambitum denticulatis, caulibus, sesquicubitalibus, in quorum fastigijs flores sunt albi, in umbellæ ferè speciem coherentes, atque odorati. Radices habet multifidas, funiculi modo exiles, sed globulis numerosis refertas perinde, ac in præonia fœmina, sed longè minoribus, oblongis, & rariusculis.

L O C V S.

Idem. Nascentur in pratis & herbosis locis.

Q U A L I T A T E S,
E T V I R E S.

Idem. Radix pota urinæ remoratui, eiusque stillicidio auxiliatur. Item renum, tum calculis, tum doloribus. Eadem stomachi inflationes discutit. Medetur suspensoriosis, & ægrè spirantibus, omnibusque in vniuersum morbis, quos pituita excitauerit. Radicum siccarum puluis vtiliter inspergitur comitialium cibis.



OENAN-

OENANTHE, Bulbocastanum, Tralliani, Græcis, Οινάρη. Italis, *Enante*. Germanis, Erd Reffen.

OENANTHE I.



FORMA.

Folia habet pastinacæ, flo-
rem candidum, caulem cras-
sum, palmi altitudine, semen
atriplicis. Radicem magnam
in multa rotunda capitula ex-
tuberantem.

LOCVS.

Nascitur in petris. * Bulbo-
castanum agris innascitur. *

QUALITATES, ET
VIRE.

Semen, caulis, & folia cum *Idem*.
mulso vino pota, secundas eij-
ciunt. Radix ex vino vrinę stil-
licidio conuenit.

APPENDIX.

Si huic plantæ caules ines-
sent crassi, assererem profecto
legitimum esse Oenanthe.

Qq

OENAN-

F O R M A.

Matth. Folijs est pyrethri, aut pastinacæ sylvestris non absimilibus, caule fœniculaceo, qui umbellas in summitate gerat, è ramis dependentes. Radicibus per omnia filipendulæ similibus.

L O C V S.

Idem. Prouenit in collibus, & locis à Sole illustratis.

Q U A L I T A T E S , E T
V I R E S.

Idem. Creditur ijdem esse viribus, quibus filipendulam præstare diximus.

O E N A N T H E T E R
T I V M.

Matth. Folia promit Gingidij, caulem fœniculaceum striatumq; è cuius ramis umbellæ oriuntur candidæ, Radicibus numerosis filipendulæ similibus, sed vegetioribus globulis.



L O C V S.

Idem. Nascitur in amœnis tractibus & in montibus.

Q U A L I T A T E S E T V I R E S.

Idem. Nihil differt suis viribus à præscriptis.

OENAN-

NOMINA.

611

OENANTHE aquatica, repens. Italis, *Filipendula serpeggiante*.

OENANTHE IIII.

FORMA.



Herba est humi serpens, *Matth.* folijs terrij ferè similibus, ex-
lioribus tamen, & magis laci-
niatis, caule sinuoso, striato-
que. Capitulis in summitate
hirsutis, in quibus semen. Ra-
dices mittit plures, rapuncu-
li ferè effigie, non solum in
ima caulis parte, sed etiam in
ramis, qui humi serpentes, ra-
dices quoq; faciunt.

LOCVS.

Nascitur in incultis locis. *Matth.*
* In paludibus sponte nasci-
tur sine radicum tuberculis,
has enim in hortos translata
aut in aridam deplantata sibi
demum adsciscit.*

QUALITATES, ET VIRES.

Et si nihil certi de eius viri. *Idem.*
bus, nobis constet: putamus
tamen à cæteris Filipendulis
non multum differre.

APPENDIX.

Oenanthe, has plantas, ideo appellare libuit, quòd ita Filipendulam, cuius
sunt species, vulgares vocent. Atquire vera nec oenanthe sunt, nec eius spe-
cies.

Qq 2

CONT-

CONYZA, Græcis, *Koviza*. Italis, *Coniſa*, seu *pulicaria*. Germanis, *Beet Wint*. Hispanis, *Attadegua*. Gallis, *Herbe aux puces*.

CONYZA.

G E N E R A.

DIOSC. Tria eius habentur genera, maius, minus, & medium. * inueniuntur etiam plura, & nos quartum adiecimus. *

F O R M A M A I O R I S.

Idem. Folijs est oliuæ similibus, latioribus tamen, & frutice altiori, graui odore, hirsutis, pinguibus, caule binum cubitorum, flore fragili, lutei coloris, qui in pappum abit. Radicibus superuacuis.

L O C V S.

Matth. Nascitur in campestribus, in collibus, & amœnis locis.

Q U A L I T A T E S.

Gal. 7. Conyza maior, & minor adsimilis sunt tum temperaturæ, tum facultatis. Gustui amara, & acris. Excalfaciuntque admodum luculenter, adeo ut tertij sint ordinis excalfacientium, & desiccantium.



V I R E S.

DIOSC. Frutextotus suffitu, substratūq; serpentes fugat, culices abigit & pulices necat. Folia conuenienter illinuntur serpentium plagis, tuberculis, ac vulneribus. Flores, & folia cum vino ad menses, partusq; eijciendos bibuntur. Item contravrinæ stillicidia. Arquatū morbum, & tormina, comitiales pota ex aceto adiuuant. Decoctum in deflectionibus vuluæ affectibus medetur, impostus succus abortum facit. Herba ex oleo efficaciter horribus oblinitur.


CONY-

NOMINA.

613

CONYZA minor, Græcis, Κοιζα μικρά. Italis, Coniζa minore.

CONYZA MINOR.



FORMA.

Folijs prouenit alterius angustioribus, frutice breuiori, pedali longitudine, & odore quidem præstantiori, cætera verò maiori similia habet.

LOCVS.

Prouenit secus itinera, in campestribus, & in amœnis.

QUALITATES, ET VIRES.

Adsimilis cum maiori est Galen. temperaturæ: quinetiam fa- diosc. cultatis,

Q9 3

CONY-

CONYZA tertia, Græcis, *Κονίζα τρίτη*. Italis, *ConiZaterZa*. Germanis, *Gich Mung*.

CONYZA TERTIA.

FORMA.

DIOSC. Caule est crassiore, & molliore, folijs mediæ inter maiorem, & minorem, amplitudinis, minime pinguis, multo tamen grauioris odoris, & iucundioris.

LOCVS.

DIOSC. Prouenit humectis locis.

QUALITATES, ET VIRES.

DIOSC. Potest omnia quæ priores, sed imbecillius operatur. Peculiariter autem auxiliatur sicæ farina dysentericis, si quotidie drachmæ duæ propinentur ex vino rubro austero.



*CONT.

NOMINA.
*CONYZA QVARTA.

615



FORMA.

Rubicundum profert cau-
lem è radice tenui alba, qui fo-
lijs angustis, aliquantum pilo-
sis, in acumen desinentibus, &
parum incisis, vestitur. In sum-
mo aliquot ramuli sustinent
flores luteos, præcedenti simi-
les quibus proculdubio etiam
papposum semen respondet.*

LOCVS.

Nascitur in pratis.

Q9 +

HEME-

HEMEROCALLIS, Græcis, *Ημερόκαλλis*. Italis, *Hemerocalle*, & *Giglio saluatico*. Germanis, *Seydnisch* & *Silien*. Hispanis, *Lirio amarillo*. Gallis, *Lusianne*.

HEMEROCALLIS.

FORMA.

Diosc. Folium, & caulem habet Lili, herbacei coloris, ut porrum. Flores in caule per singulos exortus terni, aut quaterni erumpunt lili diuisura, quoties dehiscere cœperunt, colore per quàm pallido. Radix magna est, atq; bulbosa.

LOCVS.

Matth. Prouenit in segetibus, & campestribus inter vepres.

QUALITATES.

Gale. 6. Hemerocallis radicem habet lili radici similem, non figura tantum, sed & viribus. prodest non secus atque illa igni ambustis, quippe quæ leuiter digerentem facultatem habeat, & cum hoc repulforium quiddam.



VIRES.

Diosc. Pota radix, aut cum melle, & lana in pello supposita, aquam educit, & sanguinem. Folia trita mammaram inflammationes à partu contractas, oculorumque collectiones mitigat. Radix, & folia igni ambustis vtiliter illinuntur.

HEME-

HEMEROCALLIS altera, Italis, *Giglio saluatico secondo*. Germanis, *Türckisch Goldwurz*.

HEMEROCALLIS ALTERA.



F O R M A.

Alteram facie æmulatur, *Matth.* sed radicem habet, quæ pluribus, & paruis coagmentatur bulbis. quin etiam flores profert Martagi modo repandos, prioris hemerocallis colore, ut eius imago quam hic adiecimus palam demonstrat.

L O C U S.

Prouenit in montibus. *Idem.*

Q U A L I T A T E S, E T
V I R E S.

Eadem præstare possunt, tum radix, cum folia, quæ prior.

Q q 5

L I L I U M

LILIVM conuallium, Italis, *Lilio conuallio*. Germanis, *Meienblümlein*. Gallis, *Mâguet*.

LILIVM CONVALLIVM.

FORMA

Matth. Folia profert, quadantenus plantaginis effigie, sed tenuiora, laevia, nervisque carentia, cauliculos iunceos, triangulares, tenues, ac molles, obsequiososque, in quibus flores exeunt plures balustij, aut arbuti florum effigie: odore eximio, & per quam iucundo, è quibus baccæ enascuntur virides, quæ per maturitatem rufescunt. Radices demittit laxas, longas, fibris, capillamentisque; refertas, nullis adiacentibus bulbis.

LOCVS.

Idem. Nascitur in montibus, & in eorum conuallibus.

QUALITATES.

Idem. Flores exalfaciunt, attenuant, digerunt, prouocant.

VIRE.

Idem. Aiunt iuuare cor, atque cerebrum, ac omnes principes facultates. Idcirco resolutis, comitialibus, conuulsis, vertiginosis, veteriosisque, animi deliquio laborantibus, & cordis pulsatione affectis inibent. Item agrè parturientibus stillaritiâ florum aquam vtiliter potandam censent, & oculorum inflammationes eandem sanare putant.

CENSURA.

Qui Liliû conuallium Ephemerum alterum faciunt, ijs mens sana non est. LEV.



LEYCOIVM, Græcè, *Λελκόιον*. Mauritanis, *Keiri*, *Cheiri*, *sive Alcheiri*. Italis, *Viola bianca*, & *paonazza*. Germ. *Rot Braun*, vnd *weiß Beil*. Hisp. *Violetas amarillas*, & *violetas blancas*. Gallis, *Violetes rouges*, *blanches*, *sen Violet*.

LEYCOIVM ALBYM, ET PURPUREVM.

G E N E R A.

Tria Leucoij visuntur gene. *Matth.*
ra, nempe Album, Purpureum, & Aureum.

F O R M A.

Profilunt omnia genera cu- *Matth.*
bitali altitudine, ramosa, fruticosaq; caulibus brassicæ exilioribus, sed foliorū facie variant. Namq; tametsi omnibus folia sunt oblōga, id tamen q̄ luteis exit floribus, folijs est longioribus, numerosioribus, viridioribus, ac magis in acutum desinentibus. Cetera verò nempe album, & purpureum folia gerunt breviora, latiora, & minime mucronata, quin etiam superne, inferneq; canescentia.

L O C V S.

Seritur in hortis, & scitilibus *Idem.*
ad exornandas ædium fenestras.

Q U A L I T A T E S.


Leucoij frutex vniuersus ex- *Galen. 7.*
tergētem facultatem possidet, *sim. me.*
ac tenuium est partium, plus tamen flores, & inter hos qui sunt sicciore, magis etiam quā virides: Radices similis quoq; sunt facultatis, nisi quatenus

crassioris sunt essentia, & magis terrena.

V I R E S.

Sicciflores oculorum cicatrices crassas extenuant, tum menses quoq; decoctum eorum mouet, & secundas, fortumq; emortuū elicit, & si bibatur viuum quoq; perimit, & abigens est medicamentum. Est enim id vt si q̄ aliud amarum. Sic decoctū eius si non merū fuerit, sed aqua mistum vteri phlegmonas perfusum sanat. potissimū quē diuturno tempore ad scirrhi modū induruerit, sic cum cerato vlcera ægrē ad cicatricē peruenientia curat. Sunt verò etiā q̄ cum melle ad oris vlcera adhibeant. Semē quoq; iisdē facultatib; præstat. Radices ex aceto illitæ lienes induratos sanant. Quinetiam phlegmonas in articulis induratas.

LEV-



LEYCOIVM aureum, Græcis, $\Delta\lambda\kappa\delta\iota\omicron\nu\ \alpha\gamma\chi\epsilon\delta\upsilon$. Italis, *Viola gialla*. Germanis, Gelb Negel Weill.

LEYCOIVM AVREVM.

FORMA.

Matth. Folijs est longioribus, numerosiorib⁹, viridioribus, & magis in acutum desinentibus. Flores edit luteos, odoratosque.

LOCVS.

Idem. Seritur passim in hortis, & siccilibus.

QUALITATES ET VIRES.

Diosc. Præstat ea omnia, quæ cætera genera, sed longe valentius. Ideoque præcipui est in medicina vius.



PHIL-

NOMINA.

621

PHYLLVM, Græcis, Φύλλον. Germanis, Welsch Vingelfraut.

PHYLLVM.



GENERA.

Duum est generum, θηλυγον, DIOSC.
 καὶ ἀρρενονγον.

FORMA.

Telygonon prouenit musci DIOSC.
 modo, folio oleæ, sed colore
 magis herbaceo, caule tenui,
 breui radice exili, florem album
 profert, semen papaueris ma-
 iusculum. Arrhenogonum verd
 cætera huic simile habet, solo
 fructu distat, habet enim race-
 mosum quiddam deflorentibus
 oleis non dissimile.

LOCVS.

In saxosis nascitur.

Idem.

VIRE S.

Arrhenogonon pota masculini sexus partus, vt telygonum fœminei, face-
 reproditur.

TESTI-

TESTICVLVS, Græcis, ὄρχις, & ἀππερογόνος. Mauritanis, Chast, Alchelb. Italis, Testicolo di cane. Officinis, Testiculi vulpi. Germanis, Knabenfraus. Hispan. Coyon de perro. Gallis, Coullon de Chien.

GENERA.

TESTICVLVS.

Duo tantum genera Dioscoridi recensentur. Sed re vera plura passim spectantur, ut ex iconibus hic seriatim appictis palam fiet.

FORMA.

DIOSC. Is qui Cynosorchis dicitur folijs exit circa caulem, & ima eius parte in terra striatis Oleæ molli similibus, longioribus, angustioribus, lauius, caule dodrantali, florib⁹ purpureis, radice oblonga oliuæ modo, angusta, duplici ordine, superiore que plenior est, inferiore que mollior, & rugosior. Alter verò Serapias appellatus, folijs est porri, latoribus, oblongis, pinguibus ex alarum sinu inflexis, caule palmeo, floribus planè purpureis. Radice testiculis simile.

LOCVS.

DIOSC. Nasci in petrosis, & sabuletis.

QUALITATES.

Gale. 8. Cynosorchi vis inest humida, & calida, ac gustatibus dulcior apparet.

simp. me. Ceterum maior

radix multam videtur habere humiditatem excrementitiam, & flatuosam. Altera verò, minor videlicet, contra admodum elaborata est, ita ut eius temperamentum ad calidius, & siccius vergat. Orchis verò, quem & Serapida nuncupant, sicciorē facultatem obtinet, quā ut primi ordinis haberi mereatur.

VIRE S.

DIOSC. Eduntur Cynosorchis radices coctæ, ut bulbi, ex quibus si maiores edūt viri, mares generare dicuntur, si minorem sēminæ, alterū sexum. Illius verò radix qui Serapias appellatur, illita tumores discutit, vlcera purgat, & serpē eadem non patitur, abolet fistulas, & illitu inflammationes delet. Aride radices nomas inhihent, sanantq; putredines, & oris vlcera cacoethe. Alium sūnt è vino potæ. De hac eadem, quæ de Cynosorchi produntur.

TESTI-



NOMINA.
TESTICULI SPECIES II.
ET III.

623



FORMA.

Secundi, tertijq; Testicu- *Matth.*
li forma ex duabus his ima-
ginibus circumscribi potest.

LOCVS.

Nascitur in pratis mon- *idem.*
tium, collibus, & herbosis
pascuis.

VIRE.

Vires cum cæteris vnifor-
mes habet.

TESTI-

FORMA.

Matth. Ex hac imagine facile quispiam quarti testiculi formam concipiet.

LOCVS.

Idem. Nasctur in montibus, & præsertim in pratis.

VIREs.

Idem. Vires illi eadem sunt quæ & cæteris.



TESTI-

NOMINA.

625

TESTICVLISPECIES V.

FORMA.



Folia gerit plantagini proxima, gemina, supernè striata, caulè dodrantalem, glabrum, leuemq; flores spicatos, candidos, odore longe suauissimo, radices (vt cæteri) duas oleæ magnitudine, longiusculas, nonnihil hirsutas.

LOCVS.

Prouenit in syluis & vallibus, & locis syluestribus, herboso solo.

VIRES.

Ea omnia potest, quæ cæteragenera.

Rr

PALMA

PALMA Christi maior. Italis, *Palma di Christo maggiore*. Germ. *Sandlincum*.

PALMA CHRISTI MAIOR.

G E N E R A.

Duum est generum, Alterum maius, Alterum minus.

F O R M A M A I O R I S.

Matth.

Maius folia habet alij, latiora, nigris infecta maculis, caulem rotundum, laevem, florem spicatum, varium, in purpura albicantem, odore non ingrato. Radices duas, quæ sanè canis testiculos referrent, nisi processibus quibusdam, quali digitis humanam manum exprimere viderentur.

L O C V S.

Idem.

Nascitur in montibus, potissimum in pratis, & herbosis locis.

Q U A L I T A T E S, E T V I R E S.

Idem.

Ea omnia præstat, quæ canini Testiculi. Peculiariter autem radices potæ crassâ corporis excrementa peliunt, faciemq; detergunt. Dantur maniacis magno iuuamento, quin & in nervorum affectibus. Semen drachmæ pondere in vino potum comitialibus convenit. Febrem quoque quartanam curant radices duarum drachmarum pondere haustæ.

Nicolaus Florentinus.

PALMA




NOMINA.

627

PALMA Christi minor. Italis, *Palma di Christo minore*. Germanis, *Brendelin*.

PALMA CHRISTI MINOR.

FORMA.



Folijs constat croci, caule *Matth.*
dodrantali, iunceo, leuiq; in
cuius cacumine flos emicat
purpureus amaranthi æmu-
lus, saturationi tamen purpu-
ra splendens, qui recens odo-
rem quàm suauissimum spi-
rat.

LOCVS.

Nascitur in pratis altorum *Idem.*
montium.

QUALITATES, ET VIRE.

Florum exiccatorum pul- *Idem.*
uis datur vtiliter potandum
dysentericis, ex aqua in qua
ferrum extinctū fuerit. *Idem*
totius plantæ stillatitiam a-
quam præstare aiunt.

Rr 1

HORMI-

HORMINVM, *O'gallrov.* Italis, *Horminio.* Germ. *Welsch Tag und Nacht.*

HORMINVM.

G E N E R A.

Diosc. Horminum duplex habetur,
domesticum & sylvestre.

F O R M A D O M E S T I C I.

Diosc. Planta est folijs marrubio si-
milis, sed maioribus, caule se-
micubitali, quadrangulo, cir-
ca quem eminentiæ filiquis si-
miles prodeunt, quæ ad radi-
cem spectant.

Matth. Flores edit in
caule secundum folia per in-
terualla prodeuntes purpu-
reo colore, in quibus diuer-
sum semen concluditur.

L O C V S.

Idem. Seritur in hortis.

Q U A L I T A T E S, E T
V I R E S.

Diosc. Semen ad venerem stimu-
landam bibi cum vino volunt.
Purgat cum melle argemas, al-
buginesq;. Illitum ex aqua tumores discutit, eo etiam aculei ex corpore extra-
hantur. Idem effectus est illitæ herbæ.



HORMI-

NOMINA.

629

HORMINVM sylvestre, Græcis, Οἶκινον ἄγριον. Italis, Horminio salutarico. Germ.
Wilder Scharlach/Wilde Salbey.

HORMINVM SYLVESTRE.

FORMA.

Folio est Salvia ferè simili, Matth.
caule sesquipedali, aspero, qua-
drangulo, subhirsuto, striatoq;
flore salvia, purpurascente, fili-
quis numerosis in humum re-
flexis, in quibus semen rotun-
dum, fusco colore.

LOCVS.

Prouenit in campestribus, in Idem.
pratib, secus itinera, & herbosis
locis.

QUALITATES, ET VIRES.

Eadem omnia præstat, quæ Idem.
de domestico scribuntur.



Re. 3

SCLA-

SCLAREA, Italis, *Sclarea*, *Scarleggia*, seu herba di san Giovanni, quibusdam *Matriſa-*
nia. Germanis, *Scharlach*. Gallis, *Orual*, seu *Toutelbonne*.

SCLAREA.

FORMA.

Matth.

Folij exit hormino qua-
 druplo maioribus, ac latiori-
 bus, subasperis, crispis, humi
 accubantibus, caule sesquipe-
 dali, & quandoq; maiori, hir-
 suto, firmo, quadrangulo, à
 cuius medio plures oriuntur
 rami, in quibus spicati exeunt
 flores subpurpurei, odore exi-
 mio, & quadam cum gravita-
 te iucundo, ex his calyculi o-
 riuntur, in quibus habetur se-
 men nigrum pellucidum, ac
 rotundum. Radice nititur mul-
 tifida subnigricante.



LOCVS.

Idem.

Seritur in hortis, & virida-
 rijs.

FACULTATES.

Idem.

Excalfacit, attenuat, discu-
 tit, aperit, resoluit.

VIRES.

Idem.

Folia ex aceto imposita, panos per se, vel cum melle discutit. Item foruncu-
 los anteaquam acuminentur. Itale mulieres feminis granum oculis caliganti-
 bus intromittunt, nec inde auferunt nisi caligine toluta.

APPENDIX.

Idem.

Sclarea & si Dioscoridis Horminum non est, ego tamen Horminum maius,
 aut odoratum appellauerim.

SECV-

NOMINA.

631

SECURIDACA, Græcis, Ἡδυσάρον. Vnguentarijs, *Pelecinum*. Italis, *Securidaca*.
Germanis, Groß Peltſchen.

SECURIDACA MAIOR.

GENERA.

Duum est generum, Alter- *Matth.*
rum maius, Alterum minus.

FORMA MAIORIS.



Folij exit ciceris, vñdecim *Matth.*
ex vno processu erumpenti-
bus, cauliculos edit tenues,
lentosq; floribus diluto co-
lore, purpurascens ut in
piso, sed minoribus. Siliquas
habet quadamtenus falcatas,
pressas, ad unco cacumine, in
quibus rufum concluditur se-
men ancipitis securis effigie.
Vnde illi nomen. amaro sape-
re. Radice vnica nititur, pau-
cis adnatis fibris.

LOCVS.

Nascitur in segetibus, & hordeis.

QUALITATES.

Diosc.

Hedysari semen colore rufum est, vtrinq; anceps, vt securis. Amarum, & *Gal. 6.*
subacribum apparet. *simp. me.*

VIRE.

Semen haustum stomacho vtile, cum melle ante coitum subditum concipi- *Diosc.*
endi spem adimit. Additur in Antidotis. Viscerum obstructions expurgat. *Gal. ilid.*
Idem præstant totius fruticis ramuli.

Rr 4

SEC-

SECVRIDACA minor, Græcis, ἡδυσταγον μικρὴν. Italis, *Securidaca minore*. Germanis, Klein Pelschen.

SECVRIDACA MINOR

FORMA.

Matth. Maiori ferè adsimilis est, folia tamen minora spectantur, numerosiora, & in cacumine retusa. Quin etiam & caules, & rami & cæteræ quotquot sunt partes minores habentur. Flores edit alteri haud absimiles, sed pusillos, è quibus cornicula proueniunt rotunda, incurua, acuminato cacumine, quæ per maturitatem rufescunt. Semen in his contentum alteri simile est, sed minus, ac tenuius.

LOCVS.

Idem. Nasceitur & ipsa inter segetes in agris.

QUALITATES, ET
VIREs.

Ea omnia, quæ maiori ascribuntur, ea quoq, in minori reperiuntur.




ONOSMA,

ONOSMA, Græcis, ὄνοσμα. Italis, Onosma.

ONOSMA.

FORMA.



Oblonga folia habet, an- Diosc.
chuse modo, lōgitudine qua-
tuor digitorum, & vnus lati-
tudine, mollia, in terra iacen-
tia, sine caule, sine semine, si-
ne flore. Radice nititur ob-
longa, tenui, infirma, rube-
scente.

LOCVS.

Gignitur in asperis.

Idem.

QUALITATES.

Onosma ex acri & amara Gal. li. 6.
constat substantia. simp. me.

VIREs.

Folia ex vino pota partus Diosc.
extrahunt. Prægnās si eam su-
pergradiatur abortum facere
dicitur.

Rr 5

NYMPHÆA,

NYPHÆA, Græcis, Νυμφαία. Mauritanis, Nilofar, seu Nilufar. Barb. Nenufar. Italis, Nimphea. Germanis, Weiß Seebiumen, & Haarwurg. Hispanis, Escude-tes del rio, & Higos del rio. Gallis, Blanc de eau, sine Lunet de eau, sine Lu de stagn.

NYPHÆA ALBA.

G E N E R A.

Matth. Tria eius habetur genera, duo magna, alterum quidē album, alterum Luteum, & tertium, quod parvū appellatur.

F O R M A A L B A E.

Diosc. Folij est fabæ Ægyptiæ, minoribus, & longioribus, alijs in summa aqua, alijs demersis, pluribus ex eadem radice prodeuntibus. Flore albo, Lilio simili, & in medio crocos habente, cū defloruerit, ut rotundum malum, aut papaveris caput extuberat, nigro semine, denso, & lato, lēti gustus. Caulis est lēvis, niger, minimè crassus, Ægyptiæ fabæ cognatus. Radix nigra, crassa, scabra, clauæ similis.

L O C U S.

Idem. Nasceitur in paludibus, & stagnantibus aquis.



Q U A L I T A T E S.

Galen. 8. Nymphaeæ tum radix, tum semen desiccâdi vim habet, citra morsum. Porro *simp. me.* nonnullam etiam abstergendi vim obtinet.

V I R E S.

Diosc. Sicca cum vino pota cæliacis, dysentericisque auxiliatur, & Lienem abstergit. Radix stomachi, & vesicæ doloribus illinitur, vitiliges ex aqua emendat, imposita cum pice alopecij medetur. Eadem cōtra veneris insomnia bibitur. *Matth.* Paratur è floribus oleum ipsis in eo insolis, quo vtuntur medici, ubi refrigerare ac humectare sit opus. Soporiferi enim quidpiam illi inest, folia recentia renibus admota seminis profluvia sistunt.

NYPHÆA

NYPHÆA altera, Græcis, Νυμφαία ἑτέρα. Italis, *Nimpha gialla*. Germanis, Gelb Seebiumen.

N Y M P H Æ A L V T E A.

F O R M A.

Folijs estant edictæ, radice Diosc. alba, scabra, flore luteo, nitente rosæ simili.

L O C V S.

Prouenit & hæc in stagnis, Matth. lacubus, & paludibus.

Q U A L I T A T E S.

Desiccandi vim habet tum Gal. li. 8. semē, tum radix citra omnem simp. me. morsum, & nonnihil abstergunt.

V I R E S.

Huius semen & radix, contra sceminarum profluvia efficaciter ex vino nigro bibuntur, cætera cum altera paria sunt. Attamen huius radix ad Gal. mulierum profluvia imbecillior.

C E N S V R A.

Qui putat Arabum, & Græcorum Nymphæas diuersas esse plantas, proculdubio hallucinantur.

N Y M P H Æ A



NYPHÆA parua, Græcis, Νυμφαία μικρά. Italis, Nimpheapiccola. Germanis, Klein Seeblum.

F O R M A.

Martb.

Folijs est aliarum facie similibus, sed brassicæ marinæ pauld maioribus. Flore candido, capitulis exiguis, vt in capari, semine intus papaueris magnitudine.

L O C V S.

Idem.


Nascitur in Lacubus, & paludibus, circa eorum litora, in aqua tamen, nec alibi eam videre licuit, præterquam in Boëmia.

Q U A L I T A T E S,
E T V I R E S.

Idem.

Imbecillioribus longè viribus est, quàm cætera de quibus diximus.

N Y M P H Æ A P A R V A.



*NYPHÆA

*Nymphaea parua alia.

FORMA.



Folij est circinitæ rotunditatis, subtilissimis, prodentibus è radice longa duos digitos, inferius recurva, colore partim viridi, partim sublutea, superius præsertim, nodis quibusdam protuberantibus, inæqualiter cōpacta, quorum singulis in medio nigricantia duo puncta insunt, à fibris quæ deciderunt, relictæ, enascuntur ab hac fibræ complures, albæ, crassiusculæ, spōgiosæ ad octo digitorum longitudinem, sapore nullo insignes. Florē non vidi.

Locvs.

Nascitur in Heluetia sub Suamedinga pago.*

ANDRO-

ANDROSACES, Græcis, ἀνδρόσακας. Italis, Androsace.

FORMA.

DIOSC. Androsaces herba est amara, tenues spargens iuncos, sine folijs, folliculos in capitibus habens, in quibus semen continetur.

LOCVS.

Idem. Gignitur in Syriæ maritimis.

QUALITATES.

Gal. li. 6. Androsaces humida, & asimp. me. cras herba est.

VIRE.

DIOSC. Ea drachmis duabus ex vino pota hydropicis copiosam urinam cit: eundem effectum præstat, & semen potū, & herba decoctum: podagris vultu illinitur.



ANDROSA-

ANDROSACES ALTERA.



Sunt qui putent hanc plan- *Matth.*
 tam Androsacem legitimā ef-
 se, quod è Syriæ maritimis al-
 latam sciant. Verùm cūm fo-
 lia in summitate gerat, non
 possum ego facillè eorum sub-
 scribere placitis, eam tamen
 hic excudi curauimus, vt alio-
 rum quoque sit iudicium.

ASPLENYM.

ASPLENVM, quod Scolopendrium aliqui vocant, Græcis, *ἀσπλην*. Mauritania, *Scolopendrium*, siue *Sculusendrium*. Officinis, *Cetrach*. Italus, *Aspleno*, & *Cetrach*, seu *herba indorata*. Hispanis, *Doradilha*. Gallis, *Cetrach*.

ASPLENVM.

FORMA.

Diosc. Folij est multis scolopendrea animali similibus, ab radice vna prodeuntibus, nec caulem, nec florē, nec semen habet. Folia polypodij modo diuiduntur, subterflauescentia, hirsutaq; superne viridia.

LOCVS.

Diosc. Nasceitur in parietibus, faxisq; siliceis (oppidorum mœnijijs) & opacis.

QUALITATES.

Gal. li. 6. Asplenium tenuium quidē
simp. me. partiū, non tamen calida herba est, hac vtiq; ratione, & lapides frangit, & lienes liquat.

VIRES.

Diosc. Folia in aceto feruefacta, & per dies quadraginta pota, lienem absumunt, quibus etiam contritis, lienem ex vino illini oportet, stranguriæ & regio morbo prodest, singultum sedat. Calculos in vesica comminuit, conceptum adimere creditur per se aut cum Muli liene appensa. Tradunt nocte silente Luna huius rei gratia effodienda. Ponitur in decoctis, quæ ad melancholicos parantur morbos.

HEMIO-



NOMINA.

641

HEMIONITIS, Græcis, Ημειωνίτις. Italis, Hemionite. Germ. Welsch-Hirschjung.

HEMIONITIS.

FORMA.

Folium emittit dracunculi, Diosc.
lunatum, radicibus cohæret
multis, tenuibus, nunquam
florem, neq; semen, neq; cau-
lem gignit, austero tota planta
sapore.

LOCVS.

Nascitur in petrosis. Itaque Diosc.
Romę nasci eum scribunt pro-
pe magnum amphitheatrum,
quibuldam in rudibus, aut
ædificiorum ruinis.

QUALITATES.

Adstrictionem simul & a-Gal. 6.
maritudinem possidet. simp. me.

VIRES.

Ex aceto pota lienem ablu-
mit.

Ss

Italis,



Italis, Sferra cavallo, ita appellatur, quod equis calceos ferreos calcata extrahat. Chymistis Lunaria minor. Quibusdam securidaca etiam nuncupatur.

SFERRA CAVALLO.

F O R M A.

Matth.

Folij exit minori Securi-
daca proximis, pusillis, cor-
disq; faciem referentibus, in-
curva secundum longitudi-
nem excurrente linea, pluri-
bus utrinq; longo pediculo
emergentibus siliquis oblon-
gis, pressis, numerosis, altera
parte sinuatis incisuris diui-
sis, foraminum rotundorum
speciem referentibus, promi-
nente utrinq; orificio. Caules
habet angulosos, striatosq; ra-
mulis numerosis repletos, se-
men è siliquis prodeit lunatum,
bicorni. Vnde apud chymi-
stas Lunaria nomen adinue-
nit.

L O C U S.

Idem.

Oritur in altis montibus.

Q U A L I T A T E S, E T
V I R E S.

Idem.

Nullum quod sciam habet
in medicina usum, quamvis
non desint herbarij, qui eam in potionibus vulnerum addant. Chymistae hac
tantum ex argento vivo argentum purum fieri fabulantur.

LVNA.




NOMINA.

643

LVNARIA minor, siue Lunaria Botrytis. Italis, *Lunaria del grappolo*. Germanis, *Monrauten*, *Menfraut*.

LVNARIA MINOR.

FORMA.



Gaule constat simplici, do- *Matth.*
drantali, rotundo, lento,
gracili, è cuius medio in la-
tus ramusculus exit coltæ ef-
figie, cui folia insunt vtrin-
que septem, aut plura, lunata, cra-
ssa, firmaque brassicæ marinæ
modo. flores profert in sum-
mitate caulis oxalidis mino-
ris modo, semine rufo, rotun-
do, in vix modum racema-
tim coherente.

LOCVS.

Nascitur in altis montibus *Idem.*
herboso loco.

QUALITATES, ET VIRE.

Vulneraria est planta, effi- *Idem.*
caxq; vulneribus recentibus
glutinandis. sanat pota intrin-
secas corporis fracturas, & ex-
trinsecas quoq; illita, quare
miris celebratur laudibus ad puerorum enterocellas. Datur vtiliter, commo-
deq; dysentericis, planta tota in puluerem contrita ex vino austero pota. Albas
vteri fluxiones supprimit, quemadmodum, & rubentes.

SS 2

*LVNA-

In Anglia quædam species
huius nostræ Lunarie inueni-
tur quæ pluribus folijs dona-
tur, & nonnunquam pluri-
bus etiam racemulis, quam
deliniri iussi, vt alijs quoque
herbarum inuestigatoribus
hæc varietas innotesceret.*



CHAMÆ-

NOMINA.

645

CHAMÆMELON, Græcis, Ἀγρίσις. Italis, Camamilla. Germanis, Camillen.
Hispanis, Manzanilla. Gallis, Camenima, & Camomille.

ANTHEMIS SIVE CHAMÆMILLA.

FORMA.



Rami sunt illi dodrantes, Diosc.
& sæpe maiores, fruticosi, alis
multis, concavi, tenuibus fo-
liolis, parvis, numerosis, ro-
tundis capitulis, floribus in
medio aureis, forissecus or-
biculato ambitu candidis, &
odoratis.

LOCVS.

Prouenit iuxta semitas in Diosc.
aruis, inter segetes & in pra-
tis.

QUALITATES.

Chamæmelum tenuitate Galen.lib.
quidem rosę persimile est, ca. 4 & 6.
lore verò ad olei facultates simp. me.
magis accedens, animalium
familiares, tum temperatas,
quapropter lassitudinibus, si
quid aliud confert, doloresq;
sedat, mitigatque. Præterea
tensa remittit, & laxat, quæq;
mediocriter dura sunt, emollit, quæque constipata rarefacit, excalfacit, & de-
siccatur ordine primo.

VIRE.

Portu, & infusione menstrua pellit, partus, vrinam, calculosq;, aduersus in-
flariones, & ilei tormina bibitur. Bilem suffusam expurgat, iocinoris vitia sanat.
Eius decocto vesicæ fouentur, & renes in calculi dolore, vrinam ciet, Agilopis
illita medetur, commanducata vlcera eruptiones in ore sanat. In summa o-
mnibus ferè humani corporis morbis medetur.

Ss 3

*CHAMÆ-

*CHAMÆMELVM Romanum flore multiplici.

FORMA.

Multo suavius, & Aromaticum quiddam olet, & tenerioribus repit cauliculis, foliolis quoq; brevioribus ornatur, & imprimis floribus comendatur adeo dense stipatis foliorum luxuria, ut nonnunquam centrum luteum protusus operiant.

LOCVS.

Instructior tantum hortis familiaris est in Germania. Sed circa Aurelias sponte nasci quidam referunt.

QUALITATES, ET
VIRE.

Præstantior est facultatibus suis quam vulgaris, Et præcipue ex huius floribus, succo & vino albo syrupus conficitur ictero splenis & hydropi utilissimus.*



ADONIS,

NOMINA.

647

ADONIS, Eranthemum quorundam. Germ. Feldtröstin/Margrethen Blümlein.

ADONIS.



Sunt qui hanc plantam, *Matth.* quam quidam Virgilij Adonidem vocant, eam Chamæmeli speciem faciant, quæ flore purpureo provenire asserit Dioscorides. Sed proculdubio falluntur, quod ipsiusmodi Anthemidis flores in medio aureo sint colore, & per ambitum, ut in Amello.

* Huius vero flosculi apices quidem luteolos habent sed raros & sæpius nigros circa capitulum fuscum & obscure virens, & folia in tubore splendentia versus medium atra, calix quinque folijs constant, quæ & ipsa rubent intrinsecus. caules tenuibus folijs vestiuntur, sylvestris nigellæ similioribus quam Chamæmeli vel Anthemidis folijs. Echinatum capitulum efficiunt semina coherentia, quæ sub finem æstatis delapsa crescunt, perficiunt autem caulem & florem sequenti æstate.

te. Herba subamara est & herbaceum quid redolet. radice nititur gracili, fibrata & lignosa.

LOCVS.

Nascitur in agris tantum, inter segetes, & à quibusdam in hortis colitur.

FACULTATES.

Eius semina ad frangendum calculum efficacissima sunt.

SS 4


*ADONIS

F O R M A.

Præcedenti in cunctis similis est, præterquam quod flores pallidos habeat, in medio tamen similiter nigricantes, aut in purpuram vergentes. gustu etiam respondet priori.

L O C U S.

Nascitur iisdem quibus prior, locis.*



PARTHE.

PARTHENIVM, Græcis, παρθένιον. Officinis, *Matricaria*. Italis, *Matricaria*, seu *Amarella*. Germanis, *Mutterkraut* / siue *Mettram*. Gallis, *Matricaire*.

PARTHENIVM.



FORMA.

Folij exit coriandri, tenui- *Diosc.*
bus, flore per ambitum albo,
intus melino, odore subuiro-
so, sapore amaro.

LOCVS.

Seritur in hortis, ac etiam *Matth.*
sponte nascitur.

QUALITATES.

Excalfacit, siccatur, aperit, *Idem.*
abstergit, prouocat, resoluit,
flatus pellit.

VIRE.

Siccatum cum aceto mul- *Diosc.*
so, aut sale potum, non secus
atq; epithymum, bilem, & pi-
tuita detrahit, suspiriosis pro-
dest, & melancholicis: herba
sine floribus pota calculosos,
& anhelatores iuuat. Valet
decoctum ad infundendum in
duritia vuluarum, & inflam-

mationibus. Illinitur sacro igni & in collectionibus cum flore. Epotus succus *Matth.*
drachmæ pondere cum saccharo ventris tineas perimit. Illitus, impetigines, al-
phos, & lentigines emaculat. Peculiariter autem auxiliatur omnibus vteri af-
fectibus, quos flatus, aut pituitosus humor excitauerit: menses ciet, & secūdas.
calefit recens super tegula: & irrorata vino ventri illinitur contra vteri dolores.

Ss 5

TANA-

TANACETVM, siue Athanasia, Italis, *Tanaceto*, siue *Daneda*. Germanis, *Hein-
faren*.

FORMA.

TANACETVM.

Matth. Foliagerit maioris millefo-
lij æmulis, aliquanto tamen
maioribus, amaro sapore, &
odore graui, caulibus bicubi-
talibus, floribus melinis, au-
reis globulis similib⁹, umbel-
latim quadantenus micanti-
bus. Radice nititur vnica com-
pluribus adnatis fibris.

LOCVS.

Idem. Prouenit in hortis, ac etiã
alibi sponte per se nascitur.

QUALITATES.

Idem. Excalfacit, exiccat, abster-
git, aperit, flatus pellit.

VIRES.

Idem. Alui, ventriculi, & vteri fla-
tus discutit. Lumbricos pel-
lit, vrinam ciert, & menses, cal-
culos eijcit, obstructions vis-
cerum aperit.



BYPHTHAL-

NOMINA.

BUPHTHALMVM, Græcis, Βύρθαλμον. Latinis, *Oculus bouis*. Italis, *Buphtalma*,
sive *Occchio di lue*. Arabibus, *Bihar*. Germa. *Kinds Aug*. Gallis, *Oiel de Benf*.

BUPHTHALMVM.



FORMA.

Caules emittit tenues, mollesque, folia fœniculi, luteum florem, anthemide maiorem, oculi similitudine, unde nomen traxit.

LOCVS.

Circa oppida nascitur, & in campestribus.

QUALITATES.

Flores anthemidis floribus simillimi sunt, sed multò illis, tum maiores, tum acriores, proinde & vehementius discutunt.

VIRE.

Flores cum cerato triti, tumores, duritiasque discutit. Aiunt epotam herbam post exitum à balneis, Regio morbo correptis colorem tractu temporis reddere.

*BUPHTHAL-

*BYPHTHALMUM flore purpurascens.

FORMA.

Hec eadem cum priore est, in eo autem differt, quod flores huius foliosa à parte externa vel in totum purpurascunt, vel saltem per medium purpurascens quiddam habent. Caulis quoque in priore plane viridis, in hoc purpureus est.

LOCVS.

Nascebatur in horto cuiusdam Iurisperiti Genevæ, translata fortè illuc ex vicinis montibus Allobrogum.*



BELLIS

BELLIS maior, Italis, *Primo fiore maggiore*, seu *Fiore di primavera*, nonnullis *Primula vera maior*. Germanis, *Gensblum*/Ruhblum, & *Johansblum*.

BELLIS MAIOR.



GENERA.

Complura Bellidis habent genera. Matth.

FORMA MAIORIS.

Folia gerit prope radicem, Matth. quercus modo serrata humi accubantia, crassiuscula, robustaq; sed quæ in caule sunt angustiora, ac longiuscula spectantur senecionis quodante nus emula, complures ab una radice emittit caules, cubitales, teretes, robustos, è quorum summiis partibus flores exeunt anthemidis, aut parthenij maiores, qui æstate ferè tota perdurant, colore intus aureo, & perambitum cædido. Radix illi est multifida, haud valde descendens.

LOCVS.

Nascitur in pascuis, pratis, Idem. secus itinera, & in agrorum marginibus.

QUALITATES, ET VIRES.

Præstant flores ad strumas & caluarię fracturas, qui etiam ad thoracis vlcera, Idem. quæ in eius cavitatem penetrarunt, in quem vsum Belli in potionib. addunt. Sunt qui omnia genera commendent ad Ischiadicos, & resolutos, commansa folia sanant cum oris, tum linguæ exulceratas pustulas. Eadem tusa genitalium inflammationes exstingunt ac etiam resoluunt. Herba ipsa recens ex oleo & acetato deuorata, alium adstrictam lenit. Id quod etiam præstat ex iure pinguium carniū decocta, & vnà cum iure sumpta.

*BELLIS

*BELLIS media, siue syluatica, seu montana.

BELLIS MEDIA.

G E N E R A.

Duo habentur genera, mas & femina forte, differunt enim colore, magnitudine & latitudine foliorum.

F O R M A.

A. Caules plures habere solet, à duobus ad octo, singulos cum singulis floribus, nisi præter naturam duo siue distincti siue in vnum confusi flores vni cauli infideant, quod non raro ei accidit, & tum caules non rotundi sed latiores sunt. Folia ei sunt oblongiora, angustiora, caules quoque longiores. In B. vero latiora sunt folia & caulis magis rubet, singularis. Fortè autem cum herba adultior est, in hac quoque specie plures sunt caules, Sapor utriusque acris, tenuium partium, ferè ut virgæ aureæ & radix ferè similiter transversa odore non ingrato.



L O C V S.

Nascitur in syluis & in Salena monte.

Q U A L I T A T E S.

Calida & sicca videtur in tertio gradu.*

BELLIS

N O M I N A.

655

BELLIS minor, Italis, *Primo fiore minore, fior di primavera.* Germanis, *Mäpfleiden.*
Gallis, *Marguerites, seu Pasquette.*

BELLIS MINOR.

F O R M A.

Folijsprouenit alterius mi *Matth.*
noribus, minimè sinuatis, hu
mi accubantibus, cauliculos
edit tenues, obsequiosos, ro
tundos, doctate minores. Ra
dicem alteri longè minorem
multifidamque.

• L O C V S.

Nascitur in pratis, & pa- *Idem.*
scuis.

Q U A L I T A T E S,
E T V I R E S.

Præstat omnia quæ maior. *Idem.*



BELLIS

BELLIS minima, Italis, *Margarite*, & *fiori di prima vera gentili*. Germanis, *Tausenfchön*.

BELLIDIS SPECIES.

G E N E R A.

Matth. Pluribus spectantur generibus, quæ florum varietate dignoscuntur.

F O R M A.

Idem. Folia tametsi in omni genere habeantur longiuscula, & crassiuscula, solo procumbentia, atq; per ambitum sensim serrata, flores tamen coloribus, & foliorum stipatu inter se variant. Siquidem in uno genere cetero tenus aurei, & per ambitum rubentes cernuntur, in altero verò ex candido rufescentes, aut versicolores. Sūt etiam qui intus rubescant, & in ambitu albicet, quin etiam in quodam genere flores habentur exilibus admodum foliolis, ipsisq; versicoloribus aded vbiq; stipati, vt sericinos floccos penè referant.



L O C V S.

Idem. Seruntur in hortis, & fistilibus ad coronamenta.

Q U A L I T A T E S E T V I R E S.

Omni generis paribus viribus pollent.

PÆONIA

NOMINA.

657

PÆONIA, Græcis, ΠΑΙΟΝΙΔΗ, seu ΠΑΙΟΝΙΑ. Arabibus, Feonia. Italis, Peonia. Germanis, Peonien. Hispanis, Rosa del monte, seu Rosa albardeira. Gallis, Pivoine, seu Pynoine.

PÆONIA MAS.



GENERA.

Duum est generum, Mas DIOSC. & Fœmina.

FORMA- RIS.

Mas folia iuglandis habet. *Idem.* Radix ei inest digitali crassitudine, & palmi longitudine, alba, gustu adstringens: Flores & fructus fœminæ similes.

LOCVS.

Prouenit in altissimis mon- *Idem.* tibis, & præruptis.

QUALITATES, ET VIRES.

Ijs tum qualitatibus, tum *Matth.* viribus præstat, quarum & fœmina, de qua statim dicitur.

T t PÆONIA

PÆONIA fœmina, Græcis, Γλυκυσίδη, siue Παιονία ὀηλεία. Italis, Peonia fœmina.

PÆONIA FŒMINA.

FORMA.

DIOSC. Folia Smyrnij more diuidentur. flores mittit summo caule grandes, è quibus siliquæ oriuntur amygdalis similes, in quibus cum dehiscent multa grana exigua, rubra, acinis puniceorū similia, inueniuntur. Radices habet ceu glandes circiter septem, aut octo, vñ in haustula regia.

LOCVS.

Idem. Nascitur in altis montibus, saxosis, & præruptis locis.

QUALITATES.

Gal. 6. Radicem habet leuiter adstringentem, quadā cum dulcedine, & si plusculum denribus mandas, acrimoniam item quampiam subamaram subesse percipies. Expurgat porro etiam iecur obstructū, & renes, præsertim quæ acris & subamara est. Est autem facultate omnino resiccatoria vehementer, haud tamen insigniter calida, sed aut ad symmetrum, aut paulò calidius temperamentum attingens est.

VIRE.

DIOSC. Sicca radix fœminis, à partu non purgatis datur, ciet menses, amygdalæ magnitudine pota, ventris doloribus cum vino hausta auxiliatur, valet contra regium morbum, & renum, & vesicæ dolores, decocta in vino aluum sistit. Rubra grana, rubentes menses sistunt decem, aut duodecim pota ex vino austero, stomachicis, & erosionibus ea esse prodest. à pueris pota initia calculorum eximunt, grana nigra auxiliantur nocturnis suppressionibus, Vulvæ strangulationibus, atq; doloribus. xv. numero pota in aqua mulsa, aut vino. Præstat collo suspensa Radix comitialibus pueris, & pota capitis affectibus auxiliatur, & idem facit semen.

LITHO-



LITHOSPERMUM minus, Officinis, *Milium folis*. Græcis, Λιθόσπερμον μικρόν.
 Italis, *Lithosperma minore*, Miglio saluatico, seu *Milium folis*. Germanis, Klein
 Meerhirse / seu Steinsamen.

LITHOSPERMUM MINVS.

F O R M A.



Planta est fruticosa, cauli- *Matth.*
 bus pluribus referta, sesqui
 pedalibus, lignosis, firmis, in
 quibus folia insunt oleæ mi-
 nora, & semen circa folio-
 rum exortum, album, milij
 simillimum, pellucidumq;
 sed lapidea ferè duritie. Ra-
 dices habet tenues, nume-
 rosasque.

L O C V S.

Nascitur arido, & sabulo- *Idem.*
 solo.

Q U A L I T A T E S,
E T V I R E S.

Semen cum vino albo. *Diosc.*
 tum, calculos frangit & vri-
 nam pellit. Semen datur v. *Matth.*
 tiliter potandum diebus plu-
 ribus sesquidrachmæ pon-
 dere addita Asplenij semi-
 drachma, & succini scrupu-
 lis duobus ex succo plantaginis aut portulacæ aut lactucæ ad gonorrhæam co-
 hibendam. peculiariter autem iuuat fœminas agrè parturientes, si seminis
 drachmæ duæ in puluerem contriti ex humano lacte propinentur.

T t 2

* L I T H O -

* LITHOSPERMON sylvestre, aruense, vel nigrum, Græcis, λιθόσπερμον
ἀγρίον. Germanis, Wilder Meerhirsen.


LITHOSPERMON SYL-
VESTRE.

F O R M A.

Herba hæc excedit cubi-
tum altitudine, folia habet
quodammodo similia folijs
Milij solis, minora, non ita
quidem dura sed aspera, ni-
gricantia, per ramos sparsa,
quæ quo magis ad superiora
tendunt minora fiunt. In mul-
tos diuiditur ramos tenues a-
spersos, in quibus sunt flores
albi, parui, similes floribus
milij solis, ordine per ramos
ascendentes, & ad vnum quæ-
que sunt folia, ijs succedunt
semina nigra, terna vel qua-
terna simul, similia seminibus
Echiorum, Buglossæ vulgaris
vel Borruginis, stipata par-
uis foliolis vt in Borragine, ra-
dice nititur succi plena, an-
nua tamen, superiore parte
subrubente.

L O C V S.

Nascitur in segetibus & in-
ter olera.*



PHALARIS,

NOMINA.
PHALARIS, Græcis, Φάλαρις. Italis, Falari.

661

PHALARIS.

FORMA.



Cauliculos emittit zeæ diosc.
mis similes, à minutis, ac nul-
lius vltus radicibus: multis, du-
um palmorum, geniculatos,
graciliores, validiores, ac dul-
ces, semen candidum, in spi-
catis capitulis, oblongum, mi-
lij magnitudine.

LOCVS.

Seritur in Italia, spectaculi Matth.
gratia.

QUALITATES,
ET VIRES.

Tunditur, & in aqua, aut
vino succus, & ad vesicæ cru-
ciatus vtilissimè bibitur: Se-
men cochlearis mensura po-
tum ad eadem efficax est.

Tt ; RVBIA

R V B I A sativa, siue Domestica, Græcis, Ερυθρόδακτυλον. Arabibus, *Paue*, seu *Fue*, *Alfabagin*. Italis, *Robbia*. Germanis, *Serbertrot*. Hispanis, *Ruui*. Gallis, *Garence*.

R V B I A S A T I V A.

G E N E R A.

DIOSC. Duo eius sunt genera, una sponte prouenit, altera seritur.

F O R M A S A T I V A E.


Idem. Caules illi sunt asperi, & quadranguli, longi, apertina non dissimiles, robustiores, & multo prorsus maiores, folijs per interualla circum articulos stellatim decussatis. semen rotundum, inter initia viride, mox rubrum, postea cum maturuerit nigrum. Radix tenuis, longa, rubra.

L O C V S.

Matth. Seritur quibusdam in locis in campis. in Ethruria tamen domestica etiam sponte nascitur secus itinera, sepes, & frutera.

Q U A L I T A T E S.

Gal. li. 6. Radix acerba gustu est, & *simp. me.* amara. Itaque lecur, & lienem expurgat, vrinam trahit crassam, & sanguinolentam, & menses, ac mediocriter abstergit.



V I R E S.

DIOSC. Radix vrinam ciet, qua de causa regio morbo opitulatur, ex aqua multa pota. Item Ischiadicis, & resolutis, crassam, copiosamq; vrinam pellit, nonnunquam & sanguinem. bibentes tamen quotidie lauare oportet, & excrementorum quæ redduntur differentiam spectare. Ramuli cum folijs ex vino poti, præstant aduersus serpentium morsus, semen ex aceto potum lienem absumit. Imposita radix trahit menses, & secundas. Illita ex aceto alba vitiligni medetur.

R V B I A

fen Ene,
Gallis.

NOMINA.

663

RUBIA sylvestris, Græcis, Ερυθρόδαρον ἄγριον. Italis, Robbia saluatica. Germanis, Wilder Röt.

RUBIA SYLVESTRIS.

FORMA.

Caules, & folia minora Matth.
longè spectantur quàm domesticæ, & minus quoque aspera. Radix etiam illi est non adeo rufa, multifida, tenuisque.

LOCVS.

Prouenit sylvestris locis, Idem.
secus itinera, in frutetis & propter sepes.

Eius vires longè imbecil- Idem.
liores sunt quàm domesticæ.



Tt 4

LONCHI.

LONCHITIS aspera, Græcis, Λογχίτις τραχήλια. Italis, *Lonchite aspera*. Germanis, *Spicant*.

LONCHITIS ASPERA
MAIOR.

GENERA.

Matth. Duo eius reperiuntur genera, Maius, & minus, quamvis Dioscorides vnus tantum meminerit.

FORMA.

Matth. Folijs est Scolopendrij proximis, longioribus tamen, ac magis diuisis, & ad polypodij faciem potius accedentibus, spitamæ longitudine, vtrunque disparibus incisuris dissectis, tenuibus, aculeatisq; denticulis circumferratis, ac vbique asperis, vnde illi nomen. caulem non profert, nec flores, neq; semen, perinde ac polypodium, & asplenium, quorum imaginem refert. Radice nititur multifida tenui Phyllitis modo.



LOCVS.

Idem. Nascitur in vmbrosis, opacis, & humectis locis.

QUALITATES.

Gale. 7. Folia ad glutinanda vulnera vtilia sunt, cum sunt adhuc viridia, sicca tamen *simp. me.* ex aceto potalienes induratos sanant.

VIRES.

DIOSC. Vulneribus mirum in modum prodest, in eisque inflammationes excitari non patitur, ex aceto potalieniem abluunt.

LONCHI-

N O M I N A.

665

Lonchitis aspera minor. Italis, *Lonchite aspra minore.*

LONCHITIS ASPERA MINOR.

F O R M A.

Mitiora, tenuiora, angustioraq; folia promit, & magis Polypodio similia, hirsuta, & aspera.

L O C U S.

Nascitur in opacis, & frutetis, vliginoso solo.

Q U A L I T A T E S,

E T V I R E S.

Herba est, & ipsa vulneribus glutinandis, lienibusque absumentis idonea, perinde ac altera.



T c s

*LONCHI-

* LONCHITIS ASPERA
MARANTHÆ.

Folia promit à radice nigra cirroſaſque, ſimilia ſcolopendrio, ſed magis diuiſa & minora, pediculis nixa rubentibus vt Trichomanes, attingit nonnunquam dodrantis altitudinem, ſed plerunq; infra ſubſiſtit. Nascitur locis æditis & ſaxoſis, vel in nemoribus aſpero ſolo.*



ALTHEA,

NOMINA.

667

ALTHEA, Græcis, Ἀλθαία, & ἑβραϊκῶς. Italis, Maluauschio. Mauritanis, Chirini, Chatini, siue Chatmia, siue Rosa Xaeni. Germ. Ybisch / & Heylswurk. Hisp. Hierua Cannamera, siue Marmaie. Gallis, Guymaue.

ALTHEA.

FORMA.



Althea, quam alij Ibisum Diosc. vocât, in maluarû syluestrium genere est, cui folia vt Cyclamino rotunda sunt, lanugine canescunt, flore rosaceo, caule bicubitali, tricubitalive. Radice lenta, intus alba.

LOCVS.

Nascitur in campestribus, Matth. humeâo solo.

QUALITATES.

Facultatē habet digerendi, Galen. 6. laxandi, phlegmone leuandi, simp. me. mitigandi, concoquendi. Radix porro eius, & semē cetera quidē similiter agunt, vt herba viridis, sed tenuiarum partium, magisq; exiccatoria. ad hæc magis absterforiam quā illa facultatem ostendunt.

VIRES.

In vino aut aqua mulsa decocta, & per se cū imponitur tusa efficax est cōtra vulnera. Prestat itē ad strumas, parotidas, abscessus, mammarū inflammationes. Siquidē discutit, excoquit, rūpit, & ad cicatricem perducit.

Cocta (vt dictum est) suillo aut anserino adipe adiecto terebinthina vç, vt malagmatis lentor fiat, facit ad vuluæ inflammationes, præclusio- nesq; in pëssis subdita. Decoctum eodem fungitur munere, onera vuluæ reli- quaq; à partu extrahit. Decoctæ radices succus ex vino potus succurrit vrinæ difficultati, calculosorū cruditatibus, dysentericis, ischiadicis, tremulisq; Den- tium dolorem mulcet cum aceto decocta, colluto inde ore. Viride semen, sic- cumq; tritum vitilignes, sub Sole perunctum emendat. Eodem cum oleo, & aceto peruncti à venenatis non feriuntur. Valent contra dysenteriam, sangui- nis reiectiones, alniq; profluuium. Bibitur in posca, aut vino contra omnes vesparum, apum, similitumq; aculeatorum ictus.

ALTHEA

ALTHEA altera, quibusdam Abutilon vocatur. Italis, *Maluanisibio bastardo*.

ALTHEA ALTERA, SIVE
ABUTILON.

FORMA.

Matth. Folia habet cucurbitæ, minora, tactu lævia, sed tenuissima obducta lanugine. caulem edit sesquicubitalem, & aliquando maiorem. flores in toto caule aureos, è quibus semen oritur nigrum. Radice nititur longa fibrosaq;

LOCVS.

Idem. Nascitur in campestribus, ac etiam sponte in hortis.

QUALITATES,
ET VIRES.

Idem. Semen epotū sesquidrachmæ pondere ex vino, calculos, & arenam pellit, vrinam ciet, & eius cruciatus mitigat.



ALCEA,

ALCÆA, Græcis, ἀλκαῖα. Barbaris, *Bimalua*. Italis, *Maluanisco saluatico*. Germanis, *Sigmarskraut*. Hispanis, *Malua montesina*. Gallis, *Bimaue*, vel *Guimauve sauuaige*.

ALCÆA.



FORMA.

Herba est caule, floribus, *Matth.* & semine sylvestri malvæ per quàm similis, sed folijs euidē-
tioribus, incisuris laciniatis, ranunculi modo. caules edit-
tres, aut quatuor, canna bino cortice vestitos. flores malvæ,
rum facie, tum colore simi-
les, pauloq; maiores, quem-
admodum & semē. Radicem
lōgam, latam, albam, ac mul-
titudinē malvæ similem, sed
lignosa intus matrice.

LOCVS.

Nascitur in incultis, cam- *Idem.*
pestribus, & agrorum, sero-
biumq; marginibus, iuxta se-
pes, vias, ac semitas.

QUALITATES,
ET VIRES.

Alcea sylvestris malvæ ge- *Galen.*
nus est, in vino pota dysenteriae, & erosionibus medetur, & potissimum eius *Diosc.*
radix.

CANNA-

CANNABIS, Græcis, *Kávvaβir*. Arab. *Scebedenegi*, & *Canab*. Italis, *Cannape*. German. *Zamer Hanff*. Hispan. *Canambo*. Gallis, *Chanure*.


G E N E R A.

C A N N A B I S.

DIOSC. Tria Cannabis numeratur
Matth. genera, Mas, Fœmina, & Syl-
vestris.

F O R M A.

Matth. Mas plures è caule fundit
ramos, arbusculæ speciem re-
ferens. adeo ut ex eius stipite
carbones fiant ad bombardarum
pulverem parandum. Fœ-
mina caules edit longè tenuio-
res, nullis ramis brachiatos,
nulloq; semine proliferat. Fo-
lia utriusq; fraxini, sed mino-
ra, & graciliora, sensimq; ser-
rata, quæ quidè in mari maio-
ra, nigrioraq; spectantur, qui-
na senave ex vno pediculo p-
deuntia. Radice nititur mul-
tifida, fibrosaq;. Semen tan-
tum in mari gignitur rotun-
dum, cinereo colore, cuius me-
dulla dulcis est, & alba. Syl-
vestris virgas fert altheæ similes,
minores, nigriores, & asperio-
res, cubitalesq; folijs satiæ
nigrioribus, & asperioribus,
flore Lychnidis, subrubro, se-
mine & radice altheæ.



Q U A L I T A T E S.

Galen. 7. Semen flatus discurtit, adeoque desiccatur, ut si plusculum edatur, genituram exiccat. Mul-
simp. me. tum quoque calcfacit. Ideoque sumptum paulò largius, caput ferit, vaporem sursum ad ipsum
Et li. 1. de mittens, calidum simul, ac medicamentosum.

V I R E S.

DIOSC. Semen adgeratur ijs, qui procreandæ soboli dant operam: namq; longiore cibo sumptum,
genituram extinguit. foliorum recentium succus convenienter aurium doloribus instilla-
tur. Sylvestris radix decocta, & illita inflammationes mulcet, tumores discurtit, & tofos arti-
Matth. culorum. Succus satiæ instillatur auribus utiliter ad vermes necandos: quin etiam in-
cectum infusum eiecit. Equorum quoque tineas, quæ intro sedem hærent, succus, aut de-
coctum infusum eiecit. Radix recens illinitur utiliter amibustis, sed sæpius amouenda, & ite-
rum admouenda recens, ne exiccetur.

ANACY-

ANAGYRIS, Græcis, ἀνάγρις. Italis, Anagiri, & fauainuersa. Germ. Stinctbaum.

ANAGYRIS.



GENERA.

Duum est generum, Ma- Matth.
ius, & Minus.

FORMA MAIORIS.

Frutex est arboris instar, per DIOSC.
quàm graui odore, folijs viti-
cis, virgisque, flore brassica, ra-
cemoso, semen in corniculis
non breuibus gignit, subro-
tundum, firmum, versicolori
facie, simile renibus, quod du-
rescit vix maturescence. VI- Matth.
que adeo duro, vt aqua mace-
rato, in sua tamen pertinaci
duritie consistat.

QUALITATES.

Frutex est grauiter olens, Galen. 6.
& acris, digerentis exalfaci- simp. me.
tisque facultatis, virentia fo-
lia propter humiditatis admi-
stionem, minus sunt acria, sic-
ca verò incidentis. & siccan-
tis sunt facultatis. similem
quoque facultatem habet ra-
dicis cortex.

VIRES.

Tenera folia trita tumores illita reprimunt. Si partus hæreat, si secundæ, DIOSC.
mensisq; moventur, bibuntur drachma pōdere in passo. Sic & suspiriosis dan-
tur, & contra capitis dolores in vino. difficulter parientibus adalligantur, ita
vt à partu statim auferantur. Radicis cortex concoquendis, discutiendisq; ad-
hibetur. Semen commanducatum vomitiones vehementer ciēt.

ANAGY-

ANAGYRIS altera, siue minor, Græcis, ἀνάγυρις ἑρφέα. Italis, Angiri minore.
Ananienſibus, in agro Tridentino, Eghelo.

ANAGYRIS ALTERA.

FORMA.

Matth.

Folia prodeunt ex vno pediculo terna, oblonga, in acumine mucronata, viridia, læuiusque, trifolij latiora. aureis micat floribus, vt in altero racematim dependētibus, odore tamen ingrato. Hinc cornicula prodeunt Genistæ æmula, in quibus semen continetur eiusdem genistæ magnitudine, sed oblongū, phaselii modo, colore subnigro. Materies ligni durissima, quæ Guaiaci modo exterius lutea est, medullitus verò nigra. In corrupta diu durat, proinde rura palos ad vites sustinēdas ex ea parant. Quin etiam sagittarij validissimos cōficiunt arcus.

LOCVS.

Idem.

Oritur in syluis montium, & copiosum habetur in Ananienſis vallis syluis.

QUALITATES,
ET VIRES.

Idem.

Omnia potest, ac præstat, quæ maius præstare diximus. * Odore dicitur occidere mures: Plantæ cinis ad calculum commendatur. *

APPENDIX.

* Qui putant Anagyrim alteram esse Laburnum (mea quidem sententia) non aberrant, Et fide digni rei; herbariæ peritissimi viri se in monte Iura cubito longiores racemos floribus inuenisse referunt. *

C E P H A,



NOMINA.

673

CEPÆA, Græcis, Κηραία. Italis, Cepera.

CEPÆA.

FORMA.

Cepæa portulacæ similis DIO SC.
est, sed nigriora habet folia,
& radicem tenuem.

LOCVS.

Nascitur in incultis locis. *Matth.*

QUALITATES,
ET VIRES.

Folia in vino pota, vrinæ DIO SC.
stillicidio, & vesicæ scabie la-
borantibus opitulatur. maxi-
mè id præstat, si cum decocto
radicum asparagi, quem mya-
canthon, hoc est, corrudam
vocant, bibatur.

Vu ALISMA,



ALISMA, seu Damasonium, Græcis, ἀλίσμα. Italis, *Alisma*. German. Engel-
tranch/ & Mutterwurk.

A L I S M A.

F O R M A.

DIOCS. Folia insunt ei plantaginis,
sed angustiora, conuexaq; in
terram, caule simplici, tenui,
cubito altiore, capitib. thyrsi,
flore tenui, candido, pallefcē-
te, radicibus tenuibus, vt ve-
ratri nigri, acribus, odoratis,
modicè pinguibus.

L O C V S.

Idem. Aquosos amat tractus.

Q U A L I T A T E S.

Galen. 6. Absterforiæ est facultatis.
simp. me.

V I R E S.

DIOCS. Radicis drachma vna, aut
altera pota his conuenit, qui
leporem marinū, aut opium
hauserunt, aut à rubetis de-
morsi sunt. Datur dysenteri-
cis per se, aut cum dauci semine. conuulsis, & contra vitia vuluæ prodest. Her-
ba sistit aluum, menstrua pellit, tumores illi mitiga.

A P P E N D I X.

* Quam pinxit autor hoc in loco pro Alismate, non candidum, sed aureum
gerit florem in hirsuto subrubenteq; cauliculo, pedali, odore sternutamen-
ta cientem, qui tandem in pappos abit.*

HYPS.



HYPERICVM, Græcis, *ἵππερος*. Mauritanijs, *Reiofricon*, seu *Reiofricon*. Italis, *Hiperico*, *Perforata*, seu *Herba di S. Giouanni*. Germanis, *Sanct Johannekraut*. Hisp. *Coraioncillo*. Gallis, *Millepertuis*, siue *Trucheran*.

H Y P E R I C V M.

F O R M A.

Frutice est lusculaceo, do- DIOSC.
drantali, rubescente, folioru Matth.
ta, punctim perforato, flore
luteo, leucoio simili, qui digi-
tis attritus sanguineū succum
remitit, subhirsuta siliqua,
& in rotūdo oblonga hordei
magnitudine, semine intus
nigro, resinosi odoris.

L O C V S.

Gignitur in cultis locis, & Idem.
asperis. DIOSC.

Q U A L I T A T E S.

Calefacit, & desiccāt, te- Gallib. s.
nuisq; substantiæ est, aded vt, simp. me.
& mēles, & vrinas prouocet.
Aperit, resoluit, agglutinat,
atque etiam cohibet.

V I R E S.

Vcinam eit, Menstrua pel- DIOSC.
It appositū Tertianis, Quir-
t nique libet at Semen qua-
de ginta dieb. haustum litchia
die s medetur. Folia cum se-
mine illita, ambusta sanant.

Semen ex vino potum calculos eiicit. & venenis aduersatur. Quin etiam vene- Matth.
nosorum moribus resistit, et in idem potum, cum herba ipsa deuorata, hausta-
ve, tum vulnere illita. Aqua stillactia florentis herbe bibitur vtiliter comitia-
libis, & resolutis. Datur seminis farina commodè ex polygoni succo sangui-
nem expuentibus. Idem aluum exonerat. Inest floribus, ac semini mira facul-
tas ad vulnera recentia sananda, præter ea quæ capiti infliguntur.

Vu 2 Ascr-



ASCYRVUM, Græcis, ἄσχυρον. Italis, *Asiuro*. Germanis, *Hartheu*.

ASCYRVUM.

FORMA.

DIOSC. Hyperici genus est, magnitudine distans, fruticosius, maiores habens ramos, surculosiores, rubentesque, folia tenuia, flores luteos, & fructum resinofum, hyperico non abfimilem, cuius attritu digiti ferè creuantantur.

LOCVS.


Matth. Nascitur in cultis, & quandoque in vliginosis locis.

QUALITATES.

Galen. 6. Semen purgatorium est, simp. me. foliorum verò facultas modicè extergens, & desiccans, vt & ambusta sanare credantur. Cæterum in vino austero decocta vinum ipsum magnorū vulnerum glutinatorium efficiunt.

VIRES.

DIOSC. Vfus seminis ad Ischiadicōs valet, potum in hydro-melitis sextario. nam biliosa recrementa detrahit, sed assidue dare oportet, donec sanitati restituantur, illiniuntur & ambustis efficaciter.



ANDRO-

NOMINA.
ANDROSÆMVM, Græcis, Ανδρόσαυμον. Italis, Androsæmo.

677

ANDROSÆMVM.



FORMA.

Androsæmum ab hyperico, & ascyro differt, quod fruticet, ramulis furculosis, ac tenuibus, rubentibus virgis, folijs rutæ, triplo, quadruplove maioribus, quæ trita vinoso succo manant. complures in cacumine alas habet, vtrinque expâsas pinnatasque, circa quas flores pusilli, lutei, & in calyculis semen papaveris nigri.

LOCVS.

Prouenit in montosis, & Matth. collibus.

QUALITATES.

Semen aluum purgat, at- Galen. & qui folia extergunt, & defici- simp. me. cant.

VIREs.

Semē tritum duarū drachmarum pondere potum biosa alui excrementa pellit. Diosc.

Mchiadicijs maximè medetur, sed à purgatione aquam exorbere oportet. Herba ambustis illita medetur, & sanguinem cohibet.

Vu 3 CORIS,

CORIS, Græcis, *Kôgis*. Italis, *Cori*. Germanis, *Wanzenkraut*.

C O R I S.

F O R M A.

DIOSC. Frutex est folio *Ericæ*, rubro, pinguiore, ac minore, nō altior dodrante, suavis, odoratus, acris. Flores habet hyperici æmulos, luteo colore, sed minores.

Matth.

L O C V S.

Idem. Nascitur arido solo in collibus, atque montibus.

Q U A L I T A T E S.

Idem. Aperit, excalfacit, extenuat, digerit, expurgat.

V I R E S.

DIOSC. Potum semen menses trahit, & vrinas. Contra Phalangiorum morsus, Ischiadicos, & opisthotonicos ex vino pota auxilio est. horribus ex pipere, sed opisthotonicis ex oleo aptissime illinitur.



AIVGA,

AIUGA, siue Camæpitys. Græcis, χαμαίπυτος. Mauritanis, Hamefitheos, seu Camisibius. Italis, Camepitio, & Iua. Germanis, Zesenger jester. Hispanis, Pmillo, & Iua arctica. Gallis, Tue muscate, siue arctique.

CAMÆPITYS.

GENERA.

Trium est generum.

FORMA PRIMI.

Prima herba est in terra re-
diosc.
pens, subcurua, folijs mino-
ris sedi multo tenuiorib⁹, cir-
cum ramos, frequentibus, o-
dore pinus. Flore tenui, luteo
vel candido. Radicibus cico-
rij. Alterum exit cubitalibus
ramulis in anchora: speciem
incuruatis, præternubus, co-
ma supradicta, flore candido.
Semine nigro, ac etiã pinum
redolet. Tertia Mas nomina-
tur paruula, folijs exilibus, al-
bis, scabris, caule aspero, can-
dido, luteis flosculis, semine
iuxta alas; respicit & hæc pi-
num.

LOCVS.

Nascuntur in campys tum *Matth.*
cultis, tum etiam incultis, &
præsertim exoluro solo.

QUALITATES.

Camæpitys gustu quidem
amarum saporem, acri validio-
rem obtinet. Effectu verò ex-

purgat, abstergitque viscera, plusquam calefacit. Est enim in desiccando ordi-
nis tertij, in calefaciendo verò secundi.

VIRES.

Primi generis Aiuga septem diebus in vino pura regio morbo medetur, & *Galen. 8.*
quadraginta diebus ex oxymelite Ischiadicos sanat. Datur peculiariter vrinae *simp. me.*
difficultatib. Prodest, & renū vitij, & torminosi. Bibitur cōuenienter foliorū
decoctum contra aconitū. Trita in farina, & cum fico in pilulis sumpta aluum
emollit. apposita ex melle vuluæ vitia extrahit, mammarum duritias discutit.
Vulnera glutinat, & vlcera, quæ serpunt ex melle illita cohibet. Vrinam ciet.


Vu 4 CHAMÆ-

CHAMÆPITYS alia, quam nonnulli ad Anthyllidem referunt.

* Folia profert oblōga hirsuta in tres partes diuisa, cauliculus dodrante altiore striatum, in cuius summitate flores purpureos quinis folijs constantes vt buglossi flores sed oblongioribus, habentes in medio stamina praelonga, Lignosa radice sustentatur, & transuersa, superiore parte in ramos diuaticata, quibus se propagat, tota planta odorata est & nonnihil amara.

LOCVS.

Prouenit in montibus prope Castelnou, locis valde petrosis.*



Libri Tertij Finis.

BETO-

BETONICA, Græcis, Κέσπον, & λυγέτροπον. Arabibus, *Chastra*. Italis, *Betonica*, seu *Brettonica*. Germanis, *Betonien*. Hispanis, *Brettonica*. Gallis, *Betonie*, seu *Botoine*.

BETONICA.



FORMA.

Caulē fert tenuem, cubiti ^{DIOSC.} altitudine, aut maiorem, quadratum, folia quercus, mollia, longa, in ambitu diuisa, odorata, propē radicē maiora. Flo. ^{Matth.} rē in summis caulibus fert spicatum, & rubrum. Radicē fibrosam, & vt veratri tenuem.

LOCVS.

Nascitur in pratis, & montibus, & in pascuis. ^{Idem.}

QUALITATES.

Vim habet incidendi: ipsa ^{Gal. 7.} enim herba amarior est, & ^{sub-simp. me.} acris, id quod & particulaum edicta actio ostendit.

VIRES.

Radix ex aqua mulsā pota, ^{DIOSC.} pituitā vomitione euocat. Folia dari debent mulieribus vuluæ malo opportunis, & ad arcēdos eiusdē strangulatus, ex eadē mulsā denarij pondere: tres eorundem drachmę bibuntur ex vini sextario cōtra scorpionum morsus, quibus & herba illita medetur: eiusdē drachma bibitur vtiliter cū vino ad ebibita venena: quin etiam præsumpta eorundē vires abolet: vrinam ciet, aluum

subducit: ex aqua pota medetur comitialibus, & insaniis, & iocinoris, lienisq; vitijs ex oxymelite: propinatur acida ructantibus, stomachicis quoq; prode- nit, si mansæ succum deglutuerint, & deinde dilutum vinum hauserint: valet sanguinem reijicientibus ex vino diluto sumpta: datur vtiliter ischiadicis, & in renum, & vesicę doloribus. regio morbo laborantes recreat, mentes pellit, drachmę pondere cum vino pota: aluum purgant quatuor drachmę cum oxymelitis decem cyathis. Consistentes in renibus calculos frangit, & pulmonem, ^{Matth.} iecur, & thoracem expurgat.

V u s

SERRA-

SERRATVLA, Italis, *Serratola*. Germanis, *Echartenfraut* / *Berberſcharten*.

SERRATVLA.

FORMA.


Matth. Caule conſtat purpureſcente, tenui, ramoſoque: folia gerit antea quàm cauleſcat betonica cognata, toto ambitu tenuiter ſerrata, ſed ubi adoleuerit faciem mutant, nam exortis profundioribus incifuris, maioris pluſquam dantenus ſimilia ſpectantur. Flores edit in ſummis ramuſculis purpureos, & radicem multifidam.

LOCVS.

Idem. Naſcitur ſyluoſis locis.

QUALITATES,
ET VIRES.

Idem. Datur vtiliter potanda ex albo meraco ruptis, & ab alto deuolutis: in vino decocta, ac deinde illita, vlcera mirificè mundat, carne replet, & cicatrice obducit: hæmorrhoidum quoq; dolores mulcet foru adhibita: ſiſia, & radix ſimul contuſa & impoſita, enterocellæ ſanare creduntur.



BISTOR-

BISTORTA, seu Colubrina, Italis, *Bisforta*. Germanis, *Matterburg*.

B I S T O R T A.

F O R M A.

Folijs erumpit primo statim exortu in acutum desinētibus colore subrufo, quæ ubi adoleuerint, rumicis folia referunt, læuia tamē sunt, & inferna parte subpurpurea & per ambitum sinuata: caulem edit rotundum, tennem, cubitalē, in quo folia longē minora spectantur: flos in caulis summitate prodit spicatus, ruber, siue subpurpureus, ē quo semen gignitur oxalidis proximū: radice nititur quadratenus arundinacea, sed succosa, & serpentis modo cōtorta. cortice exterius subnigro, sed rubra intus carne, adstringentis gustus.

L O C V S.

Oritur in altis montibus, & *Idem* pascuis.

Q U A L I T A T E S,
E T V I R E S.

Refrigerat, exiccat, cohibet, roborat. Bibita radix abortum reprimat: ventri, pubi,

renibūsq; ex aceto illita vrinæ incontinentiam supprimit. cum succo plantaginis pota, sanguinem ē vulnere manantē cohibet, superasperso tamen eiusdem puluere. Idem ex puticorum malorū vino potus, biliosas vomitiones supprimit. præstat potus contra latalia venena, aduersus pestilentiam, & pestilentes febres, in quibus exanthematum notæ emergunt. valet ad puerorum vermes. necandos, tum idem radicū puluis, tum earum decoctum potum: Eadem radix cohibet tum ceteras alui fluxiones, tum dysenteriam. additur commodē in potionibus, quæ ad intrinseca parantur vulnera. datur trita ad cruenta expuentibus. cavis dentium indita, cum aluminis & pyrethri momento, non modo dolorem mulcet, sed fluxiones eo decurrentes sistit. valet item ad omnes venenosorum serpentium ictus, ex vino sumpta.

* B I S T O R T A.



* B I S T O R T A minor seu Alpina.

F O R M A.

Similis est priori, sed multo minor, folia in marginibus pulcre distincta punctulis quibusdam & veluti serrata apparent.

L O C U S.

Crescit in alpidibus & in monte Iura quoque copiose provenit.*



TORMEN-

TORMENTILLA, Italis, *Tormentilla*. Græcis, Επιδράλλον. Germanis, *Tormentill*. Gallis, *Tormentille*.

TORMENTILLA.



FORMA.

Folia promit pentaphylli *Matth.* minora, septenis incisuris diuisa, radicem breuem, nodosam, compactam, rubro intus colore, sapore adstringenti: cauliculos tenues, subrubentes: flores melinos pentaphylli æmulos.

LOCVS.

Nascitur in montibus. *Idem.*

QUALITATES,
ET VIRES.

Viribus omnibus insigni- *Idem.* tur, quibus Bistorta prædita est.

* APPENDIX.

Magna varietas in radice deprehenditur, minima omnium vulgaris est, quæ passim, etiam in planitie reperitur, ea in

hortum translata tuberculum pusillum genuit, quasi nouellam radiculam, ut liquet ex imagine, qua exhibemus etiam illam montanæ quæ non tantum brevis & nodosa sed nonnunquam etiam prælonga, brachiataque inuenitur.*

LYSIMA-

LYSIMACHIA, Græcis, Λυσιμάχιον. Italis, *Lisimachia*. Germanis, Gelb Weiderich.

LYSIMACHIA.

FORMA.

DIOSC. Caules emittit cubitales, altioresve, hirsutos, tenues, prodeuntibus geniculatim folijs, tenuibus, falcis figura, gustu adstringentibus. flore rufo, aut aureo.

LOCVS.

Idem. Gignitur in aquosis.

QUALITATES.

Gale. 7. Superantem habet qualitatem adstrictoriâ, per quam vulnera glatinat.
simp. me.

VIRES.

DIOSC. Foliorum succus, sanguinis reiectiones supprimit, dysentericis auxiliatur, cum potus, tum quoq; infusus. mensium abundantiam sistit in pello: vulnerum cruorem cohibet: acerrimum nidorem suffita redolet. qua de causa serpentes fugat, & muscas interficit. Vis eius tanta est, ut iumentis discordantibus iugo imposita eorum asperitatem cohibeat.



LYSIMA-

N O M I N A.

687

LYSIMACHIA altera, Italis, *Lisimachia secunda*. Germanis, Braun Weiderich.

LYSIMACHIA ALTERA.

F O R M A.

Caule prouenit recto, qua- *Matth-*
drangulari, bicubitalique, fo-
lijs falcis, flore spicato rufe-
scente.

L O C V S.

Nascitur prope fluentes a- *Idem.*
quarum riuos, & vlginis
locis.

Q U A L I T A T E S,
E T V I R E S.

Adstringit, refrigerat, co- *Idem.*
hibet, & omnia potest qua &
altera.



P O L Y G O -

POLYGONVM, Græcis, Πολύγωνον. Aphris, *Bastiragi*. Italis *Polygono*, seu *Correggiola*. Germanis, *Beggras*. Hispanis, *Corriola*. Gallis, *Corregiole*.

POLYGONVM MAS.

G E N E R A.

Matth. Trium est generum. Mas, Fœmina, Minus.

F O R M A M A R I S.

Diosc. Caules mittit teneros obsequiosos, rotundos, geniculatos, humi graminis modo repentes: folia oblonga, ligularum modo. semine sub folijs turgescente: Flos verò ei candidus, & exiguus.

L O C V S.

Idem. In campis, ædificiorum aereis, hortis, publicis vijs, ac ferè vbique crescit.


Q U A L I T A T E S.

Gal. 8. Polygonum vti adstrictionem quandam obtinet, ita sanè vincit in eo aqueum frigidum, vt videlicet secundi sit ordinis refrigerantium, aut etiam quodammodo in initio tertij: Est & exiccatorium: Est quoq; inas ad omnia validior, quam fœmina.

V I R E S.

Diosc. Succus epotus spissat, ac refrigerat. Prodest cruenta excreantibus, cholera, alui fluxionibus, & vrinæ stillicidio. Auxiliatur ex vino potus, serpentium moribus. Fœminarum profluuium in potu sistit. Instillatur vtiliter purulentis, dolorosisq; auribus. Ex vino, & melle decoctus, facit eximie ad pudendorum vlcera, illita folia stomachi feruores extinguunt, sanguinis reiectiones sistunt, & vlcera serpentia, sacros ignes: collectiones, tumores, & recentia vulnera sanant.

POLYGO-



NOMINA.

689

POLYGONVM fœmina, Græcis, Πολύγωνον θήλη. Italis, Poligono, & Correggiola
femina. Germanis, Ranten Kraut. Gallis, Pim aquatic.

POLYGONVM FOEMINA.

FORMA.

Vno tantum caule fruticat, Diosc.
arundini teneræ simili, densis
geniculis, & in se tubarum
modo factis: articulos in or-
bem cingunt apices, foliolis
piceæ similes: radicis nullus
usus.

LOCVS.

In aquosis, & humentibus Matth.
locis prouenit.

QUALITATES, ET VIRES.

Refrigerat, siccatur, inspissatur, Diosc.
& ad ea quoq; præstat, ad quæ
mas, sed inefficacior est.



Xx

POLY-

POLYGONVM minus, Græcis, Πολύγωνον μικρόν, & nostro tempore, ἀστέρις.
Nonnullis mille grana, quibusdam Herniola, vel Herniaria. Italis, *Correg-
giola minore.*

POLYGONVM MINVS.

F O R M A.

Matth. Ramos edit exiles, humi re-
pentes, geniculatosque: folijs
pusillis, longiusculis, semine
pumilo, rotundo, minuto, al-
bicante, racemoso, adeoque co-
piofo, vt vniuersa planta semi-
ne prægnare conspiciatur.

L O C V S.

Idem. Nasctur arido solo, & in
siccis torrentium alueis.

Q U A L I T A T E S E T
V I R E S.

Idem. Vis illi est conglutinandi,
siccandi, refrigerandi, proin-
de semen potui datum diebus
pluribus, commodissimè præ-
stat ad enterocellas, vniuersæ
plantæ pulvis ex vino haustus,
non solum vrinam cit, sed cal-
culos frangit, vbi diutius su-
matur. * Iecori obstructo
prodest & ictero, quem aqua
eius sanat pota ad octo dies. *



*POLY-

NOMINA.

691

* POLYGONON marinum & * cocciferum, Polonis *Kosmaczek*.

FORMA.



Marinum prouenit viticulis vulgaris polygones subrubentibus, quae internodijs nigris distinguuntur & squamulis tenuissimis exalbidis, folia habet magis alba & densiora, flosculi pulchri rufescent & semen gignunt triangulare nigrum, vt oxalis. Radix excedit palmum, dura, lignosa, contorta, crassa, valde nigra.

Cocciferum tenuissimis prodit folijs & mucronatis, cauliculis nodosis exalbidis, & flosculis in summitate candidis inter squamas virecentes. ad radices ipsius coccum adnascitur elegantissimo rubore commendatum.

LOCVS.

Marinum, vbi nascatur cognomento prodit, cocciferum in arenosis Poloniarum locis reperitur. *

XX 2

POLY-

POLYGONATUM, Græcis, Πολυγόνατον. Italis, Frasinella, seu Ginocchietto. Germanis, Weiß Wurß. Gallis, Geniculiére.

POLYGONATUM.

F O R M A.

Matth.

Caule est cubitali, rotundo, ac lævi, circa quem folia exeunt lauri effigie, sed latiora, strijs compluribus secundum longitudinem protensis, firma, disparti exortu prodeuntia, sapore quadantenus adstringente. flores edit candidos, à quacunque foliorum cavitare: baccas pisi magnitudine, rubentes, & quandoq; purpureas. Radice nititur candida, arundinacea, tenera, frequenter geniculata, digiti crassitudine, summa tellure vagante, sed odore quadantenus graui.

L O C V S.

Idem.

Nascitur in collibus, & montibus.

Q U A L I T A T E S.

Gale. 3.
simp. me.

Mistam habet tum facultatem, tum qualitatem, habet enim adstrictionis, pariter & acrimoniæ, & amaritudinis quippiam, & indicibilis cuiusdam insuauitatis.

V I R E S.

Diosc.

Matth.

Radix vulneribus efficaciter illinitur, quin etiam maculas in facie delet. Quæ de re mulieres è radicibus aquam stillatitiam parant, quæ ad faciei nitorem vtuntur. sunt & quæ saccharo radices ipsas condiant, ad sistenda alba vteri profluua.

C E N S V R A.

Manifesto errore ducuntur, qui polygonatum, Arabum secacul esse contendunt.

*POLY



*POLYGONATVM VVLGATIVS.

F O R M A.



Radice nititur candida, nodosa transuersim sub terra serpente, vt prior, succo viscido turgente, quæ verno tempore suos mittit asparos, molles exalbidos, folia in his initio conuoluta, sed postea vbi teretes coliculi grandescunt, explicantur & figuram referunt foliorum Hippoglossi. Ad horum exortus enascuntur flosculi albidī nonnihil herbacei habentes, oblongi, qui deflorescentes vertuntur in baccas nigras, hederæ baccis vel vaccinijs nõ abfimiles. in quibus alba durâq; continentur semina.

L O C V S.

Nascitur locis riguis, etiam in planitie. *

Xx ; CLEMA-

CLEMATIS, Græcis, Κλήμας δαρνείδης. Nonnullis, vinca peruinca. Italis, Prouenca, & Prouencola. Germanis, Singrün. Hispanis, Peruinqua. Gallis, Lyserum.

CLEMATIS.

F O R M A.

Matth. Viticulas spargit tenues, laues, humi iacentes, è quibus folia exeunt per interval-
la, pari vtrinque exortu, robu-
sta, oliua modo oblonga, lau-
ri minora, virentia, è quorum
origine, primo statim vere
flores emicant cærulei. Radi-
ces fundit numerosas, albi-
cantes, summa tellure repen-
tes. Herba est perpetuo vi-
rens.

L O C V S.

Diosc. Nascitur in terrenis, & pro-
Matth. pe sepes, atque in scrobium
ripis.

Q U A L I T A T E S.

Matth. Refrigerat, siccatur, robo-
rat, cohibet.

V I R E S.

Diosc. Folia cum caulibus ex vi-
no pota, alui profluvia, & dy-
senterias sedant. Subdita in pecto, cum lacte, aut rosaceo, cruciatibus vulue me-
dientur: dolores dentium commanducata finiunt: imposita, serpentium morfi-
Matth. bus lenamentum præstant. Fœmoribus adalligata viridia folia, mensium abun-
dantiam cohibent. & conceptus adiuuant. Capiti adalligata, & collo, gulæve
circumducta, sanguinem è naribus manantem sistunt. Adduntur quoque vtili-
ter vulnerarijs emplastris, & potionibus.



* CLEM.

NOMINA.

695

* CLEMATIS FLORE MULTIPlici.



FORMA.

Conuenit cum priore tota effigie, sed flore differt, qui multiplici florum factu spectatur plenior, & è caeruleo magis ad purpureum vergit colorem, peritq; sine semine.

LOCVS.

Allata ex Austria in hortis nostris virefcit.*

Xx 4

CLEMA-

CLEMATIS altera, Græcis, κλήματις ἑτέρα. Italis, *Vitis alba porpurea*.

CLEMATIS ALTERA.

G E N E R A.

Matth. Duum est generum, Alterum flore purpureo, Alterum candido.

F O R M A P R I M Æ.

Diosc. Viticulosos fundit caules, rubescens, lentos: folia hederæ modo diuisa, gustu admodum acri, ac exulcerantia.

Matth. Flores purpureos crucis in modum diuisos, repitque per arbores, vt smilax.

L O C V S.

Matth. Oritur in syluis, & in frutetis, dumerisq;

Q U A L I T A T E S.

Gale. 6. simp. me. Folia acrem, adurentem, siue causticam facultatem habent, aded, vt lepras exco-
rient: fuerit itaque hæc plan-
ta, in quarti ordinis excalsa-
cientium initio.



V I R E S.

Diosc. Semen tritum, pituitam, bilemque, detrahit, in aqua, aut hydromelite potum, folia eius illita lepras purgant: cum lepidio conditur ad cibos.

CLEMA-

CLEMATIS tertia. Italis, *Vitalba*. Germanis, *Synen*/Baldreben.

CLEMATIS TERTIA.

F O R M A .

Viriculis repit prælongis, *Matth.*
obsequiosisq; folijs præscri-
ptæ quadantenus similibus,
acri gustu, ac exulcerandi fa-
cultate præditis: floribus ra-
cemosis, candidis, odoratis,
& myriadeo similibus, vt dif-
ferentiæ ferè nihil interfit.
Hos deinde capillacea, inca-
naq; sequitur coma, quæ tan-
dem vento excussa, nudum
relinquit fructum, angulo-
sum, simulque compactum:
subnigro colore, atq; acerrimum.

L O C V S .

Nascitur passim in sepibus, *Idem.*
& in sylvis arboribus se cir-
cumvoluens, & per eas re-
pens.

Q U A L I T A T E S , E T
V I R E S .

Viribus iisdem præstat, *Idem.*
quibus & superior.

Xx 5

FLAM-



FLAMMVLA, nonnullis Flammula Iouis. Italis, *Flammola*. Germanis, *Blat-
terjug*.

FLAMMVLA.

FORMA.

Matth. Folijs, floribus, fructuque
adeo tertiam clematidem æ-
mulatur, ut nihil prorsus diffe-
rentiæ intercedat: differt ab ea,
quod caules edat rectos, haud
vniquam repentes, sesquicubi-
tales. Folia, & flores acerrimo
sunt gustu, ac admodum fer-
uenti.

LOCVS.

Idem. Nascitur in campis, collibus,
& frutetis.

QUALITATES.

Idem. Excalfacit, & siccit excessu
quarto.

VIRES.

Idem. Cutem, carnemque; semicon-
tusa illita, exulcerat. Ischiadi-
cos iuuat imposita. Idem præ-
stat oleum, in quo folia sub ca-
lente sole diu fuerint macerata, sed rosaceum oleum ad hoc requiritur. Idem
non modo inunctum, sed etiam infusum, opitulatur articulorum iliorumque
doloribus, ac etiam nephriticis. Stillatitia foliorum, & florum aqua, eadem fe-
re acrimonia pollet. Hanc non desunt, qui propinent quartana febre laboran-
tibus, parum ante accessionem.

SYMPHY-



SYMPHYTUM petraeum, Graecis, Συμπίτον πετρεῖον. Italis, *Simplito petreo.*
 * Monspelientes hanc plantam Corin appellant. *

SYMPHYTUM PETRAEUM.

FORMA.

Ramis exit tenuibus, par- **Diosc.**
 uis, origano similibus, capitulis, & folijs thymi: lignosum totum, odoratum, gustu dulce, ac adstringens: radice longa, subrufa, seu subpurpurea, digitali crassitudine. * Hic appicta non astringit, sed amarum & nitrosum saporem habet, flosculos caeruleos, semina nigra angulosa. *

LOCVS.

Nascitur in petris, & petro- **Diosc.**
 sis montibus. * Quae hic pingi- **Matth.**
 tur in littoribus, crescit in arena, ita ut ferè lateant ramuli & flores tantum emineant. *

QUALITATES.

Ex contrarijs constat viri- **Gale. 8.**
 bus. Habet enim incidendi **simp. me.**
 vim quampiam, qua collectum in pectore, & pulmone pus expurgare potest, habet etiam quandam contrahendi vim, qua reiectionibus sanguinis auxiliatur. & tertia ad eas inest humiditas quaedam non immodicè calida, per quam gustantibus dulce apparet, & odoratu iucundum.

VIRES.

Decoctum eius ex aqua mulla paratum, potum, pulmonis vitia purgat: san- **Diosc.**
 guinem reiicientibus, & renum malis ex aqua datur ad dysenteriam, rubraque
 feminarum profluvia, in vino decoctum: vulnera recentia, enterocellaeque glutinat, & illitu cohibet. carnes cum eo decoctae coalescunt.

SYMPHY-



SYMPHYTUM maius, Græcis, Συμμευτον ἰστέρον. Italis, *Consolida maggiore*. Germanis, *Walswurz* / seu *Schwarzwurz*. Hispanis, *Suelda maiore*, siue *Consuelda maior*. Gallis, *Oreille de Asne*.

SYMPHYTUM MAIUS.

FORMA.

DIOSC. Caulem emittit cubitalem, aut
Matth. maiorem, crassum, angulosum, inanem: circa quem breui interuacante spacio, folia exeunt oblonga, lataque, buglosso proxima hirtutaque. Caule secundum angulos quosdam striato, ramis tenuibus ex alarum sinu prodeuntibus, in quibus flores lutei, quandoq; verò purpurei, nonnunquam verò albi, diuersis in plantis spectantur. Tam caulis, quam folia aspera lanugine horrent, tactuq; pruritus concitant. Radicem fundit crassam, multifidamq; nigro exterius cortice, interna verò pulpa candicat, glutinosoq; succo madet.

LOCVS.

Matth. Nascitur frequens in pratis.

QUALITATES.

Gal. lib. 3. Similem petræo vim habet, non
sew. me. tamen gustantibus dulce est, nec olfacientibus odoratum. Cæterum quatenus viscositatem quandam, & mordacitatem obtinet scillæ simile est, eoque vtuntur ad omnia, ad quæ iam dicto.

VIRES.

DIOSC. Tritæ radices & potæ, cruentis excreationibus, ruptisque proficiunt: re-
Matth. centia vulnera illitæ conglutinant: inflammationibus, præsertim sedis, cum secretionis folijs, vtiliter illinuntur. Coaluntur etiam carnes cum ijs coctæ. Ossium fracturas sanant, si contritæ imponantur, & stricta fascia ligentur.

*SYM-



*SYMPHYTUM radice tuberosa.

F O R M A.

Mense Martio flore luteo
prodit colore tantum à prio-
ris flore differens, folia quoq;
similia sunt maiori Symphito
& cauliculi, sed omnia mino-
ra, radice discrepat, quæ protu-
berantibus quibusdam nodu-
lis inæqualis est & quoquo-
versum serpit.

L O C U S.

In hortis sponte nascitur
circa sepes.*



C O N -

CONSOLIDA media, Hetruscis, Morandola, seu vt alijs, Consolida Mexicana, sine herba Laurentina. Germanis, Gilden Günsel.

CONSOLIDA MEDIA.

F O R M A.

Matth.

Folia profert minoris foliaginis, latiora, mollioraq;: aduersa parte subpurpurea, caulem pedali longitudine, pilosum, quadrangulum, inanem: flores caeruleos, qui partim inter folia, quæ caulem ambiant, partim in cacumine spicata congerie prodeunt. Radix illi est multifida, haud altè descendens.



L O C V S.

Idem.

Nascitur in hortis, & vineis, alijsq; locis.

Q U A L I T A T E S, E T
V I R E S.

Idem.

Datur vtiliter foliorum succus ab alto deuolutis, item ruptis contractisque, quin etiam ad intestina vulnera, & illinitur ad externa sanguinis grumos, vbicunque sint, dissoluit. folia in collutionibus addita faciunt ad oris, & gingivarum vlcera. Idem quoque præstant ad vlcera pudendorum vtriusq; sexus.

CONSO-

NOMINA.

703

CONSOLIDA minor, Prunella. Italis, *Consolida minore*. Germanis, *Brumelstein*.

CONSOLIDA MINOR.

FORMA.

Caulibus exit quadrangu-
lis hirsutis, spithamæ longitu-
dine, folijs menthæ proximis,
sed subasperis. flores gerit in
ramusculorum fastigijs, spica-
tos, purpurascens, & quan-
doq; candidos. Radicem mul-
tifidam, ac tenuem.

LOCVS.

Prouenit in montibus, col-
libus, & ferè vbique.

QUALITATES, ET
VIRE.

Additur in medicamentis, *Idem*.
quæ parantur ad linguæ, fau-
cium, & gutturis inflamma-
tiones, & vlcera. & in omni-
um morborum vsum venit, in
quorum affectibus præstat
solidago media, namque suas
vires illi conformes habet.

DENTA-



DENTARIA minor, siue Sannicula quinque folia. Italis, *Dentaria minor*.
Germanis, *Zan Kraut*.

DENTARIA MINOR.

FORMA.

Matth. Exit hæc folijs pentaphylli, sed longè maioribus: radice candida tam miro naturæ ordine, nodulis, ac lacijs quibusdam elaborata, ut non parùm admirentur, qui tantum naturæ opus diligenter intuentur atque examinant.

LOCVS.

Idem. Nascitur in montibus, syluosis locis.

QUALITATES, ET
VIRE.

Idem. Radix glutinat, cohibet, roborat. Eadem datur vtiliter potanda ad enterocellas, quotidie drachmæ pondere, ex vino austero diebus quadraginta continuis. præstat quoque ad interna vulnera, cum thoracis, tum etiam intestinorum, ex aqua equiseti eodem pondere sumpta.



DEN-

N O M I N A.

705

DENTARIA maior, Græcis, Ἀφύλλου, quodd sine folijs proueniat. Germanis,
Dnblat/Schupentwurk.

DENTARIA MAIOR.

F O R M A.



Germinat primo statim ve- *Matth.*
re: caules profert dodranta-
les, teneros, fragiles, succo-
sos, orobanche quadamtenus
æmulos. In quibus à medio ad
sumum flores exeunt sub-
purpurei, hirsutiq; è quibus
calyculi oriuntur, exiguo in-
tus semine. Radice consistit al-
bicante magna, succosa, fragi-
li, compactili squamarum cõ-
gerie, miro sanè naturæ artifi-
cio, acerbogustu ac subama-
riusculo.

L O C V S.

Prouenit in opacis syluis, *Idem.*
& alijs vmbrosis locis.

F A C V L T A T E S, E T
V I R E S.

Adstringit, refrigerat, & *Idem.*
abstergit; deuorata verò sopo-
rem facit.

* Magnus vsus Aquæ destil-
latæ in fluxibus & Epilepsia. *

Yy

AVRI-

AVRICVLAVRSI, siue Sannicula altera. Italis, *Orecchia de Orso*. Germ. *Bergs
nickel*/Substümlein.

AVRICVLAVRSI.

FORMA.

Matth. Folia fert planraginis, sed
carnosiora, sensim per ambi-
tum sinuata subflauis circum-
quaq; oris: caulem edit, & flo-
res primulae veris vocatae per
omnia similes, odoris eximij:
Radice nititur multifida, albi-
cante, Ellebori modo fibrata.

LOCVS.

Idem. Nasceitur in altis, & saxosis
montibus, inter ingētia saxa.

FACULTATES, ET
VIRES.

Idem. Refrigerat, siccatur, glutinat,
cohibet: Pota herba cum ra-
dicibus enterocellis vtiliter
medetur: ac etiam intrinsecis
quibuscunq; vulneribus tum
herba ipsa deuorata, tum in
portionibus addita. Folia re-
centia vnā cum radice tusa,
atq; supposita nō solum men-
sum abundantiam cohibent,
sed vuluam mirum in modum
concludunt.



HOLOSTI-


N O M I N A.

707

H O L O S T I V M quorundam, siue H o l e s t i u m, Græcis, Οαλέσιον, & ὀλέσιον. Italis, H o l o s t i o.

H O L O S T I V M.

F O R M A.



* Folia habet longa duarum vel triumvnciarum digiti, latitudine ferè digiti, incana, pilosa & astringentia. Radix ei longa, crassa nigricans, caules unus palmi in quo flores & semina similia cornu cerui vel plantagini.*

L O C V S.

Nascitur in collibus prope Monspelium, secus vias.

Q U A L I T A T E S.

Gal. 7. simpl. Suo Holosteō deficcādi vim, cum adstrictione tribuit.

V I R E S.

Vfus eius ad rupta efficax est in vino pota. Nam & carnes coguntur, quæ cum ea cōferbuerint.

A P P E N D I X.

* Non facimus Holostium hoc genuinum, sed notius pro minus noto autotis substituimus.*

Yy 2

P I L O -

PILOSELLA, Italis, Pelosella. Germanis, Meusß Dyr. Gallis, Piloselle, seu Oreille de Rat.

PILOSELLA.

F O R M A.

Matth.

Planta est humi decumbens, radiantibus circumq, folijs, oblongis, incanis, euidenter pilosis, cauliculos repentes mittit funiculi faciem referentes, hirsuta canitie obductos: flores aureos stipatos, qui maturescences in papposam lanuginem euolant. Radicibus nititur numerosis tenuibus, humi pertinaciter inhaerentibus. Lactem succum fundit amaro sapore.

L O C V S.

Idem.

Nascitur extenuato, & arido solo, in collibus, & incultis locis.

Q U A L I T A T E S.

Idem.

Lacteus eius succus amaro est sapore, id quod extenuantis facultatis, atq; etiam abstergentis inditium præbet. Herba gustu est adstringenti, glutinat, cohibet, refrigerat, siccatur.

V I R E S.

Idem.

Dysenterias, & vteri profluuia sistit: ex vino austero pota, vulnera tam intrinseca, quam extrinseca sanat: auxiliatur cæliacis, & biliosa vomentibus, quin etiam enterocellis, sanguinem reiicientibus, & omnibus in vniuersum fracturis. Additur vtiliter in vulnerarijs emplastris, & vnguentis. Foliorum succus non solum recentia vulnera sanat, sed etiam vulnera quoq; contumacia, & præsertim oris, & pudendorum.

*PILO-



*PILOSELLA maior, Italis *Pelosella maggiore*. Germanis, *Groß Weuſſſohr*.

PILOSELLA MAIOR.

FORMA.

Priori non est abſimilis ſed multo maior, erectiorq; nec tam canis folijs, quamquam ſatis hirsuta hæc ſint, & pilis obſita. Longitudine digitum ſuperant, cauliculi florem ſuſtinentes vltra dodrantem aſſurgunt cæteri repunt vt in præcedente.

LOCVS.

Ad riuulos in aggeribus herboſis naſci gaudet.

VIREs.

Valet ad dyſenterias, vulnera, ſanguinis vomitum, enterocelas. ſiue pota ſiue im- poſita, extrinſecus. Eius aqua etiam vtiliter in doloribus mammillarum adhibetur. Et vt ſummatim dicam, eadem poteſt quæ prior.*



SCABIOSA, Italis, *Scabbiosa*. Germanis, *Apostemen*. Krant. Gallis, *Scabieuse*.

SCABIOSA.

GENERA.

Matth. Duum est generum. Maior
& Minor.

FORMA MAIORIS.

Idem. Primo statim exortu folia
profert oblonga, minimè la-
ciniata: ceterum, quæ his suc-
cedunt, plu maioris modo in-
cisa spectantur: quæ verò in
caule, & ramis sunt, longè mi-
nora, ac magis dissecta vifun-
tur: capitula summis caulibus
profert in acutum desinen-
tia, compactili squamarum
ordine obducta, Cyani mo-
do, è quibus flores prodeunt
etiam similes, sed ex purpura
subrubentes. Radicem habet
pollicari crassitudine, & sæpe
maiorem brachiatamq; supo-
re tubulci, pastinacæ proxi-
mo.

Locvs.

Idem. Nascitur inter fruges, & in
campis non cultis argillaceo solo.

QUALITATES.

Idem. Excalfacit, extenuat, aperit, digerit, abstergit.

VIREs.

Idem. Radix valet peculiari quadam dote mirificè ad lichenofos, etiam si morbus
à Gallica lue prouenerit, si eius decoctum morbofi bibant quotidie in quadra-
gesimum diem vsq; sex vnciarum pondere. Idem præstat eiusdem radicis pul-
uis quotidie drachmæ pondere ex sero haustus.

SCABIO-

NOMINA.

711

SCABIOSA minor, Græcis, *Ψάρα*. Italis, *Scabiosa minore*. Germanis, *Apostemen Kraut*.

SCABIOSA MINOR.

FORMA.

Folij crescit inferioribus *Matth.*
per ambitum denticulatis,
humiliter accubantibus, subalbi-
cantibus, oblongis, & subhi-
sutis, verum quæ in caule
sunt, tenuiora, & magis diui-
sa spectantur. Caulem mittit
tenuem, teretem, rectum, ra-
mosum: flores caruleos, sti-
patos, aut pallidos, è quibus
capitula oriuntur colore sub
uiridi, speciosis obducta ocel-
lis. Radix est illi palmatis,
multifida, subcandicansq;.

LOCVS.

Nascitur in agris non cul- *Idem.*
tis, secus itinera, & in colli-
bus terrenis.

QUALITATES.

Sapore est amaro: quare ex *Idem.*
calfacit, extenuat, abstergit,
aperit, & crassa, lentaq; expe-
ctorat.

VIRE.

Herba ipsa in puluerem pota, aut succus ex melle delinctus, pectus, & pul- *Idem.*
mones abstergit, crassaq; ne glutinosa per os eijcit. Idem prestat eius decoctum
porum. scabiem sanat. Id quod & succus facit in vnguentis additus. Folia cruda
contusa, & pestiferis carbunculis admota, mirifice eorum perniciem coercent:
Datur vtiliter earundem succus, quatuor vnciarum pondere, cum theriacæ
drachma pestilentia affectis, prima statim die, verum à potione agros sudare
oportet: & iterum, atq; iterum medicamentum repetere. Datur item contra
serpentium venenosorum morsus, herba verò exterius imponitur. Illitus sca-
biosæ succus, cum chrysocolle, & caphura momento, lentigines, albos, im-
petigines, & cæteras cutis infectiones abstergit, oculorumq; per se, & cum suc-
co fœniculi, albugines delet.

YY 4

CLYME-

CLYMENVM, Græcis, Κλύμενον. Italis, Climeno.

CLYMENVM.

F O R M A.

Diosc. Caulem fert fabæ, quadra-
tum, folia plantaginis, follicu-
lis supra caulem in se se infle-
xis, vt in polyporum cirrhis.

L O C V S.

Matth. Nascitur incultis locis.

Q U A L I T A T E S, E T
V I R E S.

Diosc. Succus è tota planta expres-
sus efficax est ad sanguinis re-
iectiones, & ad cæliacos affe-
ctus, fœminarum profluvia
cohibet: sanguinem è naribus
erumpentem sistit: trita folia,
aut siliquæ, recentibus vulne-
ribus illitæ, ea ad cicatricem
perducunt.

C E N S V R A.

Errant qui saponariam, vul-
go dictam clymenum faciunt.
cæterùm tametsi ego minimè
comptum habeam, quæ nam planta legitimum sit clymenum, volui tamen
hanc imaginem hic ostendere, vt de ea aliorum quoq; sit iudicium.



PERI-

NOMINA.

713

PERICLYMENVM, Græcis, Περικλόμενον. Italis, *Marrifolua*, seu *Vincibosco*. Germanis, *Geißblatt*. Hispanis, *Madresylua*. Gallis, *Vincibosse*.

PERICLYMENVM.

FORMA.



Simplex fruticat, exinter- DIOSC.
uallis parua folia habens, i-
psum amplectentia, subcan-
dida, hederaceaque: inter fo-
lia furculi exeunt, in quibus
baccæ hederæ similes: flos fa-
bæ candidus, aliquantulū ro-
tundus, & quasi in folium pro-
cumbens: semen durū, quod
nō facillē euellatur, radice ro-
tunda, crassa.

LOCVS.

Nascitur in aruis ac sepi- Idem.
bus, conuoluēs se adminicu-
lis propè emergentibus.

QUALITATES.

Tum fructus, tum folia v- Gal. li. 8.
tilia sunt, aded̄ vehemēter in- simp. me.
cidentis, simul & exalfacien-
tis facultatis, vt si plusculum
bibantur, urinā sanguinolē-
tam ciciant: semen quoq; de-
siccatur.

VIRES.

Maturum semen in vmbra siccatur, si drachmę pondere detur in vino qua- DIOSC.
dragenis diebus, licnem absumit, lassitudinem discutit, sed urinam ciet statim à
sexto die cruentam: Orthopneæ, & singultui prodest, partum accelerat. Folia
sunt ijsdem viribus prædita, quæ tricenis septenis diebus pota, sterilitatem fa-
cere produntur. Eadem ex oleo peruncta, febrim algores abigunt. Folia & Matth.
earum succus, veniunt vtiliter in vnguenta, quæ ad capitis vulnera parantur, &
ad vlcera quæ in cruribus eueniunt.

Yy 5

TRIBV-

TRIBVLVS, Græcis, Τριβύλλος. Italis, Tribolo. Arabibus, Hafaeh. Germanis, Erdletten/Burgheldorn. Gallis, Saligoiz terrestres.

TRIBVLVS.

G E N E R A.

Diosc. Duum est generum. Terrestris, & aquaticus.

F O R M A T E R R E S T R I S.

Idem. Folij exit portulacæ proximis, tenuioribus tamen: viriculis longis, in terra stratis: spinis secundum folia, rigidis, præduris.

L O C V S.

Idem. Iuxta amnes, & rudera nascitur.


Q U A L I T A T E S.

Galen. 7. In terrestri superat terreū
simp. me. frigidum, quod & adstringēs fuerit. Fructus tenuiū est parium, quare calculos in renibus comminuit.

V I R E S.

Diosc. Drachma terrestris tribuli pota, illitave ictos à vipera recreat, contra venena, cum vino aptissimè bibitur. Decoctum eius sparsum pulices necat. Cetera cum aquatico communia habet.

TRIBV.



TRIBULVS Aquaticus, Græcis, Τριβύλλιον. Italis, *Tribolo aquatico*. Germanis, *Wasserfuß*. Hispanis, *Alroyos*, seu *Abrollos*. Gallis, *Castaignes d'Eau*.

TRIBULVS AQUATICVS.

FORMA.



Folijs prouenit latis, subro *Matth.* tundis, crassis, & aduersa parte maculosis, nervosis, & per ambitum serratis, prælongis, & crassis pediculis nitētibus. Caulem edit crassum, pingue, sed in summitate longè vegetiorem. Fructum profert nigrum, castaneæ magnitudine, triplici armatū mucrone, putamine membranoso, alba intus medulla, castaneæ sapore. Radix illi prælonga, comantibus spicatis capillamentis.

LOCVS.

Nascitur in fluminibus, la- *Idem.* cubus, & in mari.

QUALITATES.

Ex humida essentia modicè *Galen. 7.* frigida, & sicca non mediocri- *simp. me.* ter, & ipsa frigida cōponitur.

VIRES.

Inflammationes omnes cataplasmate iuuat: vlcera oris, gingiuas, tonsillasq; *Diosc.* perfrangat. Thraces Strimonæ annis accolæ, eius pabulo equos sagināt, è fructu verò esculentum faciunt panem.

SAXIFRA-

SAXIFRAGA, Græcis, Σαξίφραγος. Italis, *Saxifragia*. Germanis, *Steinbrech*. Gallis, *Perce pierre*.

SAXIFRAGA.

G E N E R A.

Math t. Plura, diuersa que reperiuntur genera, quorum nos quinque describemus.

F O R M A P R I M Æ.

Diosc. Frutex est furculosus, thymo similis.

L O C V S.

Idem. In petris, & asperis locis nascitur.

Q U A L I T A T E S,
E T V I R E S.

Idem. In vino coctus, mox potus, febricitantibus opitulatur. Stragurix prodest, singultum sedat, calculos vesicæ frangit, & urinam ciet.



SAXIFRA-

SAXIFRAGA secunda, Italis, *Saxifragia secunda*.

SAXIFRAGA SECUNDA.

FORMA.



Folia in cauliculis per inter- *Martb.*
ualla gerit parua, angusta, ac
lōgiuscula, cunilæ amula, con-
comitātib; alijs longè mino-
rib; in cacumine tamen co-
piofiora sunt: & breuiorib; in-
teruallis distincta, flores edit in
summis caulibus purpureos,
odoris non iniucundi.

LOCVS.

Prouenit in faxis, & saxosis *Idem.*
locis.

QUALITATES,
ET VIRES.

Cit vrinam, calculos in re- *Idem.*
nibus frangit, & ei; cit, visum a-
cuit, si edatur.

*APPENDIX.

Cū nondum visā mihi es-
set eiusmodi Saxifraga, qualem
autor hic depinxerat, malui

substituere hanc plantam, quæ *Satureia* durior nonnullis vocatur, quam igno-
tam effingere, præsertim cum deliniationi pulchrè conueniret. Prouenit enim
Monspelij non longè à Castelneuf in montibus inter saxa: Folia habet multò
duriora, & minora, quàm cunila vel *satureia* satiuæ & à radice plurimos emittit
ramos tenues foliosos, spicam similem ferè hyssopo, in qua sunt flores albi, solo
colore differentes ab Autoris descriptione: tota plāta viridior est *Satureia*, nec
ita nigricans. Radix valde lignosa, & hortorum cultui facilè assuescens, ac per
hyemem durans.*

SAXIFRA-

SAXIFRAGIA tertia. Italis, *Saxifragia terza*.

F O R M A.

Math. Folia mittit capillacea, fœniculæmula, sed longiora, tenuiora, rarioraq;: caulem pariter fœniculaceum, sed tenuē ac pumilum, umbellā in summitate, semine petrosilini vulgaris simile, sed longiusculo, & odorato. Radicem albicantem, pastinacæ sapore.


L O C V S.

Idem. Nascitur in magnis faxis, & sicco ac extenuato solo.

Q U A L I T A T E S,
E T V I R E S.

Idem. Excalfacit, attenuat, aperit, prouocat, abstergit. Tota plāta subacris est, & subdulcis. Radix vrinam ciet, & menses quouis modo sumpta: visum acuit, & obstructions iecoris referat.

SAXIFRAGIA TERTIA.



SAXI.

SAXIFRAGIA quarta. Italis, *Saxifragia quarta*. Germanis, *Weisser Steinbrech*.

SAXIFRAGIA QVARTA.

FORMA.



Folijs est terrestris hædere, *Matth.* minoribus tamen, circumseratis, humi accubantibus. Cauli tenui, rotundo, recto, piloso, dodratali, à quo rari oriuntur ramuli, in quib. flores panduntur candidi, ocimoidis modo, è quibus nullum oritur semen. Radix illi multifida, tenuisque, in cuius fibris grana quædam rotunda, albicantia, ac subpurpurea coriandri seminis magnitudine spectantur, quæ eius esse semen quidam affirmant. Mira sanè plantæ natura, quod semen in radicibus gerat.

LOCVS.

Nascitur locis non cultis, *Idem.* sterili solo, ac pariter inter saxa.

QUALITATES.

Grana, quæ radicibus hæ- *Idem.* rent, amara sunt. Ideoque excalfaciunt, attenuant, absterunt, aperiunt.

VIRES.

Herbæ & radicis decoctum ex albo meraco paratum, renum calculos frangit & educit: vesicam mundat, & urinam prouocat, efficacius tamè, si ex eodem decocto granorum radicum farina drachmæ pondere propinetur. Cæterum longè feliciter curatio succedit, si bibatur medicamentum, dum affecti balneo se fouent.

SAXIFRA-

SAXIFRAGIA magna, Italis, *Saxifragia maggiore*.

SAXIFRAGIA MAGNA.

F O R M A.

Matib.

Caule est lignoso, contorto, digiti crassitudine, duris, densisque furculis, ipsisq; tenuibus, stipato: folia fert exigua, oblonga, in acutum definentia, flosculos albos, & calyculos exiguos, ocimoidis modo, ore circumquaq; serrato, in coronæ modum, in quibus semen continetur rubrum admodū exiguum. Radix in petris adeò pertinaciter concluditur, ut inde auelli non possit, nisi mucronatis ferramentis.

L O C V S.

Idem.

Prouenit in saxis, & antiquis urbium mœnijs.

Q U A L I T A T E S,
E T V I R E S.*Idem.*

Mirificè tota plâta calculos comminuit & expellit.




LIMO-

NOMINA.

721

LIMONIVM, Græcis, Αιμαόριον. Italis, Limonio. Officinis, falso Behen rubrum.

LIMONIVM.



FORMA.

Folia habet betæ, tenuiora, Diosc. & longiora, decem, & saepe plura, caulē tenuem rectum, seminibus rubris scatentem, adstringenti gustu. Radix est Matth. illi vegeta, rubraq;.

LOCVS.

Nascitur in pratis, & palu- Diosc. stribus.

QUALITATES.

Semen utpote austerum au- Galen. 7. xiliatur, ubi adstrictione sit o- simp. me. pus.

VIREs.

Semen tritum, & ex vino a- Diosc. cetabuli mensura potum, dysentericos ac cæliacos iuuat: quin etiam rubra fœminarum profluvia sistit, & sanguinem expuentibus subuertit.

CENSURA.

Explodenda est seplatiariorum opinio, qui Limonij radicem, Behen rubri Galen. vice in medicamentis supponunt. Cæterum longè melius facerent, si bistortæ radice vterentur.

Zz

LIMO-

Non defunt rei plantariæ
scriptores: qui plantam, cu-
ius hic imago spectatur, limo-
nium faciunt. De qua poterit
esse etiam aliorum iudicium.



PYRO-

NOMINA.

Pyrola, Italis, *Pirola*. Germanis, *Bincergrein*.

Pyrola.

723

FORMA.



Folij est pyri, minoribus *Matth.* ramentis, ac perpetuo virentibus, caule dodrantali, tenui, tereti, in quo per intervalla flores spectantur candidi, stellatæ figura, capillamentis è medio emergentibus: Radix & illi subalbicans.

LOCVS.

Nascitur in montibus vni- *Idem.* brosis, & in sylvis.

QUALITATES, ET VIRE.

Desiccat, adstringit, glutin- *Idem.* nat: Foliorum succus illitus recentia vulnera sanat. Idem præstant & folia. Eorundem quoq; decoctum ex vino paratum, sanat potum intestina vulnera, quare additur commodissime vulnerarijs potionibus.

Zz 2

LAGO-

LAGOPVS, siue pes Leporinus, Græcis, Λαγώπους. Italis, *Lagopo*, seu *Pie di Lepore*. Germ. *Hasenpfötslin*.

LAGOPVS.

FORMA.

Diosc. Herbula est caule tenui, hirsuto, rotundo, ramoso, folijs trifolio proximis, sed minoribus. Paniculis in summitate villosis, & tactu mollibus, perinde ac leporini pedes.

Matth.

LOCVS.

Diosc. Nascitur in campis inter segetes.

QUALITATES.

Galen. 7. Qualitatis est, exiccantis, *simp. me.* aded, vt fluxus alui probè exiccet.

VIRES.

Diosc. Adalligatur tota planta in-
Matth. guinibus contra eorum inflammationes. Folia, & paniculæ dantur vtiliter ex vino austero, aut ex succo punici mali contra dysenteriam. vniuersæ plantæ decoctum, ad-

ditis malæ folijs è dulci vino paratum, datur commodè ad vesicæ morbos, & vrinæ ardores: semen auxiliatur sanguinem reiicientibus. Peculiariter cinis illitus hæmorrhoidas fluentes sistit. Sunt qui paniculis vtantur ad extergendam dysentericorum sedem.

CARYO-



CARYOPHYLLATA, Italis, *Garofanata*. Germanis, *Benedictenwurk*. Gallis, *Benoyste*, *Galliot*. seu *Resi*, &c.

CARYOPHYLLATA.



GENERA.

Trium est Generum, Cam-
pestris, palustris & Montana.

FORMA CAMPESTRIS.

Folia fundit subaspera, hir- *Marr.*
suta, tripartita: duobus etiam
longè minoribus auricularum
instar in posteriori parte adna-
tis, atq; omnibus per ambitum
laciniatis: caule est ramoso, ro-
tundo, haud crasso, sesquicu-
bitali, geniculato, subaspero-
que: florib* aureis, pentaphyl-
li æmulis, villosis: succedenti-
bus inde capitulis, in quibus
semen continetur. Radicibus
nititur copiosis, tenuibus, sub-
rulis, caryophyllorum odo-
rem spirantibus.

LOCVS.

Nascitur secus vias, propè *Idem.*
hortorum, & agrorum sepi-
menta, locis potius opacis,
quàm apricis.

QUALITATES.

Radix, cuius est vsus, excalfacit, & siccatur, aperit, & roborat.

Idem.

VIRE.

Radices præstant ad sananda vulnera, & vlcera, & præsertim ad intrinseca vul- *Idem.*
nera, si in potionibus addantur. Earundem succus cum ærugine infusus, præstat
ad cuniculosa vlcera. Eadem olfactæ vitales spiritus recreant, & frigidum iu-
uant cerebrum. Earundem pulvis epotus, prodest celiacis, dysentericis, & san-
guinem expuentibus.

Zz ;

*CARYO-

*CARYOPHYLLATA aquatica. Germanis, Wild Benedicwurz.

CARYOPHYLLATA AQUATICA.

F O R M A.

Folijis caule & nascendi figura similis est hæc plāta præcedenti Cariophyllatæ, ut vix dignosci queat. Verum discrepantiam facit radix dodrantalis, digiti crassitudine minus fibrosa, colore purpurascente, & sapore amariuscule sine manifesto odore. Deinde flores pallecentes, nonnihil purpurei habentes, qui nolæ effigiem repræsentant. Tandem semen pilosum grandius capitulum efformans, quam quod campestris Cariophyllata gignit, quod plerumque etiam calyci purpureo à flore decidente relicto insidet. Huius flores aliquando pluribus folijs insignes sunt & rubent magis, ac folijs inferne quinque aut senis herbaceis pulcre coronantur.

L O C U S.

Nascitur in sylvis & pratis humectis, alijsque locis palustribus.*



CARYO.

CARYOPHYLLATA montana. Italis, *Garofanata saluatica*.

CARYOPHYLLATA MONTANA.

F O R M A.



Folia gerit alterius crassio- *Matth.*
 ra, crispiora, hirsutioraq; plu-
 ra ab vna radice prodeuntia,
 longisq;ne pediculis inharen-
 tia. tactu subaspera, & circum-
 quaque laciniata, humiq;ne
 procumbentia. Caules tenu-
 es, nullis adnatis ramis, in qui-
 bus pusilla, sed rara folia spe-
 ctantur. In caulium summita-
 tibus vnus tantum flos eni-
 cataureus, pentaphylli simi-
 lis. sed maior paulo, qui flac-
 cescens, pinnatum efficit or-
 bem, non paruo naturæ opi-
 ficio: Radice nititur dodran-
 tali, digiti crassitudine, sub-
 rufa: caryophyllorum odore.

L O C V S.

Nascitur in Boemiæ mon- *Idem.*
 tibus, è quibus Albis fluius
 oritur.

Q U A L I T A T E S.

Radix non solum exalfacit, & siccat, sed etiam cohibet, ac roborat.

Idem.

V I R E S.

Idem cum altera pollet viribus, sed præstantioribus.

Idem.

Z z 4

C O R T V.

CORTVSA, Italis, *Cortusa*.

CORTVSA.

F O R M A.

Matth.

Folijjs prouenit ferè vitigineis, sed longè minoribus, subrotundis, atq; subasperis, adstringenti quadantenus sapore, caules edit tenues, reëtos, glabrosq; in quorum cacumine flores exeunt exterius purpurei, interius verò aurei, staminibus pariter aureis reëferti: Radices fundit numerosas, tenues: ac longas. Est etiam quæ violaceos, & quæ candidos flores gerat. sed prima frequentior habetur.

L O C V S.

Idem.

Nascitur locis umbrosis, cretaceo, & albicante solo.

Q U A L I T A T E S.

Idem.

Tota planta dum recens est, gratissimo fragrat odore, mellei faui ferè simili, sed longè admodum graviori: in sicca verò odor euanesceit: subtilium est partium, quare ex-calfacit magis recens, quàm sicca; primo tantum excessu.

V I R E S.

Idem.

Mulcet neruorum, & articulorum dolores; à quauis causa oriantur. Ad hoc autem macerantur flores recentes in oleo dulcium amygdalarum, & rosaceo, quod completum vocant, diuq; insolantur. Oleum egelidum deinde illini præstat, repetitijs illitionibus.

M E D I-



MEDIVM, Græcis, *Μήδιον*. Italis, *Medio*, nonnullis *Viola marianna*. German. *Blöckenblum*.

M E D I V M.



F O R M A.

Folia habet intubi, caulem *DIOSC.* tricubitalem, & in eo florem grandem, purpureum, rotundum, semine Cnici simile, minuto: Radicem dodrâtalem: crassitudine baculi, gustu acerbo.

L O C V S.

In saxosis & opacis nasci- *Idem.* tur.

Q U A L I T A T E S.

Medij radicem contra atq; *Gal. li. 7.* semen ipsum temperatū esse *simp. me.* contingit: nam illa quidē austera est, & fluxiones cohibet, cum alias, tum profluviū muhebre. At semen tantū abest, ut tale quid efficiat, ut etiam mēses cieat, ut pote, quodd tenuium partium, & incidentis est facultatis.

V I R E S.

Radici farina, ex melle cocta, rubros fœminarum mēses cohibet, eclegma- *Idem.* te per aliquot dies sumpto, semen verò in vino potum eosdem pellit.

A N N O T A T I O.

Medium folijs iridis provenire deprauatus Dioscoridis Codex legit: At Ori- *Matth.* basius, qui ab eo transcribit, non irides, sed seridis folijs ipsum provenire ait, quodd in suo Dioscoridis exemplari legerit, *seridis*, non autem, *iridis*, cui & nos ad- stipulamur.

Zz 5

GLADIO-

GLADIOLVS, Græcis, *Ξιφίολος*. Italis, *Gladiolo*. Senensibus, *Monacuccie*. Mauritaniis, *Kassron*. Germanis, *Schwertel*. Gallis, *Glaiis*, siue *Glaiet*.

GLADIOLVS.

FORMA.

Matth.

Folia ei sunt iridis, breuiora tamen & angustiora, striata, & in mucronem desinētia. Caulis cubitalis, lguis, succosus, in quo flores exeunt purpurei paribus sparijs vtrinq; distantes, Iridis emulhi, sed longè minores: colore verò puniceo diluto, è quibus rotundum prouenit semen: Radicibus cohæret geminis, bulbosis, rotundis, pressis verticillari specie, altera, alteri insidente. Hæ capillaceo conteguntur inuolucro, subrufoque.

LOCVS.

Idem.

Nascitur in aruis, & inter fetes.

QUALITATES.

Galen. 3.

Radix quæ superior est, attractiua, digerentem, & exiccantem facultatem habet.

VIREs.

Diosc.

Superior radix cum thure illita, admisto vino, spicula, & aculeos è corpore eximit: panos cum Lolij farina, & hydromelite discutit: mēses supposita trahit. Eadem ex vino pota venerem stimulat. Contrà verò inferior, quippe quæ sterilitatem faciat. Datur superior vtiliter cum aqua potanda ad puerorum enterocellam.

ANNOTATIO.

Tametsi scripserit Dioscorides superiorem gladioli radicē inferiorem magnitudine superare, plerunque tamen contrarium visitur.

* GLADIO-



*GLADIOLVS Indicus quibusdam vocata planta, vel Canna Indica.

GLADIOLVS INDICVS.

FORMA.



Folia ei sunt pulcra, lata, venosa, in mucronem collecta, inferna sui parte caulem ambiētia. Caulis in multam altitudinem attollitur, laevis arundinaceus, in quo flores exeunt pulchrè rubentes, Gladioli ferè florib. similes, aut cancrorum forpiculas quodammodo referentes, è quibus rotundum, nigrumque prouenit semen. Radicibus nititur multis, nodosis, in capita rotunda protuberantibus.

LOCVS.

Nascitur in riguis, & apud nos hortulanorum diligentia eget, vñ in fictilibus hieme rectè afferuetur.*

SPARGA-

SPARGANIVM, Græcis, Σπαργάνιον. Italis, *Sparganio*. Mauritanis, *Safarberamon*.

F O R M A.

Diosc. Folia habet gladioli, sed at-
tiora, & in terrâ magis pro-
cumbentia, in summo caule
veluti pilulæ prominent, in
quibus semen.

L O C V S.

Matth. Nascitur ad montium ra-
dices, humecto solo, & circa
foculos.

F A C U L T A T E S.

Gal. li. 3. Et ipsum desiccantis est fa-
simp. me. cultatis.

V I R E S.

Diosc. Datur radix ex vino contra
serpentium venena.

C E N S U R A.

Quâquam ferè omnes, qui
de materia medica scripse-
runt, hanc plantam sparganium faciunt, nos tamen non parum dubitamus, an
rectè senserint, quum hæc folia gladioli latiora gerat, non angustiora, sursum
spectantia, non humi procumbentia.

SPARGANIVM.



XYRIS,

XYRIS, Græcis, Eugis. Italis, & vulgo, *Spatola fetida*. Germanis, *Wandscus*.
frant. Hispanis, *Lirio spadanal*. Gallis, *Glaicul*.

XYRIS.

FORMA.



Folia habet Iridis latiora, Diosc.
& in cacumine mucronata, &
quorum medio caulis erum-
pit satis crassus, cubitalis, ex
quo siliquæ triangulares de-
pendēt, in quibus purpureus
flos, & in medio puniceus, se-
mē in folliculis simile fabis,
rotundum, rubrum, acre. Ra-
dix longa, geniculata, rufa.

LOCVS.

Nascitur in aquosis, & hu- Matth.
meis locis.

QUALITATES.

Tenuium est partium, at- Gal. li. 7.
tractorix, digerendi, ac nimi- simp. me.
rum etiā desiccandi est facul-
tatis, cum radix, tum multo
etiam magis eius fructus.

VIREs.

Valer ad capitis vulnera,
fractaq; efficax est: aculeos, &

spicula omnia, citra molestiam extrahit, adiecta floris æris tertia parte, & radi-
cis centaurij, & mellis quinta: tumoribus, & collectionibus illita cum aceto
medetur. Radix bibitur ex passo ad conuulsa, rupta, coxendicum dolores: stran-
gurias, & alui profluvia: semen tribus obolis potum, vrinam vehementer im-
pellit, & cum aceto lienem absumit.

ANCHV-

ANCHUSA, Græcis, *ἄνθησα*. Italis, *Anchusa*. Germanis, *Rot Ochsenjungeln*. Hispanis, *Sagem*. Gallis, *Orchaneite*.

ANCHUSA.

GENERA.

DIOSC. Trium est generū, magnitudine, & exilitate foliorum, & caulium differentium.

FORMA PRIMÆ.

Idem. Folia habet lactuca, in acumen fastigiata, hirsuta, aspera, nigra, multa, ab radice quoquo versum humi sparsa, spinis horrida. Radici crassitudo digitalis, quæ estate provenit, & manus inficit sanguineo colore.

LOCVS.

DIOSC. Nascitur læto solo, & locis
Matth. incultis.

QUALITATES.

Gal. li. 6. Radicem habet admodum
simp. me. refrigerantē, & desiccantem, tum adstringentem, & subamaram, tum quæ sufficiat extenuandis, & extergendis humoribus, corporibusque condensandis. Folia radice quidem sunt imbecilliora, cæterum adstringunt & ipsa, & desiccant.



VIRES.

Diosc. Radix adstringit: ex oleo, & cera, efficax est ad ambusta, & vetera vlcera. Medetur igni sacro, cum polenta illita. Illinitur quoque ex aceto, lepris, & vitiliginibus: partus supposita extrahit. Datur eius decoctum vtiliter potadum calculosis, lienosis, & bile suffusis, & si febris sit ex aqua mulsæ. Folia ex vino pota aluum sistunt.

ANCHV-

ANCHVSA altera, Græcis, ἀγχυσάλη. Italis, *Anchusa secunda*.

ANCHVSA ALTERA.

FORMA.



Minoribus hæc exit folijs, Diosc.
quàm prima, similiter tamen
asperis: ramulis exilibus, in
quibus flos purpureus in pu-
niceum vergens conspicitur.
Radices habet rubras, præ-
longas, quæ mellebus sangui-
neum succum fundunt.

LOCVS.

In sabulosis nascitur. *Idem.*

QUALITATES.

Calidior altera est, & ma- *Galen. 6.*
gis medicata: nam plusculum *simp. me.*
habet & gustu ipso proænis
acrimonia.

VIRES.

Vires folijs, radicibusq; in- *Diosc.*
sunt, quæ, contra virus, cum
reliquorum serpentium, tum
maximè viperarum auxilien-
tur, siue cibo, siue potu, siue

alligatu, illinitur: nam si quipiam mandens, in serpentis os inspuat, eum ne-
cabit.

ANCHV-

ANCHUSA TERTIA, Græcis, ἀγγουα τριτη. Italis, Anchusa terza.

ANCHUSA TERTIA.

FORMA.

Diosc. Est & hæc alteri non dissimilis, sed puniceo, ac minori femine.

LOCVS.

Matth. Nascitur arido, ac sabuloso solo.

QUALITATES.

Gal. li. 6. Parua hæc, etiam altera, calidior est, quæ & amarior, & magis etiam medicata.

VIRE.

Diosc. Commanducatum semen, si in serpētis fauces expuatur, eum interficiet. Radix acetabuli mensura, cum hyssopo, & nasturtio pota, latas vētris tineas excutit.



ECHIVM,

NOMINA.

737

ECHIVM, Græcis, Εχίον. Italis, Echio, & Buglossa salustica. Germanis, Wild
Dahsenjung. Hispanis, Yerua della biuora. Gallis, Buglossa sauvage.

ECHIVM.

FORMA.

Folia habet prælonga, aspe- DIOSC.
ra, aliquantum tenuia, an-
chusæ proxima, minora ta-
men, subrubra, & pingua,
spinulis tenuibus horridula:
cauliculus exiles, numero-
sos, minutaque utroque la-
tere folia, expansa pinnata-
que, nigra, in summo caule
proportione minora. Flores
secundum folia purpureos,
in quibus semina capiti vipe-
rarum similia insunt. Radix
nigricat digito tenuior.

LOCVS.

Nascitur secus itinera, in Matth.
agrorum marginibus, & sic-
co, inculto, & exoluto solo.

QUALITATES,
ET VIRES.

Radix non modo percuss- DIOSC.
sis à serpente ex vino pro-
dest, sed eos, qui antea biberint feriri non patitur. Idem præstant munus,
folia, & semen. Lumborum dolores sedat in vino, aut sorbitione sumpta.
Lac extrahit.

A a a

ECHIVM



ECHIVM,

F O R M A.

Echium aliud albis floribus
præcedenti simile, sed multo
maius & asperius fere, rectum
in alas valde deunaticatum.

L O C V S.

Hic ipsi cum priori commu-
nis est, sed ob raritatem in
hortos transferi solet. *



O C I M O I-

NOMINA.

739

OCIMOIDES, siue Ocimastrum, Græcis, *Οκίμοειδης*. Italis, *Basilica salutarico*, siue *Ocimoide*. Hispanis, *Alba haqua montefina*. Gallis, *Basilic sauvage*. Germanis, *Ze lenger je freundlicher / Eiedweich*.

OCIMOIDES.

FORMA.

Folijs exit ferè satiuo Ocimo ^{DIOSC.} ^{Matth.} mo similibus, ramulis hirsutis, quadrangulis, cubitali longitudine, in quorum summo flores emicant candidi, & nonnunquam purpurei, è quibus calyces erumpunt hyoscyami figura, capaci ventre, arctis faucibus per ambitum denticulatis, in quibus semen includitur nigrum, melanthio ferè simile.

LOCVS.

Nascitur passim inter segetes, propè sepra, & agrotum marginibus. ^{Matth.}

QUALITATES.

Radix superuacanea est: at ^{Gal. 8.} semen tenuium partium, & ^{simp. me.} deficcantis citra mordacitatem facultatis est.

VIRES.

Semen in vino porum, tum viperarum, tum cæterarum morsibus medetur. Datur Isehiadicis cum vino, melle, myrrha, & pipere.

Aaa 2

*OCIMO-



F O R M A.

Habetur quædam varietas
in floribus Ocimoidis, qui
pulchrè foliorum fœtura in-
signi exornantur. Herba ipsa
nihil differt ab altera, quæ
simplici florum natura con-
stat, cuius appinximus ramu-
lum proferentem rubros flo-
res, vt posset animaduerti
quid hi ab alijs, qui candidi
sunt, differrent. *



• GRAMEN,

NOMINA.

741

GRAMEN, Græcis, ἄγρωσις. Arabibus, *Vagem*, *Negen*, seu *Nagien*. *Thekel*, & *Negil*. Italis, *Gramigna*. Hispanis, *Grana*. Gallis, *Den de chien*. Germanis, *Graß*.

GRAMEN.



GENERA.

Complura graminis visuntur Genera, de quorum nonnullis dicitur.

FORMA PRIMI.

Geniculatis serpit ramulis, à quibus radices sparguntur dulces, articulis præcinctas. Folia acuminata, dura, & ut arundinis parvæ lata, eaq; iumenta, & boues pascunt.

LOCVS.

Prouenit in campis, & in cultis locis.

QUALITATES.

Radix mediocriter frigida est, & sicca, mordacitatem quandam exiguum, & partium tenuitatem obtinens: herba vero primo quidem excessu refrigerat: in humiditate, & siccitate moderata. Semen

imbecillum est. Radix esculenta est viridis. Dulcis enim est, instar aquæ, sed acre quiddam exiguum, & subacerbum obtinentem.

VIRE S.

Trita radix illitu vulnera glutinat. Decoctum eius in potu torminibus medetur, atq; vrinæ difficultatibus: calculosa etiam vesicæ excrementa committit. Idem potum interancorum vermes necat.

Matth.

Aaa 3

GRAMEN

GRAMEN mannæ, Italis, *Sanguinella*, siue herba *Capriola*. Germanis, *Schmeltz* / Schwaden.

GRAMEN MANNÆ.

F O R M A.

Matth.

Folijs, ac radicibus exit al-
terius tenuioribus: caule ge-
nuculato, prælongo, spicis
numerosis in cacumine refer-
to, ipfisq; sensim aculeatis,
adeò vt naribus inditæ, ma-
nuq; agitæ, sanguinem
eliciant. Semen ijs inest mi-
nutum albicans, panico lon-
gè minus, orizæ se. è sapore,
quod à Germanis estur in pin-
gui iure decoctum, quod per
quàm bellè placeat. Quade-
re hoc semen Mannam ap-
pellant.



L O C V S.

Idem.

Seritur in Germania, & di-
ligenter colitur in cāp is: quin
etiam sponte per se nascitur
in incultis locis.

Q U A L I T A T E S.

Idem.

Semen orizæ qualitates ha-
bet, quare mediocriter ventrem adstringit.

V I R E S.

Semen ex pingui iure decoctum, & illitum mammarum durities resolu-
it. In cibis mediocriter alit.

C E N S V R A.

Errant profectò qui hanc plantam coronopum faciunt.

*GRAMEN

N O M I N A.

743

* GRAMEN floridum, Græcè ἀγρὸς λευκάνθημος, Germanis, Augentrost
Graf. *

GRAMEN ALTERVM.

Est & Alterum, quod flo-
ridum appellari potest, folijs
& caulibus cæteris similibus:
floribus in summitatibus stel-
larum instar radiantibus, can-
didisque: Radice tenui mini-
mè geniculata.



Aaa 4 GRAMEN

GRAMEN Parnasi, vulgo vnifolium. Græcis, ἀγρωσις ἢ ἐν παρνασῷ. Italis, Gramigna de Parnaso. Germanis, Einblat.

GRAMEN PARNASI.

FORMA.

DIOSC. Densius hoc fruticat, folijs hæderaceis, flore odorato, candido, semine paruo, non inutili: radicibus quinis, aut senis, digitali crassitudine, candidis, mollibus, & admodum dulcibus.

LOCVS.

Idem. Prouenit in monte Parnaso.

QUALITATES.

Galen. 8. Semen desiccatorium, tenuium partium, & subacereum est.

VIREs.

DIOSC. Succus cum pari melle, & myrrhæ dimidio decoctum, adiectis piperis, & thuris tertijs portionibus, probatissimum erit oculorum medicamentum: præsertim si in ænea pyxide recondatur. Decoctum radicis idem, quod herba præstat. Semen vehementius urinam impellit, aluum vomitionesque sistit.



GRAMEN

N O M I N A.

745

GRAMEN aculeatum, Italis, *Gramigna spinosa*. Græcis, ἀγρωσις ἀχύνθιδης.

GRAMEN ACULEATVM.

F O R M A.

Folia, caules, radices primi *Matth.* graminis modo profert. In caulibus tamen singulis è folijs, aculei peculiariter exeūt, triplici apice constantes, ac suis nixi pediculis, tribulorū terrestrium instar.

L O C V S.

Prouenit inter rudera, & *Idem.* in muris vetustate collapsis.

Q V Á L I T A T E S,
E T V I R E S.

Vires easdem habet, qui- *Idem.* bus pollet primum graminis genus.



Aaa s

SIDERI-

GRAMEN

SIDERITIS, Græcis, Σιδερίτις. Arabibus, Sidrichis. Italis, Siderite. German.
Wasserandorn.

F O R M A.

DIOSC. Folia habet Marrubij, sed longiora, satis ad frondem quercus, aut saluæ accedentia, minora tamen, & aspera. caules edit quadratos, dodrantes, aut etiam maiores, non iniucundi gustus, aliquantum substringentis, in quibus per interstitia orbiculatæ vertebrae, ut in marrubio spectantur, & semen in eis nigrum.

L O C U S.

Idem. Nasceitur in petrosis locis.

Q U A L I T A T E S.

Gallib. s. Habet quidem etiam absimp. me. stergendi quandam facultatem, sed plurima eius pars humida est, & mediocriter frigida, paucula verò inest adstrictio, quare phlegmonem sedat, & glutinat.

V I R E S.

DIOSC. Illita folia, suapte vi vulnera sine inflammationis periculo iungunt.

S I D E R I T I S.



A N N O T A T I O.

Cum hæc planta humectis, ut plurimum, nascatur locis, non ausim eandem affirmare, legitimam esse primi generis sideritim, & si ceteræ correspondeant notæ. Quo factum est ut sequentem deinde legitimam crediderim, esse primi generis sideritim.

SIDERT-

German.

NOMINA.

747

SIDERITIS vulgaris. Germanis, Zeisigkraut.

SIDERITIS VULGARIS.



FORMA.

Exit hæc caule quadrato, dodrantali, aut maiori, ramo-
loque, folijs marrubio lógio-
ribus, ad saluæ faciem acce-
dentibus, crispis, albicanti-
bus, sapore haud ingrato: flo-
ribus verticillatim in caule
summo prodeuntibus colore
palescente.

LOCVS.

Nascitur aridis locis.

QUALITATES,
ET VIRES.

Eadem illi sunt vires, quas
primo sideritis generi tribuit
Dioscorides, & Galenus.

VIRGA.

eandem
pondeant
ille primi

DERI-

VIRGA aurea. Italis, *Virga aurea*, quibusdam herba Iudaica, siue Pagana. Germanis, Heydnisch Wundkraut.

VIRGA AVREA.

F O R M A.

Matth. Caulem edit bicubitalem, subrusum, læuem: folia oliuæ latiora, circum minutissimè ferrata, flores in caulium fastigijs aureos, ac spicatos, qui flauescerent in pappos diffiliunt.

L O C V S.


Idem. Nascitur in collibus, in agrorum marginibus, & vineis.

Q U A L I T A T E S.

Idem. Subamara est, absterforiæ facultatis, ac glutinatoriæ.

V I R E S.

Idem. Additur vtiliter tota planta in vulnerum intrinsecorū potionibus: vulnera quæcunque glutinat: calculos comminuit, & vrinam ciet. Pota aut infusa alui fluxiones cohibet: eius decocto sanantur foris vlcera.



* VIRGA

NOMINA.

749

*VIRGA AVREA folijs non ferratis.

FORMA.

Folia habet minora & sine
crenis vel saltem minus con-
spicuis, reliqua non differunt
à priore.

LOCVS.

Nascitur in opacis & me-
morosis saltibus.*



ACHIL.

ACHILLEA, Græcis, *Αχιλλεύς*. Arabibus, *Sichritis*, seu *Egilos*. Succus verò *Damalo chotten*. Italis, *Achillea*. Germ. *Grosse Garben / Schaffrip*.

ACHILLEA.

FORMA.

DIOSC. Scapos gerit dodrantes, aut maiores, fusorum effigie, minutulis folijs circūdatos, ex obliquo crebras incisuras habentibus, Coriandri similitudine, subflauo colore, lentis, odore non insuauis, verū medicato, umbella in cacumine rotunda, floribus candidis, purpureis, & aurum æmulantibus.

LOCVS.

Idem. Prouenit lato solo.

QUALITATES.

Galen. 8. Viribus est Sideritis non dissimilibus, ceterū adstrictione exuperat. quare ad sanguinis eruptiones, dysenterias, & muliebri profluuium conuenit.



VIRES.

DIOSC. Trita coma sanguinolenta glutinat, & ab inflammationum periculo tueretur. Erumpentem sanguinem inhibet, & exvellere subdita, cruenta vulnæ profluua: bibitur ad dysenteriam vniuersæ plantæ decoctum, in quo etiam insident fœminæ vteri profluuiio laborantes.

RVBVS,

NOMINA.

751

RUBUS, Græcis, *Báros*. Mauritanis, *Buleich*, seu *Haleich*. Italis, *Roma*. Germ.
Bramen. Hisp. *Carza*. Gallis, *Ronce*. Fructus, Latinis, *Mora Rub.* Græcis,
Batira n *βατρία*. Italis, *Mora di Roma*. Germanis, *Brambeer* & *Krasbeer*.

RUBUS.

GENERA.

Plura rubi repertiūrgene *Theoph.*
ra, aliud.n.exit arboris instar. *lib. 3. de*
 Aliud sepibus frutetisq; im- *plan. hist.*
 plicatur. Aliud humi serpit,
 radicatorq; graminis modo.
 Aliud denique alijs modis in
 montibus, & sylvis vagatur.
 Cæterum nobis duorum tan-
 tum generum meminisse sat
 fuerit, nepe vulgaris, & Idei.

FORMA.

Qui passim in sepib. & fen- *Matth.*
 tetis nascitur, virgas edir qua-
 drangulas subrubentes obte-
 quiolas, aduncis ubiq; aculeis
 refertas. Eramulis pediculi ex-
 eunt aculeati, è quibus terna
 prodeūt folia fragariae herbæ
 æmula, sed aspera, & in acutā
 definentia, dorso aversa parte
 aculeato. Flores profert race-
 mosos, albicantes, è quibus
 mora oriuntur. Radix illi est
 graminis modo repens.

LOCVS.

Nascitur in sepibus, dume- *Idem.*
 tis, frutetisque.

QUALITATES.

Folia, germina, flos, fructus, & radix qualitate adstringente participant, ea- *Galen. 6.*
 que non obscura. Atqui folia recenter nata plurimum in se habent substantiæ *simp. me.*
 aquæ, parum verò adstrictionis, eadem ratione, & germina. Fructus immatu-
 rus acerbus est, & valde exiccatorius: maturus verò non parum habet calidi
 temperati. Flos viribus est immaturi fructus. Radix cum adstrictione tenuium
 est partium, quare renum calculos comminuit.

VIRES.

Ramorum decoctū potum, aluum stringit, & fœminarū profluvia: capillos *Diosc.*
 tingit, folia cōmanducata gingiuis, & oris virijs medetur. Serpentiæ vlcera co-
 hibent, & quæ in capite manant. Ulinuntur quoq; condylomatis, & hamor-
 rhoidibus. Eadem trita cardiaca, & stomachi doloribus vtiliter admoventur.
 Flores ex vino poti aluum sistunt.

RUBUS.



RVBVS IDÆVS, Græcis, *ῥάβος ἰδαία*. Italis, *Roumontano*. German. *Himbeer/*
vel. Hoolbeer/Item, Doctbeer.

RVBVS IDÆVS.

F O R M A.

Matth.

Est altero longè clemen-
tior. Folia p̄fert latiora, mol-
lioraq̃, virgas rotundas, fra-
giles, spinis nullis, aut omni-
no raris. Flores albos, alterius
æmulos. Fructus rubi mora
per omnia referunt: cæterum
differunt quòd hi teneriores,
mollioresq̃, habeantur: sapo-
re, cum dulcedine quadam
insipida, adstringente, non ta-
men iniucundo, rubicundo
colore. * Nonnunquam fla-
uescente vel penitus albo. *
Tridentina rura, hæc mora
vocant Ampomele, & frago-
rum vice ijs vescuntur.

L O C V S.

Idem.

Prouenit copiosus in mon-
tibus.

Q U A L I T A T E S,
E T V I R E S.*Diosc.*

Eadem præstat, quæ supra dictus. Illinitur flos cum melle oculorum colle-
ctionibus. Ignem sacrum extinguit: stomachicisq̃, ex aqua bibendus datur.

HE LXI NE



HELXINE cissampelos, Græcis, Ελξίνη κισσάμπηλος. Italis, *Vilucchio minore*.
Arabibus, *acfin*. Germanis, *Mittel Winde*. Hispanis, *Campanelayerua*.

HELXINE CISSAMPELOS.



FORMA.

Folijs est hederæ minori- *DIOS.*
bus, ramulis exilibus, longis, *Matth.*
quibus complectitur quod-
cunque contigerit adminicu-
lum. Flores edit albos, læui
tamen purpura perfusos, ca-
lathi figura, è quibus semen
oritur nigrum.

LOCVS.

Nascitur in sepibus, vineis, *Idem.*
ac legetibus.

QUALITATES.

Digerendi facultatem ha- *Galen. 6.*
bet. *simp. me.*

VIRE S.

Foliorum succus potus al- *DIOS.*
uum deijcit.

Bbb

ELATINE,

ELATINE, Græcis, Ελατίνη. Arabibus, *Atbin*. Italis, *Elatina*.

ELATINE.

FORMA.

DIOSC. Folia habet Helxine similia, minora tamen, rotundiora, pilosa, tenuibus & dodrantalibus ramulis, quinis, senisve, à radice, foliosis, gustu adstringentibus.

LOCVS.

Idem. Nascitur in segetibus, & cultis.

QUALITATES.

Galen. 6. Modicè tum refrigerat, tū
simp. me. adstringit.

VIRES.

DIOSC. Oculorum fluxionibus, inflammationibusque auxiliantur folia cum polenta trita. Eadem cocta, forbitionis usu, dysenteriam sistunt.



Nympha-

NOMINA.

755

NVMVLARIA, siue Lunaria minor. Italis, *Lunaria minore*. Gerin. *Egelstrauch*
Pfenningkraut.

NVMVLARIA.



FORMA.

Serpit hæc humi, iunceis *Matth.*
cauliculis, cubito longiori-
bus, in quibus à radice ad sum-
mum, breuibus interstitijs v-
trinque folia exeunt, crassius-
cula, rotunda paruorum num-
morum instar, vnde illi no-
men: flores fert aureos, ac
speciosos.

LOCVS.

Nascitur in scrobium ri- *Idem.*
pis, & vlginosi aggeribus se-
cus vias.

QUALITATES.

Glutinandi, cohibendi que *Idem.*
facultate prædita est.

VIREs.

Herba ipsa illita, recentia *Idem*
vulnera glutinat. Idem præstat eorum succus. Præcipua autem vis eius est, ad
puerorum enterocellas, cum illita, tum in puluerem hausta.

Bbb 2

EVFATO-

EVPATORIUM, Græcis, Ευπατόριον. Officinis, & Italis, Agrimonia. Arabib.
Casat, Cifit, seu Gafet. Gerin. Odermeng. Hisp. Agramonia. Gallis, Agremoine.

F O R M A.

E V P A T O R I U M.

Diosc. Fruticosa est herba, vnicum
efferens caulem, lignosum, ni-
gricantem, rectum, renuem,
hirsutum, cubitalem, inter-
dum ampliorem, folijs per in-
terualla quinquefolij, aut câ-
nabis similibus, quinque par-
tito, aut amplius diuisis, nigri-
cantibus, & per ambitum ser-
ratis. Semen medio caule e-
rumpit, pilosum, deorsum
spectans, quod siccatum ve-
stibus inhæret. Flores gerit
spicatos, aureos, radicem li-
gnosam, subrubram penta-
phylli modo.

Matth.

L O C V S.

Idem. Nascitur secus sepes, itine-
raque, in agrorum margini-
bus, & incultis locis.

Q U A L I T A T E S.

Galen. 6. Tenuium est partium, in-
simp. me. cidendi, extergendiq; faculta-
tem, citra manifestam calidi-
tatem obtinet, quo circa ob-
structiones hepatis expurgat:
inest ei & adstrictio modica,
propter quam robur visceri additur.



V I R E S.

Diosc. Folia contrita & cum suillo adipe imposita, vlceribus cõrumacibus meden-
tur. Herba, aut semē in vino potum, dysenteria, iecinorijs vitijs, & serpentium
Matth. ictibus liberat. Iocinorosos iuuat decoctum potum. Idem ex vino albo para-
tum, cum saccharo sex vnciarum pondere tribus diebus potum, mirificè stran-
guriā sanat, & vrinas impellit. Additur herba in potionibus, quæ ad intrin-
seca parantur vulnera.

EVPATO-

EUPATORIUM vulgare, Officinis, *Eupatorium Avicenna*. Italis, *Eupatorio*.
Germanis, *Künigunde Kraut*.

EUPATORIUM VVLGARE.



F O R M A.

Caulem edit tricubitalem, *Marth.*
subrubrum, rotundum, folia
cannabis, sed maiora, albi-
cantia, hirsuta, amaro gustu,
odore medicato, non insuauis.
Flores exeunt in summitati-
bus, in umbellis subpurpu-
rascentes, qui flaccescentes
in pappos abeunt. Radix mul-
tifida illi est, sed superuacua.

L O C V S.

Nascitur vlgiginosis locis, & *Idem.*
in scrobium aggeribus.

Q U A L I T A T E S.

Excalfacit, siccit, abstergit, *Idem.*
incidit, aperit, & subtilium est
partium.

V I R E S.

Præstat foliorum decoctū *Idem.*
iocinoris doloribus, ac cate-
ris eiusdem affectibus ab ob-
structione prouenientibus:
quin etiam lienis tumoribus,
& obstructionibus. Datur i-
dem diutina febre laboranti-
bus. Urinas & menses pellit, scabiem, & pruritum sanat, præsertim cum fuma-
ria, & caprino sero, sed succus fortior est. Is itaque potus incipienti elephan-
tiæ medetur. Flores illiti vulnera recentia, & vlcera sanant: succus drachma-
rum duarum pondere in catapotijs sumptus, intestinorū vermes necat: Dan-
tur folia vtiliter pecoribus tussientibus, & anhelosis equis.

Bbb 3 POTENTIL-

POTENTILLA, quibusdam Anserina. Italis, *Potentilla*. Germanis, *Genserd*
sive Brensing. Gallis, *Agrimoine sauvage*.

P O T E N T I L L A.

F O R M A.

Matth.

Folij exit agrimonie proximis, hirsutioribus, prona parte virentibus, supina verò albicantibus. cauliculos fundit humi repentes, è quibus aurei prodeunt flores: Radice constat exterius subrufa, interius verò candicans, auste rogu, & adstringenti.

L O C V S.

Idem.

Nascitur humecto solo.

Q U A L I T A T E S.

Idem.

Refrigerat, siccatur, adstringit, repellit, roborat.

V I R E S.

Idem.

Feminarum profluvia, & dysenterias cohibet, ac cæteras alui fluxiones. Datur utiliter sanguinè reijcientibus. Herba decoctum ex vino paratum, præstat potum ad intestinorum tormina, & dorsi dolores. sicca farina ex sua ipsius aqua stillatitia pota, albas vteri fluxiones cohibet, sed valentius, addito corallio, & ebore. Datur ad enterocellas, & bubonocellas. vulnera recentia, & oris, pudendorumque vlcera sanat: ex acero decocta. colluitur utiliter ad commotos dentes: & laxas gingivas, dentiumque dolores mulcet, & prolapsam columnellam restituit, addito aluminis momento.



Q V I N Q V E.

QUINQUEFOLIUM, Græcis, Πεντάφυλλον. Italis, Cinquefoglio. Germanis, Fünffingerkraut. Hispanis, Cinco enrama. Gallis, Quintefueille.

QUINQUEFOLIUM.

G E N E R A.

Plura quinquefolij exant *Matth.* genera, colore, ac magnitudine differentia.

F O R M A P R I M I.

Ramulos fert festucarum *Diosc.* similitudine, tenues, dodrantales, in quibus semen: folia menthae, quina singulis pediculis, in ambitu serrata: florē ex candido pallescentem, auriculatum, subrubram habet radicem, oblongamq; nigro veratro crassiore.

L O C U S.

Nascitur in riguis & aqua- *Idem.* rijs ductibus.

Q U A L I T A T E S.

Radix vehementer desic- *Galen. 8.* cat: nimirum verò acris est, & *simp. me.* cum sit tenuium partium citra morsum desiccatur. Radix enim desiccatur ordine quodammodo tertio, minimum habens euidētis caliditatis.

V I R E S.

Radicum decoctum, collu- *Diosc.*

tione, dentium dolores sedat, & vlcera putrida sistit, arteria scabritias gargari-
zatu leuigat. Dysenterias, & ceteras alui fluxiones cohibet, quin etiam articu-
lorum coxendicumque cruciatus potu tollit. Coctæ in aceto, & illitæ, serpen-
tia vlcera reprimunt. Strumas, tumores, duritias, abscessus, & collectiones
discutunt. Ignes sacros, & condylomata sanant. Teneræ radices succus, ioci-
noris, & pulmonum vitij medetur. pollet etiam aduersus venena: folia trice-
nis diebus pota, comitiales iuuant. Eorundem succus tribus cyathis diebus ali-
quot potus, celerrimè regio morbo medetur. Ex melle, faleque illita, vulneri-
bus, & fistulis auxiliatur. Medetur etiam enterocellis. Tota planta, & potu, &
illitu, sanguinem inanantem sistit.

Bbb 4

QUINQUE-



iones co-
& bubo-
acero de-
tiumque
iis mo-

NOVE

F O R M A.

Folia minora profert, angustiora & magis laciniata, incana tota; cauliculos erectos, in quibus flores lutei alterius similes sed minores. Radix rubranigricat, & alte descendit sapore ceu glandium astringente.

L O C V S.

Nascitur in aggeribus, & secus arua, macro solo.

Q U A L I T A T E S,
E T V I R E S.

Eadem illæ quæ priori.*



QVINQVE-

NOMINA.

761.

QUINQUEFOLIUM album, Græcis, Πεντάφυλλον λευκόν. Italis, Cinquefoglia,
bianco. Germanis, Weiß Fünffingerkraut.

QUINQUEFOLIUM ALBUM.

FORMA.



Folij est incanis, hirsutis, *Matth.*
per ambitum sensim denti-
culatis, quinis ex vno quo-
que pediculo, dependenti-
bus cauliculis mollibus, ob-
sequiosisque, flore candido,
radice squamosa, agnatis ex
obliquo prodeuntibus.

LOCVS.

Nascitur in saxis ingenti- *Idem.*
bus, & saxosis locis.

QUALITATES.

Adstringit, siccatur, robo- *Idem.*
rat, repellit: Radix subtili-
um est partium.

VIRE.

Ea omnia præstare potest *Idem.*
quæ alterum, quo tamen ad-
stringentior est.

Bbb. s.

* QUIN-

* QVINQVEFOLIUM palustre fragiferum, vel Heptaphyllum porphyranthemum. Germanis, *Benßtraut* / *Sibenfingertraut*.

QVINQVEFOLIUM
PALUSTRE.

FORMA.

Oblongis quasi sarmentis se propagat serpitque per vliginem, angulosus nonnihil & striatis nigris, in quibus ramuli nascuntur & folia pentaphylli quina interdum sed ut plurimum septena, subtus cinericia, superiore parte virentia, Floret per æstatem: flosculus cõponitur ex quinque aut sex folijs atrotubentibus, & paruo capitulo medium obtinente, cinctoque staminibus purpureis. Hoc subinde increfcit augeturque donec magnitudinẽ fragi ferre attingat, cui & figura & colore simile fit, nullo intus succo. Radicibus nititur longis, tenuibus, nigricantibus & in geniculis fibratis.



LOCVS.

Nascitur vliginosis, putridis & macris pratis.

QUALITATES.

Astringit tota herba, præsertim fructus. *

DIAPEN-

DIAPENSIA, siue Sannicula. Italis, *Cinquefoglio maggiore*. Germanis, *Sannicel*.

DIAPENSIA.



FORMA.

Folia profert quinquefo- *Matth.*
lij maiora, vitiginea specie,
cauliculis rotundis, gracili-
bus, obsequiosis, in quorum
summitate, & adnatorum fa-
stigijs capitula prodeunt sub-
albida, fragorum figura: Ra-
dicibus constat numerosis,
gracilibusque.

LOCVS.

Nascitur in montibus, & *Idem.*
syluosis collibus.

QUALITATES.

Refrigerat, & secat, cohi- *Idem.*
bet, reprimat, glutinat, &
roborat.

VIREs.

Vniuersæ plantæ deco- *Idem.*
ctum, datur potandum ad in-
trinfeca vulnera sananda, fistulas, & enterocellas. *Idem* quoque præstat fo-
liorum, & radicum farina.

*SANICV-

* *SANICVLA alpina*, siue guttata quibusdam. Italis, *Vmbilicu Veneris*. Septentrionalium alijs, *Hepatica montana*. Valchij, *L'herba Sante Condria*, vel sans *Contura*. Germanis, *Wilde Schelkraut* / oder *weiß Sanickel*.

SANICVLA ALPINA.

FORMA.

Elegans est planta, floribus albis, qui guttulis asperguntur sanguineis, figura quodammodo Hyperici floribus correspondentes, cui & semen simile est, caulis hæc sustinet sesquipedalis, cui folia subsunt hederacea, rotunda, crenato ambitu, prona parte candidiora utraque hirsuta nonnihil exiguis pilis candidis, qui tamen cultura penè evanescent, radix interdum minimi digiti longitudinem æquat, crassiuscula, subrufo colore.

LOCVS.

Crescit copiose in monte Iura & monte Mola, locis umbrosis & humidioribus. Reperitur etiam in montanis Pannoniæ.

QUALITATES,
ET VIRES.

Astringit & ferè insipida est. Ex parte prona folij cutem decorticant, & sic vulneribus illud imponunt. Eliciunt aquam è planta minutim concisa ad glutinanda vulnera, aut in pulueres redigunt flores, itemq; folia & vlcibus vulneribûsq; inspergunt.*

FRAGA-



FRAGARIA, Italis, *Fragolaria*: Fraga verò, Italis, *Fragole*, & *Fraghe*. Germanis, Erdbeer. * *Fragaria sylvestris* vel montana. Germanis, *Bergelderbeer*. *

FRAGARIA.

FORMA.



Planta est humi repens, fo- *Matth.* lijs pentaphylli maioribus, ternis ex vno pediculo prodeuntibus, & per ambitum serratis: floribus candidis, rubi æmulis, è quibus fraga oriuntur: cauliculos habet tenues, hirsutos, obsequiososque: radices habet numerosas, & tenues adstringentis gustus. * Sylvestrior exigua est herbula, & strigiosior tota, fructu minore & minus sapido rubro. *

LOCVS.

Proueniunt in montibus, *Idem.* collibus, syluis, secus itinera, & prope sepes.

QUALITATES.

Refrigerat excessu primo, *Idem.* & siccat secundo.

VIRES.

Folia, & radix vulnera, & vlcera sanant, muliebres fluxiones, & dysente- *Idem.* rias cohibent. urinam cient, & lieni conferunt. Eorundem decoctum potum præstat ad iocinoris inflammationes, & ad renum vesicæq; sordes. *Idem.* in ore contentum gingiuas roborat, commotos dentes stabilis, & destillationes sistit: At fraga, præter id quod æstate deuorata maximè placent, biliosis, æstuantibusque ventriculis præfunt, siticulosisque opem ferunt. Vinum quod ex eis elicetur, vlcusculis faciei mirificè medetur, illitum. quin & varos, & oculorum fluxiones calidas impositum tollit.

* FRAGA

FORMA.

Priori similis herba sed minor & magis cana, hos fructus profert, qui colore solo à præcedentis Fragariæ fructu differunt.

LOCVS.

Rarior est quam superior, & propterea ad hortorum cultus expetitur. Nec dubium est, alicubi sponte nasci & ijsdem locis gaudere quibus vulgatio. *



EVFRA-

N O M I N A.

767

EVFRAGIA, Italis, *Eufragia*. Germanis, *Augentrost*. Gallis, *Eufraise*.

E V F R A G I A.

F O R M A.

Tenuis est planta ad spithamæ altitudinem assurgens, folijs minutis, crispis, & per ambitum crenatis, gustu adstringentibus, & subamaris. caule tenui, rubentique: flore inter purpuram, & aurum albicante, quem mittit in fine æstatis. *Matth.*

L O C V S.

Nascitur in pratis, & in syluis.

Q U A L I T A T E S.

Excalfacit parum, siccatur magis, abstergit, & cohibet.

V I R E S.

Præstat tam in cibis, quam in medicamentis sumpta, cum recens, tum sicca, ad omnia oculorum impedimenta, & præsertim cum in cibis, aut potu sumitur diutius. Vinum ex ea paratum idem præstat potum. Eius enim usu senum oculi reuiuiscunt. visus mirificè acuitur. & cæcipientes ad lucem redeunt, & præcipuè in pinguibus, & pituitosis corporibus, hæc omnia præstat.

P H O E N I X,



PHOENIX, Græcis, φοινῖξ. Quibusdam lolium murinum: Italis, *Gioglio saluatico*. Germanis, *Daubenweiss/Weusforn*. Gallis, *Turaye sauvage*.

P H O E N I X.

F O R M A.


DIOSC. Folia habet hordei sed breviora, & angustiora, spicam lolio similem, calamos senum digitorum, radici aduolutos, septenas, octonave spica.

L O C V S.

DIOSC. Nasceitur in aruis, tectis, recenter illitis, & secus itinera.
Matth.

Q U A L I T A T E S,
E T V I R E S.

Ex vino austero pota alui profluuium, & mensium abundantiam sistit: vrinæ impetus cohibet, in puniceo vellere adalligata: collo suspensa (vt aiunt) sanguinem manantem sistit.



R H O D I A

RHODIA radix, Græcis, Ροδία ριζα. Italis, Radice rodia. Germanis, Rosen-
wurq.

RHODIA RADIX.

F O R M A.

Caules mittit teretes, cu- *Marth.*
bitales, folijs vbiq; stipatos,
longiusculis, in acutum desin-
nentibus, portulacæ, seu mi-
noris seti instar pinguibus,
minutim per ambitum serratis.
Umbella in cacumine vi-
ridi tithymali cyparissæ mo-
do. Radix ei inæqualis, stru-
mosa, crassa, lævi cortice ob-
ducta, splendescens. Substan-
tia intus subrufa, rosarum o-
dore. Radix est omnium vi-
uacissima. Siccis enim locis
mensibus pluribus asseruata,
& deinde sata, statim repulu-
lat.

L O C V S.

Nascitur in altissimorum *Idem.*
montium rupibus, saxosis, ac
præruptis locis.

Q U A L I T A T E S.

Tenuium est partium, & *G. le. 8.*
discentientis facultatis, in ca- *simp. me.*
lesaciendo verò, secundi re-
cellus censenda est, aut certè
tertij incipientis.

V I R E S.

Vtilissima est, capitis doloribus, si madefacta fronti ac temporibus, cum ro- *Diosc.*
facei momento imponatur. Vbi aut dolor à calida prouenerit causa, tula, & *Marth.*
rosacea aqua madefacta imponi debet. vbi verò à frigida, ex amaraci aqua illini
præstabit.

Ccc

Eqvi-

EQVISETVM, Græcis, *ἰσῆς*. Arabibus, *Dhemb alchil*, *Dhemb alchi*, *sive Damb alchail*. Italis, *Coda di Cavallo*. Officinis, *Cauda equina*. Germ. *Rosßchwanz*. Hispanis, *Coda de mula*, *sive Rabo de mula*. Gallis, *Queue de Cheval*, *sive Frela*.

EQVISETVM.

GENERA.

Matth. Aliquot nobis sunt genera.

FORMA PRIMI.

Profert cum primum è terra erumpit quoddam tenerimum germen oblongum, inglandum iulo non ablimile, subnigricanti colore. & deinde caules inanes, geniculati, subrubefcentes, leniter scabri, iuncea circa eos coma, aspera, exilis, setarum instar. adeo ut equorum instar caudæ appareat. Radicem lignosam, duram.

LOCVS.

Idem. Nascitur aquosis, & humidis locis, in riguis, & scrobibus.

QUALITATES.

Gale. 6. simp. me. Adstringentem cum amaritudine facultatq; possidet, ac proinde valenter simulq; citra mordacitatem exiccantem. Itaque vulnera maxima imposita conglutinat, etiam si præfectos nervos esse contingat.

VIRE.

Diosc. Herba succus sanguinem è naribus erumpentem sistit: prodest dysentericis ex vino potus: urinam ciet. Trita folia, & illita sanguinolenta vulnera glutinat. Radix cum sua herba tussim, orthopneam, ruptaq; adiuuat. Folij in aqua potus, dissectiones vesicæ, & intestinorum, enterocellæq; in vnum coalescere, cogque ferunt.

EQVISE-



NOMINA.

771

EQUISETVM alterum, Græcis, ἰσσογίς ἐτέρα. Italis, Coda di Cauallo minore.

EQUISETVM SECVNDVM.

FORMA.

Caulis est rectus, cubito DIOSC.
maior, inanis: comis per in-
terualla breuioribus, candi-
dioribus, & mollioribus.

LOCVS.

Prouenit humectis locis, Matth.
& viginosis pratis.

QUALITATES ET
VIRES.

Valer ad omnia, ad quæ GE- DIOSC.
nus alterum.



Ccc 2

EQUI-

EQUISETVM tertium, Græcis, *ἰσσοειδὲς τρίτον*. Italis, *Coda di Cavallo*.

EQUISETVM TERTIVM.

FORMA.

Matth. Caulem edit geniculatum, striatumque, inanem, fragilen, à quo complures oriuntur rami. Eripi quoque geniculati, ac asperi, nulla circumstante coma.

LOCVS.

Idem. Prouenit & hoc palustri solo.

VIRE.

Idem. Iisdem cum alijs poller viribus.



COCVVM

Coccum infectorium, Græcis, Κόκκος βαρυνκός. Arabibus, Charmens, seu Kermes. Italis, Grana da tingere. Germanis, Scharlachbeer. Hispanis, Grana per atennir, seu grana in grano. Gallis, Vermillon.

C O C C U M I N F E C T O R I U M.



F O R M A

Frutex est surculosus, folijs Matth. oblongis per ambitum aculeatis aquilij modo, sed longè minoribus, baccis rotundis, inanibus, puniceo colore.

L O C U S.

Gignitur in Galatia, Armenia, Asia, Cilicia, Hispania. Matth. Nascitur etiam in Cilicia è quercu. Quin etiam in Polonia, & Boemia, è quercubus legitur.

F A C U L T A T E S.

Adstringentem, simulque Gale. 7. amaram facultatem possidet: simp. me. vtraq; sine morfu desiccatur.

V I R E S.

Vulneribus nervisque præ-diosc. cisis convenienter ex aceto Matth. tritum illinitur. Baccharum pulvere feliciter utuntur Itale mulieres ad forum roborandum, & abortum prohibendum ipsum ex ovo sorbili prægnantibus propinantes, addito thuris, aut masticeis momento.

C E N S U R A.

Non rectè sentiunt, qui Coccum infectorium, & Chermesinum idem faciunt.

Ccc 3

* Cocc-

* COCCIFERA ILEX, a. flos separatus, b. ramus cum coccis.

COCCIFERA ILEX.

F O R M A.

Præterea habentur nonnulla in ea notatu digna. Primum maximæ glandes, maiores quam aliarum Ilicum, cuius cupulæ etiam asperiores, proueniunt in autumnno. Postremo quædam genera excrementorum, si ita liceat vocare. Vnum quod ante alia prouenit, Mense Aprili & Maio, grana sunt in folijs rubra, partim rotunda, partim oblonga, ex ipsa fere substantia foliorum facta, pilorum paruorum magnitudine, quarum substantia intus alba est, non dissimilis multum à substantia fructuum oxyacanthæ, gratè gustu, non nihil velut acidi habentes, in quibus tandem nascitur vermiculus, suntque talia excrementa huius arboris parua, vt Gallæ in Quercu. Est secundum excrementum, rotundum, nigrum, exterius pellucens, satis durum, intus liquorem album habens cum vermibus, quod tandem inarescit, vt plurimum, sic ramis copiosè adhærescit satis leuiter. Circa eas baccas, vt sic dixerim, saepe formicæ copiosè conglomerantur. Hoc etiam excrementum reperitur in maiore ilice, prouenit mense Maio. Huic simile in omnibus coccum tinctorium quod eodem tempore prouenit. In hoc differt, quod grana siue bacca sint rubra, si saltem abstergatur puluis albus, quo asperguntur, liquore item tubeo, scatentq; vermibus rubris, vnde Gallice Vermillon. Præterea non solet prouenire nisi in minore ilice, nec tanta copia, vt alia excrementa.*



P I M P L.

PIMPINELLA, seu saxifraga hircina, Italis, *Sassifraga di becco*. Germanis, *Wibernel*.

PIMPINELLA SAXIFRAGIA.

GENERA.

Duo eius habentur genera, *Matth.*
Maius & minus.

FORMA.

Maiores radice nititur longa, *Idem.*
folijs, quæ ad radicem sunt,
humis accubantibus, pluribus
ex vno pediculo utrinque emer-
gentibus, & per ambitum ser-
ratis: caule quadrangulo, flo-
ribus in umbella candidis. Ra-
dix illi longa digitali crassitu-
dine, hircum quadatenus re-
dolens, acris sapore.

LOCVS.

Nascitur in montibus, col. *Idem.*
libus, & pratis non viginosis.

QUALITATES.

Radix, in qua vis tota con- *Idem.*
sistit, exalfacit, siccaturque ordi-
dine secundo completo, aut
tertio incipiente, aperit, pro-
uocat, attenuat, digerit, in-
cidit.

VIRES.

Utriusque radix præstat ad renum, & vesicæ incommoda: calculos enim in *Idem.*
renibus genitos frangit, & eiecit: urinas pellit. succus radicis ex meraco hau-
stus, præstat contra deleteria medicamenta, & virulentorum animalium ictus.
Quare non desunt, qui radices etiam contra pestilentiam miris laudibus effe-
rant.



F O R M A.

Minor cognomento facile suam à maiore differentiam ostendit, radice tenuiore simplici prolixaque vermem imitatur. Folijs caule floribus & colore præcedenti similis est, & magnitudine tantum ab illa vincitur, interdum etiam costæ rubescunt & cauliculi. semen paruum Ammi refert. Huius varietas observatur alicubi in folijs quæ minutissime laciniantur, ut Carifolia, ut rudioribus facile imponant, ne pro pimpinella hanc agnoscere possint, Flosculi quoque nonnunquam prorsus rubescunt.

L O C U S.

Locis arenosis exit, & montosis, ac rimis petrarum innasci gaudet.



Q U A L I T A T E S.

Acrior est & valentior maiore, id quod sapor manifestus arguit. *

PIMPI-

PIMPINELLA Sanguisorba. Italis, *Pimpinella*, seu *Sorbastrella*. Germanis, *Hergotts Wärtlin*. Gallis, *Pimpinelle*.

PIMPINELLA SANGVISORBA.

G E N E R A.

Duum est generum: Maius, *Marth.* & minus.

F O R M A M I N O R I S.

Folijs prouenit ab vna ra- *Idem.*
dice numerosis, compluribus
ab vno tenui pediculo vtrin-
que prodeuntibus, subrotun-
dis, pusillis, vbique in ambitu
crenatis, firmis, humi in or-
bem accubantibus, adstring-
enti gustu: cauliculos edit
plures, tenues, subrubentes,
rotundos dodrantes, atque
maiores, in quorum summi-
tatibus capitula exeunt squa-
rosa, subpunico colore. in
quibus semen. Radice nititur
lignosa subrufescente, adstring-
entis gustus.

L O C V S.

Nascitur in agris non cul- *Idem.*
tis, in collibus, & seritur in
hortis.

Q U A L I T A T E S.

Degustata adstringit, sed mansa lentoris copiam fundit, glutinat, siccatur, re- *Idem.*
soluit & cohibet.

V I R E S.

Sistit pota tubra, albaq; sceminarum profluvia, dysenteriam, & ceteras alui *Idem.*
fluxiones: biliosas vomitiones cohibet, sanguinis reiectiones sistit: vulnera, &
vulnera sanat: vnguentis quoque vtiliter miscetur, quæ tum ad capitis vulnera,
tum ad carcinomata parantur. Natat sæpe in poculis vino repletis, quod gra-
tiam quandam, iucunditatemq; potantibus afferat.

Ccc 5

PIMPI-



Matth. PIMPINELLA, seu Sanguisorba maior. Italis, *Pimpinella*, seu *Sorba*, *rellamag-*
giore.

SANGVISORBA, SEV PIMPINEL-
LA MAIOR.

FORMA.

Idem. Facie ab altera non differt,
nisi quod maior sit omnibus
suis partibus, & folia longio-
ra, latioraque proferat: cau-
les prociores, & capitula
crassiora, oblongioraque.

LOCVS.

Idem. Prouenit in pratis, pascuis,
& inculto solo.

QUALITATES, ET
VIRE.

Idem. Viribus iisdem prædita est,
quibus & minor.



TRAGVM,

TRAGVM, Græcis, Τράγος ἡ σκῆπτρον. Italis, Trago.

TRAGVM.

FORMA.

Planta est dodrantalis, aut DIOSC.
amplior, fruticosa, humilis,
oblonga sine folijs, pusillis
circa ramos acinis, rufis, mul-
tis, tritici magnitudine, acuto
cacumine, gustu admodum
adstringente.

LOCVS.

Nascitur maximè in mari-
timis. *Idem.*

FACULTATES, ET
VIRES.

Baccæ gustu sunt admodum
adstringenti. *Idem.* Racemorū bac-
cæ decem, ex vino potæ, cæ-
liacis, & fæminis fluxione
vulvæ laborantibus auxilian-
tur.

LYNCVS,



IUNCUS, Græcis, *Ἰνκός*. Italis, *Giunco*. Germanis, *Vingen/Schmelen*. Hispanis, *Iunco*. Gallis, *Ionc*.

IUNCUS.

G E N E R A.

DIOSC. Duum est generum, Alterum læue, Alterum acutum; cuius etiam duo extant genera, vnum sterile, alterum fertile: Est & alterum *ἰσόχαιρος* vocatum, seu Æthiopicum.

F O R M A.

DIOSC. Caulis est læuis, viridis, in cacumine aculeatus, alba intus medulla: Semen gerit in superiore caulis parte, elatere prodiens racemosum, subrubrum, adstringentis gustus. Alter consimilis est, sed sine semine prouenit. & tenuioribus calamis.

Matth. Nascuntur omnia genera cum in mari, tum in fluminibus, lacubus, paludibus, ac ceteris aquosis locis.

L O C V S.



Q U A L I T A T E S.

Gal. lib. 8. Composita eorum temperies est, ex terrena videlicet essentia, leuiter frigida, & aquea, leuiter calida, vt & inferna desiccare possint, & sensum frigidus ad caput vapores submittere, quibus somnolentos efficiant.

V I R E S.

DIOSC. Semen rostum ex vino potum, aluum sistit, & rubra fœminarum profluvia: vrinam ciet, capitis dolores facit: Quæ proxima sunt radici folia tenera, conuenienter illinuntur aduersus Phalangiorum morsus. Semen potum somniam conciliat.

IUNCUS

IVNCVS floridus, Italis, *Giunco florido*.

IVNCVS FLORIDVS.



FORMA.

Folijs exit ab vno cespite *Matth.*
 numerosis cyperi similibus,
 sursum spectantibus, cauli-
 bus pluribus, læuibus, iunci
 modo glabris, in quorum ca-
 cumine flores emicant spe-
 ciosi, subpurpurei, è quibus
 semen gignitur.

LOCVS.

Pronenit in fluuiorum li- *Idem.*
 toribus.

QUALITATES, ET
 VIRES.

Creditur ea omnia præsta- *Idem.*
 re posse, quæ cætera præstant
 genera.

LICHEN,

LICHEN, Græcis, Λειχην. Officinis, Epatica. Arabibus, ArZeZallacher. Italis, Lichene, seu Epatica. Germanis, Stein Lebertraut, Hispanis, Epatica, seu Figadella. Gallis, Epatique, seu Porcorau.

LICHEN.

FORMA.

Matth. Folijs est latis, robustis, asperis, nullis adnexis pediculis in cacumine tripartitis, asperginosis lapidibus pertinaciter inhaerentibus, radicibus numerosis perquam exiguis aduersa foliorum parte emergentibus: floribus paruis, stellarum figura.

LOCVS.

Idem. Prouenit in asperginosis faxis.

QUALITATES, ET VIRE.

Diosc. Adstringit, refrigerat, abstergit: illius folia sanguinis profuua sistunt: inflammationes arcant. Impetigini medetur, Iuuant regio morbo laborantes, cum melle illita oris, & linguae defluxiones inhihent. Praefertur maximè hæc planta ad iocinorosos affectus.



PVLMONA-

PVLMONARIA, Italis, *Pulmonaria*; Germanis, *Lungenkraut*; Gallis, *Herbe aux
pulmons*.

PVLMONARIA.

GENERA.

Duo eius habentur genera, *Math.*
Arboreum alterum, Alterum
terrestre.

FORMA ARBOREÆ.

Similis est Licheni, sed ma- *Idem.*
iora, latioraque fundit folia,
varijs modis per ambitum la-
ciniata, ac si à vermibus erosa
fuerint, arefcentia, prona par-
te viridia, supina verò palle-
fcentia, ac subalbicantibus
maculis respersa.

LOCVS.

Prouenit in densis, opacisq; *Idem.*
syluis, in annosarum arborum
caudicibus.


QUALITATES.

Adstringit, siccatur, abstergit: *Idem.*
vulnera glutinat.

VIREs.

Præstat, (vt scribunt) ad tabem, pectoris, & pulmonis vlcera, & cruenta spu- *Idem.*
ta, quin etiam ad vulnera, & pudendorum vlcera, & ad vtrunq; muliebri pro-
fluuium, dysenteriam, & biliosos vomitus: Sunt qui ea vtantur ad suspiciosos,
& asthmaticos, cum dulcis radicis succo, hyslopo, helenio, & scillino oxymeli-
te: Datur quoq; vtiliter à pastoribus tussientibus pecudibus, cum sale.

PVLMO-



Italis,
igadella.

anta ad

IONA-

PVLMONARIA altera, Italis, *Polmonaria*. Germanis, *Lungenkraut*/ *Fleckenkraut*/ *klein Walwurtz*. Gallis, *Herne aux pulmons*.

PVLMONARIA ALTERA.

FORMA.

Matth.

Folij affurgit borraginis quadantenus æmulis, non tamen crispis, nec hispidis, oblongis, asperis, hirsutis, albis maculis superna parte resperis, * aut non maculosis, * boraginis sapore: caulem gerit angulosum, atque tenerum: in cuius adnatorum cacuminibus flores erumpunt, * quandoq; purpurei, quandoque carulei * cynoglossi vulgaris modo. * Semen in folliculis plerunque vnum aut alterum inuenitur, maturitate nigrescens, Echij semini pene simile & æquale. Radice nititur fusca multis fibris terræ inharrente. *



Locvs.

Idem.

Nascitur opacis locis, prope vlginosas sepes.

QUALITATES, ET VIRES.

Idem.

Cohibet, consolidat, siccatur, abstergit: Praefertur ad pulmonis cum vlcerum ceteras infectiones, & ad sanguinis reiectiones: Datur totius plantæ decoctum ad suprascripta, magno auxilio, cum saccharo pluribus diebus: Idem cum maiori quoque successu præstat foliorum succus potus.

PARO-

NOMINA.

785

PARONYCHIA, Ruta muraria. Græcis, Παρωνυχία. Italis, Paronicchia. Germanis, Maiverrauten.

PARONYCHIA.

FORMA.

Exiguus est frutex, in petris nascens, peplo similis, minor longitudine, sed maioribus folijs. *Diosc.*

LOCVS.

Nascitur in petris.

Idem.

QUALITATES.

Vis eius est tenuium partium, & exiccatoria, morlu vacans. Talia enim sint oportet, quæ paronychia sanant: exalfacit ordine tertio. & siccat pariter. *Galen. s. simp. me.*

VIRES.

Illita paronychijis, atque fauis, remedio est. *Diosc.*

APPENDIX.

Quoniam non desint, qui hanc plantam vnâ mecum paronychiam faciunt, quum tamen sint, qui reclamatione, ne dissensio vterius protrahatur, non Dioscoridis, sed nostram paronychiam eam esse volumus. Scimus enim non solum paronychijis ipsam mederi, sed ad crenandas vrinas, & renum calculos frangendosq; præstantissimam esse. *Matth.*

Ddd

PARO-



PARONYCHIA altera.

PARONYCHIA ALTERA.

FORMA.

Matth.

Folia profert pepi, longiora, flores paruos, copiosos, racematim coherentes. albo colore. sed qui paronychiam florere scribat haecenus non legimus: quin etiã mihi incompertum est, an in saxis oriatur. Quo fit vt ne hanc quoq; legitimam paronychiam facere aulam.



HELI-

N O M I N A.

787

HELICHRYSVM, Græcis, *Ελίζανθον*. Italis, *Helicriso*.

HELICHRYSVM.

F O R M A.

Ramulum habet candi. Diosc.
dum, virentem, rectum, fir-
mum, folia, intercedentibus
spatijs, angusta, abrotano si-
milis, comam aureæ lucis in
orbem: umbella rotunda ve-
luti sicci corymbis depen-
dentibus: radice tenui.

L O C V S.

Nascitur in asperis, & tor- Idem.
rentium locis.

Q U A L I T A T E S.

Facultatis est incidentis, & Gal. 6.
extenuantis. simp. me.

V I R E S.

Coma ex vino pota, men- Diosc.
ses ciet: auxiliatur quoq; ser-
pentium ictibus, coxendi-
cum doloribus, & vrinæ stil-
licidijs. sanguinem in ventri-
culo, aut vesica concretum

absumit, destillationes sistit, cum mulso à ieiunis pota tribolari pondere: ve-
stibus interposita, eas à tinea tuetur.

Ddd 2

HELI-

Helichrysum Italicū hanc
plantā appellare libuit, quod
plurimum in Italia proueni-
at, & ijsdem sit facultatibus
præditum, quibus & præce-
dens.



HELI-

HELICHRYSUM creticum. Italis, *Helichriso di Candia*.

HELICHRYSUM CRETICVM.

F O R M A.

Planta est exilis, folijs longis, angustis, hirsutis, striatisq; caulibus angulosis, umbella in summitate aurea, diuulsaq; radice tenui, ac superuacua.

L O C V S.

Nascitur in Creta Insula. *Idem.*

F A C U L T A T E S, E T
V I R E S.

Ea omnia hoc quoque, quæ *Idem.* superscripta præstare posse creditur.

* A P P E N D I X.

Hæc planta melius quadrat ad Dioscoridis descriptionem quam prior, nec in Creta solum sed etiam in Hispania & alibi nascitur.*

Ddd ; STOE-



HELI-

STOECHAS citrina. Italis, *Amaranto giallo*. Germanis, *Reimblumen*/ *Züngling*/ *Wattenkraut*.

STOECHAS CITRINA.

FORMA.

Matth.

Folia profert albicantia, hirsuta, longa, caules decedentes, aut maiores, lanuginosos, incanos, in quorum summitatibus flores sunt aurei, globosuli, odorati, in umbellæ diuulsæ modum se se pendentes. Radice breui subnigricante.



LOCVS.

Idem.

Nascitur locis incultis, & in pascuis.

QUALITATES.

Idem.

Excalfacit, siccit, aperit, & abstergit, vt amarisculus indicat sapor, nec adstringenti facultate vacat.

VIRES.

Idem.

Decocta coma, aut ex vino macerata, iocinoris obstructions aperit, proinde datur commodè eius decoctum, dilutùm vè, regio morbo affectis. Idem potum interancorum vermes necat.

* Comas grandiores habentem breuiusculam plantam ex Crera missam accepi, cuius hic appinxi particulam.*

AMA.

NOMINA.

791

AMARANTHVS. Græcis, *Αμάρανθος*. Italis, *Amaranto*, seu *for velluto*. Germanis, *Sammat Blum*. Gallis, *Passe velours*.

AMARANTHVS.

FORMA.

Folia profert ocimi, maior, caulem crassum, pinguem subrubentem, striatum: florem spicatum, admodum purpureum; qui etsi quàm diu siccatus asservetur, haud quam tamen colorem perdit.

*LOCVS.

Elegantia studio in hortis seritur.*

QUALITATES.

Refrigerat, siccatur, repellit, *Idem*. cohibet.

VIRES.

Flos epotus coliacos, & dysentericos iuuat, mensum abundantiam sistit, & albos ventris fluxiones. prodest quoque sanguinem excreantibus.

Commendatur etiam ad vlcera sanie manantia.

Ddd 4

*AMA-



* AMARANTVS cristatus, Germanis, *Danen Rait.*

AMARANTVS CRISTATVS.

F O R M A.

Venustior est hæc amaranthi varietas, vt separatim pingi mereatur. Panniculas habet in fastigio latiores & quasi compressas hilari florum purpuranitidas, vegetas, vt cristas imitentur, iucundissimo spectaculo. Folia, vt in priore, ocymo non absimilia sunt, aut folano, longiora tamen, & maculis plerumque rubris variegata. Semen atrorubens pusillum splendidum in nostris regionibus maturescit nisi pluviosa cōstitutione anni corrumpatur.

L O C V S.

Rarior est & maiorem ob id gratiam in hortis consequitur.*



CHRY-

N O M I N A.

793

CHRYSANthemVM, Græcis, Κρισάνθεμον. Italis, *Chrysanthemo*. Germanis, Goldblum.

CHRYSANthemVM.

FORMA.

Herba est tenera, fruticosa, Diosc. lœnes proferens caules, & multifida folia: flores luteos admodum splendentes.

LOCVS.

Propter oppida nascitur. *Idem.*

QUALITATES,
ET VIRES.

Flores cū cerato triti, steatomata discutere produntur. *Idem.* Ictericos breui ad bonum colorem restituunt, si sequente longo balnei vsu, post exitum ebibantur, caules manduntur olerum modo.



Ddd 5

*CHRY-

*CHRYSANTHEMON minus. Germanis, Klein Goldblum.


CHRYSANTHEMON MINVS.

FORMA.

Minutioribus prouenit folijs, nec tam altè attollitur vt præcedens, quæ humanam altitudinem nonnunquam adæquat, vel etiam superat. Semē est amarissimum, in flore & folijs nulla est aut minima amaritudo.

LOCVS.

In hortis satum facilè prouenit, forte etiam sponte aliubi nascitur.*



AGERA-

AGERATVM, Græcis, ἀγέρων. Officinis, *Eupatorium Mesue*. Italis, *herba Giulia*.
Germanis, *Freimb & bertraut*.

AGERATVM.



FORMA.

Fruticosa est herba, binū Diosc. dodrantū longitudine assurgens, simplex, humilis, originō maxime similis: umbellā gerit, in qua flos bullis aureis similis, helichryso minor: nomen ei inditum est, quoniam diutissime flos in sua coloris specie conseruetur.

LOCVS.

Nascitur in inculto solo, *Matth.* & in pascuis,* & in hortis plantata viget.*

QUALITATES.

Digerit, & inflammationes *Galen. 6.* quodammodo resoluit. *simp. me.*

VIRES.

Vis decocti feruens, herbæ *Diose.* vltæ nidor vrinam ciet, & vul *Matth.* uæ duritias emollit. *Florum Mesue.* dilutū ex albo meraco paratū.


tum, puerorum vermes necat duarum vnciarum pondere potum. Excalfacit ordine primo, & siccatur secundo. Bilem, & pituitam facile purgat, tenuat, incidit, terget, expurgat, putredinem prohibet: resoluit sine attractione, obstructions referat, & earum affectus sanat, diuturnis febribus mirifice medetur. Adstringit, quare ventriculum, iecur, & cætera viscera roborat: cum sero lactis efficacius purgat.

CENSURA.

Medicam materiam non assequuntur, qui negant *Eupatorium Mesuis* non esse *Dioscoridis Ageratum*.

*AGERA-

Varietas deprehenditur in Agerato. Nam quod sponte nascitur in Hetruria, multò minus est, nec adolescit tantopere, vt hortense nostrum, quod & surgit altius & folia habet magis crenata, vt Cristagalli. Obseruatur etiã quẽdam Agerati species, quæ candidas prorsus umbellas gerit, sed rarior est cæteris.*



VERBE.

VERBENACA, Græcis, Περσέσση, ἢ ἰσὰ βοτάνη. Latinis, *Verbenaca supina*. Italis, *Verminacola, Berbena, & Berbenaca*. Germanis, *Eisenkraut*. Gal. *Vernaine maffe*.

VERBENACA.



FORMA.

Ramulos emittit cubitales DIOSC.
aut maiusculos, angulosos, in
quibus ex interuallis folia ex-
cunt quercus, sed minora, &
angustiora, eiusdem in ambi-
tu diuisuris, colore aliquate-
nus cæsis. Radix lōga, tenuis.
Flores purpurei, graciles.

LOCVS.

Nascitur secus vias in ciui-
tatibus, & oppidis, & in pla-
teis. *Matth.*

QUALITATES.

Vim habet aded desiccantem, Gal. li. 8.
ut vulnera glutinet. In-
signiter est amara: quare excal-
facit, & siccatur, abstergit, ape-
rit. *simp. me. Matth.*

VIRE.

Folia cū radice in vino po-
ta, illitave, serpentium ictibus
auxiliantur. Folia bibuntur cōmodè ex vino vetere quadragenis diebus ad icte-
ritiam: veteres tumores & inflammationes mitigant: sordida vlcera purgāt: to-
ta in vino decocta, tonsillarum crustas abrumpit: oris nomas gargarizatu cohi-
bet: Datur potandum in tertianis febribus, tertium à terra geniculum, cum fo-
lijs circulantibus: quartanis quartum. Sacram vocāt herbam, quoniam mul-
tum ad amuleta, expiationesque commendetur.

HYACIN-

HYACINTHVS, Græcis, *ἵακινθος*. Italis, *Iiacintha*. Germanis, *Mergenblumen*. Hispanis, *Maïos flores*. Gallis, *Vaccet*.

HYACINTHVS.

G E N E R A.

* Aliquot genera habentur, è quibus sequentia depingi curauimus, nimirum vulgare hyacinthum, & peregrinos tres.*

F O R M A V U L G A R I S.

Diosc. Folia habet bulbi: caulè draconitalem, minimo digito tenuiorem, herbacei coloris: comam procumbentem, florum purpureorum plenam, incuruamque: radicem quoque bulbaceam.

L O C V S.

Matth. Nascitur in campestribus, ferè vbique inter segetes.

Q U A L I T A T E S.

Gal. li. 8. Bulbosa radix exiccat ordine primo, & refrigerat secundo completo, aut tertio incipiente: semen leuiter extergit, & adstringit. Exiccat autem quadantenus ordine tertio. Cæterum in medio consistens caliditatis & frigiditatis.

V I R E S.

Diosc. Pota radix aluum sistit, & vrinas propellit: phalagiorum moribus medetur. Semè adstringentius est, theriacis expetitur, cum vino potum ictericos iuuat.

*HYACIN-



[*HYACINTHVS TRIPOLITANVS.

Flore pulcherrimo, phalan-
gij florem representante, cœ-
rulei coloris prouenit, caule
gracili, folijs admodum an-
gustis. Radix illi bulbosa non
magna.*



HYACIN-

HYACINTHVS orientalis, Italis, *Hia. int'bo orientale.*

F O R M A.

Matth.

Folijs exit lilij, minoribus, angustiorib⁹, sursum spectantibus, pinguioribus, & in acutum desinentibus: caule crasso, in quo flores exeunt cærulei, lilij figura, sed parui. Radix illi bulbosa, squamosa que.

L O C V S.

Idem.

Seritur in hortis, & colitur in fictilibus vasis, * imo nō opus est, vt in fictilibus asseruetur, cum nihil periculi ipsi a frigore immineat.*




HYACIN-

NOMINA.
HYACINTHVS ORIENTALIS ALTER.

301

FORMA.

Folij est alterius latioribus,
pinguioribus, & in summitate
retulis. cætera cæteris per-
quam similia sunt.



Ecc

РАРА-

PAPAVER erraticum, Græcis, *Μήκων ποικίλ.* Ital. *Papauero saluatico.* Germ. *Flap-
per Rosen.* Hispan. *Amapollis, seu Papoulla.* Gallis, *Pauot, suuoge, siue' enfanons.*

PAPAVER ERRATICVM.

FORMA.

Diosc. Folia habet erucæ, diuisa,
scabra: caulem iunceum, re-
ctum, cubitalem, asperum.
Florem sylvestris anemones
punicum, interdum album:
capite oblongo. sed anemo-
nes minori, in quo rufum se-
men. Radix est longa, subal-
bida, minoris digiti crassitu-
dine, gustu amara.

LOCVS.

Matth. Nasceitur plurimum in ar-
uis inter segetes.

QUALITATES.

Gal. 6. Refrigerandi, ac soporem
simp. me. inducendi illi potestas est.

VIRE.

Diosc. Capita quinq; aut sex in vi-
ni cyathis tribus ad dimidias
decocta, potuiq; data, sopo-
rem faciunt: semen acetabuli
mensura ex aqua mulsa pota, aluum leniter emollit: folia cum calycibus illita

Matth.

Flores in puluerem triti, & ex aqua dulci pori, pleuritidi commodè medentur.
* Aqua florum commendatur ad Erysipelata, & oculorum inflammationes.
Hac imbuta stippa cannabina, vtiliter imponitur iccoris regioni ad compe-
scendum sanguinis fluxum è naribus.*

PAPA-



PAPAVER sativum, Græcis, *Μήλον ἡμερόν*. Arabibus, *Thaythay*, seu *Caschas*.
Italīs, *Papauero domestico*. Germanis, *Magsamen*. Hispanis, *Dormidera*. Gal-
lis, *Pauot blanc*, seu *Pauot priue*.

PAPAVER SATIVUM.



GENERA.

Tria eius habentur genera. Diosc.
Hortense, cui candidum inest
semen: & sylvestre, cuius duo
sunt genera, quæ etiam serun-
tur: His accedunt corniculatum, & spumeum.

FORMA.

Hortense capitulum habet *Idem*.
oblongum, & semen candi-
dum, sylvestre verò caput ha-
bet infidens, demissumq; &
semen nigrum. Tertium ma-
gis sylvestre, multò his longi-
us est, & productiore capitu-
lo.

LOCVS.

Hortense in hortis, cætera Matth.
in campis seruntur.

QUALITATES.

Omnium facultas refrige- *Galen. 6.*
ratoria est, sativi autè semen *simp. me.*
mediocriter somnum conci-
liat, visu candidum. Cætera ge-
nera longe magis soporifera
sunt.

VIRES.

Omnium in commune na- *Diosc.*
tura refrigeratrix: foliorum,

capitumq; decoctum ex aqua paratum, somnum conciliat: calyces cum farina
hordeacea triti, & cataplasmatibus admisti, ignibus sacris, & inflammationibus
medentur. coquantur quoque capita per se ad dimidias. coquiturque deco-
ctum cum melle, quousq; eclegmatis modo crassescant. Hoc itaq; modo para-
tur medicamentum ad tussim, arteriæ fluxiones, & cæliacos affectus, efficacius
tamen redditur, addito hypocistidis succo, & acacia: Cæterum nigri papaveris
semen tritum cum vino bibitur contra citam aluum, & foeminarum profluvia,
& fronti quoq; in peruigilijs illinitur ex aqua. Opium autem, quod è papaue-
rum nigrorum capitibus paratur, magis refrigerat, inspissat, siccatq;.

Ecc 2

*PAPA-

In hortis cultioribus passim habetur hoc papauer, elegantiae gratia solummodo, nam densis foliorum lacinijs cirrisque luxurians aspectui mirè blanditur, sed capitula ferè inania, nec tanta seminum copia distenta exiguum fœnus reddunt, ideoq; ijs qui delectationi vtilitatem præferunt hoc papaveris genus non vsq; adeo expetitur.*



PAPA-

PAPAVER corniculatum, Græcis, Μήκων Κεράτιος. Arabibus, *Almacharam*. Italis, *Papauero cornuto*. Germanis, *Gelböl Wagen*. Hispanis, *Dormidera marina*. Gallis, *Pauot Cornu*.

PAPAVER CORNICULATVM.

F O R M A.



Folia habet candida, hirsuta. Diosc. ta, verbasco similia. in ambitu sylvestris papaueris modo ferrata: caule non dissimili: flore pallido (quandoq; puniceo) calyculo in corniculorum modum inflexo: semine papaueris, pusillo, nigroque: Radice per summa cespitum nigra, crassaq;.

L O C V S.

Nascitur in maritimis, & Idem. asperis. Cæterum quod flo Matth. re est puniceo nascitur copiosum in campis, in Moravia, & Boemia.

Q U A L I T A T E S.

Vim habet incidendi, & abstergendi. Galen. 7. simp. me.

V I R E S.

Radicis decoctum, ad diem paratum, coxendicum & iocinoris affectus potu sanat: prodest his, qui crassa quædam, & arenosa cum lotio reddunt. Semen in aqua potum acetabuli mensura aluum leniter purgat Illita folia, & flores, crustas emarginant, & iumentorum argemas. & nubeculas abstergunt.

Ecc 3

HYP-

HYPECOVUM, Græcis, ὑπέκοον. Italis, Hippocoo. Germanis, Benediger Pappel/
Wetter Nößlin.

HYPECOVUM.

FORMA.

Matth.

Folijs provenit rutæ paulò
maioribus, si singulatim ex-
pendantur, caulibus exilibus,
mollibus, hirsutis, in quibus
flores sunt pallidi, & propè
calycem subpurpurei: flori-
bus succedunt capitula, tenui
involucro contecta, in qui-
bus semen recòditur nigrum,
tactu asperum, pseudomelan-
thio proximum.



LOCVS.

Idem.

Nascitur in agris inter sege-
tes, & legumina.

QUALITATES.

Galen. 3. Refrigerandi vim habet, ex
simp. me. tertio ferè refrigerantium ordine, aded, vt parum absit à papauere.

Diosc.

VIRES.

Natura eadem, quæ papaueris succo.

APPENDIX.

Nullam hæcenus plantam mihi videre licuit, quæ magis hypecovum referat:
tamen si etiam mihi per omnia non satisfacit.

HYOSCY-

HYOSCYAMVS, siue Apollinaris herba, Græcis, *τοσκάμω*. Arabibus, *Bengi*.
Italis, *Iusquiamo*. Germanis, *Bilsam*. Hispanis, *Pelenho*. Gallis, *Iusquame*, seu
Hanabene.

HYOSCYAMVS.

GENERA.

Tria sunt eius genera. Ni- Diosc.
grum, Album, & Flauum.

FORMA.

Flauī folia lata sunt, & ob- Diosc.
longa, diuisa, nigra, hirsuta.
Flores è latere caulis ordine
prodeunt, tanquam punico-
rum cytini, scutulis septi, fe-
minum plenis, vt papaueris.
Flores ei sunt lutei, & semen
subflauum, & siliquæ mino-
res. In nigro autem flores spe-
ctantur purpurei, & cytini præ-
duri ac spinosi: radice alba di-
gitali crassitudine.

LOCVS.

Proueniunt secus itinera, *Matth.*
& in agrorum marginibus.

QUALITATES.

Cui semen atrum est, insa- *Galen. 8.*
niam, ac soporem affert. Huic *simp. me.*

propinquam habet facultatem, cui semen mediocriter est flauum. verum vtri-
que fugiendi sunt, vt inutiles, & venenosi.

VIRES.

Flauī semen, vbi album non addit, eius loco supponi potest, sed maiori cum Diosc.
cautela vti eo præstat.

Ecc 4

HYOSCY-



HYOSCYAMVS albus, Græcis, ὀσκνιάμιον λευκόν. Italis, Iusquiamo bianco.

HYOSCYAMVS ALBVS.

F O R M A.

Matth.

Folij crescit alterius non dissimilibus, sed subrotundis, pinguioribus, mollioribus, hirsutioribus, rarioribus, albicantibus. Flores illi candidi, aut subpallidi, è quibus eodem ordine, quo in cæteris, cytini oriuntur, sed rariores, & elementiores, in quibus album concluditur semen.

L O C V S.

Idem.

Nascitur sponte, & feritur in hortis.

Q U A L I T A T E S.

Galen. 8.

Ad sanationes is vel maxime idoneus est, ex tertio quodammodo ordine refrigerantium.

V I R E S.

Diosc.

Semen collyrijs, quæ dolum sensum auferunt, commodissime inseritur: contra acutas, calidasq; fluxiones, aurium dolores, atque vuluæ mala profunt: cum farina autem hordeacea oculorum, pedumq; ac cæterarum partium inflammationes placat. Idem tussi, destillationibus, & oculorum doloribus efficax est. Contra mentium abundantiam, & erumpentem aliunde sanguinem oboli pondere, cum papaveris semine, & aqua multa bibitur. Podagris subuenit, testibus inflatis, manibusque à partu tumentibus, tritum ex vino illinitur. Folia omnibus medicamentis dolorem ledantibus, tum per se, tum cum hordeacea farina vtiliter imponuntur: recentia ad mitigandos omne genus dolores oblinuntur. Radix in aceto decocta dentium dolores mulcet.

HYOSCY-



HYOSCYAMVS tertius, seu potius quartus. Italis, *Iusquiamo nuouo, seu Iusquiamo maggiore*. Germanis, *Bundt Bilsam gelb Bundttraut*.

HYOSCYAMVS TERTIVS.

F O R M A.



Planta est insignis, caules edit sesquicubitales, rotundos, tenui obductos lanugine, ramososq; folijs amplis, pinguibus, tenui pilo pubescētibus, mollib⁹, solani soporiferi speciem quadantenus referentibus, graui etiam odore. Flores edit pallidos, hyoscyami emullos, è quibus capitula subrotunda oriuntur, quæ nonnullâ hyoscyami cognationem præferunt: similibus enim ferè scutulis concluduntur, coronato circumquaq; cacumine, & semine intus subflauo: Radice est alba spithamæ longitudine.

L O C V S.

Seritur in hortis.

Idem.

F A C V L T A T E S,
E T V I R E S.

Refrigerat ordine tertio *Idem.*
completo: soporem inducit, adeò vt ea sit ei natura, quæ cæteris Hyoscyamis.

Ecc 5

*HYOSCYA-

*HYOSCYAMVS Peruvianus vulgo dictus, quondam Pontiana & Nicotiana. Hispanis, *Petun*, & *Tabaco*. Gall. *Herba de la Roine Mere*. Germanis, *Indianisch Windkraut*. Indis, *Picielt*.

FORMA.

Ampla, pmit folia, sinuata per ambitū & in mucrone sensim se colligētia, molli lanugine pubescētia, pingua & mordicantia linguā, si gustetur: flores pētagonos in summo caulis insidentes, ramulis cōphoribus dilutiorē purpurā rubeſcentes, quib. oblongæ, teretes acuminatæq; succedūt capsulæ, in medio habētes interstitiū quoddā, paruo semine pulloq; refertæ. Caules humanā altitudinē vincunt, & radicibus diuicatis albisq; terraherēt.

LOCVS.

Nascit̃ in India locis humidis & umbrosis, & exculto leuiq; solo. In hortis nostris semel plātata, postea seipsā ferit hęc herba, decidentibus ē vasculis seminibus, sed nisi perhiemē in fictilib. asseruetur, eius iniurias ferre nequit.

QUALITATES.

Adeo diuersis facultatibus præditā ex varijs partib. cōponi apparet. Recēs enim nonnihil frigidi possidet, & nimio humore obtūdit laritantem calorem, qui ramen in arida egregie se profert, adiunctam siccitatem habet.

VIREs.

Ad varios morbos, eosq; diuersos celebratissima est. Folia Cephalgiam ex frigore ortam sedant, si imponantur, & ventriculi dolores compescunt. Sed & soporem inducunt, podagricis cruciatibus medentur, vermes intestinorum necant, matricis tormina discutiunt, impetigines emendant, vulnera & vlcera sanant, canculos item & carbones. Aqua elicitur ex herba, quæ eadem potest: colluuntur succo dentes, si dolent, syrupus ex hoc conficitur, tussientibus, asthmaticis, & alijs eiusmodi morbis pituitosis conueniens. Nec non epilepticis & hydropicis succus propinatur in Hispania, sed caute est agendum, nam robustissimis quoque validum purgans fuisse obseruatum est. Vnguentum ex Nicotiana paratum apud alios autores videatur. Indi fumum foliorum hauriunt ad recreandas vires.*

PSYLLIUM,



NOMINA.

311

PSYLLIVM, Græcis, Ψύλλιον. Arabibus, Bazarachahona, seu Bezer corbume. Italis, Psillio. Germanis, Psyllienkraut. Hispanis, Zargatona. Gallis, Herbe à puce.

PSYLLIVM.

FORMA.



Folij est incanis, longis, Matib. hirsutis, coronopo æmulis, non tamen corniculatis. Ramis numerosis, dodrantalibus, rotundis, gracilibus, & foliosis, humi potius, quàm in altum sese diffundētibus, in quorum cacaminibus capitula oriuntur, scabiosæ vocatæ modo: flosculos edit pusillos, pratenues, lanuginosos, pilorum specie referentes, albo colore, plantaginis angustifoliæ modo, semē pusillum nigrum, pellucidum, pulicum effigie.

LOCVS.

In arvis & incultis nasci. Diosc. tur.

QUALITATES.

Semē admodum vile est, Gal. li. 8. ex secundo refrigerantiū or- simp. me. dine, in desiccando verò &

humectando, medium quodammodo est, & symmetrum.

VIRE.

Vis ei ad refrigerandum, inspissandum, & emolliendum conueniens: articu- Diosc. lorum morbis, parotidibus, tuberculis, tumoribus, luxatis, illitum auxiliatur. Imponitur in dolore capitis cum rosaceo, aqua, aut aceto. Enterocellis infantium, & prominenti vmbilico, illitum ex aceto medetur. Seminis mucago ex aqua parata, vehementer refrigerat: cōtra sacros ignes efficax est: cum adipe tustum sordida vlcera, & quæ cacoethe vocantur, expurgat: succus vermiculosis auribus, aut fluxione laborantibus, ex melle infusus prodest.

SOLA-

SOLANVM hortense, Græcis, Στεφύλιον καπνικόν. Arabibus, Hamebathaleb, seu Hameb alcha chaich, seu Hanabalthaleb. Italis, Solatro, seu Herba morella. Germanis, Nachtschatt. Hispanis, Terua mora. Gallis, Morelle.

SOLANVM HORTENSE.

F O R M A.

Matth. Folijs exit ocimo maiorib. sed amplioribus, nigriorib⁹, mollioribus. Plures circūque fundit ramos, non sine alarum cavitatibus, florib. albis, & in medio luteis, stellæ figura, baccas edit rotundas, racematim dependentes, vinofo succo prægnantes, orobi quantitate, in quibus semē continetur albū, minutumque: variat in baccis color: namque in hac planta nigra, in illa lutea, in altera subuirdes spectantur.

L O C V S.

Idem. Nascitur in hortis, plateis, secus itinera, & ferè vbique.

Q U A L I T A T E S.

Gal. li. 8. Vfus eius est ad omnia ea, *simp. me.* quæ refrigerari & adstringi postulant, potest enim hæc duo ordine secundo.

V I R E S.

Diosc. Folia conuenienter illinuntur, cum hordeaceæ farinæ polline ignibus sacris, & vlceribus, quæ serpunt: agilopia, capitisque dolores, trita, & imposita per se sanant: astuanti stomacho auxiliantur: parotidas cum sale detrita, illita discutunt, foliorum succus, cum rosaceo perfusus, valet contra infantium syriasim: instillatur vtiliter aurium doloribus: in vellere subditus, mensum abundantiam sistit. Fuluo gallinarum fimo subactus & appositus, agilopis præsentaneo est remedio. Phreniticos inuat ex aceto, & rosaceo sincipiti illitus. Illinitur fronti contra calidas oculorum fluxiones, & additur cōuenienter in vnguentis, & emplastris, quorum ad vlcera contumacia est vfus: cibus idoneus est.



SOLA-

N O M I N A.

813

SOLANVM Halicacabum, Græcis, *ἡλίκακας*. Mauritanis, *Kekengi*, seu *Alkekengi*. Italis, *alcachengi*, & *Halicacabo*. Germanis, *Zudendöcklin* / *Schlutten* / *Zudenfirſchen*. Hispanis, *Besiga de perro*. Gallis, *Buguenandes*.

SOLANVM HALICACABVM.

F O R M A.



Folia mittit hortensis simi *Matth.* lia, sed latiora, firmiora, & sub aspera, nec aded, vt in illo nigricantia: caulibus lentis: floribus cædidis, & quibus vesicæ oruntur turbinatæ, iuglandiū magnitudine, angulosæque, quæ per maturitatē rufescūt, in quibus singulis singule concluduntur bæcæ, vinoso succo refertæ, ipsæq; rubentes rusci bæccis persimiles, sapore austero, simul & amaro: numeroſo minutoq; intus lemine.

L O C V S.

Nascitur propter vligino. *Idem.* sas sepes, & locis umbrosis.

Q U A L I T A T E S.

In foliorū facultate hortēfi *Gal. li. 3.* solano simile est, multis admi *simp. me.* scet compositis, q̄ ad iecur, vesicā, & renes accommodantur.

V I R E S.

Vim, vsusque hortensis solani habet: verū in cibis nunquam expetitur, re- *Diosc.* gium morbum purgat: semen potum vrinam pellit. Baccarum vis habetur *Matth.* non solum præstantissima ad renū vitia, & ciendam vrinam, sed ad eius quoque acredinem retundendam: bibitur namque earum succus ad ea omnia vtiliter cum papaueris albi cremore, aut seminum melopeponum, aut cucurbitæ, cucumerisve. Aspidibus autem aded aduersissimū est Halicacabum, vt ad mota propius eius radice, sopore inexpugnabili necentur.

V E S I C A -

VESICARIA, siue Halicacabum repens. Italis, *Vilucchio forestiero*. Germanis, *Herkfamen/Herkförner*.

VESICARIA, SIVE HALICACABUM REPENS.

F O R M A.

Matth.

Folijis cōstat oblongis, per ambitum laciniatis, floribus pallidis, aut candidis, è quibus vesicæ prodeunt virides, subrotundæ, senis secundum longitudinem suturis: semine intus pullo, erui magnitudine, aut paulò maiore, in cuius latere humani cordis nota visitur albo colore.

L O C V S.

I dem.

Seritur in hortis, & scitilibus, ad topiaria.

Q U A L I T A T E S.

I dem.

Creditur valere semen ad omnes cordis affectus, ob notam quatem insignitur.



SOLANVM


NOMINA.

315

SOLANVM somniferum, Græcis, Σνλνφν & ννρνφνδς. Italis, solatro somnifero.

SOLANVM SOMNIFERVM.

FORMA.



Numerosis fruticat ramis, DIOSC.
densis, caudicosis, fractu con-
tumacibus: folijs multis, pin-
guibus, cotoneæ mali haud
abfimilib⁹, plenis, flore gran-
di, rubro: fructu in folliculis
croato: radice grandi, subru-
bro cortice vestita.

LOCVS.

Nascitur in saxosis, non *Idem*.
procul à mari.

QUALITATES.

Radicis cortex opio qui- *Gal. li. 3.*
dem perfimilis est, sed imbe- *simp. me.*
cillior, adeò vt tertium refri-
gerantium ordinem non ex-
cedat: cum opium sit quarti.
Idem desiccat secundo ordi-
ne completo, ac tertio inci-
piente.

VIREs.

Radicis cortex ex vino drachmæ pondere potus, somnificam vim habet, o- DIOSC,
pio tamen mitiorem: Semen vehementer urinâ cit, corymbi duodecim hydro-
pici dantur: plures verò mentis alienationem faciunt. Remedio est aqua co-
piofa potui data: inferitur pastillis, & medicamentis, quæ doloris leuamentum
prestant. Vinum in quo idem decoctum fuerit in ore contentum, dentium do-
lorem mulcet. Radicis succus ex melle illitus, oculorum hebetudines tollit.

SOLANVM

SOLANVM somniferum alterum. Italis, *Solatro Somnifero minore.*

SOLANVM SOMNIFERVM ALTERVM.

FORMA.

Matth.

Folij est angustioribus, venosis, in humum spectantibus: caule anguloso: Floribus tinnabuli figura, subpurpureis, per ambitum crenatis, ex quibus bacca proueniunt nigrae, vinosae, minuto intus semine, viridi quodā calyculo ad medium usque, contactae, in coronae modum denticulato. Radicem habet grādem, strumosam, albicantem.

LOCVS.


Idem.

Nascitur in montibus inter saxa.

QUALITATES,
ET VIRES.

Idem.

Vires alteri similes habet, sed proculdubio imbecilliores.



SOLANVM

SOLANVM maius. Italis, *Solatro maggiore*, *sive Herba bella donna*. Germanis, *Dokkewurz* / *Schlaffbeer*.

SOLANVM MAIUS.

F O R M A.



Folijs provenit hortensis *Matth.* solani maioribus. caule bicubitali, tricubitalique, atque maiore, ramis numerosis, alis multis, floribus oblongis, tintinnabuli instar concavis, subpurpureis, capillaceis intus staminibus. His baccæ suboriuntur singulatim dependentes, & breui calyculo superiori parte comprehensæ, quæ maturescen-tes nigricant, acini vix magnitudine, pellucida exterius cute, vinoso succo prægnantes, ac minuto numerosoque semine. Radicem fundit longam, crassam, albicantem, & succi plenam.

L O C V S.

Nascitur in montibus *sa-Idem.* xosis, & feritur in hortis.

F A C U L T A T E S.

Refrigerat ordine tertio, *Idem.* & siccatur secundo, estque

somnifico solano viribus simile.

V I R E S.

Baccæ quatuor, aut sex deuoratae, fumentes deliros faciunt, atque furentes, plures verò veteranos efficiunt. Aqua è tota planta distillata, (ut quidam fatentur) duorum, aut ad summum trium cochleariorum mensura, internas viscerum inflammationes extinguit, nullo omnino incommodo: sed à copiosiore potu abstinendum. Eadem exterius admota, erysipelas, sacros ignes, & alios calidos affectus inuat: contusa folia, & illita oculorum, palpebrarumque flegmonas mitigant.

F f f

MANDRA-

MANDRAGORAS, Græcis, *Μανδραγόρας*. Arabibus, *Labora*, seu *Xabroha*. Italis, *Mandragola*. Germanis, *Mraun*. Hispanis, *Mandraccla*. Gallis, *Mandragore*, siue *Mandegloire*.

M A N D R A G O R A S.

G E N E R A.

Diosc. Duum est generum nigra, quæ femina, & Alba, quæ mas dicitur.

F O R M A F O E -
M I N A E.

Idem. Folijs prouenit lactucæ minoribus, angustioribusque, viosis, ac graueolentibus, humi sparsis. Mala gerit forbis similia, pallida, odorata. in quibus semen veluti pirorum: Radicibus cohæret magnis, binis ternisve inter se conuolutis, nigris foris intus albis, crasso cortice vestitis: caulem nullum fert.

L O C V S.

Matth. Nasceitur copiosa in Gargano Apulicæ, & alijs in montibus quæque habetur.

Q U A L I T A T E S.

Gale. 7. simp. me. Vincentem habet facultatem refrigerantiam, adeo, vt tertij sit ordinis refrigerantium, verum, & caliditatis cuiusdam particeps est, & in primis humiditatis, proinde soporis conciliandi vim habet. Radicis cortex cum sit valentissimus, non tantum refrigerat, sed etiam desiccatur: reliquum, quod intus est, imbecillum existit.

V I R E S.

Diosc. Succus è radicibus corticibus duobus obolis ex mulso potus, vomitione bilem atram, pituitamque extrahit: potu verò largiore interimit. Admiscetur medicamentis ocularibus, & his, quæ dolores finiunt, semiboli pondere inditus. partus per se, & menses expellit. Folia recentia conuenienter oculorum inflammationibus, & collectionibus, quas vlcera excitant, cum farina hordeacea imponuntur: suppurationes, Strumas, & tubercula discutunt: stigmata delent, si quinis, senisve diebus sensim perfricentur. trita radix ex melle, aut oleo illita, serpentium moribus medetur. Mala olfactu soporem afferunt. ac etiam si mandantur: Semen eorundem potum vulvas purgat. Radix ebur emollire fertur, quæ senis horis, cum decocta sit & ad accipiendam, quam cōfingere optaueris formam, ipsam facillè præstat,

M A N D R A -



NOMINA.

819

MANDRAGORAS mas, Græcis, *Μανδραγόρας ἄππλω*. Italis, *Mandragola maschio*.

MANDRAGORAS MAS.

FORMA.

Folia habet magna, alba, Diosc.
lata, lævia, ut betæ: mala-
que alterius duplo maiora,
colore in crocum inclinante,
iucundè, cum gravitate
quadam olentia, quorum
pomorum cibo aliquan-
tùm opiliones soporantur.
Radix alterius est similis,
maior tamen, & candidior,
orbata & hæc caule.

LOCVS.

Nascitur & hæc in mon- Matth.
tibus.

QUALITATES, ET VIRES.

Isdem est insignita facul- Diosc.
tatibus, quibus & fœmina.

CENSURA.

Qui credunt, mandrago-
ras, quæ ab impostoribus circumferuntur, humana forma, esse legitimas,
manifesto hallucinantur. Fictitiæ enim sunt.

Eff 2

MELON-



MELONGENA, seu mala insana, Italis, *Petranciani*, seu *Melanzane*. Germanis, *Dollöpfel*.

M E L O N G E N A.

F O R M A.

Matth.

Folia gerit stramonix cognata, aut maioris solani subaspera tamen, & subhirsuta, & per ambitum sinuata, caulivnico, dodrantali, aut maiore, tereti, firmo, subpurpureo, & hirsuto: flores edit albicantes, aut subpurpureos in stellæ modum, è quibus oblongi oriuntur fructus, cucumeris magnitudine, purpurascens, virentesve, lævi cortice, succola albicanteque intus pulpa: semine numeroso, paruo, siliquastris æmulo: radice nititur multifida.

L O C V S.

Idem.

Seritur in hortis, & vasis fistilibus.

Q U A L I T A T E S,
E T V I R E S.*Idem.*

Manduntur in cibis fructus.

Auic.

Sunt è nostratibus, qui horum esu venerem concitari putent: quod forsitan ideo præstant, quod flatus gignant. Cæterum, frequenter manducati, cum biliosos, tum atrabiliarios generant humores, viscerum obstructions, carcinomata, elephantiasim, tristitiam, capitis dolores, & iocinoris, & lienis obstructions. Quo fit ut postea diuturnæ oriantur febres, & habitus malus.

* P O M A



* POMA AMORIS. Poma aurea, Italis, *Pomo d'oro. vel Pomi del Peru.* Gal-
lis, *Pommes d'amours.* Germanis, *Goldsépffel.*

POMA AMORIS.



F O R M A.

Herba late ramos spargit,
grauiter olentes, fere vt Ga-
riophyllorū Indicorum plan-
ta, crescit ad altitudinem hu-
mani corporis. fert poma ma-
gnitudine oui, primo viridia,
vbi maturuerint, crocea, vel
rubra.

L O C V S.

Habetur in hortis, locisque
gaudet humidis.

Q U A L I T A T E S,
E T V I R E S.

Frigida est, & forte nō absq;
maligna qualitate, Poma vero
innoxie in Italia eduntur. Ea-
dem oleo macerantur & inso-
lantur, vel in finum equinum
infoduntur, ad scabiem inun-
gendam, idque mirifice à qui-
busdam commendatur.

Fff 3 ACONT-

ACONITVM Pardalianches, Græcis, ἀκόνιτον παρδαλιανχες, ἡ Θηλυφόρον. Ital.
lis, Aconito pardalianche.

ACONITVM PARDA-
LIANCHES.

GENERA.

Matth. Quatuor nos obseruauimus genera. Primum, quod Dioscoridis, secundum, quod Plinij, tertium quod Theophrasti esse censemus, & quartum, quod Doronicum errore magno vocatur.



FORMA PRIMI.

Matth. Planta est admodum rara, folijs cucumeri proximis, sed maioribus, ad summum quatuor, subhirsutis. caulem edit dodrantalem, floribus chrysanthemi similibus, sed minoribus. Radicem alabastriformi modo splendentem, digitali crassitudine, in acutum desinentem, incuruam, geniculatam, & tota facie scorpj caudam æmulantem.

LOCVS.

Diosc. In nudis, & arduis montium summitatibus, cauitibûsq; prouenit, vmbrosistantum locis.

QUALITATES.

Gal. li. 6. Putrefaciendi facultatem obtinet, & lethale est, itaq; cibo, potuq; fugiendum: attamen ad putrefaciendum extremas corporis partes, aut circa sedem, idoneum est: Herbæ verò radix ad hæc utilis est.

VIRES.

Oculorum medicamentis leuandi doloris gratia adijcitur: Enecat pantheras, sues, lupos, & feras omnes in carnibus obiectum: torpescunt, (vt fama est) scorpiones, admota radice, stupentq; sed statim ellebori contactu excitantur.

* APPENDIX.

Planta hæc tam rara est, vt non dum etiam diligentissimis Rei herbariæ studiosis sese vspiciam offerre voluerit. De ea itaq; nihil adhuc certi indicare possumus: alij planè negant extare. *

ACONI-

Ita- ACONITVM Pardalianches Theophrasti. Italis, *Aconito Pardalianche terzo.*

ACONITVM PARDALIANCHES
THEOPHRASTI.

F O R M A.

Folia profert cyclamini *Matth.*
haud dissimilia, radicem scor-
pionem integrum præsefe-
rentem. cui fibræ insunt ge-
niculatæ, graminis modo, &
eiusdem quoque modo se se
propagantes, & alios quo-
que scorpiones effingentes,
è quibus germina, & folia e-
rumpunt. Atqui caules, &
flores à cæteris minimè diffe-
runt. * Est vero hæc planta
sequenti Doronico conge-
ner.*

L O C V S.

Nascitur in altissimis mon- *Idem.*
tibus, præscriptis locis.



Fff 4

ACONI-

ACONITVM pardalianches minus, Officinis, *Doronicum*. Italis, *Doronico*. Germanis, *Gemsenwurh*.

ACONITVM PARDALIAN-
CHES MINVS.

FORMA.

Matth.

Folia, caules, & flores gerit cæterorum generum similes, radicem quæ graminis modo serpit, & quæ hinc inde numerosa edit tubercula scorpionum effigiem præferentia, candida, tenera ac dulcia.

LOCVS.

Idem.

Nascitur & hoc in altissimis montibus, vbi sylvestres capræ inhabitant.

QUALITATES,
ET VIRES.

Idem.

Radix canes, vulpes, & lupos necat cum carnibus duarum drachmarum pondere propinata: Est enim lethalis, & deleteriæ facultatis.

* CENSURA.

Arabum *Doronicum* non esse hoc nostrarum officinarum *Doronicum* facile assentior Autori, pro quo radicem *Galangæ* vel *Zedoariæ* cum pauco cortice *Citri* substituendam esse cum alijs peritis medicis censeo. Sed venenum esse illud & hominibus lethale, nondum comprobauit experientia, licet canes interimat. Venatores certe multis in locis apud nos, præsertim vbi sunt venationes *Rupicaprarum*, comedunt contra vertiginem & vocant, *Schwindelkraut*. *

* TORA



*TORA maior, Toxicum Valdensium. Italis, *Thora Gualdeſe*.

TORA MAIOR.

FORMA.



Folia habet Cyclamino ſimilia, circinata & aſpera, non hirsuta, per ambitum crenata, duo, tria, quatuor, aut etiam quinque ab vna radice, magnitudine & figura ferè foliorũ Cucumeris. Flores proferet æſtatis principio, Ranunculo colore & ſpecie ſimiles, & ſemen etiam ſimile. Radices plures, coniunctæ vt aſphodeli ex vno capite producentes, cum recentes ſunt omnium candidiſſimæ ſunt, non tamen alabaſtri modo ſplendentes, ſicceſcentes vero ad ruſſum colorem abeũt.

QUALITATES,
ET VIRES.

Caustica viſiſſi in eſt & veneno Napellum ſuperat. Eius ſucco venatores ſagittas inſiciunt.*

Fff 5

*TORA

Minoribus folijs constar,
ad plurimum tribus ab vna
radice, sæpius verò singulari
tantum folio prædita est. Flo-
res quoque minores sunt, si-
miles tamen, uti & semen. ra-
dices longiusculam habent ap-
pendicem scorpij caudæ æ-
mulam, qua se propagare vi-
detur.*



Aconit-

NOMINA.

327

ACONITVM II. Luparianoſtra. German. Wolffſturz.

ACONITVM II.

Flores habet luridos aut
luteos pallescentes.

LOCVS.

Nascitur hoc, cum ceteris *Matth.*
infraſcriptis generibus, in al-
tis montibus, & præſertim in
monte Baldo in Veronenſi a-
gro.



ACONI-

ACONITVM III. * Aconitum hyemale.

ACONITVM III.

Folia explicat rotunda in
 rotæ modum, per ambitum
 incisa, innitentia oblongo pe-
 diculo. flosculus hyeme nasci-
 tur aureus, Ranunculi æmu-
 lus, qui si minor fuerit flauior
 est, si maior aut longiusculus
 obscurioris est flauedinis,
 quem subsequuntur siliquæ
 omnino similes ellebori nigri
 siliquis, sed in diuersum ma-
 gis tendunt. Radix ex pluri-
 bus tuberculis aut granis cõ-
 ponitur, acri sapore & fer-
 uenti.*



ACONT-

ACONITVM IIII.

*Flores promit caeruleos
caudatos.*



ACONI-

Flores illi insunt * crocei, folia vitigineis aut ficulneis accedunt magnitudine ac figura seu diuisione, maculis verò albis & liuescentibus venis deformantur, radix nigricat. Sic enim pinxit peritiss. pharmacopola Veronensis Franciscus Calceolarius, cui etiam sequētes picturæ acceptæ referendæ sunt.

LOCVS.

Magna eius copia inuenitur in monte Baldo.*



ACONI-

ACONITVM VI.



* Napello simili folio sed
multo maiore conspicitur
& albis quibusdam seu pal-
lidis liuescente venulis, flo-
ris figura ad lupariam no-
stram accedit, colore pal-
lescente luteoue.*

ACONIT

Flores mittit purpureos.



ACONI-

ACONITVM VIII.

* Floribus prouenit rube-
scentib⁹, folio ferè vitigineo,
radice quadruplici ab vno ca-
pite crasso.*



Ggg

ACONI-

Luteos gerit flores, * radi-
ce duplici, diuaticata sustine-
tur, minora & graciliora
quam alij napelli folia & ma-
gis dillecta promit. Anteram
forte aliquis non male exili-
maret nisi maior & longior,
vt mihi videtur, hæc esset. *




HERBA

HERBA paris, quibusdam vva versa, siue vva lupina. Italis, *Herba Paris*. Germanis, *Wolfsbeer*/sen *Sternfraut*. Gillis, *Ruissin de Renard*.

HERBA PARIS.

FORMA.



Vno tantum constat caule, *Matth.* rotundo duorum dodrantum longitudine, è cuius medio quatuor erumpunt folia, eodem ambitu crucis instar patentia: sanguineæ virgæ similis: vnicam in summitate baccam gerit, purpuream, acinovæ similem, atq; vinoso succo prænantem: numeroso intus semine, albo, minutoque halicacabi modo: radiantibus quatuor subtus foliolis, oblongis, & acutis: Radix illi subest tenuis, ac multifida.

LOCVS.

Prouenit in montibus: in *Idem.* conuallibus, & frutetis.

QUALITATES.

Herbavnâ cum baccis re- *Idem.* frigerat, & siccat.

VIREs.

Semen quod è baccis eximitur (vt quidam asserunt) semidrachmæ pondere *Idem.* potum, eos maximè iuuat, qui aut ex morborum diuturnitate, aut veneficijs, amentia tenentur. Baccæ antidotis admiscuntur, quæ contra deleteria pharmaca parantur: Herba recens tiffa, & illita, genitalium tumores, & inflammationes sanat, ac pariter oculorum phlegmonas: paronychijs quoq; medetur.

CENSURA.

Errant, atque maximè hallucinantur, qui hanc plantam Aconitum pardalianchem faciunt.

Ggg 2

NAPEL-

NAPELLVS. Italis, *Napello*. Chymistis, *Herbatoria*. Germanis, *Blau Eysenhit-
lin*, *Barrenkappen*.

NAPELLVS.

F O R M A.

Matth.

Folijs exit quinis ex vno pediculo prodeuntibus, circum quaq; diuisis, supina parte albicantibus; caulem edit bicubitalem, subrufescētem, striatumq;: in cuius fastigio flores exeunt, purpureo colore, horum sylvestris modo: Hos sequuntur corniculatæ siliquæ, sursum spectantes, ternæ ex vno quoq; pediculo prodeuntes, in quibus semen concluditur nigrum, ac minutum. Radice nititur turbinata, subnigricante, à qua numerosæ oriuntur fibræ, in retis modum complicatæ. * Appinxi radicem aliam eiusdem plantæ, quæ cum illa effosa ex eodem serobe extracta fuit. nullus ei caulis apparuit, sed germen tantum albicans quasi nunquam germinasset. Fibris aliquot quibus abundauit, resectis, quædam relictæ sunt. *



L O C V S.

Idem.

Nascitur in montibus, & in conuallibus.

Q U A L I T A T E S.

Auicē.

Excalfacit, & siccatur ordine quarto.

V I R E S.

Idem.

Venenum est perniciosum. Linctum tamen vitilignes tollit, eius antidotum est Diamoschos.

ANTO-

ANTORA, siue Antitora. Italis, *Antora*. Germanis, *Giffthcil*.

ANTORA.

FORMA.



Caulem edit sesquidodran- *Matth.* talem, rotundum, firmum, in quo multifida, ac tenuia, disparibus interuallis oriuntur folia, numerosa, in latus, sese diffundentia. Flores edit summo caule numerosos, * In luteo pallescentes (purpurei nodum à nobis visi *) Napelli emulos, sed minores: radices duas foli- das, oblongas, turbinatas, oli- uæ crassitudine, subnigrican- tes, sed alba intus carne, nardi montanæ modo.

LOCVS.

Prouenit in Gallia Cifalpi- *Idem.* na, & Liguria montibus.

QUALITATES, ET
VIREs.

Præstant radices ad epotum napellum, & ad cætera quæ- cunq; venena: quin etiam ad vi- perarum & cæterorum serpentium ictus. Vermes intestinorum necant. Propi- nantur quoq; commodissimè ad tormina, & cæteros intestinorum cruciatus: & contra pestilentiam: auxiliantur omnibus cordis affectibus. Dantur magno auxilio pestilenti febre: cum exanthematibus laborantibus: & cum legitimo Doronico careamus, eius loco per quàm bellè supponi possunt.

APPENDIX.

Antoræ radices, ego quidem Auicennæ Zedoariam esse censeo, quòd vnà cum napello proueniant.

Ggg 3

* ANTO-

Et hoc obseruauī, non v-
niusmodi figurā representa-
re radices Antoræ, aliæ enim
singulare tuber habent, aliæ
geminæ coherent, suntq; vel
turbinata, vel oblongæ, non-
nunquā triplices inueniuntur,
nonnunquā quæ Scorpionum
imaginem imitantur. Hanc
itaq; varietatem icone adie-
cto rei herbariæ studiosis in-
dicare volui.*



CICV-

NOMINA.

839

CICUTA. Græcis, *Κώρεον*. Arabibus, *Sucaram*. Germanis, *Schirling*/seu *Witt-
rich*. Hispanis, *Cegula*. Gallis, *Cigue*, *Segue*, sine *Cocue*.

CICUTA.

FORMA.

Caulis edit geniculatus, Diosc.
ut feniculi, grandis, folia fe-
rula, angustiora tamen, odo-
re graui: Rami, in umbella
in summo prodeunt, flores
quoque albicantes, & semen
aniso candidius: radice non al-
ta, concaua.

LOCVS.

Nascitur passim propè vr- *Matth.*
bium, & oppidorum mœnia,
& secus itinera.

QUALITATES.

Facultatis est extremè refri- *Galen. s.*
gerantis. *simp. me.*

VIREs.

Lethale venenum est: suae. Diosc.
nim vi refrigeratoria necat:
Herba cum comatrita, & te-
stibus circumlita, libidinum
imaginationes, in somno compefcit, sed genitale resoluit. Lac puerperarum
extinguit mammis apposita: In virginibus mammas coerct, & crescere non
patitur. Ab Alinis deuorata, tam improbum ijs soporem inducit, vt mortui *Matth.*
videantur.

Ggg 4

Taxvs,



Taxvs, Græcis, Σμίλαξ. Italis, Tasso, seu Naffo. Germanis, Eibenbaum. Hispanis, Teño. Gallis, Tf.

T A X V S.

F O R M A.

Diosc. Arbor est Abietis magnitudine, & foliorum eiusdem figura. Baccas fert rubentes, atq; vinosas, glutinosasque: Ligni materies rufa, venosa, robusta, ac ferè incorrupta: qua hastæ, arcus, & tela fiunt.

Matth. Provenit in montibus saxosis locis.

L O C V S.

Q U A L I T A T E S.

Galen. 8. simp. me. Facultatis est venenosæ.

V I R E S.

Diosc. Baccæ ab hominibus deuorata, alui profluium excitant: Læduntur maximè, qui in Narbonensi agro sub taxi umbra obdormierint: imo sæpius moriuntur. Bo-
Matth. ues foliorum pastu necan-
Diosc. rur. Quare de taxo hæc traduntur, vt ab ea caueamus.



A P O C Y -

N O M I N A.

341

APOCYNVM, Græcis, *Αποκύνον*. Italis, *Apocimo, siue periploca*.

APOCYNVM.

FORMA.



Frutex est longis viticulis **DIOSC.** constans, malè olentibus, lentis, vitiliumque modo obsequiosis, fractu ferè inuictis: folio haderæ, molliore tamen, & per extremum acutiore, odore graui. Id luteo succo turget: siliquæ ceu fabarum: folliculari specie; digiti longitudine protenduntur: semine intus duro, paruo, nigro.

LOCVS.

Prouenit in Syria & Apulia. *Matth.*

QUALITATES.

Est autè hominibus venci- *Galen. 6.* num. Herba multum grauius *simp. me.* olens: proinde omnino calida est non instrenue: non tamè proportionè desiccatur. Itaque illita, admodum digerentis est facultatis.

V I R E S.

Folia cum adipe in panes coacta, canes, lupos, vulpes, & pantheras enecant **DIOSC.** in cibo data, & protinus eorum coxendices resoluunt.

Ggg 5 Apocy-

APOCYNVM repens. Italis, *Apocino serpeggiante.*

APOCYNVM REPENS.

FORMA.

Matth. Folia promit alterius longiora, caules, seu potius viticulas obsequiosas, & fractu contumaces, lentasque: quibus non solum humi repit, sed arbores quantumvis proceras scandit, tota planta lacteo succo tithymali modo scatet: sed non ut in altera luteo. Est & in siliquis differentia: namque in hac planta binæ ex uno pediculo in origine coniunctæ prodeunt, & in sese invicem inflexæ, nerij siliquis perquam similes.

LOCVS.

Idem. Prouenit hæc planta copiosa in Apulia, & Calabria.

QUALITATES,
ET VIRES.

Idem. Creditur ijsdem pollere viribus, quibus & alterum.



NERIVM

N O M I N A.

845

NERIVM, seu Rhododendrum, Græcis, Νήγιον, ἢ ῥοδὸδένδρον. Italis, Oleandro. Germanis, Oleander. Hispanis, Adelfa. seu Elocandro. Gallis, Oleandre, Rosage, seu Rosagine.

NERIVM SEV RHODODENDRVM.

F O R M A.



Arbor est vulgaris notitiæ, DIOSC. longioribus, quàm amygdala folijs, crassioribusque: flore in rosam cōformato: fructum fert cornu similem, qui patefactus, quandam lanosam naturam ostēdit: spinosarū plantarum pappis similem: Radice longa, acuta, lignosa: gustanti salsa.

L O C V S.

Nascitur in amœnis, mari- Idem. timis, & secus amnes.

Q U A L I T A T E S.

Foris quidem corpori illi- Gal. li. 3. tum, discutienti vim obtinet, simp. me. intra verò in corpus assumptum, perniciosum non tantum hominibus, sed plerisque etiam pecudibus.

V I R E S.

Flores & folia, mulis, asinis, canibus, & quadrupedum plurimis venena sunt: DIOSC. hominibus verò contra serpentium morsus præsidia è vino pota, & eo magis addita cuta. Iam ecillè etiam animantes, ut oues, & capræ, si aquam bibant, in qua folia maduerint, moriuntur.

F Y N G I.

FVNGI, Græcis, Μυκήτες. Arabibus, Hatar, seu Fater. Italis, Fonghi. Germanis, Schwamm/Pfifferling/Weisfen. Hispan. Hongos, Cogomelos, seu Cylerques. Gal-
lis, Capignon, seu Potyron.

G E N E R A.

DIOSC. Fungorū genera, numero-
sa quidem sunt, verū quædā
esculenta sunt, quædam verò
perniciosa.

F O R M A.

Matth. Vt quidem varia spectatur
facie, ac colore, ita hominib.
maximè noti sunt fungi: pluri-
mi tamē galeri modo forman-
tur palmari: ac etiā minori pe-
diculo nitētes, vario superius
inferiusque colore.

L O C V S.

Matth. Nascuntur quidam in pra-
tis, pleriq; in pascuis, nonnul-
li in syluis, quidam in frutetis,
& aliqui in arborum caudici-
bus.

Q U A L I T A T E S.

Gal. li. 3. Fungus, frigida, humidaq;
simp. me. planta est: quamobrem etiam proximè ad deleteriam, enecantemque faculta-
tem accedit, & sanè inter eos sunt, qui interficiant, præsertim, qui ex natura mi-
stam habent qualitatem putredinosam.

V I R E S.

DIOSC. Multis de causis venenosi gignuntur: vbi videlicet clauus ferreus rubigino-
sus, aut panni marcor affuerit, aut si iuxta serpentis cauernam, arboresque, qui
priuatim noxios patiunt fructus. Qui verò esculenti sunt, suauē in iuribus gra-
tiam habent: largius tamen deuorati, nocent, & ægrius concocti strangulant,
aut choleram morbum gignunt.

COLCHI-

F V N G I.



COLCHICVM, sine Ephemerum, Græcis, Κολχικόν. Offic. falso *Hermodactylus*. Arabibus, *Surugen*. Italis, *Colchico*, & *Zaffarano salustico*. Germanis, *Zeitloß* aut *wild Safran*. Gal. *Mort au chien*, seu *chiennæ*. *A. Colchicum polyanthon flores albos profert. B. vulgare purpurascens. C. apices intus albos habet, reliqua luteos.*

COLCHICVM.

FORMA.



Autumni exitu florem ge- Diosc.
rit croci, subalbicantē, postea
verò folia bulbi, sed pingui-
ora, caulē palmo altum, feren-
tem rufum semen: radicem
foris è nigro rufescentē, quæ
delibrata candida, & mollis
spectatur: lacteo succo ma-
der, gustu dulci: bulbus eius
mediam habet rimam, fissu-
ramque qua flos erumpit.

LOCVS.

* Nascitur in pratis, & pa- Matth.
scuis.

QUALITATES.

Strangulando necat: est e- Gal. li. 6.
nim deleteriæ facultatis. simp. me.

VIREs.

Deuorata radix, fungorum Diosc.
more strangulando necat.

*I.Flos

*I. Flos Colchici Vere prodiens. II. Folia & folliculi seminum. III. Folliculus & semina separatim picta.

Mense Aprili nonnunquā Colchici florem inveni prodeuntem ex folijs breuiusculis ternis, herbaceis, quibus antequam emergat, inuoluitur. Flos ipse obsoletiore colore purpurascit, quā qui autumnō prodit, apices paruos luteos habet, & totus etiam minor strigosiorque apparet.*



HERMO-

HERMODACTYLVS, Græcis, ἑρμόδακτυλος. Arabibus, *Saragen*. Italis, *Hermodactilo*.

HERMODYLVS.

FORMA.

Folia mittit prælonga, binū *Matth.* didrantum, ac etiam longiora, porri, aut asphodeli quadante nus similia, longè tamē angustiora, breuiora verò sunt, quæ circa radicem exeunt. Radices habet quatuor ex vna eademque basi prodeuntes, digitorū figura, colore subrufescente, albis in summitate ungibus: caulis è medio proflit tenuis, in cuius summitate oblongum prominet capitulum pyri figuræ, ephemeræ colchici modo.

LOCVS.

Oritur in Orientalibus re- *Matth.* gionibus, & in Arabia.

QUALITATES.

Excalfacit & siccit ordine *Mesue.* secundo. Cum humiditate ex- *Serap.* crementosa, flatulenta.

VIRE.

Pituitā crassam, & præsertim ab articulis trahit: ac proinde podagris, ac catarractis articulorum morbis confert. Impinguat, genitale semen auget, & vlcera purgat, & carnem in his putrem consumit.

CENSURA.

Errore magno ducuntur, qui Colchico nostrate, Hermodactyli loco vtuntur.

PSEUDO-



PSEUDOHERMODACTYLVS, * Dens caninus vulgo. * Italis, Hermodactylus bardo.

PSEUDOKERACYLVS.

FORMA.

Matth.

Folia habet aquaticæ plantaginis, minora tamen, infirmioraque, longo pediculo nientia: caulem tenuem, singularem, in cuius summo flos emicat albus, * nonnihil purpurascens, * stellæ figura. Radices habet binas, * plures vel pauciores, * bulbosas, candidas, teneras.

LOCVS.

Idem.

Prouenit in frutetis, & propter semitas, & sepes.

QUALITATES,
ET VIRES.

Idem.

Sunt qui radices probent ad ea omnia, ad quæ legitimus hermodactylus conferre potest. Nos verò horum sententiam nec probamus, nec improbamus, cum nullam certam de eo habeamus experientiam.



HELXI.

HELXINE, Grecis, ἐλξίνη ἢ περδίκιον. Officinis, *Panetaria*. Italis, *Vetriola*. Germanis, *Tagvnd Nacht*. Hispanis, *Terua del muro*. Gallis, *Paritoire*.

HELXINE.

FORMA.

Folia profert mercurialis, *Diosc.* hirsuta, cauliculos subrubentes, & circa eos veluti semina aspera, adhaerentia vestibus.

LOCVS.

Nascitur in domorum parietibus, sepibus, & macerijs, arido solo.

QUALITATES.

Vis ei inest abstergendi, & *Gale. 6.* leniter constringendi, cum *simp. me.* humiditate subfrigida.

VIRES.

Folia illita, sacrosignes, ad *Diosc.* uista, condylomata, incipientes panos; tumores, inflammationesq; sanant. Succus eius, cum cerussavlceribus, quę serpunt commodę illinitur: imponiturq; podagris cum hircino adipe, veterem tussim

emendat, instar cyathi haustus: Gargarizatur, ac illinitur vtiliter tonsillarum inflammationibus: aurium dolorem mulcet, cum rosaceo instillatus. Vis herba quoq; magna ad vulnera recentia sananda: Si enim recens semicōtusa vulneri adalligetur, & tertia die solvatur, non erit opus alio medicamento: foliorum succus defecatus, potus trium vnciarū pondere: cum saccharo, urinā mirificę propellit: & renes abstergit: Folia super regulā ignita calefacta, & albo meraco aspersa: pubiq; illico imposita, calculosis, & urinę malo affectis mirificę auxiliatur. Additur commodę in clysterijs, quā ad ventris, & vteri dolores parantur. Stillatitia eorum aqua faciem abstergit, & eius nitorem conciliat.

Hhh

ALSINE,



ALSINE, Græcis, *ἀλσιν*. Italis, *Centone*, *Paparina*, *Budello di Galline*, & *Centouice*. Germanis, *Hünerdarm* seu *Vogelkraut*. Gallis, *Mouron*.

ALSINE.

GENERA.

Matth. Plura eius sunt genera, quæ in maiora, & minora diuidi possunt.

FORMA.

DIOSC. Minus folia habet ad similia helxinæ, sed humiliora, minimeque hirsuta, adeo ut muscutorum auribus similia videantur: cum teruntur cucumerem respiciunt.

LOCVS.

Idem. Locis opacis gaudet.

QUALITATES.

Gal. lib. 6. Facultatem habet refrigerantem, & humectantem: est enim essentia aquæ frigida: quare, & citra adstrictionem refrigerat.



VIREs.

DIOSC. Vim refrigerandi, adstringendi que obtinet: oculorum inflammationibus cum polenta illinitur, succus aurium doloribus infunditur. Ex oleo chamæmelino seruefacta illinitur vtiliter ventri contra tormina, & vteri dolores.

* ALSI-

* ALSINE MAIOR.

FORMA.

Maior alsine cognomento arguit, quid à minore discrepet. Longè altius enim surgit & si sustentacula consequitur, quibus niti queat, humanam altitudinem superat, folia & cauliculi respondent minori sed hi grandiores illa ampliora spectantur. Flosculi candidi stellati pulcre staminibus ruffis in medio exornantur. Semen minutum luteum in vasculis oblongis clausum latitat.

LOCVS.

Nascitur in frutetis & humido solo gaudet.

QUALITATES ET
VIRE.

Hæc cum prioris qualitatibus viribusque conueniunt.



Hhh 2

LENS

LENS palustris, Græcis, φακός ὁ ἐν τῶν τελευμάτων. Arabibus, Tahaleb, sen Taleb. Italis, Lente aquatica, & lenticulana. Germanis, Wasser-Hirsen / vel Wasser-Lin. sen. Hispanis, Lenteyá della goa. Gallis, Lentille de mer.

LENS PALVSTRIS.

FORMA.

DIOSC. Muscus est aquæ innatans, folijs lenticulæ similibus.

LOCVS.

Idem. Inuenitur in aquis non fluentibus.


QUALITATES.

Galen. 8. Humidæ, frigidæque temperaturæ est, vtrinque ex secundo quodammodo ordine.

VIREs.

DIOSC. Illinitur conuenienter collectionibus, igni sacro, & podagris, tum per se, tum cum farina hordeacea. Glutinat & puerorum interanea. Stillitia eius aqua (quorundam testimonio) datur commo-

distimè ad internas viscerum inflammationes, & ad pestilentes febres: præstat quoque ad oculorum ruborem, & palpebrarum phlegmonas, & ad mammarum, testiculorumque collectiones, antequam augeantur. Herba ipsa recens fronti adhibita, capitis dolores mulcet, vbi à calore prouenerint.



LENS

N O M I N A.

853

LENS palustris altera. Italis, *Lente palustre del seme.*

LENS PALVSTRIS ALTERA.

FORMA.

Caulem gerit repentem, *Matth.*
angulosum, à quo plura, per
interualla catenatim oriun-
tur folia, prælongis, ac tenui-
bus pediculis nitentia, quæ
quaterna, crucis in modum
sefe pandunt, subrotunda, se-
men profert racemosum, in
ipso caule, lentium ferè effi-
gie, subnigrum, densum, du-
rumque.

LOCVS.

Nascitur in paludibus, la- *Idem.*
cubus, & cæteris stagnanti-
bus aquis.

QUALITATES, ET
VIRE.

Nihil habeo, de qualitati- *Idem.*
bus, & viribus, quod probare
possim, non tamen ambigo,
quin sit frigida humidæque
temperaturæ.

Hhh 3 SEMPER-



fen Taleb.
Saffor & m



um, testi-
onti adhi-

LENS

SEMPERVIVVM, siue sedum maius, Græcis, Αἰζων μέγα. Arabibus, Beia halalen, seu Hui albale. Italis, Sempreviuo maggiore. Germanis, Groß-Hauswurk. Hispanis, Semperviva, seu Yerua puntera. Gallis, Iou barbe.

SEMPERVIVVM MAIUS.

GENERA.

Matth. Plura sunt semperuii genera, Maius, Minimum, & arborefcens.

FORMA MAIORIS.

Diosc. Caulis cubiti altitudinem implet: interdum excedunt, pingues, pollicari crassitudine, in cacumine linguæ similis: alia in terram conuexa, alia inuicem in capite stantia, ita, ut in ambitu effigiem imitentur oculi.

LOCVS.

Idem. Nascitur in montibus, faxis, testaceis, & supra domicilia etiam seritur.

QUALITATES

Gale. 6. Leniter quidem desiccat, simp. me. quandoquidem & mediocriter adstringit, omnis alterius vehementis qualitatis expers; quare in eo plus ceteris abundat essentia aquea: Caterum non mediocriter refrigerat. est enim ex tertio ordine, & recessu refrigerantium.



VIRE.

Diosc. Medetur igni sacro, nomis, vlceribus, quæ serpunt, oculorum inflammationibus, ambustis igni: folia per se, & cum hordeacea farina illita, podagris auxiliantur: succus illitus, capitis dolores mulcet: & præsertim si cum rosaceo infundatur: Datur potandum ad phalangiorum ictus, dysenteriam, aluiq; profluuia: teretes tineas potus in vino excutit: subditus in vellere, mulierum abundantiam sistit: Idem oculorum lippitudinibus inungitur.

SEMPER-

NOMINA.

855

SEMPERVIVVM, seu Sedum minus, Græcis, Αἰζωνία. Italis, *Semprenio minore*. Germanis, *Klein-Haustvurk*. Gallis, *lou barbe petit*.

SEMPERVIVVM MINVS.

FORMA.

Caulibus provenit ab vna DIOSC.
radice multis, tenuibus. cre-
bro foliatis: exilibus folijs,
rotundis, pinguibus mucro-
natis: caule à medio emican-
te palmum alto. umbellam,
herbidosque flores, & te-
nues gerente.

LOCVS.

In petris, parietinis, & ma- *Idem*.
cerijs, nec non in scrobibus
opacis nascitur.

QUALITATES, ET
VIRES.

Folia eisdem cum priori, *Idem*.
viribus prædita sunt.



Hhh 4

SEMPER-

SEMPERVIVVM minimum, siue tertium, Græcis, Αειζώνες τρίτον. Arabib.
Halsebram, Handrachabara, seu Tilafon. Italis, Herba grassella, siue Sempre vino mi-
nuto. Germanis, Wauer Pfeffer.

SEMPERVIVVM MINIMUM.

F O R M A.

DIOSC. Folij prouenit pusillis,
crassioribus, hirsutis, portu-
lacæ proximis.

L O C V S.

DIOSC. Nascitur in muris, locis
Matth. saxosis, & secus itinera.

Q U A L I T A T E S, E T
V I R E S.

DIOSC. Visei excafactoria, acris,
exulcerans. Illita folia cum
axungia, strumas discutiunt.



SEMPER-

NOMINA.

37

SEMPERVIVVM Arborefcens, primum: Italis, *Sempreviuo Arborea.*

SEMPERVIVVM ARBORESCENS.

FORMA.

* Caulem profert ſesqui-
cubitalem, vel interdum al-
torem, craſſum & frangi con-
tumacem, carnoſo obductū
cortice, in quo folia carnoſa
ſucculenta circundant ena-
tos cauliculos in multos te-
nues pediculos diuifos ſuſti-
nentes luteos ſtellarosq; flo-
res, radice nititur in multas
propagines diuaticata.

LOCVS.

In Orientis ac Græciæ pro-
vincijs, marisq; Mediter-
ranei Inſulis, Creta ſive Can-
dia, Rhodo, Zacintho, & alijs
ſpōte rectis innafcitur. Apud
nos, imo etiam in Italia non
niſi in hortis cultioribus in-
uenitur.

QUALITATES, ET VIRE.

Huc refer quæ de maiore
ſedo dicta ſunt.*

Hhh 5

VMBI-



UMBILICVS Veneris, siue Acetabulum. Græcis, κοιλιδὼν ἢ δὲ κυμβάλιον. Italis, *Bellico di Venere*. Hetrulcis, *Copertoiole*. Hispanis, *Seuantes*. Gallis, *Escudes*. Germanis, *Graven Nabel*, *Nabel Kraut*.

UMBILICVS VENERIS.

GENERA.

DIOSC. Duum est generum. Alterum acetabuli, alterum maioris fedi figura.

FORMA PRIMI.

Idem. Folio est in acetabuli formam tornato, latenter concauo, breui cauliculo, in quo semen inest, radice oliuæ modo rotunda.

LOCVS.

Gale. 7. Nasceitur frequens in saxis, limp. me. & vetustis ædificiorum parietibus, & in oppidorum mœnijs.

QUALITATES.

Mixta est qualitatis, nempe humidæ subfrigidæ, & cuiusdam obscure adstringentis, & cum ea leuiter amaræ. vnde refrigerat, repercutit, abstergit, & discutit.

VIRES.

DIOSC. Foliorum & radicum succus, cum vino circumlitus, instillatûsve, contexta genitalia nudat: inflammationibus, sacris ignibus, strumis, pernionibus illitum auxiliatur. Stomachi ardorem refrigerat: folia cum radice comesta calculos frangunt, vrinam cient, hydropicis ex melle dantur. Phlegmonas Erysipelatodeis: Erysipelata phlegmonodeis curant.

UMBILI-



UMBILICVS Veneris alter. Græcis, Κοτυληδάριον. Italis, *Bellico di Venere* secondo.

UMBILICVS VENERIS ALTER.



FORMA.

Pinguibus exit folijs, latioribus, ligularum modo densis, circa radicem, medium oculi ambitum describentibus, ut in maiore semperuiuo: adstringentis gustus: cauliculo tenui, in quo flores, & semina hyperici: radice maiuscula.

LOCVS.

Nascitur in saxosis montibus, & petris.

QUALITATES ET VIRE.

Facit eadem, quæ semperuiuum.

CYMB-

Gallis,

entecta
as illitu
alculos
pelato-

MBILI-

CYMBALARIA, Italis, *Cimbalaria*.

CYMBALARIA.

F O R M A.

Matth.

Emuris comæ modo dependet, cauliculis numerosis, tenuibus, funiculi instar prælongis, lentisq; è quibus folia prodeunt hederacea, pingua, longis pediculis adnexa: flosculis parvis lutescentibus, qui è tenuissimis quoq; pediculis exeuntes, clauicularum modo sese implicant.

L O C V S.

Matth.

Nascitur in antiquis, vliginosisq; ædificiorum parietibus, macerijs, & saxis.

Q U A L I T A T E S.

idem.

Facultatis est humidæ frigidæque, cum adstrictione quadam.

V I R E S.

Idem.

Iis profectò hanc plantam pollere facultatibus, factò periculo constar, quibus primi generis cotyledonem. sunt qui eavtantur ad alba vteri profluvia, eandem recentem in acetarijs propinantes.

C E N S V R A.

Tametsi hæc planta Veneris umbilici viribus prædita sit, errant tamen, qui putant hanc ipsam herbam Veneris umbilicum.

V R T I C A,



VRTICA. Græcis, *Ἀκρόνη*. Arabibus, *Huniure*, seu *Angiara*. Italis, *Ortica*. Germanis, *Welsch* oder *Dörmisch* Nessel. Hispanis *Ortiga*. Gallis, *Ortie*.

VRTICA.

GENERA.

Trium est generum. Prima asperior. Altera non æquè aspera, & tertia omnium minima.

FORMA PRIMÆ.

Sylvestrior hæc est, asperior, latioribus, nigrioribus-^{Diosc.} que folijs. semine lini, sed minore. ^{Matth.} Caule rotundo, aspero, hispidoque, ac pungenti: pilulas in caule gerit hirsutas, ac vrentes, in quibus semen gignitur.

LOCVS.

Prouenit calidis tractibus, ^{Matth.} aridis, & incultis locis.

QUALITATES.

Semen, ac folia digerentis ^{Gale. 6.} sunt facultatis, sed & quid-^{simp. me.} dam flatuosum obtinent; quo venerem extimulant: porro non vehementer calefacit, sed admodum tenuium est partium.

VIRE.

Folia cum sale illita, canum moribus medentur, gangrenas, carcinomata, ^{Diosc.} sordida vlcera, & quæ cacoethe vocantur, stem luxata, panos, tubercula, parotidas, suppurationesque sanant: lienosis cum cerato imponuntur: cum succo trita, & natibus indita, sanguinem fluentem cohibent. Ciunt menses trita, & cum myrrha supposita: procidentes vuluas restitunt, suo contactu: semen ex passo potum venerem stimulat, & vuluæ era patefacit, cum melle delinctum, orthopnæ, lateris, & pulmonum inflammationibus prodest: toracem expurgat. Cocta cum conchis folia, aluum emolliunt, vrinas mouent, inflationes discutiant..

VRTICA



VRTICA altera, Græcis, *Αγρίνητέρα*. Italis, *Ortica volgare*. Germanis, *Ger
mein Brennessel*.

VRTICA SECUNDA.

FORMA.

Matth. Folij3 prouenit alterius si-
milibus, verum non æque
asperis: semen profert race-
mosum, ac minutum: caulem
quadrangulum, asperumq3;
tactu acuto, ac pungente.

LOCVS.

Idem. Nasctitur vbicunque.

QUALITATES, ET
VIREs.

Idem. Iisdem cum altera est fa-
cultatibus: atqui peculiari-
ter seminis puluis, sangui-
nem è cerebri membranis
manantem supprimit.

* Seminis huius in Offici-
nis Septentrionalium, cum
destituuntur Romanæ vrticę
semine, plurimus est vsus,
Folia vino incocta & pota
ventrem molliunt, flatus dif-
cutiunt, cholicos dolores sedant, (nisi obstructio illos genuerit) vrinam cient,
& renes purgant. Idem præstat & quidem efficacius in vino dulci coctum se-
men, vel ex melle sumptum. [Aqua destillata ex vrticis vulnera mundificat si ea
lauentur. Radices in vino decoctę, addito parum mellis tussientibus & asthma-
ticis profunt, & pleuriticis, morbisq3; ex viscosa pituita ortum habentibus.*



VRTI-

VERTICA tertia, Græcis, *Αγγλίχη τρίτη*. Italis, *Ortica minore*. Germanis, *Hei-
ter Nessel*.

VERTICA TERTIA.



FORMA.

Folia profert cæteris simi- *Marth.*
lia, sed longè minora, acutio-
ra, vrentioraque: caule do-
drantali, hispidiore, ac vren-
te, deffloribus folijs, & in am-
bitu serratis.

LOCVS.

Nascitur secus ædificio- *Idem.*
rum muros, in hortis, & ferè
vbique.

FACULTATES ET
VIRE.

Non minus valet, quàm *Idem.*
cætera genera.

CARDIA-

is, Ge

m cient,
ctum se-
icat si ea
asthma-
bus.*

VRTI-

CARDIACA, Italis, *Cardiaca*. Germanis, *Herzgespann* / *sue* *Herzgesperr*. Gallis, *Gripaume*, seu *Cheneuse*.

CARDIACA.

FORMA.

Matth.

Facie vriticam quadantenus referre videtur, folijs tamen, quæ prope terram sunt, rotundioribus constat, & ramunculi ferè modo per ambitum laciniatis: caulem habet quadrangulum, ramis copiosis pariter quadratis, in quibus bina vtrinque folia, paribus interuallis ab imo, ad summum exeunt, sed minora, & per ambitum magis diuisa: flores in purpura albicant & verticillato ambitu, marrubij modo, caulem ambiunt. Radix in rubro pallescit.

LOCVS.

Idem.

Prouenit in ruderibus: iuxta semitas, & propè vrbi-um mœnia.

QUALITATES

Gustu vsq; adeo amarescit, vt facillè existimari possit ad secundum exalfacientium ordinem, & ad tertium siccantium accedere.



VIRES.

Præstat (quorundam testimonio) ad omnes cordis affectus, ad conuulsos, ac resolutos: obstructions referat, vrinam ciat, & menses, pectus à pituita detergit. Lumbricos necat. foliorum farina, domestici cochlearis mensura in vino hausta, ægrè parturientibus mirificè opitulatur.

GALIO-

N O M I N A.

865

GALIOPSIS, Græcis, Γαλιόψις. Italis, *Ortica fetida*, seu *Ortica mortua*. Germanis, Daubnessel. Hispanis, *Ortica muerta*. Gallis, *Ortie*.

GALIOPSIS.

FORMA.

Folij, & caule constat vr- Diosc.
tica similibus. tactu tamen *Muth.*
non mordentibus, floribus
purpureis, tenuibusq; odo-
re fatido, ac graui.

L O C V S.

Prouenit in ædificiorum Diosc.
areis. in plateis, iuxta semitas,
& circa hortorum sèpes.

Q U A L I T A T E S, E T
V I R E S.

Folia, caules, semen, suc- *Idem.*
cusq; duricias, & carcinoma-
ta dissipant: strumas, panos,
& parotidas discutunt: opor-
tet bis in die tepidum ex ace-
ro cataplasma imponere, &
eius decocto fouere: ad pu-
trescentia, gangrenas, & no-
mas, cum sale efficaciter illi-
nuntur.



lii

SCRO-

nuillos, ac
uita deter-
ura in vino

GALIO-

SCROFULARIA, Mille morbia, Ferraria, siue Castrangula. Italis, *Scrofularia*. Germanis, *Braunwurk*. * alijs, nescio quam ob causam, *Schwarz Nachtschatt* & *Burntraut*. * Gallis, *Grande Scroulaire*.

F O R M A.

Matth.

Caules abvna radice mittit plures, sesquicubitales, angulosos, subruscetes, in quibus folia insunt nigricantia, robusta, ad verticem faciem accedentia, per ambitum leuiter denticulata. Flores mittit in caulium ramorumque, summitatibus pusillos: purpureosque, galeæ faciem referentes, & semen in capitulo, ut in lino, & blactaria herba, rotundo, acuto summa parte apice. Radice habet magnam, albicantem, strumolam.

L O C V S.

* Prouenit in humidioribus locis & interdum siccis etiam ad sepes & vetustas maceries. *

Q U A L I T A T E S.

Matth.

Desiccat, extenuat, discutit, abstergit: est enim gustu amara, & subtilium est partium.

V I R E S.

Radix præstat recens ad strumas, & hæmorrhoidas sanandas, in quem vsus effoditur autumnus, & repurgata tunditur cum recenti butyro. & operculato fictili, viginoto loco reponitur, bis quinq; aut pluribus diebus. mox lento igne colliquatur butyrum, & percolatum asseruatur: quo postmodum præscripti morbi illinuntur. Idem illitum scabiem sanat: Aqua è radicibus distillata, faciei ruborem illita tollit. Siccæ radicis puluis impositus hæmorrhoidas siccat: Idem drachmæ pondere potus, lumbricos ventris pellit.

C E N S V R A.

Cæcutiunt ad summum vsque, qui Scrofulariam Dioscoridis ocimastrum faciunt, nec minus aberrant, qui eandem Galiopsum esse contendunt.

* SCROFUL-



NOMINA.

367

*SCROFULARIA foemina, Vulgo Germanis, Weiße Nachschare.

SCROFULARIA FOEMINA.

FORMA.

Similis est mari floribus, femine, folijs, caulibus, & odore. Sed magnitudine discrepat & colore, qui cauli folijsq; prorsus viridis est. Totâ planta viriditudinem attingit, Radix paucioribus & interdum nullis ferè tuberculis prædita visitur.

LOCVS.

Ad fossas aquarum nascitur.

VIRES.

Curat vlcera & contusa si mane & sero continuis diebus in foco calefacta & contrita imponatur. idem præstat melius succus eorum cum melle decoctus.*



III 2

GALL-

GALIVM, Græcis, Γάλιον. Italis, Galio. Germanis, Meger Kraut. Hispanis, Col-
ia lecheyerna. Gallis, petit Muguet.

GALIVM.

F O R M A.

Diosc. Ramulum, foliumque ha-
bet aparine simillimum, re-
ctum, florem luteum, tenu-
em, densum, copiosum, odo-
ratum.

L O C V S.

Matth. Nasctur ferè ubiq; copio-
sum, ppe sepes, & secus vias.

Q U A L I T A T E S.

Galen. 6. Facultatem obtinet defic-
simp. me. catoriam, & subacrem. est au-
tem flos boni odoris, & colo-
ris lutei, vel albi.

V I R E S.

Diosc. Flos igni ambustis illinitur,
& sanguinis profluvia sistit:
radix venerem concitat: co-
ma in lacte macerata, illud
coaguli modo condensat, vn-
de illi nomen.



SENECIO,

NOMINA.

369

SENECIO, Græcis, *ἡνιόχον*. Italis, *Cardoncello*, seu *Spelliciosa*. Germanis, *Creutz-
wurk*. Hispanis, *Bon varon*. Gallis, *Senesçon*.

SENECIO.

GENERA.

Dum est generum: Maius, *Matth.*
& minus.

FORMA MINORIS.

Cauliculo est cubitali, sub *Diosc.*
rubro, folijs sensim per extre-
mitates crucæ modo diuisis,
sed minoribus multò, luteis
floribus, qui celeriter disse-
cti, euanescent in pappos, ra-
dice superuacua.

LOCVS.

Nascitur maximè in mace- *Idem.*
rijs, parietibus, & circum op-
pida.

QUALITATES.

Facultatem mistam obti- *Gal. 6.*
net, simul refrigerantem, & *simp. me.*
modicè digerentem.

VIRES.

Folia illita cum vini modico, vel per sese, testium & sedis inflammationes sa- *Diosc.*
nant. Quin etiam cum manna thuris medentur, cum reliquis vulneribus, tum
ijs, quæ nervi acceperunt. Illiti per se, aut cum aceto pappi, idem munus præ-
stant. verùm recentes epoti, strangulant. totus caulis si coctus ex passò potui
derur, stomachi dolores à bile contractos, persanat.

APPENDIX.

Cùm autem herba euidenter sit amara, vt siccet, abstergat, aperiatq; neces-
se est, quare nil mirum fuerit, si fœminæ Epoto foliorum succo, aut totius plan-
tæ decocto, remorantes menses sibi prouocent. ab anis edoctæ.

lii 3

SENETIO



SENETIO maior, Italis, Cardoncello, seu Spelliciosa maggiore. Germanorum offic. Flos S. Iacobi: vulgari verò sermone S. Jacobs Blum.

SENETIO MAIOR, SIVE FLOS
S. IACOBI.

F O R M A.

Matth.

Folia mittit erucæ sylvestris æmula, per ambitum laciniata, nigricantia, amaro gustu, caulis illi est sesquicubitalis, artemisiæ similis, a medio ramulosus, furculosusque. Flos in summitate aureus, qui flaccescens, in pappum evolat lanuginem, Radice est multifida ac breui.

L O C V S.

Idem.

Nascitur in campestribus inculto solo.

Q U A L I T A T E S, E T
V I R E S.

Idem.

Excalfacit, siccit, aperit, abstergit, digerit, & reliquas minoris Senetionis vires obtinet.



Myscvs

NOMINA.

871

Muscus marinus, Græcis, *Βρύον θαλάσσιον*. Arabibus, *Tahaleb, sive Thabel*. Italis, *Corallina*. Germanis, *Weer Witjes*; seu *Weer Weesj*. Hispanis, *Malhor quiana*. Gallis, *Coralline*.

MUSCVS MARINVS.

GENERA.

Duum est generum: Dio- Matth. scoridis alterum, alterum vero Plinij.

FORMA PRIMI.

Gracilis, capillaceusq; pro- Idem. uenit caulis expers, colore cum siccatur subrufescente, falso sapore, odore concharum marinarum simili.

* Varia effigie hic nascitur ut ex pictura patet, colore quoq; discrepat, qui in alio ruber, in alio candidus in nonnullo etiam subluteus esse obseruatur.*

LOCVS.

Nascitur in scopulis testaceisq; Diosc.

QUALITATES.

Compositus est ex terrena, Gal. 6. & aquea essentia, utraq; frigida, siquidem gustum adstringit, & calidis quibusdam illitus, ea euidenter refrigerat, & adiunat.

VIRES.

Præcipua ei spissandi vis, & collectiones cohibendi: podagras iuuat, quas refrigerare opus sit. Peculiari autem sicci dote, admirabilis est facultatis, ad teretes intestinorum vermes pellendos, potui datus drachmæ pondere ex passio, aut cum Egyptiæ filiquæ pulpa.

APPENDIX.

Posse quidem marinum muscum, qui recens fuerit, refrigerare, facile cum Galeno, & Dioscoride concedam: quod vero siccum id efficere possit, quod gustu falso sentiat, non ita facile mihi concedendum videtur.

lii 4

MUSCVS



Muscus marinus alter, Italis, Mosco marino di Plinio.

MUSCVS MARINVS ALTER PLINII.

F O R M A.

Pli. li. 27. cap. 8. Bryon marina herba, sine dubitatione lactucae folijs similis, rugosa, veluti contracta, sine caule, ab ima radice exeuntibus folijs.

L O C V S.

Idem. Nascitur in scopulis, maxime testis terra comprehensis.

Q U A L I T A T E S, E T
V I R E S.

Idem. Præcipua ei spissandi, siccandi; vis, & collectiones omnes, inflammationesq; cohibendi, præcipue podagra, & quicquid refrigerare opus sit.



P O T A -

NOMINA.

873

POTAMOGETON, Græcis, Πόταμωζεντος. Italis, Potamogeto. Germanis, See-
hasden kraut. Gallis, Herbe des estagnes, vel Esphy deaue.

POTAMOGETON.



FORMA.

Foliū fert betæ simile, hir- DIOSC.
sutum, paululum superemi-
nens extra aquam.

LOCVS.

Nascitur in palustribus, & idem.
aquosis.

QUALITATES.

Adstringit, & refrigerat si- Gal. li. 8.
militer polygono, sed essen- simp. me.
tia eius crassior polygono est.

VIRES.

Refrigerat & inspissat, pru DIOSC.
riginibus vtile, & contra ve-
terum vlcera non mas.

lii 5

SAGITTA.

SAGITTA, Græcis, Πισάδα. Italis, Saetta. Germanis, Pfeilkraut.

GENERA.

Matth. Duum est generum. Maius,
& minus.

FORMA MINORIS.

Folia habet robusta, sagittæ auriculatæ figura; pediculo triquetro, spongioso, tesquicubitali, maiori, aut minori pro aquarû profunditate, in quibus vivit: caulem habet rectum, lævem, rotundum, spongiosum: ramulos hic superius mittit, è quibus flores exeunt albi, tribus tantum foliolis circumscripti, è quibus capitula producuntur subpurpurea, hirsuta, nucis Ponticæ magnitudine, in quibus minutum gignitur semen, rotundo intus globulo in hærens. Radice nititur alba, multifida, fibrosa, plantaginis aquaticæ modo, cuius cognitionis sagitta esse videtur.

LOCVS.

Idem. Nascitur in aquis, cum stagnantibus, tum decurrentibus.

QUALITATES, ET VIRES.

Idem. Temperamento est frigido, humidoque, & iisdem cum plantagine aquaticæ viribus pollet.

SAGITTA



NOMINA.

375

SAGITTA maior, Græcis, Πισάνα μέγα. Italis, Saetta maggiore. Germanis, Groß Pfeilkraut.

SAGITTA MAIOR.

FORMA.

Minori est per omnia simili-
lis, sed omnia quoque maio-
ra spectantur: verum folia pō
usq; ad eō acuminata habent-
tur.

Matib.

LOCVS.

Nascitur, vt altera stagnan-
tibus, & decurrentibus aquis.

QUALITATES,
ET VIRES.

Paribus alteri viribus præ-
stat.

STRATIO.



aquati-
GITTA

STRATIOTES millefolium, Græcis, Στατιάτης χιλιόφυλλος. Italis, Millefolio.
Germanis, Carben. Hispanis, Millboyas yerua. Gallis, Millefeuille.

STRATIOTES MILLEFOLIUM.

G E N E R A.

Matth. Duum est generum. Maius,
& minus.

F O R M A M I N O R I S.

Diosc. Exiguus est frutex, palmi al-
titudine, aut amplius assurgit:
folijs auicularum pennas imi-
tantibus: breui admodum dis-
sectoque foliorum exortu: fo-
lia sylvestre cuminū simulant,
præsertim breuitate, breuio-
ra paulò, densiore umbella, &
pleniora: Surculos in cacumi-
ne gerit exiguos, & capitula in
modum anethi: flores paruos,
& candidos.

L O C V S.

Idem. Nascitur in asperis agris,
præcipueque circa semitas.

Q U A L I T A T E S.

Gal. li. 7. Nonnihil habet adstrictio-
simp. me. nis, proinde & vulnera gluti-
nare potest, & vlceribus esse
vtile.

V I R E S.

Diosc. Eximij est vsus ad vlcera ve-
tera, recentiaq; profluentem
Matth. sanguinem, & fistulas. Datur

utiliter foliorum succus ad sanguinis reiectiones. Idem præstat sicci farina ex
symphiti maioris, aut plantaginis aqua pota, eadem naribus indita, fluentem
inde sanguinem compescit: dysentericis commodè infunditur, vnà cum sui-
ipsius succo. Herba recens tusa, pubique illita, mensium abundantiam compe-
scit: Candida millefolij umbella, tusa, & cum sua ipsius aqua pota, aut caprino
lacte, gonorrhæam in viris, in feminis alba vteri excrementa cohibet. Atqui fæ-
licius auxiliatur, si cum corallio, succino albo, & ebore propinetur: foliorum,
& florum farina vncie pondere, vnà cum Armeniæ terræ drachma, ex vaccino
lacte pota, præstat mirum in modum ad sanguinis mictum: commanducata ra-
dix, diuque sub dente retenta, dolorem mulcet.

MILLEFO-



NOMINA.

877

MILLEFOLIUM maius, Græcis, Στραπώτης χιλιάφυλλος μέγας. Italis, Millefoglio maggiore.

MILLEFOLIUM MAIUS.

FORMA.


Folia profert minoris simi- *Matth.*
lia, sed maiora, Tanaceto qua-
dātenus proxima, caules quo-
que maiores, subhirsutos, at-
que grandiores umbellas: flo-
ribus in purpura albicātibus,
odore medicato.

LOCVS.

Prouenit in montibus, & *Idem.*
collibus.

QUALITATES,
ET VIRES.

Præstat eadem, quæ minus. *Idem.*



VERBA-

VERBASCUM, Græcis, *φλόμω*. Officinis, *Tassus barbassus*. Hetruscis, *Barbaraschio*. Cæteris Italis, *Tasso barbasso*. Germanis, *Weiß Wulffraut*. Hispanis, *Verbasco*. Gallis, *Bouillon*.

VERBASCUM.

GENERA.

Matth. Plura Verbasci numerantur genera, ut ex appictis iconibus palam fiet.

FORMA PRIMI.

Diosc. Primum, quod sæmina vocatur, folia habet brassicæ, pilosiora multò, & latiora, candidioraque: caulis illi albus; cubitalis aut amplior, subhirsutus: flores ex luteo pallefcentes, semen nigrum, radix lōga, gustu acerba, crassitudine digiti.

LOCVS.

Idem. Nasceitur in campestribus.

QUALITATES.


Gal. li. 8. Radix gustu acerba est, & *simp. me.* fluxionis affectib. prodest, atamen folia digerēdi vim habet: omniū. n. folia desiccandi, & digerendi vim habent.

VIRE.

Diosc. Radix datur ludicri tali magnitudine cōuenienter ex vino, in alui profluuiio. Decoctum dentium dolorem collutione mitigat. Omnia genera, sed fœmina magis, sedis

Matth. ferè morbis omnibus subuenit: seminis & florum farina, larigna resina excepta, cum anthemidis floribus, procidentem sedem suffitu cohibet, & tenasum in dysentericis sanat, formine radicis succus, anteaquam caulescat, duarum drachmarum pondere ex vino Cretico haultus, in ipsa accessionis hora, quartanam fugat, sed ter, quaterve id repetendum est. Succus tam foliorum, quàm florum asperis verrucis illitus, eas delet. Folia tusa, cineribusque calefacta, sanant panos, quos bubones vocat: stillatitia florum aqua, oculis instillata, fluxiones cohibet, & illita faciei ruborem tollit: eoque magis si caphura tantillum adijciatur. Flores unà cum oui vitello, & mica panis, ac porri folijs illiti, perbellè præstant ad cohibendas tumentes, dolorificasque hæmorrhoidas.

VERBA-



NOMINA.

879

VERBASCUM mas, siue secundum, Græcis, *ελειος* *αππλω* *αδης*. Italis, *Tasso barbasso mafchio*.

VERBASCUM II.

FORMA.

Oblongius est, albis folijs, *Diosc.* angustioribusque : tenuiore *Matth.* caule. Floribus in cacumine minoribus, pallido colore. Radice minori, minusque carnosâ.

LOCVS.

Nascitur in campestribus, *Matth.* exoluto solo.

QUALITATES, ET VIRES.

Idem præditum est viribus, quibus & fœmina.



VERBA-

VERBASCUM tertium, Græcis, φλόμω ἀγρίω μέλας. Italis, Taffo barbaſſo minore.

VERBASCUM III.

F O R M A.

Matth. Folia profert nigriora, oblongiora, saluæ ferè modo aspera, sed latiora: caulibus rotundis, robustis, tenuioribus; floribus in cacumine spicatis, aureo colore.

L O C V S.

Idem. Prouenit & hoc quoq; in campestribus.

Q U A L I T A T E S,
E T V I R E S.

Idem. Eadem cum alijs habet vires.



VERBA-

NOMINA.

831

VERBASCUM sylvestre, Græcis, φάρμακον ἀγρίον. Italis, Taffo barbasso saluatico.


VERBASCUM SYLVESTRE.

FORMA.

Folia fert Saluix, altas vir- Diosc.
gas, & lignosas, & circa eas ra-
mulus, quales marrubium, flo-
res luteos, auræmulus.

LOCVS.

Nascitur in campestribus, Matth.
& apricis montibus.



Kkk

VERBA-

Verbascum aliud est, cuius
folia corniculati papaveris
modo prodeunt per ambi-
tum sinuata: Ideoq, recte Di-
oscorides huiusce papaveris
folia, verbascum similia fecit.



PRIMV.

PRIMVLA VERIS, nonnullis, Brache Cuculi: Quibusdam Herba paralyfis.
 Italis, Fiore di Primavera. Germanis, Schlüsselblumen. Gallis, Primœure, seu
 Brayes de Cocu.

PRIMVLA VERIS.



GENERA.

Duum est generum, alte- Matth.
 rum odoratum, alterum ino-
 dorum.

FORMA PRIMÆ.

Folia profert lactuca qua- Idem.
 dantenus similia, oblonga, ru-
 gosa: Labri veneris ferè mo-
 do, humi iacentia, è quorum
 medio cauliculus exit dodran-
 talis, atq; incanus, è cuius fa-
 stigij, flores exeant complu-
 res lutei, per ambitum fim-
 briati odoratique, vrin vrsi
 auricula, quam & radice quo-
 que imitatur.

LOCVS.

Prouenit secus vias, pro- Idem.
 pter sepes, & in pratis.

QUALITATES, ET
VIRE.

Tota planta articularibus Idem.
 morbis auxiliatur. Radicum decoctum renum calculos ejicit: præstat idem
 additis saluia, & amaraco ad frigidos neruorum, & cerebri morbos: quare re-
 solutis ac tremore affectis potum confert: epotus foliorum succus, ac etiam il-
 litus fractis, luxatisq; ossibus confert. Stillaticia florentis plantæ aqua commen-
 datur ad animi deliquium. flores illinuntur aduersus scorpionum ictus. Herba
 ipsa, aut flores, aut radices, tritæ, & illitæ vulnera glutinant. Mulieres è floribus,
 & polygonati radicibus in albo meraco maceratis, stillaticiam aquam faciunt
 ad faciei nitorem conciliandum.

Kkk 2

Ijsdem

Iisdem nominibus appellatur, quibus, & altera.

PRIMVLA VERIS ALTERA.

FORMA.

Matth.

Folia profert latiora, & in cacumine rotundiora, humi pariter accubantia, crispa, rugosaque, ac magis tenera: caule verò, floribus, ac radicibus, ab altera non differt.

LOCVS.

Idem.

Nascitur iisdem in locis, & frequenter in sylvis herbosis.

QUALITATES, ET VIRES.

Idem.

Easdem, quas altera possidet vires, imbecilliores tamen.



BLATT.

BLATTARIA, Dioscoridi verbasum aurei floris. Italis, *Blattaria*. Germ. Mist-
ten oder Schabenkraut, Goldt Knöpfplun.

BLATTARIA.

FORMA.

Herba est similis verbasco, *Plinius*,
folijs minus candidis: caulicu- *Matth.*
lis pluribus, flore luteo. Se-
mine capitulis concluso lini
modo, sed durioribus.

L O C U S.

Nascitur in campestribus. *Matth.*

Q U A L I T A T E S.

Sapore est amaro, exalta- *Idem*.
ciens, & sicans.

V I R E S.

Herba prostrata blattas in *Plin.*
se contrahit.

* Farctus quoq; viscerum,
mesaraicarumq; expedit. *



ÆTHIOPS, Græcis, αἰθίοψ. Italis, Eriope, & Etiopide.

ÆTHIOPS.

FORMA.

Diosc. Folia habet verbasco similia, per quam hirsuta, densaq; in orbē circa radicem inam redacta: caulem quadrangulum, scabrum similem apiastro, aut arctio, multis concauum alis. semen erui magnitudine: geminum in vno conceptaculo: Radices ab eodem cespite numerosas, longas; crassas, gustu glutinosas, quæ sicca nigrescunt, duranturq; ut cornua imitari videantur.

LOCVS.

Idem. Plurima nascitur in Ida, & in Messenia.

QUALITATES, ET VIRES.

Idem. Auxiliatur purulentis excreationib⁹, Ischiadicis, pleuriticis, arteriæ scabritijs decocta radix, & pota, quin etiam cum melle Eclegmatis vicem præbet.



PERSO-

NOMINA.

887

PERSONATA, Græci, *Agæion*. Officinis, *Bardana*, Italis, *Lippola maggiore*. Germanis, *Groß Kletten*. Hispanis, *Bardana*, seu *Pagumacera mayor*. Gallis, *Glosteron*, seu *Bardana*.

PERSONATA.

FORMA.



Folia habet cucurbitæ ma- *Matth.*
iora, nigriora, hirsutiora, cras-
sioraq; caulem crassum, angu-
losum, albicantem, sesquicubi-
talem, atq; ramosum, fructu co-
piofo, echinato, non magno, a-
culeis repandis, vestibus perti-
naciter inhaerentibus. Floribus
purpureis, semine enici mino-
re. Radice longa, vegeta, intus
caudida, foris nigra.

LOCVS.

Nascitur passim in agrorum
marginibus, secus itinera, & fe-
rè vbiq;

QUALITATES.

Discurit simul, & desiccatur, & mediocriter adstringit.

VIRES.

Radix drachmæ pondere, cum pineis nucibus pota, purulenta, & cruenta *Diosc.*
extussientibus auxiliatur: trita dolores à contritione arctuum contractos, illitu
sedat. Folia vtiliter antiquis vlcibus illinuntur. Semen porum calculosis au- *Matth.*
xiliatur. Idem facit radice decoctum infusum.

Gal. 6.

simp. me.

Kkk 4

PERFO-

PERFOLIATA: Italis, *Perfogliata*. Germanis, *Durchwachf.*

PERFOLIATA.

FORMA.

Matth.

Folia profert subrotunda, pingua, sed in acutum definentia, pisi ferè modo: venis compluribus secundum longitudinem protensis. caulis illi est gracilis, glaber, rotundus atq; etiam ramosus: folia, quæ in caule, & ramis sunt ab ijs umbilicotenus transguntur, magno naturæ artificio: quare putarem ego, ut perforata magis, quàm perfoliata dici deberet: flores gerit aureos, è capitib⁹ quibusdam prodeuntes in stellæ modum: semen nigrum, paruum pſyllij modo pellucidum.

LOCVS.

Idem.

Nascitur invicis, campis, & alijs quoq; locis, & in agrorum limitibus.

QUALITATES, ET
VIRE S.*Idem.*

Gustu est subamaro, & adstringenti. Datur herbæ decoctum ex vino paratum, aut folia in puluerem trita, ad internas affectiones, & ad rupta: quare bibuntur commodè ad umbilici eminentias, & enterocellas. illita strumas quoq; resoluunt.



ELLEBO-

ELLEBORINE, Græcis, *Επιπάκτος*. Italis, *Elleborina*.

EPIPACTIS SIVE ELLEBORINE.

F O R M A.

Parua est herba, & exiguis fo-
lijs.

L O C U S.

In Asia, & Græcia nascitur. *Idem.*Q U A L I T A T E S,
E T V I R E S.Iocinoris vitijs utilis, & con-
tra venena pota.

A P P E N D I X.

*Difficile est coniectu, quænam sit Helleborine Dioscoridis, cum tantilla vel nulla ferè ipsius descriptio habeatur. Itaq; substituta fuerat ab autore, eius loco Herba quædam hoc nomine insignita, quod nigri veratri quadantenus effigiem referret, & similes quoque radices haberet. Ea cum viua nobis nondum cõspecta sit, ideoq; exactior depingi haud potuerit, maluimus

elegantem hanc plantam hic apponere, congenerem ei quam plures alij sub Helleborines appellatione exhibuere, quæque nusquam non reperiri potest in locis humidis. Hæc verò, cuius imago hic visitur, etiam palustria & lacus amat, & pratis irriguis familiaris est, flore Orchidũ, sed ternis foliis ad seminis conceptaculum annexo, suppurpureo, interdum pulcre rubẽte, aut etiam penitus albo, huic semina subnascuntur planè vt in orchidibus: folijs & pene etiam radicum fibris Helleborum album imitatur, vnde vulgaris ei notio tributa fuit.*

Kkk 5

FVMA-

FUMARIA, Græcis, *Kαρυds*. Officinis, *Fumus terra*. Arabibus, *Seebiterig*, siue *Sa-
beteregi*. Italis, *Fumofterno*. Germanis, *Erdrand* / *Ragenförsel*. Hispanis, *Pa-
lomelha*. Gallis, *Fumeterre*.

F U M A R I A.

G E N E R A.

Marb. Duum est generum. Ma-
ius, & minus.

F O R M A M I N O R I S.

Diosc. Fruticosa herbulæ est, pte-
tenera, cortandro similis, fo-
lijs candidioribus, vndiq; nu-
merosis, cineracei coloris,
flore purpureo.

L O C V S.

Matth. Nasctur in hortis, vineis,
& campis.

Q U A L I T A T E S.

Galen. 7. Acris simul, & amaræ qua-
simp. me. litatis est: nec tamē planē ex-
pers est acerbæ: quam obrem
vrinam biliosam multam tra-
hit.

V I R E S.

Diosc. Oculis claritatem facit, de lachrymationemq; succus instillatus. Manducata
Matth. herba biliosam vrinam trahit. Attenuat, penetrat, obstructions aperit, ac de-
iectionis est facultatis, cohibet, aggregat, & roborat. Aluum facile ducit, bilem
trahit, & adustos humores: vis eius non modo ad iecur, sed ad venas permeat,
quare sanguinem expurgat: medetur elephantiasi, carcinomatibus, lichenis, &
cæteris cutis infectionibus: quin etiam omnib. ferè morbis ex viscerum infar-
ctu prouenientibus: ventriculum, iecur, lienem, & cætera interna viscera robo-
rat, biliosasq; finit febres: & quæ à vasorum obstructione excitantur.

F U M A -



NOMINA.

891

FUMARIA altera, Græcis, Καπνὸς ἰστέφα. Italis, Fumoferno maggiore. Germanis, Polwurz.

FUMARIA ALTERA.

FORMA.

Planta est fruticosa, præ-
tera, folijs coriâdri, cineracei
coloris: flore purpureo. Radi-
ce tuberosa, inani, buxo intus
colore: odore aristolochia.

LOCVS.

Prouenit in hortis, & sege-
tibus hordeaceis, & propter
sepes.

QUALITATES,
ET VIRES.

Radix amara est, & ea omnia
potest vnâ cum herba, quæ al-
tera Fumaria. Radix ex vino
pota, venenis, & pestilentiæ me-
detur: sudorem, & urinâ ciet,
& ictericos inuat: semen bibi-
tur ad diuturna alui profluuiâ.
Radix farina, inanantia quæ-
libet vlcera exiccat, & mudat.

CENSURA.

Non recte sentiunt Germani medici, ac pharmacopæi, qui hæc plantam ro-
tundam esse Aristolochiam putant. Alij verò pistolochiam.

CORYDA-



CORYDALIS, Græcis, Κορύδαλις. Quibusdam split. Italis, Coridala.

FVMARIA CORYDALIS.

F O R M A.

Matth. Foliagerit coriādri, sed minora, tenuioraque: caules exiles, compluribus ramusculis: floribus in summitate auicularum speciem referentibus: radicibus numerosis, tenuibus, prælongis, ac subalbican-
tibus.

L O C V S.

Idem. Prouenit in collibus cultis, & agris, * præsertim in Illyria.*

Q U A L I T A T E S,
E T V I R E S.

Idem. Præstat vniuersa planta ad colicos dolores, siue recens manducetur, siue sicca in puluerem sumatur ex vino pluribus diebus.



L O T V S

LOTVS VRBANA, Græcis, Λοτὸς ἡμερῶν. Italis, Tribolo, seu Trifoglio Canallino. Germanis, Grentsee.

LOTVS VRBANA.

FORMA.

Caules edit bicubitales, ac Diosc. etiam maiores, rectos, firmos, Matth. ramosos, & in his folia trifolij præcis æmula, leuiter per ambitum denticulata, beneq; olentia: flores edit racemosos, tenues, paruosq; luteo colore, aut albo, odoratosque.

LOCVS.

Nascitur in hortis, pratis, Idem. agris, & vbique ferè locorum.

QUALITATES.

Vt mediocriter cōcoquen- Galen. 7. di vim possidet, sic etiam exic- simp. me. candi in caliditatis, frigiditatisque coniugatione, media quodammodo est, & temperata.

VIRES.

Extractus succus, addito Diosc. melle, oculorum argemas, nubeculasque, ac cæteras caligines discutit. Vfur- Matth. patur tota planta vnguentarijs, quod odoratam ex ea faciāt aquam, in qua chirothecas macerant, ac lauant.

LOTVS



LOTVS sylvestris, Græcis, λωτὸς ἄγριος. Italis, *Lotosaluatico*. Arabibus, *Handa choca*. Germanis, *Sibengezeit*.

F O R M A.

Diosc. Folij prouenit trifolij pra-
 Matth. tensis, caule cubitali, & saepe
 maiori, alis multis (floribus in
 capitulis cæruleis) semine fæ-
 nogræci, sed longè minore,
 odore medicato.

L O C V S.

Diosc. Plurimum in Lybia nasci-
 Matth. tur. Nascitur copiosum et-
 iam in Boemia.


Q U A L I T A T E S.

Galen. 7. Semen secundi est ordinis
 simp. me. excalfaciētium, habetq; non-
 nihil absterforium.

V I R E S.

Diosc. Vitia cutis in facie, macu-
 lasq; cum melle peruncta ex-
 purgat: trita per sese, aut cum
 maluz semine, bibitur aptis-
 simè cum vino, aut passo con-
 tra dolores, qui vesicam malè habent.

LOTVS SYLVESTRIS.



CYTISVS:

CYTISVS: Græcis, Κύπρος. Italis, Cirsio. Germanis, Geißflce.

CYTISVS.

FORMA.



Frutex est albus, in totum vt **DIOSC.**
Rhamnus, ramos spargens cubi-
tales, & maiores, in quibus folia
fœnogræci, minora, dorso medio
prominente: Ea digitis trita, eru-
cam olent, gustatuque cicer re-
cens sapiunt.

LOCVS.

Nascitur sponte in Campania *Matth.*
propè Neapolim.

FACULTATES.

Folia digerēdi facultatem ob- *Gal. li. 7.*
tinent, aquæ temperatæ mistam, *simp. me.*
sicut & maluæ folia.

VIREs.

Folia refrigerant, tumores in- **DIOsc.**
ter initia discutunt, si cum pane
trita illinantur. Decoctum po-
tum, vrinam ciet: nonnulli, quod
apes alliciat, prope alucaria fe-
runt.

MYRIO-

TISVS:

MYRIOPHYLLVM, Græcis, *Μυριοφύλλον*. Italis, *Miriofillo*. Germa. *Fenchelgarb*.

MYRIOPHYLLVM.

FORMA.

Matth. Myriophyllum, siue millefoliū, cauliculus est tener, singularis, vnica nixus radice, plurimis folijs, læuibus, fœniculo similibus, caulis flauescit, varius, ac veluti ex industria deliniatus.

LOCVS.

Idem. Nascitur in palustribus.

QUALITATES.

Vsq; adeo deficcatoriæ est facultatis, vt vulnera glutinet.

VIRE S.

Vulnera recentia ab inflammatione vindicat, si vel viride, vel siccum; ex aceto oblinatur, præcipitatis in potu cum aqua & sale datur.



MYRIO-

Helgarb.

NOMINA.

897

MYRIOPHYLLVM ALTERVM.

Si quis hanc Myriophylli
plantam nouerit. cuius hic
imago uisitur, is facile Myrio-
phyllum Dioscoridis esse con-
sentiet. & praesertim cum in
palustribus nascatur.



LII

MYRRHIS,

MYRIO-

MYRRHIS, Græcis, Μύρρις. Italis, Mirrade. Germanis, Welscher Körbel.
MYRRHIS.

F O R M A.

DIOSC. Simillima est cicuta, caule, folijsq;: radix ei oblonga, mollis, rotunda, odorata, cibo non insuavis.

L O C U S.

Idem. Nascitur in hortis, & alijs cultis locis.

Q U A L I T A T E S.

Gale. 7. Radicem habet odoris iucundi, & dulcis: exalfacit ordine secundo, adiuncta quadam partium tenuitate.

V I R E S.

DIOSC. Radix in vino pota, phalangiorum moribus auxiliatur: cit menses, partus, & secundas, purgatque à puerperio fœminas: subuenit & tabidis cocta in sorbitione. Adiunt quoq; eandem bis die, teruè potam ex vino, in pestilentia salutarem esse. & ne morbi contagia sentiantur obitare.

C E N S U R A.

Non desunt, qui vulgare Cerofolium Myrrhim faciant. verum cum caulis cicuta non sit, nec radice vsus, sed foliorum: ijs profectò subscribere nequeo.

ANGEL.



ANGELICA, Italis, *Angelica*. Germanis, *Angelick*. Gallis, *Angelique*.

ANGELICA.



V I R E S.

Radix venenis mirificè aduersatur, manditur aduersus pestilentia contagia: *Idem*.
per se sumpta, pituitosos, lentosq; humores digerit, & cruditates concoquit:
Idem præstat radicis decoctum, & tussientibus ex frigore, celeriter auxiliatur.
Eodem epoto dissoluntur sanguinis grumi: Radicis farina datur vtiliter in o-
mnibus frigidis affectibus. valet ad rabioforum; & venenatorum morsus; tam
intus sumpta, quàm exterius cum ruta imposita. mansa, & dentium cauis indi-
ta, dolores sedat. Anhelitum aded commendat, vt præsumpti alij odorem faci-
lè occultare valeat.

G E N E R A.

Duum est generum, satiuæ, *Matth.*
& sylvestris.

F O R M A S A T I V Æ.

Caulem edit geniculatum, *Idem*.
cubitalem altitudinem exce-
dens, inanem: multis alarum
canis: folia oblonga per am-
bitum serrata, umbellam ma-
gnam, albis floribus refer-
tam: semine tenui, lentis mo-
do compresso: Radice crassa,
complurimis adnatis fibris
longis, nigricanti colore, exi-
mio odore præditis, sapore
acri ac subamaro.

L O C V S.

Seritur, coliturque in Ger. *Idem*.
mania in campis, præfertim-
que in Misnia, & Saxonia.

Q U A L I T A T E S.

Radix cuius est vsus, acris *Idem*.
est, atq; amariuscula. Quare
manifestè excalfacit, & sic-
cat, ordine secundo comple-
to, aut tertio incipiente: pro-
inde aperit, attenuat, discus-
tit, penetrat, incidit, & flatus
pellit.

ANGELICA sylvestris: Italis, *Angelica saluatica*. Germanis, *Wilde Angelick*.
Gallis, *Angelique sauvage*.

ANGELICA SYLVESTRIS.

F O R M A.

Matth. Pumilior est omnibus suis
partibus, sed viribus longè
præstantior: Radicem pro-
fert minorem, paucis fibris,
quæ secta liquorem subuiren-
tem mittit, acerrimi gustus,
& qui lachrymas cient.

L O C U S.

idem. Nascitur plurima in altis-
simis montibus, in pratis, &
paulis amœnis locis.

Q U A L I T A T E S.

idem. Cum acerrimi sit gustus,
longè valentius, quàm dome-
stica exalfacit, & siccat.
Quare ad quarti ordinis prin-
cipium accedit

V I R E S.

Omnia præstare potest,
quæ domestica, sed longè va-
lentius. cæterum non adeo copiosius ea uti præstabit, quod nimis corpus ac-
cendat. mansa enim os, linguam, & fauces maximè urit, atq; inflammat.

PSEUDO-




N O M I N A.

901

PSEVDOMYAGRUM, Italis, *Miagro falso*. Germanis, *Lein Dotter* / *Finken*
Samen.

PSEVDOMYAGRUM.



F O R M A.

Caulem edit cubitalem, *Matth.*
ramosum: & folia, quæ in eis
sunt, glasti, aut thlaspi qua-
dantenus similia: floribus in
summitate albis, tenuibusq;
semine paruo, dulci.

L O C V S.

Nascitur in campis inter *Idem*.
linum, & frumenta.

Q U A L I T A T E S

Modicè excalfacit: atque *Idem*.
humectat.


V I R E S.

Accedit omnino ad sesa-
mi vires semen: paratur pari-
ter ex eo oleum, ad similes fa-
cultatis. Semen quoque est
auiculis gratissimum.

LII 3

*PSEUDO-

Plures species Myagri putati notari possunt è quibus duæ hæ notiores. Vna longe tenerioribus virgulis, quam vulgaris, nascitur, sed cultura fruticosior fit, & semen minus in vasculis vegetioribus ni profert, & quia rarior est, Myagri Turcici nomen sortitur ab hortulanis. Hacinuetur alia quædam exilior, vasculis rotundioribus, quæ aliquibi in aruis sponte nascitur.*



CIRSIVM.

CIRSIVM, Græcis, Κίρσιον. Italis, Cirsio.

CIRSIVM.



F O R M A.

Caulis est tener, triangula- Diosc.
 ris, bicubitalisq; ab imò folijs
 rosæ speciem referentibus,
 angulis spinosis, per interual-
 la mollibus. Folia ei buglossò
 similia, longiora, subcandida,
 modicè hirsuta, per extremi-
 rates aculeata; cacumen cau-
 lis orbiculatum, hispidum, in
 quo capitula in summo pur-
 purea, quæ in lanugines sol-
 uuntur.

L O C U S.

Nascitur vlginosis locis.

Q U A L I T A T E S , E T
V I R E S.

Radix laboranti loco adal- Matth.
 ligata, dolores varicum sa-
 nat.

LII 4

ASTER

ASTER Atticus, siue Bubonium. Græcis, *Aspê aîmôs*. Arabibus, *Astaraticon*. Italis, *Asteratico*. Germanis, *Stern Kraut*. Gallis, *Petite espargoutte*, seu *petit Mugue*. Vergilio, *Amellus*.

ASTER ATTICVS.

F O R M A.

Matth.

Caules ab radice mittit rectos, solidos, ac lignosos, colore fusco lutescente; è quibus circa cacumen ramuli oriuntur tenues, in quorū summitate flores spectantur, vt in Anthemide, & Belli: sed in medio lutei, & per ambitū purpurei. Folia profert oblonga, oliuæ figura, minora tamen, aspera, hirsuta, nigricantia, aspero sapore, ac subamaro, radicem habet multifidam, odore non ingrato.

L O C V S.

Idem.

Nascitur in asperis, incultis, collibus, & conuallibus.

Q U A L I T A T E S.

Gale. 6.

Mistæ est facultatis, vt irosimp. me. sa, verum id non adstringit.

V I R E S.

DIOSC. Feruenti stomacho, oculorum inflammationibus, proci duæ sedi, ac inguinibus illita auxiliatur: tradunt quoque purpureum in flore, si ex aqua bibatur, anginis, & pueris comitialibus, opitulari. Herba ipsa recens illita, inguinum bubones, inflammationesq; curat. Cum veteri axungia tusa, imponitur vtiliter rabioforum canum moribus: & incensa serpentes fugat.

*ASTER



* A S T E R Atticus cæruleus alpinus.

F O R M A.

Flores promit cæruleos ut
prior, folia quoque prior non
dissimilia, radice se propagat,
sed tamen papposa quoque se-
minagignit, & interdum glo-
buli tumentes villosi prope
radicem adnascuntur foliolis,
estque omnino minor vulgari
Aster.



LII 5

A S T E R

F O R M A.

Visitur facies, ex icone suæ
 ipsius plantæ: nos tamen eam de-
 lineandam duximus, vt etiam a-
 liorum possit esse iudicium: cæ-
 terum nos priorem omnino pro-
 bamus. Et præfertim cum in hu-
 ius flore nihil purpurei habea-
 tur.



*ASTER

**ASTER* Luteo flore, alijs *Conyzæ* species.



FORMA.

Caules profert mediocres per quædam intervalla radicis repentis & se propagantis ab inferiore parte demissis fibris rectis, quæ aliquantulum odoratæ sunt, sapore aromatico modice ad cinamomi saporem accedente, subacri. In summis caulibus duos vel tres ramulos habet, quibus flores lutei disco in medio apicibus conferto insident, qui tandem in pappos abeunt. Folia per caules alterna hirsuta nullo pediculo duabus quasi alis eodem amplectuntur.

LOCVS.

Nascitur in saltibus.*

STELLA-

STELLARIA, siue pes Leonis, siue Alchimilla. Italis, *Stellaria*. Germanis, *Synnav*. Gallis, *Pie de Lyon*.

STELLARIA.

FORMA.

Matth. Folijs prouenit maluæ similibus, robustioribus tamen, ac magis carinatis, octonis circumquaque angulis. Et per ambitum denticulatis adeo, vt patefacta, stellæ imaginem referant: caulis ei tenuis, semicubitalis, lanuginosus, à quo còplures exeunt rami, in quorum summo flores emergunt subpallidi, tenues, stellarum effigie. Radice cohæret digitali crassitudine, sapore adstringenti.

LOCVS.

Idem. Prouenit in montibus, in pratis, & pascuis.

QUALITATES, ET VIRES.

Idem. Exiccat, cohibet, atq; conglutinat: pota efficax est ad interna vulnera. quin etiam externa illita glutinat. Aridæ farina in sui ipsius decocto hausta, enterocellis medetur. Conceptum adiuuat, & steriles fecundas reddit hausta continuis viginti diebus cochlearis mensura ex vino, vbi præsertim sterilitas ab vteri humiditate prouenerit. quare datur quoq; vtiliter ad alba vteri profluvia.

* STELLA-



*STELLARIA argentea, vel Argentaria petraea, vel Alchimilla minor, Heparaphyllum montanum. Germanis, Bergshymaw, Steinshymaw.

STELLARIA ARGENTEA.

F O R M A.

* Folia habet stellata radiataq; inferna parte argenteis pilis nitentia, ut plurimum septena in unius pediculi summitate coherentia, flores in corymbis pallidos, ut vulgaris Alchimilla.

L O C U S.

Elocis saxosis montium in hortum translata, quouis loco facillime diutissimeque viret.

Q U A L I T A T E S.

Incompertae facultatis est, nisi sit exiccantis & astringentis, atq; adeo ad vulnera conglutinanda efficax, ut prior.*



VIOLA

VIOLA purpurea, Græcis, *ἰὼν πορφυρεή*. Arabibus, *Senesfige*, *Sonosfig*, seu *Benefesigi*. Italis, *Viola*, & *Viola Mammola*. Germanis, *Merken Diolen*. Hispanis, *Violetta*. Gallis, *Violette*.

VIOLA PURPUREA.

FORMA.

DIOSC. *Viola purpurea* folium habet hedera maius, tenuius, ac nigrius, nec multo dissimile, cauliculus à radice medius prodit, in quo flosculus suavisimè olens purpureus.

LOCVS.

DIOSC. Opacis, & asperis nascitur
Matth. propter sepes, & sec^o itinera.


QUALITATES.

Galen. 6. Folia aqueam, & subfrigidam substantiam superantem possident.
sim. me.

VIRES.

DIOSC. Refrigerandi naturam habet. Illinuntur folia per se, aut cum hordeacea farina aptissimè stomacho æstuanti, & oculorum inflammationibus, sediq; procidenti. Refrigera-

Mesue. rant, & humectant ordine primo, sed sicæ minus. Humiditas, quæ superflua recentibus inest aluum emolliendo ciet, sicæ verò deiectione sunt facultatis, non quodd emolliant, sed quodd dissoluant. In summa torporifera sunt, calidos dolores mulcent, inflammationes extinguunt, leniunt, & soluunt. Bilem educunt, eiusq; feruorem mitigant, conferunt capitis doloribus, quos caliditas excitauit, somnum conciliant. Pectoris, & tracheæ arteriæ scabriciem leniunt. Medenturq; anginis, & columnellæ vitijs. Præcipuo autem auxilio sunt pectoris, & lateris inflammationibus, sitimq; arcent.



VIOLA

NOMINA.

911

VIOLA arborescens, *vel potius erecta. * Italis, *Viola arborea*.

VIOLA ARBORESCENS.

FORMA.

Crescit hæc duorum cubi- *Marth.*
torum altitudine, pluribus
ab vna radice sublati cauli-
bus, in quibus folia violæ pur-
pureæ angustiora, per ambi-
tum denticulata, atque pari-
bus interuallis distincta, flo-
res edit purpureos, consoli-
dæ regalis vocatæ haud abfi-
miles, odore purpureæ violæ.

LOCVS.

Nascitur in Baldo monte *Idem.*
in agro Veronensi.



IACCIA,

Benefe-
lispanis,

na super-
ant facul-
tunt, cali-
t. Bilem e-
s caliditas
n leniunt.
nt pecto-

VIOLA

IACCEA, seu herba Trinitatis. Græcis, *ἰσὺ ἐλάργου*. Italis, *Iaccea*, seu *Minuti pensieri*. Germanis, *Greysamkraut*/ *Sibenfarben Blümlein*. Gallis, *Pensées*, aut *Menues pensées*.

IACCEA, SIVE FLOS TRINITATIS.

G E N E R A.

Matth. Duum est generum, Maior, & Minor.

F O R M A M A I O R I S.

Idem. Folijs exit primo exortu rotundis, per ambitum serratis, quæ tamen per incrementum in longitudinem protenduntur. caulibus constat triangularibus, quadantenus striatis, inanibusque, quibus genicula supereminent paribus interuallis, è quorum alis ramusculi exoriuntur, à quibus flores exeunt violæ purpureæ magnitudine tribus referti coloribus. Sunt enim supernè purpurei, in medio candidi, & ima parte lutei, sed penitus inodori.

L O C U S.

Idem. Nascitur in campis, & passim feritur in hortis, & viridarijs.

Q U A L I T A T E S E T V I R E S.

Idem. Sunt qui hanc ad enterocellas pollere credant, atque ægrè spirantibus, & pulmonum inflammationibus opem ferre, quin etiã scabiem sanare, & cetera cutis vitia delere.

IACCEA,



N O M I N A.

913

IACCEA, siue herba Trinitatis altera. Iralis, Iaccea, seu Minuti penseri minori.
Germanis, Wild Grehsam Kraut/ Stieffmütterlin.

IACCEA ALTERA.

F O R M A.

Crescit hæc minoribus, ac breuioribus Matth.
tum folijs, tum floribus, qui tamen non tri-
bus, sed duobus tantum constant coloribus,
candido videlicet, & lutescente.

L O C U S.

Nascitur pariter iisdem in locis, & feritur
in hortis.



Mmm

BVGLOS-

BYGLOSSVM, siue Borrage, Græcis, βύλλον. Mauritanis, *Lifenaltiaur*, siue *Lesenaltiaur*. Italis, *Borragine*. Germanis, *Durretsch*. Hispanis, *Borraia*, *Dorraienes*, *Borraies*. Gallis, *Borraube*.

BYGLOSSVM, SIVE BORRAGO.

FORMA.

Matth. Folij exit latis, atq; oblongis, asperis, eminentibus vbiq; bullis, tenuissimis armatis aculeis, qui totam plantam hispidam ac rigidam reddunt, aculeato vndecunque ambitu. Caule est cubitali, & quandoque maiori. pingui, coneano, aculeis vbiq; scatente, ramis multis brachiato, floribus in stellæ modum radiantibus, cæruleo colore, & quandoque candido, nigro e medio prominente apice, semine nigro, striatoq;.

LOCVS.

Idem. Nasceitur per se passim in hortis.

QUALITATES.

Galen. 7. Humidæ, calidæq; temperiei est. Itaque vinis injectum letitiæ, ac hilaritatis causa esse creditum est. Sed & his qui ob faucium asperitatem tussunt, coctum in mellicrato conuenit.



VIREs.

Diosc. Herbam abscessibus vtilem esse volunt. Herbar, & radici vis sanè magna est, quin etiam & floribus ad animi deliquium, & cæteros cordis affectus, atque melancholicos morbos, & præsertim eorudem decoctum ex vino, aut ex aqua paratum. Succus foliorum potius valet, contra lethalia pharmaca, & venenolorum animalium ictus. Stillatitia totius plantæ aqua delirij, quæ cum febre fiunt, mirifice subuenit, quin etiam oculorum inflammationes mulcet, tam interius, quam exterius imposita.

BYGLOS-

NOMINA.

915

BVGLOSSVM vulgare, Italis, *Buglossa*. Germanis, *Dachsenjung*. Gallis, *Buglose*.

BVGLOSSVM VVLGARE.

VIREs.

Duocius sunt genera, Hor. *Matth.*
tense, quod maius, & minus
est, & sylvestre quod pariter
duas habet species. Altera
quidem minori hortensi si-
milis, Altera flore nigro.

FORMA HORTENSIS.

Folia profert longa sym- *Idem.*
phyti maioris modo, hirsuta,
aspera, hispidaq; tenuissimis
aculeis scatentia, caule ses-
quicubitali, rotundo, robu-
stoq; hispido, ac pungente, à
quo rami complures exeunt
sursum spectantes, in quorum
summis paribus flores emi-
cant purpurei borraginis mi-
noribus, semine nigro. Radix
illi est borraginis, crassior, &
carnosior, lentore quodam
prædita, ac crassiori, pingui-
orque libro, Minor autem fo-
lia oblonga profert, sed lon-



gè angustiora, breuioraque, hirsuta, sed aculeis vacantia, cætera similia sunt.

LOCVS.

Seruntur passim in hortis.

Idem.

QUALITATES ET VIREs.

Eadem omnia præstare possunt, quæ Borrago.

Idem.

Mmm 2

BVGLOS-

BVGLOSSVM alterum sylvestre flore nigro, albo & purpureo. Italis, *Buglossa saluatica del fior negro, bianco & porporeo.*

BVGLOSSVM ALTERVM SYLVESTRÆ
FLORE NIGRO.

F O R M A.

Matth.

Extat & sylvestre genus hortenfi minori per omnia simile, sed in omnibus agrestius, * & flore nonnunquam nigro, nonnunquam etiam albo exornatur, ut plurimum vero purpureos. habet flores. *

L O C V S.

idem.

Nascitur in campestribus.

Q U A L I T A T E S E T
V I R E S.

idem.

Viribus iisdem poller, quibus ambæ hortensium species.



C Y N O.

Buglossa

TRE

NOMINA.

917

CYNOGLOSSVM vulgare, Italis, *Pariter Cinoglossa, seu Lingua canina.* Germanis, *Hundsjung.* Gallis, *Langue de chien.*

CYNOGLOSSVM VVLGARE.

FORMA.

Folia edit lata, longaq; hor. *Matth.* tensis, ac maioris buglossi modo, numerosa ab vna radice prodeuntia, tactu subaspera, ac pilosa, caulem cubitalem, teretem, robustum, ac pariter subasperum, & à medio ramosum, flores purpureos Echij æmulos, è quibus parua prodeunt lappa, aculeo quodam è medio prominente, magno naturæ artificio, quæ maturelcentes vestibis pertinaciter adhærent.

LOCVS.

Nascitur passim, ferè vbiq; *Idem.* secus vias, & in agrorum marginibus.

QUALITATES.

Manifesto refrigerat, & *Idem.* siccatur.

VIREs.

Folia recentia imposita mirum in modum vulnerum inflammationes arcent, ac etiam alias quascunque.

Mmm ; CALTHA,

CYNO-

CALTHA, Italis, Fior rancio, siue Fior d'ognimese. Officinis, Calendula. Germanis, Dingelblum. Gallis, Poussy.

C A L T H A.

F O R M A.

Matth.

Folij exit oblongis, minime acuminatis, Leucoij quadantenus similibus, latioribus, ac longioribus, caulem edit singularem, subpinguem, sesquidrantalem, ramosum. Flores in caulium summitatibus aureos, speciososq; , odore cum grauitate haud iniucundo, è quibus semen prouenit in capitulis apertis; quod si diducatur aicularum vnguibus quadantenus simile spectatur. Radice nititur alba, rectaque.



L O C V S.

Idem.

In tota Hetruria sponte per se nascitur, secus itinera. Atqui in compluribus Italiae locis, & in Germania in hortis ad coronamenta seritur.

Q U A L I T A T E S.

Idem.

Excalfacit, attenuat, aperit, digerit, & prouocat, quamuis gustu adstrictione non vacare deprehendatur.

V I R E S.

Idem.

Constat, multis admodum sceminarum factis periculis, herbam valere plurimum ad mentes ducendos, epoto eius succo, aut herba ipsa recente diutius deuorata. Succus viciae pondere, cum drachma pulueris terrestrium lumbricorum, potu ictericos inuat. Sunt qui dicant huiusce herbae vsu inuari maxime oculorum aciem. Constat tamen stillatitiam floridae plantae aquam oculorum ruborem, & inflammationem arcere, si in oculos instilletur, aut linetolis applicetur, in ea madefactis. Siccata puluis, dentium cauernis impositus dolorem ledat.

HIPPO-

N O M I N A.

919

HIPP OGLOSSVM, Græcis, ἵππογλωσσον. Italis, Bislingua, sine Bonifacia. Germanis, Zäpfflin Kraut. Hispanis, Lengua de Cavallo. Gallis, Bislingua.

HIPP OGLOSSVM.

F O R M A.



Frutex est folijs rusci maioribus, polygonati similibus, secundum longitudinem frequenter striatis, e quorum medio ligula quædam solifera assurgunt, sub quibus rubentes exoriuntur bacca, vt in rusco. Radicem habet albam, geniculatam, ac duram.

L O C V S.

Nascitur in syluosis, montibus. Idem.

Q U A L I T A T E S, E T
V I R E S.

Capitis dolorem, corona Dioscori ex comis imposita minuit. Matth. Datur radix vtiliter ad omnes vteri affectiones, & præsertim præfocatis ab vtero mulieribus, cochlearis mensura. Est quoque ad puerorum

enterocellas præstantissimum auxilium si diutius radicis puluis sesquidrachmæ pondere quotidie ex maioris symphiti decocto propineur.

M m m 4

ANTIR-

ANTIRRHINUM, * vulgo Caput canis & Caput vituli, Nares vituli. * Græcis, *Αντίρρινον*. Italis, *Antirrino*. Germanis, *Drant*; * *Söwenmäuler*; *Hundstöpf*; *Brackenhanpt*. * Hispanis, *Cabeça de ternera*. Gallis, *Mouron violet*.

ANTIRRHINUM.

G E N E R A.

Matth. Quatuor nos observamus genera, quorum facies ex sequentibus iconibus patebunt.

F O R M A.


Idem. Folij omnes sunt oblongis, in altero latioribus, in altero vero angustioribus, caulibus ramosis, floribus in quibusdam purpureis, in cæteris vero candidis. Semen profertur minutum nigrumq; receptaculis quibusdam inclusum, quæ vitulorum capita per quam bellè referunt.

L O C V S.

Matth. Nascitur in arvis, & in collibus. * In Italijs & Gallijs, præsertim provincialis & Narbonensis inter Oliueta.*

Q U A L I T A T E S.

Galen. 6. Ad sanationes inutile est.
sim. me. Ipsum ad similes est cum Bubonis facultatis.



V I R E S.

Diosc. Tradunt perunctos huius semine ex oleo vetustiores fieri, nec villo medicamento lædi posse, si quis appensum gesserit. Quin etiam principum gratiam sibi conciliari posse putant hoc tantum amuleto..

ANTIR-

ANTIRRHINUM IL.

* Floribus est conspicuum
ex purpura albicantibus seu
incarnatis vulgo dictis, rictu
luteo, leonini oris æmulo.*



Mmm 5

ANTIR-

medica-
nam sibi

ANTIR-

*Rarissime cubiti altitudinem assequitur, cæteris partibus quoque minus est multo quam hortensia. flosculos gerit albos pusillos, & semen vituli nares referens sed admodum minutum.

L O C U S.

Crescit in aruis & vinetis.*



ANTIR-

N O M I N A.
ANTIRRHINVM IIII.

923



* F O R M A.

Folia & flores prioribus sunt similia, sed minora omnia. Flosculi non in summitate sed secundum foliorum exortus per intervalla prodeunt, purpurascens, ex quibus fiunt capitula membranacea, vitulinæ, aut simiæ calvariarum figura, in quibus semen minutum, ut in reliquis.

L O C V S.

Vbiis hortorum, incultorumque marginibus sponte plurimum innascitur.

A P P E N D I X.

Quibusdam placet esse Archigenis Orontium, quasi Aurantium, quod Aurigenam morbum siue Ictericum leuet.*

A D I A N -

ADIANŦVM, Græcis, *Αδαντρον*. Officinis, *Capillus Veneris*. Arabibus, *Borſe-guaſcen*, ſeu *Berſauſan*, ſeu *Chulbare albir*. Italis, *Capel venere*. Germanis, *Strawen-Har*. Hiſpanis, *Culantrillo de poſſo*. Gallis, *Capil venere*.

F O R M A.

ADIANŦVM.

DIOſC. Puſilla gerit folia coriandri ſimilia, in ſummo inciſuris diuiſa, cauliculi quibus exoriantur, nigro colore nitet, validi, pretenues, palmū alti, radice ſupernacua, neq; caulem, neq; florem, neq; ſemen gerit.

L O C V S.

Idem. Umbroſis, & paluſtribus, circa parietum aſpergines, & fontium ſpecus enaſcitur.

Q U A L I T A T E S.

Galen. 6. Adiantum in caliditate quiſim. me. dem, & frigidityte ſymmetrū eſt, verū deſiccatur, & extenuatur, & diſcutit.

V I R E S.

DIOſC. Decoctum herbæ potū prodeſt difficulter ſpirantibus, ſuſpirioſis, lienosis, felle ſuffuſis, & urina anguſtijs, calculos frangit, aluum ſilit, ſerpentium morſibus auxilio eſt, cōtra ſtomachi fluxiones in vino bibitur. Menſes, & ſecundas ciet, ſanguinis reiectiones inſibet. Illinitur recens contra ſerpentium morſus. Alopecias deſat, ſtrumas diſcutit. Furſures, & manantia capitis vlcera ex lixiuo emendat, cum ladano, & myrthino oleo deſtuentes capillos continet. Idem præſtat eius decoctum ex vino, & lixiuo paratum. coturnices, & gallinaceos pugnatiores facit in cibis eorum additum. Aluum ſubducit, bilem, & pituitam deijcit, craſſaque excrementa, quæ diu in interioribus inhaſere. ſanguinem clarificat, animam dilatat, & iecur, & ventriculum purgat præſertim ſi obſtructione laborant. Decoctum eius ſceminas à partu purgat. Eius cinis agilopas curat. Dilatilibra epota commodiſſimè aluus ſubducitur.

T R I C H O -



NOMINA.

925.

TRICHOMANES, Græcis, Τριχομανές. Officinis, Polytricum Italis, Politrice.
Germanis, Steimbrech. Hispanis, Politrice. Gallis, Polytricen.

TRICHOMANES.

FORMA.

Est filici simile, sed exilius, DIOSC.
folijs lenticulæ, tenuibus, in
ordinem vtrinque digestis,
in se aduersis, ramulis tenui-
bus, acerbis, subnigris, pellu-
cidisque.

LOCVS.

Nascitur eisdem in locis Idem.
quibus Adiantum. Et præ- Matth.
fertur in puteis, & antiquis
parietibus.

QUALITATES ET
VIRE.

Eadem quæ Adiantū præ- DIOSC.
stare posse constat.



XANTHI-

XANTHIVM, siue strumaria, Officinis, *Lappaminor*. Græcis, Ξάνθρον. Italis, *Lappa minore*. Germanis, *Wettlers Leusi*/seu *Spitz Kletten*/Zgel Kletten. Hispanis, *Lappa menor*. Gallis, *Petit Gloutteron*, seu *Grappellas*.

XANTHIVM.

FORMA.

DIOSC. Caule ex cubitali, anguloso, pingui, crebris ex eo prodeuntibus alis. Folia habet atriplicis, insecta, nasturtium odore imitantia, fructum grandis oliuæ modo, & ut platani pilula aculeatum, qui contactu vestibis adhærescit.



LOCVS.

Idem. Nascitur læto solo, & pingui, & lacubus exiccatis.

QUALITATES.

Gale. 8. Fructus discutiendi vim obtinet.
simp. me.

VIREs.

DIOSC. Fructus flauos facit capillos, si acetabuli instar tepida aqua madescat, mox caput nitro ante perfrictum illinatur. Alij in vino tundunt, & ita asservant. Semen aptissimè tumoribus imponitur.



ÆGILOPS,

Italis,
Hispa-

NOMINA.

927

ÆGILOPS, siue festuca, Græcis, αἰγίλωψ. Arabibus, Daufir, Dauser, siue Daser.
Italis, Egilopa, siue Orzo saluatico.

ÆGILOPS, SIVE FESTUCA.

FORMA.

Folia habet tritici, sed molliora, in summo capite semina bina, ternave, rubra, quibus arista quasi capillacea ex-
eunt.

LOCVS.

Nascitur in agris inter segetes.

QUALITATES.

Digerendi vim possidet id Gale. 6.
quod ex gustu patet. leuiter simp. me.
enim est aeris.

VIRES.

Herba cum farina illita ægilopis medetur, duritias discutit. succus farinæ admixtus siccatur, & eorundem gratia reponitur.

ÆGILOPS



bus im-
ILOPS,

ÆGILOPS altera, Avena sterilis. Italis, Vena Vana. Ananienfibus, Squala.
Gallis, Avoine sterile.

ÆGILOPS ALTERA.



POLY-


Squala.

NOMINA.

929

POLYGALA, Græcis, Πολύγαλον. Italis, Poligala.

POLYGALA.



FORMA.

Palmi altitudinem petit, fo. Diosc.
lijs Lenticulæ, gustu adstricto.

LOCVS.

Prouenit in collibus apri- Matth.
cis, & incultis locis.

VIRES.

Pota lactis abundantiam fa- Diosc.
cit.

POLY-

Nnn

OSYRIS,

OSYRIS, Græcis, *ὄσυρις*. Italis, pariter, & Hispanis, *Linaria*. Germanis, *Harthe*.
fraut. Gallis, *Linatre*.

OSYRIS.

F O R M A.

Diosc. Frutex est niger, ramulos fe-
rens tenues, lentos, fractuque
cōtumaces, & in his folia qua-
terna, quina, senave, ceu lini,
nigra in initio, deinde colore
mutato rubescencia.

L O C V S.

Matth. Nascitur ferè ubiq; in cam-
pis, & agrorum aggeribus.

Q U A L I T A T E S.

Galen. 8. Amara illi inest qualitas, &
simp. me. obstructiones expediendi fa-
cultas, quare & in iocinore,
consistentes obstructiones ad
iuuat.

V I R E S.

Diosc. Decoctum eius potum iu-
nat arquatos.

A P P E N D I X.

Tametsi hoc loco *Linariæ* herbæ vulgo vocatæ imaginem appinximus vul-
gum secuti, non ob id tamen ipsam legitimam *Osyridem* facimus.

SMILAX



NOMINA.

931

SMILAX aspera, Græcis, *Σμίλας τραχεία*. Itali, *Rouo ceruino*, siue *Hedera spinosa*. Germanis, *Scharpffe Winden*. Gallis, *Tan*, siue *Smilax aspre*.

SMILAX ASPERA.



FORMA.

Folia habet Periclymeni, Diosc. aut hederæ, aculeato dorso, Matth. sarmenta tenuia, multa, rubi, aut paliuri modo aculeata. Arbores scandit ab imo ad summum perreptans, sese conuoluens eis. Fructum habet racemosum, qui maturus rubescit, gustuq; leuiter mordet. Clauiculis plena est, quibus arboribus se circunvoluit.

LOCVS.

Nascitur in palustribus, & Galen. asperis. Ac etiam in Syluis. Matth.

QUALITATES.

Folia gustata aliquid habent Gale. 7. acrimoniæ, & alioqui si illis v. simp. me. taris calefaciunt.

VIRES.

Folia, & acini, ante, & post Diosc. epoti venenorum antidota sunt. Tradunt si infantibus nuper in lucem editis, quid ex his tritum propinetur, nulla postmodum venena nocitura. Admiscen- tur quoq; & Alexipharmacis.

Nnn 2

SMILAX

SMILAX lævis, Græcis, *Συλάξ λαία*. Italis, *Vilucchio maggiore*. Germanis, *Witden*, aut *Zaunglöcklin*. Hispanis, *Correguela maior*. Galis, *Liset*, seu *Campanette*.

SMILAX LÆVIS.

FORMA.

Diosc. Folia Hederae similitudinem habent, molliora, leuiora, tenuiora, sarmenta habet asperę smilacis similia, sed nullis spinis horrentia, conuoluitur arboribus, ut prior. fructum parit lupini modo nigrum, exiguum, florib⁹ in cacumine perpetuis, multis, rotundis, folia per autumnum decidua sunt.

LOCVS.

Idem. Nascitur prope arbores quibus conuoluitur.

QUALITATES.

Galen. 7. Facultate quodammodo simp. me. prædictæ similis est.

VIRES.

Diosc. Semine cum dorycnio potu ternis singulorum obolis, varia, & tumultuosa in somnis obuersari traduntur.



CENSURA.

Non ausim ego affirmare an hæc planta legitimam smilacem læuem referat.

LXXV

LVPVLVS, Italis, Lupolo, Bruscardolo, seu Forancefo. Germ. Hopffen. Gall. Houblon.

LVPVLVS.



GENERA.

Duum est generum. Satiuum, *Matth.*
& sponte proueniens, at facie
inter se non differunt, præter-
quam magnitudine, & exilita-
te. * Distinguitur etiam in ma-
rem & feminam. *

FORMA.

Mas planta est arbores scan- *Idem.*
dens, & cõtendens p̄gulis aptif-
sima, folijs vitigineis, brionæ
modo diuisis, asperis cucume-
ris modo. Samenta habet præ-
longa, aspera, hirsuta, & qua-
dantenus aculeata. Folliculos
edit, racemosos & numerosos,
exiles, cõpactili quadam serie
dependentes, in quib⁹ atrum,
& amarum concluditur semen.

LOCVS.

Satiuum Germanis colitur in *Idem.*
campis, syluestre in sepibus, &
frutetis sponte nascitur.

QUALITATES.

Lupuli flores, folliculi, ac tra- *Idem.*
dices excalfaciunt, siccant, ex-
tenuant, aperiunt, absterunt,
expurgant, sanguinẽ mundant.
Atqui turiones cum plus humi

ditatis habeant parum quidem tum excalfaciunt, tum siccant.

VIRE.

Turiones aluum emolliunt in cibum sumpti, vbi prius probè fuerint elixi. *Matth.*
Florum, & folliculorum decoctum datur potandum commodè contra hausta
venena, scabiem, Gallicam luem, ac ceteros quosq; affectus, qui extimam cu-
tim inficiunt. Datur idem contra diutinas febres ab infarctu prouenientes. Se-
men tritum, & potui datum semidrachma pondere interaneorum animalia ne
cat. menses prouocat, & urinam pellit. Lupulus flavam bilem detrahit. *Mesue*

Nnn 3

* LVPV-

s, Wit-
panette.

referat.

LVPV-

F O R M A .

Fœmina differt à mare,
quod flosculos edat subpalli-
dos penè Cannabis fœminæ
flosculis similes, sed maiores,
insipidos aut subdulces, qui
in pollinem subtilissimum lu-
teum tandem abeunt & sine
fructu pereunt, folia quoque
rotundiora nec tam profun-
dis incisuris dissecata, ut mas,
& iuxta radicem potissimum
prorsus sine incisuris spectan-
tur, paululum saltem per am-
bitum serrata.

L O C V S .

Nascitur in sepibus ut pri-
or Lupulus, cui plerumq; et-
iam sociatur.

N O T A .

Non desunt, qui mare ap-
pellitent Lupulum qui steri-
les habet flores, & fœminam
cui folliculares fructus atq;
flore innascuntur, id quod etiam in Cannabi & alijs herbis faciunt, fœcundas
fœminino sexui, masculino steriles adscribendo.*



R V S C V S .

NOMINA.

935

Ruscus, Græcis, *Myrsin agla*, & *ἑρμαγεῖον*. Italis, *Brusca*, & *Pongitopi*. Germanis, *Brusch*, *Wenßdorn*. Hispanis, *Ius barba*, & *Gilbarbera*. Gallis, *Brus*.

RUSCUS.

FORMA.

Folium fert myrti, latius, in *Diosc.* formam lanceæ mucronatum. Baccæ per maturitatem rubescunt, rotundæ à medio folio dependentes, ossæo intus nucleo. cubitales rami ab radice exeunt, vitilium modo lenti, fractu contumaces, foliosi; radice graminis simili, acerba, & subamara.

LOCVS.

In asperis, & præcipitibus *Idem*. locis nascitur.

QUALITATES.

Excalfacit radix, siccat, aperit, abstergit, extenuat. *Matth.*

VIRE.

Folia, & baccæ in vino pe- *Diosc.* tæ urinam cient, menses pellunt, vesicæ calculos frangunt, stillicidio urinae medentur, do-

lores capitis sanant, & regium morbum. Decoctum radice in vino potum eodem præbet effectus. Cauliculi recentes asparagorum vice in cibo sumuntur; amari autem sunt, sed urinam mouent.

Nnn 4

LAVRVS



LAVRVS Alexandrina, Græcis, Δάφνη Αλεξανδρεῖα. Arabibus, *Gat Alexandria*.
Italīs, *Lauro Alessandrino*. Gallis, *Laurier Alexandrin*.

LAVRVS ALEXANDRINA.

F O R M A.

Diosc. Folio est Hippoglossi, paulò maiore, molliore, & candi-
diore, semine inter folia ru-
bro, ciceris magnitudine, ra-
mos spargit in terra dodranta-
les, interdum longiores. Ra-
dice Rusco simili, maiore,
molliore, odorata.

L O C V S.

Idem. Inuenitur in montosis.

Q U A L I T A T E S.

Galen. 6. Temperature euidenter est
simp. me. calidæ, simul & gustantibus a-
cris, & subamara.

V I R E S.

Diosc. Difficiles partus accelerat,
radice pota in vino dulci sex
drachmarum pondere, & stil-
licidio vrinæ auxiliatur, sed
sanguinem extrahit.

* C E N S V R A.

Polygonati potius esse speciem rei herbariæ peritiores existimant.*

DAPHNOI-



DAPHNOIDES, Græcis, *Δαφνοειδής*. Arabibus, *Daphnides*. Italis, *Laureola*. Gal-
lis, *Laureole*. Germanis, *Groß Kellershalß*.

DAPHNOIDES.

FORMA.



Cubiti altitudine fruticat, DIOSC.
ramis flexilibus, obsequiosis-
que multis à medio sursum
versus foliosis, cortex supra
modū viscosus ramos vestit,
folia lauri, graciliora, & mol-
liora, fractu cōrumacia, quo-
rum gustu os, & fauces in-
cendūtur. Flores candidi. Bac-
ca cū ematurerit nigra. Ra-
dix inutilis.

LOCVS.

Nascitur in montosis. *Idem.*

QUALITATES.

Est viribus & ipsa persimi- *Gal. li. 6.*
lis Lauro Alexandrinæ. *simp. me.*

VIREs.

Pituitam extrahit foliū re- DIOSC.
cens, vel aridum in potu, vo-
mitum, & menses ciet: caput
inanit commanducatum, ster-

nutamenta mouet. Baccæ quindecim potæ aluum resoluunt. Folia recentia *Matth.*
contusa illinuntur vtiliter ischiadicis, quousq; ruborem, aut vesicas excitent.

APPENDIX.

* Appinimus vulgo dictum Daphnoides, cū nō esset ad manus viua plan-
ta, cuius iconem autor exhibet. Profert illud coccum gnidium, quod in Offici-
nis habetur contentum in baccis rubris. Flosculi vere primo emergunt copio-
si, purpurascens, odorem spirantes non ingrati.*

Nnn 5

CHAMÆ-

CHAMÆDAPHNE, Græcis, Χαμαδάφνη. Italis, Laureola minore.

CHAMÆDAPHNE.

FORMA.

DIOSC. Virgas emittit cubitales, singulari ramulo constantes, rectas, tenues, læves, folia latri similitudine, læviora multo, ac viridiora, semen rotundum, tubens, annexum folijs.

LOCVS.

Matth. Prouenit in montibus, & in syluis.

QUALITATES.

Gal. li. 6. Viribus & ipsa est Daphnoidis persimilibus.

VIREs.

DIOSC. Trita folia illinuntur capitis doloribus, & stomachi ardores mulcent. Bibuntur cum vino ad sedanda tormina, potus cum vino succus menses, & vrinas ciet Idem facit pello appositus.



*APPENDIX.

Reperi quidem similem aliquando plantam in montibus Silesiæ altissimis versus Morauiam, sed folijs crassis, duris, & caule satis denso, baccis nigris, quapropter verisimile est potius ad Daphnoidem referendam esse, nec immerito de hac stirpe tanquam incognita nonnulli dubitant.*

ELLEBO.

ELLEBORVM, siue Veratrum album. Græcis, Ελλέβορος λεῖον. Arabib. Cherbachem, seu Charbechahid. Italis, Elleboro bianco. Germ. Weiss Nieswurk. Hisp. Verde gambie blanco, seu Yerna de batefle. Gallis, Veraire, seu Ellebore blanc.

ELLEBORVM ALEVM.



FORMA.

Folia fert plâtaginis aut be DIOSC.
tę sylvestris similia, sed breuiora, nigriora, rubescentia, caulem canum quadrantalem, tunicis conuolutum, quas abdicat cum arescere incipit. Radicibus nititur multis, tenuibus, ab oblongo, & exiguo capite cepaceo exeuntibus. Flo Matth.

LOCVS.

Prouenit copiosum in montibus & asperis. DIOSC.

QUALITATES.

Elleborus uterque tum albus, tum niger, extergentis simus, & excalfacientis est facultatis, quamobrem ad alphas, imperigines, scabies, leprasque accommodati sunt, porro niger gustu calidior est, albus vero amarior. Gal. li. 6. simp. me.

VIRES.

Radix vomitione varios extrahit humores. Menses impositum pellit. Sternutamenta excitat. Mures interficit. Vomitiones concitant subditi ex oleo balani cum aceto. Mortiferum est medicamentum, quod sæpe homines stragulet. Caterum prisci medici album elleborum propinabant comitialibus, melancholicis, vertiginosis, infantibus, lymphaticis, couulsis, podagricis, resolutis, hydropicis, elephantiacisque, sed iam eius exoleuit usus, ut in puluere propinetur. Eius autem diluto quamplurimi sine incommodo vtuntur. Radix in lixiuio decocta pediculos, & lendes necat. Decoquitur in lacte ad muscas perimendas. Mures quoque necat, & gallinas. Paratur à radicem succo in Hispania venenum, quo venatores sagittas illinunt, quibus qui feriuntur, breui tempore pereunt, nisi cydonia poma vorauerint, aut eorundem biberint sucum. Mesue. Matth.

ELLEBO-

ELLEBORVM nigrum, Græcis, Ελλέβορος μέλας. Arabibus, Cherbachem, seu Car-
 bech asued. Italis, Elleboro nero. Germanis, Christwurß. Hispanis, verde gambre
 nero, seu Elleboro. Gallis, Viraire, & Ellebore noire.

ELLEBORVM NIGRVM.

FORMA.

Diosc. Folia ei viridia, platani simi-
 lia, minora tamen, subaspera,
 nigriora, plurib. diuisuris in-
 cisa, caulis asper, flores in pur-
 pura albicantes, racematim co-
 hærentes, semen cnici. Radi-
 cibus coheret nigris, tenuibus
 à capitulo cepaceo cõfibratis.

LOCVS.

Idem. In collibus asperis, & siccis
 locis nascitur.

QUALITATES.

Gal. li. 6. Extergentis simul & excal-
 simp. me. facietis est facultatis, est enim
 ex tertio ordine exalfacien-
 tium, & desiccantium, gustu-
 que albo calidior habetur.

VIREs.

Diosc. Ventrem purgat, bilem de-
 trahit, pituitamque: prodest
 morbis comitialibus, melan-
 cholicis, infanientibus, articulatij doloribus, & resolutis. Menses inditum tra-
 hit, partus necat, fistulas purgat impositum, & tertia die detractum. Demitti-
 tur in aurem contra gravitatem auditus, & vsq; in alterum, aut tertium diem si-
 nitur. Scabiem illitum sanat, vitilignes, lepras, imperigines, ex aceto medetur.
 Dentium dolores collutione mitigat. Imponitur vitiliter hydropicorum ven-
 tribus farina hordeacea & vino exceptum.

ELLEBO-



ELLEBORVM alterum, Nobis Elleborum fœmina, seu pseudoelleborum.

ELLEBORVM NIGRV M ALTERVM.

FORMA.



Folia gerit digitis nouē ad *Matth.* pediculum vsque dissecta, ac niti Cynoctoni ferè modo, sed longiorib. diuisuris, nigricantia, digitis circumqua; ferratis. Caulem edit vegetū, subsperumque. Flores alterius similes, sed herbaceo colore, aut quadatenus subpalescentes, quinque, aut pluribus emergentibus è medio corniculis acuminatis, vtrinq; compressis, in quibus semen continetur. Radicib. cohaeret numerosis, tenuib⁹, palmari longitudine, ac per omnia alterius similibus, odore graui, nauseam commouente, sapore amaro.

CENSURA.

Sunt qui putent hanc plantam Plinij esse Consiliginem, cuius sententiæ est clarissimus, ac doctissimus Fracastorius, qui etiam eiusdem Plinij Enneaphyllon eandem facit. Verum nos nec hæc, nec illam esse putamus, quod nullus sit autor qui ne vna tantum nota consiliginis faciem & historiam describat, quodq; Plinius nusquam meminerit Enneaphyllon consiliginem Latinis vocari, eamq; vrentis facit facultatis, & lumborum, coxendicumq; doloribus utilem: consiliginem verò ad Pulmonis tantum morbos valere scribit.

PSEUDO-

PSEUDOELLEBORVM, Græcis, Ψευδοελλέβορος. Italis, Elleborofalso.

PSEUDOELLEBORVM.

FORMA.

Matth.

Affurgit hæc planta ad dñi palmorum altitudinem. Cauliculus emittit tenues, ac molles, folia longiuscula tenuia, Abrotani quadantenus æmula. Flores Buphthalmi, paulo tamé maiores, è quibus capitula prodeunt oblôga, ruborum moris similia. Radicibus cohæret nigris, nigrum veratrum æmulantibus, tenuioribus tamen, & nigrioribus.


LOCVS.

Idem.

Plurimū prouenit in Boemia, in Pragenſi præſertim agro.

QUALITATES,
ET VIRES.

Huiusce plantæ radicibus tum Medici, tum pharmaco-pœi, qui Boemiam incolunt, vtuntur paſſim pro legitimo nigro veratro, *non ſine errore, *ac priuatim ad ſuorum pecorum morbos.



OPHRIS.

OPHRIS, Italis, *Elleboro bianco falso*. Germanis, *Zweiblatt*.

O P H R I S.

F O R M A.



Duo tantum hæc folia pro- *Matth.*
fert, albi veratri quadantenus
similia, inter quæ caulis erum-
pit tenuis, calyculis oblongis,
parvisque refertus, balauftio-
rum effigie, è quibus flosculi
exeunt candidi paruarum lin-
guarum faciem referētes. Ra-
dice nititur gracili, compluri-
bus tamen adnatis, alba, & o-
dore præstanti.

L O C V S.

Nascitur in montibus, & in *Idem.*
conuallibus.

Q U A L I T A T E S.

Manfa radix glutinosum len *Idem.*
torem reddit, subdulci sapo-
re, Quare calida fuerit, & hu-
mida.

V I R E S.

Præfertur vniuersa planta ad denigrandos capillos, fracturas sanandas, &
vulnera glutinanda.

SESAMOI-

SESAMOIDES paruum, Σησαμοειδὲς μικρὸν, Græcis dicitur.

SESAMOIDES PARVUM.

FORMA.


DIOSC. Cauliculos edit dodrantales, folia coronopi minora, hirsutiora, & in cauliculorum cacumine capitula florum penè purpureorum, medio eorum albo, semen sesamæ, fulvum, amarum. Radix tenuis.

LOCVS.

Idem. Nascitur in asperis.

QUALITATES,
ET VIRES.

Idem. Semen bilem, pituitamque detrahit ex aqua mulsa potum dimidio acetabulo, illitum ex aqua tumores, ac tubercula discutit.



*SESAMOI-

* SESAMOIDES paruum flore magis completo.



Ad intybacea potius ego
 referrem hanc plantam, cum
 radix lacte non paucò turgat
 & multis quoq; doctis & her-
 baria rei peritissimis hæc sen-
 tentia ardeat. Flores Cicho-
 rio figura respondent & alij
 simplici foliorum textura cõ-
 stant, alij densius stipantur,
 colore eleganti cæruleo, sta-
 mina in medio lutea habentes,
 è quibus relinquitur semen
 subnigrum angulosum
 pusillum, squammatis capi-
 tulis inclusum, quod an pur-
 gandi vim obtineat, nemi-
 nem experiendo cognouisse
 arbitror, Vnum hoc scio in
 parua quantitate exhibitum
 nihil efficere, sapore est o-
 mnino dulci nihil vel mini-
 mum amaritudinis obtinen-
 te.*

Ooo

Cvcv-

CUCUMIS sylvestris, Græcis, *ἑλκων*. Officinis, *Cucumer aspinus*. Arabibus, *Chese allimar*, *Kate allhenei*, seu *cheta alhamar*. Italis, *Cocomero saluatico*. Germanis, *Wilder Cucumer* seu *Efels Cucumer*. Hispanis, *Cogombrillos amargos*. Gallis, *Cogombre sauvage*.

CUCUMIS SYLVESTRIS.

F O R M A.

Matth.

Folia illi sunt satiuo cucumeri similia, sed rudiora, hirsutiora, asperioraq; , auersa parte subalbicantia. Flores ex alarum cavitatibus, quæ in sarmentis habentur, prodeunt aut rei, stellarum figura, retro ex tuberrante fructu, satiuo cucumeris modo, qui tandem auctus, & oblongus factus, glandis magnitudinem superat, aut dactylos æquat. Is hirsutus adeo est, ut quasi aculeatus sentiatur, qui maturus factus candicat, & sponte, aut leuiter impulsus non sine impetu, a pediculo disungitur, & tormenti instar, nigrum, maturumq; semen unum cum succo in legitimum manus ei aculatur. Radicem habet doctilem, ac etiam longiorum, brachialium crassitudine, candidam, succosam, & insigniter amaram, quemadmodum planta est tota, & fructus.

L O C V S.

Diosc. Nasctur in sabuletis, & rudibus.
Matth. Incultis & vlgiosis locis.

Q U A L I T A T E S.

Gal. & simp. me. Vniuersa planta in usu est. Succus summe quidem amarus est, leuiterq; calidus, ut ex secundo sit ordine excofacientium. Digerendi etiam vim possidet & subtilium est partium. Radix similem succo facultatem obtinet. abstergit namq; digerit, & emollit. Porro cortex ea potentius desiccatur.

V I R E S.

Diosc. Instillatus foliorum succus, aurium dolori cõuenit. Illita ex polenta radix veterem omnem tumorem discutit. Imposita cum Resina terebinthina, tubercula rumpit, Ischiadicis infunditur. Arida farina impetigines, lepras & vitiliginas abstergit, nigris cicatricibus colorem reddit, & maculas in facie delet. Radicis succus selquioboli pondere, & ite cortex acetabuli quarta parte bilem, pituitamq; deiciunt, præsertim in hydropicis. Deiectiones autem circa stomachi iniuriam mouet. Elaterium vero è fructuum succo paratum menses ciet, partus emecat in pello subditum, naribus cum lacte infusum morbo regio medetur, & diuturno capitis dolore liberat. Efficacissimè anginis illinitur, cum vetere oleo, melle, aut felle taurino.

STAPHIS

NOMINA.

947

STAPHISAGRIA, seu herbapedicularis, Græcis, *Staphis agria*. Arabibus, *Alberas*,
Muiba Zagi, sine *Muibe Zegi*. Italis, & Officinis, *Staphisaria*. German. *Bisnning*,
 Hispanis, *Fabaraz*, & *Paparra*. Gallis, *Herbe aux poux*.

STAPHISAGRIA.

FORMA.



Folia habet Labruscæ diui. Diosc.
 fa, & cauliculos rectos, mol-
 les, nigrosq; Florem fert Gla-
 sti, & folliculos virides, simi-
 les ciceri, & in his nucleura
 triangulum, scabrum ex ni-
 gro subfuluescentem, intus
 album, gustu acrem.

LOCVS.

Nascitur in opacis. Copio- Plinius.
 sissima autem provenit in Matth.
 Dalmatia, Istria, Apulia, &
 Calabria.

QUALITATES.

Vehementer acrem obti- Galen. 7.
 ner facultatem, sed & vrendi smp. me.
 vimaliquam habet.

VIRES.

Pota quindecim seminis Diosc.
 grana trita ex mellicrato cras-
 sum humorem per vomitum
 purgant, atq; sumentes ambulare debent, & aquam mullam continuo pota-
 re, quoniam pericula strangulationis inferunt, & fauces adurunt. Trita, & ex o-
 leo illita phthiriasi prodest: item prurigini, & pforis. cit commanducata pluri-
 mam pituitam. coquitur in aceto, eoq; in dolore dentium os vtiliter colluitur.
 reumatismum gingivarum sistit. vlcera oris manantia cum melle sanat.

000 2

THAPSIA,

THAPSIA, Græcis, Θάψια Italis, Thapsia. Mauritanis, Hiantum, sive Drix. Gal-
lis, Turbit blanc.

THAPSIA.

FORMA.

Diosc. Totanatura ferulæ similis
est, graciliore caule, folijs sæ-
niculi umbella anethi in ca-
cumine à singulis furculis e-
rumpente, flore luteo, semen
quale ferulæ latiusculum, sed
aliquanto minus. Radix foris
nigra, intus candida, magna,
acis, crassiore libro vestita.

LOCVS.

Matth. Nascitur plurima in Apu-
lia Gargano monte.

QUALITATES.

Galen. 6. Acrem habet, & vehemen-
ter excafacientem faculta-
tem cum humiditate. Quam-
obrem ex alto vehemèter ex-
trahit, & quod extraxit dige-
rit, vis eius post annum mul-
tum resolutur.

VIREs.

Diosc. Tam cortex radice, quam succus purgandi vim habet, & lacteus succus in
aqua multa potus, nam vtrinque bilem extrahunt. Radicis quaterni oboli cum
tribus seminibus anethi drachmis, succi terni oboli, lactis obolus vnus propinan-
tur. Quod eo amplius assumitur periculosum est. Conuenit hæc purgatio sulpi-
riosis, & diuturnis laterum doloribus, reiectionibusq, succus illitione, aut ra-
dix recens affricu alopecias expleat Radix, & succus cum thuris, & ceræ æquis
portionibus sugillata, huoresq, tollunt. Viria cutis in facie emendant. Cum
melle illitus succus lepras tollit, & tubercula discutit, cum sulphure perunctus.

SPARTI-




NOMINA.

949

SPARTIVM, Græcis, Σπάργον. Italis, Sparro. Germanis, Psrimmen. Hispanis Sparrio. Gallis, Genêt de Espagne.

SPARTIVM.

FORMA.



Frutex est longas ferens vir Diosc.
gas, sine folijs, firmas, fractu
cōtumaces, quibus vites vin-
ciuntur. Semen Lenticulæ in
foliculis phasolorum modo
nascens. Florem, vt albæ vio-
læ luteum.

LOCVS.

Plurimum prouenit in Hi- Matth.
spania, aridis, & siccis locis.

QUALITATES.

Semen, & virgarum succus Galen. 3.
non instrenuè trahentis est simp. me.
facultatis.

VIRES.

Purgant per superna vehe- Diosc.
menter elleborivice citra pe-
riculum flores, & semina qui-
nis obolis in aqua mulla po-
ta. Semen deiectionem mo-
ra.

Semen deiectionem mo-
ra. Ramis in aqua maceratis, mox tuis extractus succus, ischiadicis auxiliatur,
si cyathi medium ieiuni bibant. Quidam marina aqua macerant, & infundunt
Ischiadicis clystere: strigmenta autem elicit cruenta.

Ooo 3

GENISTA,

GENISTA, Italis, *Ginestra*, Hispanis, *Genestra*, *Giesta*, siue *Giestrina*. Germanis, *Ginst*. Gallis, *Geneste*.

GENISTA.

FORMA.

Mesue. Arbor est montana, è cuius caudice complurimæ oriuntur virgæ, rectæ, flexiles, fractu contumaces, acuminatæ, quibus vites & fasciculi ligantur. Flores edit flauos lunari figura, è quibus siliquæ prodeunt oblongæ vicia modo, in quibus semen illi quoq; simile.

LOCVS.


Matth. Oritur in montibus, & collibus.

QUALITATES.

Mesue. Planta tota perturbat, prouocat, incidit, attenuat, cordiq; & ventriculo nocet.

VIRES.

Idem. Epotum semen pituitam
Matth. vtrinque valentissimè purgat, & ab articulis quoq; humores trahit. Renum excrementa pellit, vrinam citè efficacissimè, & calculos disrumpit tam in renibus, quàm in vesica, prohibetq; ne in posterum renascantur calculi. Flores contriti strumas auferunt, si cum melle rosaceo aut sorbili ouo sumantur. Fit ex ijs oximel, cuius vtu in duraci lienes resoluuntur. Pro sunt ischiadicis, podagricis, calculosisq; si postquam sumperint euomant.



NARCIS-

NOMINA.

957

NARCISSVS, Græcis, Νάρκισσος. Arabibus, *Narces*, seu *Nargies*. Italis, *Narciso*. Germanis, *Hornungsblumen* / *Narcissen* Nöpflein. Gallis, *Narcisse*, *Campanette*, seu *Isunette*.

NARCISSVS.

GENERA.

Complura narcissi videntur atthm. genera, vt ex appictis hie iconibus seriatim palam fiet.

FORMA PRIMI.

Folia profert porro similia, Diosc. sed multo minora, & angustiora, caulis vacuus, & sine folijs supra dodrantem attollitur, flos albus, intus croceus, in quibusdam purpureus, radix intus alba, rotunda, bulbosa, semen velut in tunica nigra longum. Flores suauis sunt odore.

LOCVS.

Nascitur in montibus, & Diosc. scribitur in hortis. Matth.

QUALITATES.

Radix vsq; adeo exsiccandi Galen. 8. facultate pollet, vt & maxima simp. me. vulnera conglutinet, vel ad

incisiones vsq; quæ circa tendones accidunt. Habet verò quiddam absterforium, & attractorium.

VIRES.

Radix cocta, siue estur, siue bibitur vomitoria est, ambustis igni prodest cum Diosc. exiguo melle trita, præcisos neruos illitu glutinat, vitia cutis in facie, vitiliginosq; cum semine vrticæ, & aceto emaculat, cum eruo, & melle vlcera fordes expurgat, abscessus concoctioni repugnantes rumpit, infixæ corpori extrahit, illita cum lolij farina, & melle.

000 4

NAR-



NARCISSVS II. * Narcissus flore pleno, Græcis, Νάρκισσος πολιάνθος. Germanis, Gefüllte Narcißten Köpff. Arabibus, Modaph.

NARCISSVS II.

F O R M A.

Non differt hic à priore, neque facie, neque viribus, sed tantum floribus, quos admodum speciosos promit, candidos quoq; sed quorum medium habent foliola.*



NARCIS-

NOMINA.

953

NARCISSVS III. *Narcissus totus luteus. Hispanis, *Campanilla*. Gallis, *Coquelurde*. Germanis, *Gelb Josephstabi*/Hernungsblumen.

NARCISSVS III.

FORMA.

Flores promit luteos speciosos, nola effigie, folijs luteis, sed pallidioribus circumdatos, qui interdū duplices vel triplices etiam spectantur, quibus decidentibus relinquitur capitulum semina intus nigra alteruans, quæ principio latiuscula, tēporis progressu rotūdiora fiunt. Folijs & radice à priore parum discrepat.

LOCVS.

Scatent hoc flore nemorosa prata. Inuenitur etiam in montibus prorsus luteus ferius florens.*



Ooo 5

NARCIS-

NARCISSVS IIII. *Græcis, λειριονάρκισος & πολύανθος. Italis, Hyacintho del padre nostro.

NARCISSVS IIII.

FORMA.

Flores speciosos plures, lactei candoris, folijs lenis constantes, Ornithogali floribus ferè similes, sed maiores profert, insidentes pediculis suis longis, in quos diuiditur summitas caulis, qui emergit inter folia oblòga Narcissi. Radix est Ornithogali pluribus bulbulis adnatis se propagās.

LOCVS.

Rarus est, ideoq; horti cultiores hūc sibi vendicarunt.*



NARCIS-

N O M I N A.

955

NARCISSVS V. *Lilionarciſſus, Turcis, Tulipan, Caſe Lale, Zampul.

NARCISSVS V.

FORMA.



E bulbo Colchici æmulo folia nascuntur Liliacea, aliquantum cōcava carinatæ, oris sinuatis, ex horum medio caulis assurgit assumitq; folia, quib. vestiatur, plerunque terna. Eius summitas ornatur flore venustissimo, lilij effigie, colorū varietate mire discrepante. Nam vel purpureus, vel coccineus, vel violaceus, vel aureus, vel flauus, ceusq; , vel prorsus candidus habetur. Sunt qui cæruleum se vidisse affirmant. Quin & varij colores in vnico flore spectantur, quorum diuersitates omnes describere non est huius loci, præsertim cum indies augeat ista varietas. Subnascitur semen foliaceum aurei coloris, vt Lilij rufi, clausum oblongo membraneoq; folliculo.

Locvs.

Habetur in hortis.*

NARCIS.

NARCISSVS VI. * *Leuconarcissifolium bifolium*. Germanis, *Schnurpoffen*.

NARCISSVS VI.

F O R M A.

Palmari cauliculo Vere pro-
dit inter folia gemina, flore
exili lacteolo, tribus tantū fo-
lijs constante, aut senis si tria
exigua illa herbacea medium
flores obtinentia simul nume-
rentur. Bulbosa nititur vt re-
liqui Narcissi, sed parua radi-
ce.

L O C V S.

Nascitur in pratis & salti-
bus vmbrosis.*



NARCIS-

N O M I N A.

957

NARCISVS VII. *Leuconarcissolition vulgare, Viola alba Theophrasti aut eiusdem Opition. Germanis, Weiß-Hornungsblum/Merzenblumen.

NARCISVS VII.

F O R M A.

Floribus præcedēti cognata est, vt & reliquis partibus, sed per omnia maior & vegetior.

L O C V S.

Nascitur sponte in nemoribus Germaniæ copiosè, nec non alibi, vt in Salena monte & agro Aurelianensi.*



NARCIS-

NARCISSVS VIII. *Lilionarcissus Bononiensis. Tulipā minor. Græcis, *Λι-
νονάρκισσος* & *πολλύλλυος*.

F O R M A.

Inconditam quandam effi-
giem hoc loco exhibuerat au-
tor sine descriptione, quæ ta-
men videbatur esse Tuliparū
Bononiensium (ut appellan-
tur hoc nostro tempore) Di-
uaricantur enim harum non-
nunquam caules, fiuntq; tri-
plices & sæpe quadruplices,
sustinentes in summo flores
stellatos, luteos, odoratos, qui
tandē abeunt in triquetra ca-
pitula continentia semen la-
tum, rufum, ut Liliū. Bulbus
nucleum oblongū allij æquat,
sed membrana lutea nitidaq;
tegitur.

L O C V S.

Apud nos in hortis inueni-
tur, & sponte nascitur in mon-
tibus circa Bononiam. *

NARCISCVS VIII.



R I C I N V S.

N O M I N A.

959

RICINVS, Græcis, Κικιήριον. Italis, *Mirafale*, & *Girafale*. Arabibus, *Cherua*. Germanis, *Wunderbaum* / *Türckischer Hanff*. Hispanis, *Figueira dell' inferno*. Gallis, *Palma Christi*.

RICINVS.



FORMA.

Prouenit parua ficus alti- Diosc. tudine, folio platani, maiore, leuiore, & nigriore, ramis, caudicibusq; cauis in arundinis morē, semine in uuis asperis, quod corticib. exutū, ricinum animal representat.

LOCVS.

Seritur in hortis, & in uiri- Matth. darijs. In Ægypto sponte nascitur.

QUALITATES.

Semen quemadmodū ex- Gal. li. 7. purgat, detergit, & digerit, simp. me. sic quoque folium, sed vnde- quaq; debilius. Oleum quod ex semine conficitur, tum calidius, tum tenuiorū partiū est, quā oleum commune, ac proinde etiam discutit.

VIRE.

Grana triginta numero Diosc. purgata, trita, potaq; pituitas, bilis, aquamq; per aluū extrahunt, vomitionesq; mouent, sed iniucunda admodū est, & molesta purgatio, sto-

machum vehementer subuertens, Tusa & imposita vitia cutis in facie, varosq; expurgat. Folia cum hordeacea farina trita inflammationes oculorum, tumoresque leniunt. Turgentes mammas cohibent. Eadem ex aceto illita ignes sacros restringunt. Confert semen coli, & articulorum doloribus si ex veteris Mesue. galli iure hauriatur. Oleum quod ex semine elicitur infunditur commodè ad colicos cruciatus, inunctum autem tum scabiem, tum capitis vlcera sanat. Medetur sedis inflammationibus, & conuersis, ac præclusis fœminarum locis. Inungitur vtiliter indecoris cicatricibus, & aurium doloribus.

APPENDIX.

Suspicio in Dioscoridis exemplari subesse mendam. Grana enim triginta seminis non sine periculo vitæ dari possunt. Quo sit ut cum Oribasio legam tria grana, non triginta.

TITHY-

TITHYMALVS, Græcis, Τιβύμαλ. Arabibus, *Xauser*, seu *Erbula*. Italis, *Tirimalo*, & *Tortumaglio*. Germanis, *Wolffsmilch*. Hispanis, *Lecce treña*, seu *Lecce tre-gua*. Gallis, *Tithymale de montaigne*.

DIOSC.

GENERA.

Septē tithymalorū habent genera, nēpe Characias, Myrrites, seu Myrsinites, Paralip, Helioscopius, Cyparissias, Dendroides, & Platiphyllus.

FORMA CHARACIÆ.

Idem.

Caules supra cubiti altitudinē attollunt, rubri, lacteo succo, atq; acri madētes, folijs oleæ circū ramos, angustiorib. & lōgioribus, radice crassa lignosa. Pender in caulium cacuminib⁹ coma iunci, sub qua caueolæ foliolis balnearum similes, in quib. semen continetur.

LOCVS.

DIOSC. Nascit in asperis, & mōtib⁹.

QUALITATES.

Gal. li. 8. Vincentem habent oēs acri, calidamq; facultatē, inest verò & amaritas. Validissimus itaq; est eorū liquor. Secundū locū tenet, semē & folia. Radix verò dictarū facultatū particeps est, sed non ex quo adurunt, & exulcerant quamuis corporis partem.

VIRES.

DIOSC. Succus aluum purgat, trahit pituitā, bilem q; binis obolis in posca sumptus, & cum aqua nullā vomitiones mouet. Recens lac perunctum in sole capillos ex oleo euellit, renascentesq; flauos & exiles efficit, denique omnes perimit. Dentium cauernis inclusum leuat dolores. Tollit illitu impetigines, fornicantes verucas, & thymos. Valet aduersus pterygia, carbunculos, vlcera, phagedænas, gangrenas, fistulasq; Semen, & folia lactei succi effectum præbēt dimidio acetabulo pota. Radix drachmæ pondere in hydromelite pota, per inferna trahit, Acetum in quo decocta fuerit, collutione dentiū dolores mulcet. Omnia genera cordi, iocinori, & vetriculo maximè nocēt, vala distrupunt, intestina abradunt, vniuersum exalfaciunt corpus, adeò vt inde febres facili concitentur.

TITHY-



TITHYMALVS Myrsinites, Græcis, Τιθύμαλος μυρσινίτης, ἢ Μυρσινίτης. Italis, Tithymalo Myrsinite.

TITHYMALVS MYRSINITES.



FORMA.

Folijs crescit myrti proximi- DIOSC.
mis, sed maioribus, firmis, in
cacumine acutis, & pungenti-
bus. Ramulos ab radice mit-
tit dodrantes. Fructum fert
alternis annis, nuci similem,
mordacigustu.

LOCVS.

Nascitur in asperis.

Idem.

QUALITATES, ET
VIRE.

Succus, radix, semen, folia Idem.
consimilem antedicto sortiun-
tur facultatem, sed ad citan-
das vomitiones validior, atq;
efficacior est.

Ppp

TITHY-

TITHYMALVS Paralios, Græcis, Τιθύμαλος παράλιος. Italis, *Titimale marino*.

TITHYMALVS PARALIOS.

FORMA.

DIOSC. Ramis nascitur subrubentibus, dodrantalibus, rectis, quinis, senisve à radice exeuntibus, folijs lini, angustis, parvis, oblongis, in versus quosdam digestis, capite in cacumine orbiculato, denso, in quo semen, vt eruum vario colore emicat. Flos albus. Frutex totus cum radice lacteo succo turget.

LOCVS.

Idem. Prouenit in maritimis.

QUALITATES, ET
VIRES.

Idem. Similes ad vsus reconditur.



TITHYM.

NOMINA.

963

TITHYMALVS Helioscopius, Græcis, Τίθυμαλος ἡλιοσκοπίος. Italis, Titimalo
Helioscopio. Germanis, Sonnenwende Woltffemilch.

TITHYMALVS HELIOSCOPIVS.

FORMA.



Folijz prouenit Portulacæ **DIOSEO.**
tenuioribus, rotundioribus
que, ramulis prodeuntibus
à radice quaternis, aut qui-
nis, rubentibus, dodrantali-
bus, tenuibusq; lactis copio-
si plenis, capite anethi, semi-
ne in capitibus incluso.

LOCVS.

Circa oppida nascitur, po. *Idem.*
tissimum in ruderibus.

QUALITATES, ET
VIREs.

Ezdem illi quæ superiori. *Idem.*
bus sunt vires, non tamen vl-
que adeo validæ.

Ppp 2

TITHY-

TITHYMALVS cyparissias, Græcis, Τιβύμαλος κυπαρίσσιος. Italis, *Esulaminore*.
Germanis, Cypresse Wölffsmilch.

TITHYMALVS CYPARISSIAS.

F O R M A.

Diosc. In caulem exit dodrantalem, vel maiorem, subrubrum, ex quo folia pini similitudine exoriuntur, molliora tamen, & tenuiora, in totum nascentem pinum æmulatur, candido succo madet.

L O C V S.

Matth. Nasceitur ferè ubique circa oppida, & secus vias.

Q U A L I T A T E S, E T
V I R E S.

Idem. Eadem illi vis quæ superioribus.

A N N O T A T I O.

Mihi profectò mirum videtur, quòd Dioscorides hoc tithymali genus κυπαρίσσιος appellauerit, cum pinum nō cyparissum, referat.



TITHY-

NOMINA.

965

TITHYMALVS Dendroides, Græcis, Τιβύμαλος Δενδροειδής. Italis, Titimalo arboreo.

TITHYMALVS DENDROIDES.



FORMA.

Ampliter opacat, in cacu-
diosc. cumine frondosam spargens
comam, succo lacteo præ-
gnantem, cauliculis rubenti-
bus, folijs myrti tenuioribus,
fructu Characiæ.

LOCVS.

Nascitur in petris.

QUALITATES, ET
VIRE.

Eiusdem est effectus, cuius Idem.
superiores.

Ppp 3

TITHY-

TITHYMALVS Leptophyllos, Græcis, τιθύμαλος λεπτοφυλλος. Germanis, Die
kleinße Weiffemilch.

TITHYMALVS LEPTOPHYLLOS.

FORMA.

Matth. Patet eius facies ex hîc
appicta figura.

LOCVS.

Idem. Nascitur incultis locis, &
asperis.

QUALITATES, ET
VIRE.

Idem. Facultatibus ijsdem pollet,
quibus & reliqua genera.




PITYVSA,

NOMINA.

967

PITYUSA, Græcis, Πιτύσσα. Arabibus, Scebram, & Pthias. Officinis, Esula maior. Italis, Esula maggiore. Gallis, Turbit noir.

PITYUSA.



FORMA.

Caulis supra cubiti altitudinem assurgit, geniculatus, folijs pini, acutis, exilibus, flore paruo, velut purpureo, semine instar lenticulae lato. Radice crassa, candida, succo referta. Quibuldam in locis prægrandis reperitur.

LOCVS.

Nascitur in montibus, ac Matth. etiam in campestribus.

QUALITATES.

Purgat similiter, vt Tithy- Gale. 3. mali, cæterisque viribus illis simp. me. est adfimilis.

VIRES.

Detrahit per aluum radix Diosc. drachmis duabus data in aqua mulsa. Item seminis drachma: succi cum farina subacti cochlearium in catapotio datur; modus foliorum drachmae tres. Multa verò lumentibus affert incommoda.

Mesue.

PPP 4

LATHY-

LATHYRIS, Græcis, Λαθύρις. Arabibus, Mendana, seu Mahendane. Italis, Cataputia minore. Officinis, Cherua minore. Germanis, Springkraut / Körner / seu Treibkörner. Hispanis, Tartago. Gallis, Esfurge.

LATHYRIS.

F O R M A.

DIOSC. Caulem emittit, cubitali altitudine, digitali crassitudine inanem. Gignuntur in cacumine alæ, & folia in caule oblonga amygdalinis proxima, latiora, & læviora, quæ autem in summis ramulis exierunt minora cōspiciuntur, aristolochiæ, aut oblongæ hederæ figura. In cacumine fructu in summis furculis gerit, triplici loculamento insignè, rotundum, ceu capparin, in quo grana intercurrentibus membranis inter se distincta continentur, eruis maiora, rotunda, quæ dum corticibus exuuntur candida sunt & gustu dulcia. Radix illi tenuis, & nullius usus. Totus frutex lacteo succo turgens, uti Tithymalus.

L O C U S.

Matth. Nascitur passim in hortis, & secus itinera exoluto solo.

Q U A L I T A T E S.

Galen. 7. Sunt qui dicant hanc esse

sim. me. Tithymali speciem, tum quod similem illis succum habeat, tum quod eodem illis modo purget totaq; illis facultate similis sit, nisi quod semen gustantibus videatur dulce, quod sanè etiam maximè purgatoriam vim obtinet.

V I R E S.

DIOSC. Grana sex, aut septem in catapotio, aut cum ficis, aut palmulis deuorata, aluum purgant, sed aqua frigida postea sorbenda. Trahunt autem bilem, pituitas, & aquas. succus Tithymali modo potus, eosdem effectus præbet. Decem duodecimve feminis grana à putaminibus delibrata, vomitum potenter citant. Itaq; ijs vtiliter propinantur qui philtia deuorarunt, aut alia veneficia.

PEPLVS.



NOMINA.

969

PEPLVS, Græcis, Πέπλος. Italis, *Pepla*. Germanis, *Hundsmilch*.

PEPLVS.

FORMA.

Frutex est lactei succi ple- DIOSCO.
nus, folijs parvis, vt rutæ, paulo
rarioribus, rotunda coma
ferè dodrantali, humi resper-
sa, semine sub folijs paruo, ro-
tundo, minore quàm candidi
papaueris. Vnicam habet ra-
dicem, ipsamque superua-
cuam.

LOCVS.

Nascitur inter vites, & in Idem.
hortis.

QUALITATES.

Succum habet similem Ti- Galen. 8.
thymalis, cum in alijs, tum *sim. me.*
quia purgat eum illi.

VIRE.

Semen acetabuli mensura DIOSCO.
ex hydromelitis cyatho po-
tum, bilem, ac pituitam pur-
gat.

Ppp 5 PEPLIS,



PEPLIS, Græcis, Πέπλος. Italis, *Peplo*.

PEPLIS.

F O R M A.

DIOSC. Frutice est latè opaco. succi candidi pleno, folijs satiuæ portulacæ, rotundis, infernè rubentibus, semine sub folijs rotundo, vti in *Peplo*, feruenti gustu, radice singulari, tenui, superuacua.

L O C U S.

Idem. In maritimis maximè nascitur.

Q U A L I T A T E S.

Gale. 3. Succum obtinet, velut *Thymali* validum, non tamen admodum vtilem.

V I R E S.

DIOSC. Vires habet *Peplo* similes.



SCAMMO-

NOMINA.

971

SCAMMONIA, Græcis, Σκαμμονία. Mauritanis, *Scammonea*. Italis, *Scammonea*.

SCAMMONIA.



FORMA.

Ramos ab radice mittit *Diosc.* trium cubitorum, multos, pingues, & nonnihil crassitudinis præferentes, folijs helixine, seu hederaceis, mollioribus tamen, & triangulis, flore candido, rotundo in calathi modum cauo, graueolente. Radice prælonga, crassitudine cubitali, candida, graui odore, succo prægnante.

LOCVS.

Nascitur in Mysia Asia *Idem.* regione, quin etiam in Syria & ludæa.

QUALITATES.

Exuperat in ea acredo, *Mesue.* quare corporis spiritus accendit, flatus mordaces gignit, immoderatas alui fluxiones facit, intestina abradit, tormina, & dysenteriam excitat.

VIRES.

Succus per inferna bilem & pituitam extrahit. Illinitur vtiliter Ischyadicis *Diosc.* Radix in aceto decocta, & cum hordeacea farina trita. Succus cum melle, aut oleo illius tubercula discutit. Decocto in aceto perunctæ lepræ abiguntur. Diuturni capitis dolores ex aceto perfunduntur.

*SCAMMO-

*SCAMMONIA Monspelienſium, vel marina, Periploca repens.

SCAMMONIA MONSPELIENSIVM.

F O R M A.

Folijs & floribus Apocyno ſimilis eſt, ſuperficie duorum cubitorum & fortasſe multo altior alicubi, radice cubitali, craſſitudine minimi digiti, intus ſubflaua, foris ſuſca, ſubrufa modice, friabili, inter mandendum crepitante parum, & ſi diutius ori teneatur acris eſt cum aliqua dulcedine. Nervus intus eſt flauus, qui fractus minimis foraminibus plenus eſt, caules ſive rami cœcaui, qui primo ortu ſunt erecti, poſtea repunt vt in volubili.

Q U A L I T A T E S.

Calida eſt vltra tertium gradum.

V I R E S.

Quidam vtuntur huius herbæ ſucco, vbi Scammonio deſtituuntur, & Maſſilienſes ferunt eodem & colophonia Scammonium adulterare tam exacte vt vix cognoſci queat.*



CHAMÆ-

NOMINA.

973

CHAMÆLEA, Græcis, *Χαμελέα*. Mauritanis, *Mezereon*, seu *Almezerion*. Italis, *Chamelea*. Germanis, *Zylandr*. Gallis, *Boys gentil*.

CHAMÆLEA.

FORMA.

Surculosa fruticat, ramis dodranta- DIOSC.
libus, folia oleæ similitudinem habent,
tenuiora, & amara, quæ gustata lin-
guam mordent, & arteriam deradunt.

LOCVS.

Nascitur in montibus.

Matth.

QUALITATES.

Vincentem habet qualitatem ama- Galen. 8.
ram, quamobrem admodum fordida *sim. me.*
vlcera, & quæ maximas habent crustas
cum melle purgare potest.

VIRE S.

Pituitam, bilemque detrahit, folijs DIOSC.
in catapotio deuoratis. Folia cum mel-
le trita fordida vlcera, & crustosa re-
purgant. Cauendum ab eius vsu, nisi *Matth.*
ea admista fuerint, quæ eius deleter-
iam facultatem superare possunt, de
quibus scripsit Melue.

* CENSURA.

An sit Arabum Mezereon non parum adhuc dubitatur, cum Mesues hoc
dicat esse ex herbis lactarijs. *

THYME-



THYMELÆA, Græcis, Θυμelaia. Italis, Timelea.

THYMELÆA.

FORMA.

Diosc. Virgas ædit pulchras, multas tenues, binum cubitorum, folijs Chamelææ, angustioribus, & pinguioribus, viscosis, gummosisque si mordeantur. Flore candido. Fructu myrti modo rotundo, qui inter initia viret, & tandem rubescit. Involucrum fructus durum, foris nigrum, intus album.

LOCVS.

Idem. Prouenit in altis montibus, & asperis.

QUALITATES ET VIRES.

Idem. Semen per inferna bilem, pituitas, aquasque detrahit, si viginti granorum pars interna bibatur, verum fauces adurit. Itaque cum hordeacea farina, aut in vuar acino dari debet. Herba stomacho infesta.

CENSURA.

Decipiuntur qui Cneoron Theophrasti, cuius duo ab eo produntur genera. Alterum quidem Chamelæam, alterum Thymelæam esse contendunt.



SAMEV-

SAMBUCVS, Græcis, Ἀκτὴ. Arab. *Iafacti*. Italis, *Sambuco*. Germanis, *Folder*. Hispanis, *Sabuco*, seu *Caninero*. Gallis, *Suseau*, seu *Suyer*.

SAMBUCVS.

GENERA.

Quatuor habet genera. Do- *Matth.* mesticum, Montanum, Aquaticum & Minus, quod Ebulus vocatur.

FORMA DOMESTICI.

Arbor est surculos mittens *Diosc.* arundinaceos, teretes, cauos, *Matth.* candicantes, proceros, medulla intus candida, ac fungosa, folia iuglandis terna, quaternave ex interuallis circa ramos exeunt græcolètia, minutim in ambitu secta, & in ramulorum cacuminibus cauliculisq; circinata spectantur umbellæ, quæ floræ candidum pariunt, odore non ingrato, mox acinum in nigredine subpurpureum racemosum, succo madentem, vinosumq;.

LOCVS.

Nascitur passim, vbique in *Matth.* sepibus, & circa vrbes.

QUALITATES.

Desiccandi, conglutinandi, *Gale. 6.* modiceq; digerendi facultatem obtinet. *simp. me.*

VIRES.

Vis illi detrahens aquam, stomacho inutilis. Folia olerum modo decoquuntur *Diosc.* ad pituitam, bilemque detrahendam, caules teneri in patinis cocti eadem efficiunt. Radix in vino decocta, & in cibis data hydropicos adiuuat; prodest, & viperarum moribus, eodem pota modo. Vulvas emollit insidentium decocto. Patefacit earum spiracula, & vitia corrigit. Acini in vino decocti eodem funguntur munere. Præterea folia ex hordeacea farina illita inflammationes mitigant, ambustis, & canum moribus illita profunt. Vlceræ quæ dehiscunt in fistulam agglutinant. Illinuntur vriliter podagricis cum seuo taurino, aut hircino. Stillatitia è floribus aqua fronti, &incipiti illita, capitis dolores mulcet, *Matth.* succus è radice cortice expressus, vomitum valentissimè commouet, & aquam intercutem pellit.

SAMBUCVS.



SAMBVCVS montana, Græcis, ἀκτὴ ὀρεινή. Italis, *Sambuco montano*.

SAMBVCVS MONTANA.

F O R M A.

Matth. Virgis folijsque vrbano similis est, sed minori longè proceritate adolefcit. Flores non in vmbellis, sed racematis coherent. Quin etiam baccæ in vix modum dependent, rubro perpetuo colore, vinosæ ac fucci plenæ.

L O C V S.

Idem. Nascitur in montosis, & algentibus locis.

Q U A L I T A T E S , E T
V I R E S.

Idem. Vires illi vrbano per omnia similes, imbecilliores tamen.



SAMBVC-

SAMBUCVS aquatica, Italis, *Sambuco aquatico*. Germanis, *Schweleken*.

SAMBUCVS AQUATICA.

FORMA.

Virgis est sambuci domesti. *Matth.*
ci æmulis, geniculatis, alba in-
tus medulla, sed caduca, & fra-
gili materie. Folijs vitigineis.
Flore albo Sambuci modo,
odore non iniucundo, à quo
baccæ prodeunt rubentes,
oxyacanthæ magnitudine, vi-
noso, ac amaro succo refertæ.

LOCVS.

Nascitur in aquosis, & vli- *Idem.*
ginosis locis.

QUALITATES, ET
VIRÆ.

Baccæ deuorata vomitio-
nes citant. Succovis est abster-
soria.



Qgg

FRAN-

FORMA.

Matth.

Arbor est mediocris, pœritatis, folio ferè corni, aut virgæ sanguineæ, cortice Alni, albis maculis exterius resperso, interius verò adeo flavescente, ut si mandatur croceo colore inficiat, Rhabarbari modo. Flores edit albos, fructum paruum pisi magnitudine, per medium diuisum, adeò ut duabus simul baccis constare videatur. Is primo exortu viret, deinde rufescit, postremò verò nigricat. Duo intra se habet ossicula lupinorū figura, sed lentibus paulò grandiora. Ligni materies omnino fragilis, imbecillaq; est.

LOCVS.

Idem.

Nascitur passim in Boemia syluis, & nemoribus.


QUALITATES, ET VIRE.

Idem.

Cortici vis inest cum aluum exoluens, tum quoq; adstringens. Quare Rhabarbari modo operatur, quæ in extimo tantum

cortice habetur, exoluit. in intimo verò adstrictoria viget facultas. Dilem eius decoctum, & pituitam expellit. Quinetiam hydropicorum aquas ducit. Decoquitur cortex cum aperientibus medicamentis ad cachexiam, icteritiam, & aquam intercutem. Daturq; potandum decoctum quatuor vnciarum pondere per quam commodè. Sed prius corpus expurgari debet. Soluit aluum absq; incommodo, belle iecur expurgat, & roborat, aperit omnium viscerum obstructions, & vasa à crassorum excrementorū infarctu expedit. Delibranur cortices in ipso veris principio, & in umbra siccantur. Recentium enim nullus debet esse vsus, quod vomitiones moueant. Decoctum quod ex ijs paratur quiescat prius oportet, antequam propinetur duobus, aut tribus diebus, quousq; flauus color niger fiat, alias vomitiones mouere quandoq; solet.

EVLVS,



NOMINA.

279

EBVLVS. Græcis *Κουάδερν*. Arabibus, *Kamea* & *s*. Italis, *Ebulo*, seu *Nebbia*. Germanis, *Ärtich*, seu *Niderholler*. Hispanis, *Hierguos*, seu *Subugo perquenno*. Gallis, *Hieble*.

EBVLVS.

FORMA.

Sambuco longè humilior **Diosc.** est, magisq; herbaceo generi assignandus, caule quadrangulo geniculato, folijs amygdala ex intervallo longioribus, geniculatim expansis, pinnatisq; graucolentibus, in ambitu serratis, muscario sambuci, flore & acino eiusdem. Radice nititur longa crassitudine digitali.

LOCVS.

Nascitur in plateis, & arc. *Matth.* is, secus vias, & in templorum claustris.

QUALITATES, ET VIRES.

Ea omnia præstat, quæ **vr-Diosc.** banasambucus.



Q99 2

APIOS,

APIOS, Græcis, ἄπιος. Italis, *Apios*.

APIOS.

F O R M A.

Diosc. Iunceos ramulos duos, siue tres spargit, rubros, tenues, qui à terra parum attolluntur, folijs rutæ sylvestris, oblongioribus tamen, & angustioribus, herbaceis. Semine paruo. Radice in formam pyri turbinata. Succo sæcunda, cortice exterius nigro, intus verò candida substantia.

L O C V S.

Theoph. Nascitur in montibus,
lib. 9. c. 10.
de p. hist.

Q U A L I T A T E S.

Idem. Datur ad expurgandū corpus, quod altera radice parte superius, altera inferius purget.

V I R E S.

Diosc. Superior eius pars vomitione bilem, pituitamque extrahit, inferior per aluum. Totā vtrinque purgationes mouet. Purgat vtraque parte succus sesquibolo potus.

PSEUDO-



PSEUDOAPIOS. Italis, *Apio falso*. Germanis, Erdmüß.

PSEUDOAPIOS.

FORMA.



Multipli crescit caule, cu- *Marth.*
 bitali, ac sæpè maiori, humi
 procumbente, pisi ferè mo-
 do, folijs oblongis, & subaspe-
 ris. Floret Iunio præsertim
 mense floribus puniceis, pisi
 æmulis, odoratis, racematim
 coherentibus, è quibus filicu-
 læ oriuntur, in quibus semen
 concluditur. Radices habet
 fici, aut pyri figura ternas, qua
 ternasve è staminibus depen-
 dentes, filipendulæ modo, ni-
 gra exterius cute, & alba in-
 tus pulpa, nulla purgatoria vi
 prædita.

LOCVS.

Nascitur cum in campis, *Idem.*
 tum in vineis.



Q99 3

Colo-

COLOCYNTHIS, Græcis, Κολοκύνθη. Arabibus, Chandel, Handel, seu Halandal. Italis, & Officinis, & Hispanis, Coloquintida. Germanis, Coloquint / seu Wilt-der Kürbiss. Gallis, Coloquinte, seu Courge saumage.

F O R M A.

C O L O C Y N T H I S.

Matth. Folia, & sarmenta emittit Anguria vulgo vocata, per terrâ repêtia, diuisa, fructum in speciem mediocris pilæ conglomeratum, vehementer amarum.

L O C V S.

Ilem. Seritur in hortis.

Q U A L I T A T E S.

Galen. 6. Colocynthis gustu amara est, *simp. me.* sed quæ amarissimo medicamento epoto ad sunt opera, ea euidenter efficere nequit, ob purgatoriam facultatem, quam validam in se se continet, nimirum cum ijs quæ expurgat, ante & ipsa per aluum excerni præuertens.

V I R E S.

Diosc. Medulla fructus purgatoriâ vim habet, si quatuor obolis in aqua mulsa, melle cocto, myrrha, & nitro excipiantur, & cogatur in catapotium. Arefactæ pilæ puluis clysteribus infusus prodest nervorum resolutioni, coxendicæ doloribus, & coli vitij, ut quæ bilem, pituitâ, & strigmenta, interdum etiam cruorê eliciunt. Fœtus ad mota pila enecat, si aqua mulsa,

aut passum, in eadē incoquatur, & sub dio refrigescat. potu crassum humorē, & alui strigmenta detrahit. Stomacho supra modū aduersatur, subdita pro balano alui excrementa eijcit. Virentis succo utilissimè ischiadici perfricantur. Porocerebrum, & nervos expurgat, quin etiâ musculos, thoracē, & pulmonem. Quare vertiginosis, comitialibus, resolutis, conuulsis, hemierania, diurno nocturno capitis dolore affectis, asthmaticis, & ægrè spirantibus utiliter in catapotijs exhibetur. Collachtymantes adiuuat oculos, & diutina tussi laborantes. Est præterea vis eius efficax ad omnes frigidos articulorum dolores. Pellit aquas tam potas, quam clysteribus infusa. Fit de fructu oleum ad retardandam canitiem, denigrandos capillos, & eorum defluuium cohibendum, si exempta de fructu pulpa, canitas oleo repleatur, & in cineribus calidis coquatur. eo mulcentur aurium dolores, atque sonitus discutiuntur. Quin etiam oleo ipso, & felle bubulo, interaneorum vermes necantur, si calida vmbilico illinantur.

E P I T H Y.



NOMINA.

983

EPITHYMVM, Græcis, *Επιθυμον*. Mauritanijs, *Efitimo*, seu *Eficemo*. Italis, *Epithimo*. Hispanijs, *Cabellos*, seu *flores del Tomilho*. Gallijs, *Teigne de Tym*.

EPITHYMVM.



FORMA.

Capillamenta sunt Epithy. *Matth.*
num tenuiora, quæ thymo ad-
nascuntur flauo colore, flori-
bus, & capitulis, perinde ac in-
cuscuta vocata.

LOCVS.

Nascitur, & viuít super thy. *Idem.*
mi plantas apricis præsertim
locis, & ab austro perflatis.

QUALITATES.

Thymi facultatem habet, *Galen. 6.*
ad omnia tamen efficacius est. *simp. me.*
Desiccatur enim & exsiccatur or-
dine tertio.

VIRE.

Potum cum melle pituitam *Diosc.*
bilemque atram per inferna de-
trahit. Priuatim prodest me-
lancholicis, & inflatis aceta-
buli mensura, ad quatuor

drachmas cum melle, sale, & aceti exiguo. Valentius cæteris alijs medicamen-
tis atram bilem expellit, citra ullam molestiam. Efficax est ad cerebri morbos,
nempe melancholiam, Epilepsiam, diuturnos capitis dolores, aliasque atrabilia-
rias ægrotudines. Cõfert cordis tremoribus, & animi deliquijs, opitulatur eam
ob causam omnibus lienis affectibus. Item renum vitijs, & hypocondriaca me-
lancholia vexatis optimè confert Epithymi vsus. Datur quoque, vtilissimè aduer-
sus carcinomata, Elephantiasim, & vlcera maligna, & atra, & quartana febre af-
fectos liberat.

Q99 4

CVSCV-

CVSCVTA, Italis, *Cuscuta*. Germanis, *Flachseiden*. Gallis, *Couche in'icy*.

CVSCVTA.

FORMA.

Matth.

Eius est natura, ut in frutices, & herbas Epithymi modo, prosiliat, & viuat, earum admiculo fulta, nulla radice nixa, sed velut ab alarum sinu prodeuntibus cirris capillamentisve longissimis. Hæc statim ab exortu plantis sese implicat, & adeo crebris inuolucris his se circumuoluit, ut breui plantas ipsas strangulet, atque enecet. Folijs nullis vestitur, flores tamen edit albos complurimos, quibusdam in capitulis, à quibus semen tenuè prodit, sed superuacuum. cirri rufescunt, vitium capreolis. crassitudine, & facie pares.



LOCVS.

Idem.

Nascitur ferè vbique, atque in sæpibus, aut propè eas frequens visitur varijs, ac diuersis plantis connexa.

QUALITATES, ET VIRE.

Idem.

Excalfacit ordine primo, siccatur, secundo, abstergit, & quadam cum adstrictione roborat. Iecoris obstructions aperit. Infarcti lienis vitia expedit, venas pituitosis, atq; biliosis exonerat excrementis, urinas pellit, & regium morbum sanat. Puerorum febribus auxiliatur, sed diuturno vsu ventriculum grauat, quæ tamen noxa tollitur admisto Anisi semine.

CENSURA.


Non rectè sentiunt qui Plinij Cassytam in Syria nascentem nostratam Cuscutam faciunt.

ALYPVM,

ALYDVM, Græcis, ἄλυτον. Italis, *Alipo*.

ALYDVM.

FORMA.



Surculosa herba est, subru- **DIOSC.**
bra, gracilibus ramulis, tenui-
bus folijs, flore molli, leui, &
copioso, radice beta, tenui a-
cri succo referta, semine Epi-
thymi.

LOCVS.

Gignitur in maritimis ma- **Idem.**
ximè Libiæ quàm largissima,
quanquam alibi quoque plu- **Matth.**
rima prouenit.

QUALITATES,
ET VIRES.

Semē atram bilem deijcit, **Idem.**
si mēsurā Epithymo pari cum
sale, & aceto sumatur. Verūm
interanea leuiter exulcerat.

Q99. 5

VITIS

VITIS sylvestris, vulgo Dulcamara. Græcis, ἀμπελὶς ἀγρία. Italis, Vite saluatica.
Germanis, Ze lenger je lieber.

F O R M A.

DIOSC. Sarmenta mittit prælonga
vitis viniferæ modo, aspera,
lignosa, folijs hortensis Solani
longioribus, ac latioribus,
racemoso flore, & capillaceo,
fructu exiguis vuis simili, post
maturitatem rubente, rotunda
acinorum facie.

L O C V S.

Matth. Nascitur in dumeris, sepibus,
syluis, & montibus.

Q U A L I T A T E S.

Gal. li. 6. Racemi abstergendi vim habent,
sed & adstrictionem quandam extrema germina tenent.

V I R E S.

DIOSC. Feruēfacta radix in aqua, & in ciathis duobus vini aqua marina diluti pota, humorē alui ciet. Ideo hydropicis datur. Vux eius vitia cutis in facie, & maculas omnes expurgant. Enascentes viticulae cibi gratia sale condiuntur.

VITIS SYLVESTRIS.



VITIS

VITIS alba, siue Bryonia. Græcis, ἀμπέλκις. Mauritan. Fesne, Alfesire, Fesse-
ra, seu Alfescera. Italis, Bryonia, seu zucca saluatica. Germa. Stickenwurz, seu Zenn-
felsenwurz. Hispanis, Nuxa, siue Anorca. Gallis, Colubrine, seu Couluree.

VITIS ALBA.



F O R M A.

Folijs viticulis, pampinisq; DIOSC.
satiuam vitē imitatur, sed hir-
sutiora sunt omnia. Ea quos
prope nata frutices, suis cla-
uiculis complectitur. Fructus
rubens in vna dependet, quo
coria pilis spoliatur. In Ger-
mania, & Vngaria fructū ferr
nigrum. *Matth.*

L O C V S.

Prouenit passim secus vias, *Idem.*
& propter sepes.

Q U A L I T A T E S.

Prima germina adstringūt
modicē cū quadā acrimonia,
& subamarore. Radix abster-
gentem, desiccantem, & re-
nuium partium, ac moderatē
calidam vim obtinet, corym-
bi depilatorij sunt.

V I R E S.

Folia, fructus, & radix vlce-
rum phagædenis, cancrenis,
chironijs, putrentium tibiariū
tadio efficaciter cum sale illi-
nuntur. Radix corpus abster-
git, & cutē erugat, vitia cutis

in facie varosque, lentigines, & cicatrices nigras emendat: cum Eruo, Creta
Chia, & fœnogræco, suggillata tollit, & reduuias cōmittit, suppurationes rum-
pit. Infracta ossa extrahit trita, & impolita. Datur comitialib. in potu drachmæ
pondere quotidie anno toto. Prodest attonitis, vertiginosisque eodem modo
sumpta. Auxiliatur contra viperarum ictus pota duarum drachmarum ponde-
re: subposita partus, & secundas trahit, & pota ciet vrinam. Lienem confumit,
ternis obolis triginta diebus ex aceto bibita. Illinitur ad eadē cum fico, ad mu-
liebres quoque infessus decoquitur, siquidem vuluas purgat, sed abortum fa-
cit. Succus cum aqua mulsæ potus pituitam extrahit. Ad pforas & lepras, semen
efficaciter illinitur. Idem vrinam trahit & cerebrum mundat, viscerum ob-
structiones aperit, renes à calculis expedit.

VITIS

VITIS nigra, Græcis, ἀμπέλαιος μέλαινα. Arabibus, Fesire sentanin Als fese fese, siue Faserfim. Gallis, Vite nera, seu Tamaro.

VITIS NIGRA.

F O R M A.

Matth. Folia fert hædæ, sed maiora, similaceis, pxiima, caules etiam cognatos, capreolis suis arbores, quasi adminicula cōprehēdit. Fructus racematim coherēnt, qui inter principia virent, & post maturitatem rufescunt, & quandoq; nigrescunt. Radix foris nigra, intus buxæo colore nitet.

L O C V S.

Idem. Nascitur in dumetis, in sepibus, & in syluis.

Q U A L I T A T E S.

Gal. li. 6. Viti albe ad omnia similis,
simp. me. nisi quodd imbecillior.

V I R E S.

DIOSC. Viticulæ quæ primo germi-
nati erumpunt in olera reci-
piuntur, menses pellunt, vri-
nam cient, lienem absunt, vertiginosis, comitialibus, & resolutis profunt.
Radix eadem quæ vitis alba præstat, sed inefficacius. Folia cum vino exulceratis
iumentorum ceruicibus commodissimè illinuntur. Quin etiam luxatis articu-
Matth. lis. Nihil eius radice succo valentius fuerit ad strumas sanandas, si cum vini ac
mellis æquali portione is hauriatur. Præstat ad idem quoque eadem radix, si tu-
ta, & melle excepta illinatur.

M O M O R.



MOMORDICA, seu Viticella. Italis, Balsamina, Viticella, Momordica, seu Pomo di Gierusalem. Germanis, Balsamtraut Männlin. Gallis, Marueilles.

BALSAMINA, SIVE MOMORDICA.



F O R M A.

Planta est, quæ prælogis, tenuibusq; viticulis vitro, citroque reptantib. proximas plantas cõprehendit, folijs vitis albae, aut viniferae similibus, sed longè minoribus, magisq; per ambitum diuisis, capreolis tenuibus ex alarum sinu prodeuntibus, quibus sese appositis implicat adminiculis. Florem promit cucumeri similem, paruum, subluteum. Fructu vtrinque turbinatum, gallinacei ferè oui magnitudine, cute carnosa, acutis tuberculis scatente. Huic maturo puniceus color, qui præterea facillè diffilit vltimam maturitatè adeptus. Semen includit Anguriæ vocatæ simile, minus tamen, contractum cute crassa pingui, lubrica, & perquam rubente.

L O C V S.

Nusquam nisi sata in Italia Idem. provenit, vbi in hortis, & fictilibus colitur.

Q U A L I T A T E S,
E T V I R E S.

Folia vulnera recentia glutinant. Fructu in oleo immaturo infolato, paratur Idem. oleum præstantissimum ad arcendas vulnerum mamillarumque inflammationes, & dolores mulcendos. Valer idem Siphone infusum ad exulceratos, inflammatosque vteros. Doloribus hæmorrhoidum quoque mirificè auxiliatur, in quem usum Fructus oleo Amygdalino dulci, aut de semine lini macerantur. Idem medetur ambustis tam igne, quàm aqua: punctis, sauciatisque neruis vtiliter illinitur: quin etiam vulnerum cicatrices delet, & vesparum ictus sanat. Foliorum pulvis cochlearis mensura exequisetti decocto potum, intestinorum vulneribus medetur.

B A L S A M I -

BALSAMINA altera. Italis, *Balsamina maggiore, siue semina*. Germanis, *Balsamin*
fraut Weibte.

F O R M A.

Matb. Caulis illi est crassus sesqui-
 cubitalis, pinguis, & succo
 prægnaus, ramis multis abun-
 dè vegetibus. Folia profert Sa-
 licis modo longa per ambitū
 serrata, flores prægades pur-
 pureos retro inflexe caudica-
 tos. E quibus poma suboriun-
 tur, alterius Balsaminæ haud
 admodum dissimilia, turbi-
 nata, hirsuta, viridi primū co-
 lore, & per maturitatem lu-
 tescente: internum semē len-
 ticulæ faciem exprimit. Ra-
 dice nititur numerosa, crassa,
 robusta que.

L O C V S.

Idem. Seritur in hortis, & horti-
 bus.

Q U A L I T A T E S,
E T V I R E S.

Idem. Putat quidam (id quod et-
 iam scribunt) & hanc idem
 esse cum altera viribus. Verum nos nullam eius experientiam habemus.

BALSAMINA ALTERA.



F L I X.

NOMINA.

991

FILIX, Græcis, Πτέλις. Arabibus, Sarax, seu Sarachis. Italis, Felce. Germ. Wald-
farn. Hispanis, Helechoyerua. Gallis, Osmunda Regale, seu Fongiere masse.

FILIX.

GENERA.

Duo eius habetur genera, Diosc.
Mas & Fœmina.

FORMA MARIS.

Filici folia, sine caule, sine *Idem.*
fructu, sine flore ex vno pedi-
culo cubitali longitudine ex-
eunt, multifida, è laterib. pri-
uata, & expansa velut ala, sub-
gravi odore. Radice per sum-
ma cespitum nigra, oblonga,
filices multos fundente, sub-
stringenti gustu.

LOCVS.

Nascitur in montibus, & *Idem.*
faxis. Quin etiam alibi vñ *Matth.*
brofis locis.

QUALITATES.

Mas radicem habet maxi- *Gal. li. 8.*
mè vtilem: latum enim humi- *simp. me.*
bricum interficit. Est enim a-

mara, paulum habens adstrictionis, valentem desiccandi facultatem obtinet,
nec tamen mordax est.

VIRE S.

Radix ex aqua mullâ pota quatuor drachmarum pondere latas vètris tinea D I O S C.
excurrit. Laborantes hienus in eodem recreat. Radix cum pota, tum cum axun-
gia illita, vulnibus sagitta arundinea factis, medetur. Est enim inter eam, & *Matth.*
arundinem non parua similitudo.

FILIX



FILIX fœmina, Græcis, *Θηλυπέγης*. Italis, *Felce femina*.

FILIX FOEMINA.

FORMA.

Diosc. Filix fœmina folijs est alterius filicis, surculosis, altioribusq; & quæ non singulati, ut illa pediculo fulciantur. Radicibus longis, pluribus, obliquis, quæ ex nigro in luteum flavescent, aliæ etiamnum rubræ inveniuntur.

LOCVS.

Math. Nascitur in syluis, & in montibus, & ferè ubique, maximè frigido solo.

QUALITATES,
ET VIRE.

Diosc. Radices pellunt cum melle sumptæ lata interaneorum animalia: cum vino aut drachmis tribus teretes tineas eijciunt. Datæ fœminis sterilitatem faciunt, & prægnantibus abortum, si supergrediantur. Farina humidis vlceribus, & cicatrici repugnantibus inspargitur. Iumetorum ceruicibus medetur. Foliarecentia in oleribus cocta manduntur ut ventrem emolliant.

FILICV-



NOMINA.

993

FILICVLA, Græcis, Πολυπόδιον. Mauritanis, Bisberg Aibeig. siue Bessaigi. Italis, Polipodio. Germanis, Engelsfuss; Baumsfarn/ siue Droppsfarn. Hispanis, Filipo- dio, & Polipopo. Gallis, Polypode.

FILICVLA, SEV POLYPODIUM.

FORMA.

Palmari altitudine assur- git, filici similis, subhirsutis, & robustioribus folijs, aduer- sa parte fulvescentibus, ma- culis resperfis. caulē, florem, fructumq; nullum profert. radicibus nititur per summa cespitum vagantibus, poly- porum piscium cirris simili- bus, vnde illi nomen, fibris, pilisq; propē innumeris re- fertis, colore exterius subful- uescente, interius verò viri- di, sapore dulci, & austero si- mul.

LOCVS.

Nascitur in muscosis pe- tris, & vetustis arborum cau- dicibus, præsertim Quercu- um.

QUALITATES.

Dulcem simul, & austeram habet vincentem qualita- tem, vt facultatis sit admo-

VIRE S.

Purgandi vim habet, coquitur cum gallina, aut piscibus, aut beta, aut malua, ad aluum soluendam. Aridæ farina aquæ mulæ insperfa detrahit bilem, & pi- tuitam. Trita luxatis efficaciter illinitur, & aduersus rimas quæ inter digitos sunt. Bilem præsertim atram extrahit.

Rrr

DRY-
us.



Foliare-

ILICV-

DRYOPTERIS, Græcis, *Δρυόπτερις*. Italis, *Felce Quercina*. Germanis, *Baumfarne*. Gallis, *Fuchiere des chesnes*.

DRYOPTERIS.

FORMA.

Diosc. Filici similis, sed multo minori foliorum incisura. Radicibus inuicem implexis, hirsutis, gustu acerbis in dulcedinem vergentibus.

LOCVS.

Idem. Nasctur in veterum Quercuum musco.

QUALITATES.

Gal. 6. *simp. me.* Gustu mistam facultatem præfert, dulcem, acrem, amarum, in radice vero item acerbam, facultatem habet septimam.

VIRES.

Diosc. Psilothrum est cum radicibus trita. Illinitur enim postquam corpus exudauerit, mox sudor abluatur, & recens imponitur.



CNICVS.

CNICVS, Græcis, *Κνίδος*. Mauritanis, *Kartan*, seu *Charthm*. Italis, *Zoffarano Sa-*
racinesco. Officinis, *Cartanum*. Germanis, *Wilder Safran*. Hispanis, *Ala-*
cor, & *semente de Pappagatos*. Gallis, *Saffran bastard*, & *Saffran sauvage*.

CNICVS.

FORMA.



Singularem emittit caulem *Matth.*
 sesquipedalem, & quandoq;
 maiorem, teretem, rectū, sub
 albicante, striatumq; firmū,
 atq; lignosum, ramis à medio
 caule copiosis dodrantalibus.
 Folia oblōga, crassiuscula, ro-
 busta, glabra, in mucronē de-
 sinentia, infirmis aculeis cir-
 cumuallata, & sine pediculis ē
 ramis pdeuntia. spectantur in
 ramorū summitatibus acana-
 cea capitula in latū turbinem
 fastigiata, oblōgis ac spinosis
 squamis radiantib⁹ circūqua-
 que, ima parte foliolis, aculeis
 pariter rigentibus, & syderis
 faciem referentib⁹. Flores me-
 dijs ē capitibus erumpunt, ca-
 pillacci, ac graciles, vt in cæte-
 ris acanaceis, aureo colore,
 ad rubrum inclināte, crocinis
 staminibus æmuli. Semē inest
 album, angulosum, lēquī puta-
 mine ac duro, alba intus me-
 dulla. Radice nititur oblōga,
 fibrata, sed superuacua.

LOCVS.

Seritur in hortis & campis. *Idem.*

QUALITATES.

Semine duntaxat ad purgationes vtimur, tertij est ordinis exalfacientium, *Galen. 7.*
 si quis foris eo vti volet. *simp. me.*

VIRES.

Seminis rufi & delibrati medulla ex aqua mulsā aut iure gallinacei aluū pur- *Diosc.*
 gat pota. seminis succus lac cogit, & magis ipsum resoluendæ alui facultate do-
 nat. Idē pituitam, & aquas extrahit, quo fit vt coli dolore affectis, & hydropicis
 opē mirificè præstet nō modo haustum, sed etiā clysmate infusum. Seminis me-
 dulla, à putaminibus repurgata, & saccharo elegantis modo excepta pectus,
 & pulmones abstergit, vocem clarificat, & prolificum semen auget.

Rrr 2

MERCY-

MERCVRIALIS, Græcis, *Λινοζάσις*. Italis, *Mercorella*. Germanis, *Bingelkraut*. Hispanis *Mercuriale*, & *virtuosa morta*. Gallis, *Mercuriale*.

MERCVRIALIS.

G E N E R A.

Diosc. Duum est generum, Mas alterum. Alterum fœmina.

F O R M A M A R I S.

Idem. Frutex est dodrantalis, aut maior, folijs Ocimi, helxinæ cognatis, sed minoribus, ramis duplici geniculorum modo cinctis, alarum cauis multis; fructu è foliorum sinu dependente, paruo, rotundo, ceu binis testiculis vnâ cohærentibus.

L O C V S.

Matth. Nasceitur in hortis, vineis, vrbium plateis, & inter rudera.

Q U A L I T A T E S.

Gale. 7. Mercuriali vtuntur omnes ad ventris purgationes duntaxat. verum enim vero, si quis eius facere periculum volet in cataplasmate, sanè eam digerentis admodum facultatis esse experietur.

V I R E S.

Diosc. In oleribus manditur ad aluum ciendam, cocta in aqua epoto iure bilem, aquamq; detrahit. Constat, vt mares gignantur, hunc facere, vt fœminæ illam si à purgatione bibantur, & trita folia genitalibus admoueantur. Obseruatum quoque est tolli verrucas omne genus illitis vtriusque folijs, aut eorum succo. Malis item quæ serpunt succus cum aceto medetur. Fœmineis locis supposita menses citat.

MERCY-



NOMINA.

997

MERCVRIALIS fœmina, Græcis, *Διούροσφις θήλυς*. Italis, *Mercorella femina*. Germanis, *Vingeltraut Weibte*. Gallis, *Mercuriale femelle*.

MERCVRIALIS FOEMINA.



FORMA.

Caule, ramis, folijs per o. *Matth.*
omnia alteri similibus pro-
uenit. verum fructu dif-
fert, quod in hac racemo-
sum spectetur & semine co-
piofo.

LOCVS.

Nascitur simul cum ma- *Idem.*
re ijsdem locis.

QUALITATES, ET
VIRE.

Ad simili Mari facultate *Idem.*
præstat, nisi quod hæc à
purgatione bibita fœmi-
nas gignat, illa mares.

RER 3

CYNO-

CYNOCRAMBE, siue Caninabrafica. Græcis, *Kivoxgá:βn*. Italis, *Mercorella bafarda*. Germanis, *Wild Dingelkraut*. Gallis, *Mercuriale fauuage*.

CYNOCRAMBE MAS.

FORMA.

Diosc. Cauliculum binū dodrantum altitudine emittit, mollem subalbidum, folia mercuriali, aut hederæ similia, certis interstitijs, subalbida, fermen folijs adhæret paruum rotundum.

LOCVS.

Nascitur omnibus ferè locis in vineis, campis, & propter vrbiū mœnia. * frequētissima vero in syluis prouenit.*

QUALITATES,
ET VIRES.

Diosc. Folia cum caulibus pota aluum cient, oleribus commendantur. Ius decocti & pituitam, & bilē, & aquas detrahunt.



* CYNOC-

NOMINA.

999

*CYNOCRAMBE FOEMINA.

FORMA.



Tenerior est & mollior quam mas, quum prodiveris initio flosculos racemosos ut Mercurialis vulgaris foemina proferens. Temporis progressu decidentibus flosculis evadit multo durior, & foliorum longitudine tantum à mare discernitur.

LOCVS.

Locis montosis & sylvis innascitur.*

RIT 4

HELIO-

HELIOTROPIVM maius, Græcis, *ἡλιότροπον μέγα*. Officinis, *Verrucaria*. Italis, *Eliotropio maggiore*.

HELIOTROPIVM MAIVS.

GENERA.

Diosc. Heliotropium duū est generum, Maius, & Minus.

FORMA MAIORIS.

idem. Folia habet Ocimi, hirsutiora, candidiora, & maiora, ramuli à radice terni, quaterni, aut sæpe quini exiliunt, multis alis concaui. Flos in cacumine candidus aut subfulvus, incuruatus, ut scorpionis cauda. Radix tenuis est, & inutilis.

LOCVS.

Diosc. Nascitur in asperis. *Quint.* etiam in ædificiorum plateis, in hortis, & agris incultis, & sabulosis.

QUALITATES, ET VIRES.

Diosc. Herba ex aqua decoctum fasciculo manus plenæ, potu pituitam, bilemque, per aluum extrahit. Prodest in vino potum, quin etiam ad motum, ad scorpionum ictus. Ad alligatur ad conceptus arcendos. Aiunt per horam vnā ante accessiones seminis grana quatuor cum vino pota quartanas finire, tria verò tertianas. Illitum semen formicantes verrucas, penilesque, & thymos exiccat. Folia podagricis, luxatisque vulissimè illinuntur. Menses cient, partus trita, & imposita pellunt. *Matth.* Epotum horum decoctum vnā cum cumino renum calculos pellit, ac frangit, & intestinorum animalia necat. Formicæ quoque necantur earum foraminibus Heliotropio obturatis. Foliorum succus carcinomatis, ac contumacibus ulceribus mirificè auxiliatur. illitus.

HELIO-



N O M I N A.

1007

HELIO TROP I V M minus, Græcis, Ηλιοτρόπιον μικρόν. Italis, *Heliotropio minore.*

HELIO TROP I V M MINVS.



FORMA.

Heliotropium paruum fo- DIOSC.
lijs est antedicto proximis, ro-
tundioribus, semine acrochor-
donum, verrucarumq, modo
pensili, rotundo.

LOCVS.

Nascitur in palustribus, & Idem.
iuxta lacus.

QUALITATES,
ET VIRES.

Herba cum suo semine po- DIOSC.
ta adiecto nitro, hyslopo, na-
sturtio, & aqua laticineas, re-
retesque excutit. Pensiles ver-
rucas, quæ acrochordones vo-
cantur, cum sale illita tollit.

* Huius herbæ baccis vtun-
tur infectores lanarum in Gal-
lia Narbonensi, vocantque *la-
Morella.**

RIT §

SCORPIO-

SCORPIOIDES, Græcis, Σκορπιοειδής. Italis, Scorpioide.

SCORPIOIDES.

FORMA.

Matth. Herbula est folijs paucis,
femine caudæ scorpionis ef-
figie.

LOCVS.

In hortis tantum hâc plan-
tam satam vidimus.

QUALITATES.

Idem. Excalfacit ordine tertio,
desiccat verò secundo.

VIREs.

Gal. li. 8. Illita scorpionum ictibus,
simp. me. præsentaneo est auxilio.



VITIS

NOMINA.

1007

VITIS vinifera. Græcis, *Ἀμπέλαιος*. Italis, *Vite vinifera*. Arabibus, *Harin Karin*, seu *Karm*. Germanis, *Weinreb*. Gallis, *Vigne*.

VITIS VINIFERA.

FORMA.

Vitium omnium genera, ac formas adeò tam elaris, quàm obscuris viris, tam nobilibus, quàm ignobilibus, tam deniq; urbanis, quàm rusticis innotuerunt, ut nemo sanè sit, qui nò de vitium generibus, earundemq; historiam scire, ac distinguere loqui possit.

QUALITATES.

Folia refrigerant, & adstringūt. DIOSC. Idem præstant & capreoli.


VIRES.

Folia & tritici capreoli capitis dolores illitu mitigant, & inflammationes stomachi, ardoresque cum hordeacea farina. Potus eorū succus dysentericis, sanguinem excrementibus, stomachicis, & gravidarum malacijs medentur. Eadem efficiūt madefacti in aqua capreoli, & poti. Lachryma quæ veluti gummi in caudicibus concrevit, ex vino pota calculos pellit, illita lichenas, & psoras, leprasque nitro prius perfrectas sanat. Eadem cum oleo pilis sepius illitis psilothri effectum habet, maximeque sanies quæ ex accensis sarmentis exsudat, qua perunctæ verrucarum infectiones extrahuntur. Vinaceorum & sarmentorum cinis ex aceto illitus detractis in sede contumacis & thymis medetur. Prodest luxatis, & viperarum moribus, & contra lienis inflammationem illinitur, cum rosaceo, ruta, & aceto. Acerbæ vix succus admiscetur vtiliter celiacorum & dysentericorum cibis, quinetiam medicamentis quæ ad sanguinis reiectiones parantur. Id quod etiam præstant acinorum nuclei in faianam triti, & ventri, stomachoque illiti. Vix pensilis matura, manibus confracta, & illita, recentibus ambustionibus mirifice auxiliatur, statim enim dolorem mulcet. Vix probe maturæ inter fructus autumnales principatū in cibis obtinent. Itaque fugacibus omnibus magis nutriunt, minimumq; pravi succi habent. Pensiles si prius maturæ sunt, & dulces, cæteris minus ventriculum inflant, & alium conuenienter emolliunt.

Matth.

Gal. 2. de alim. fac.

Quartus & ultimus libri, Finis.



1005
ITER BALDI CIVITATIS VERONAE
MONTIS, IN QVO MIRABILI
ORDINE DESCRIBITVR MONTIS
ipfius, atque aliarum quarundam
ipfum contingentium par-
tium fitus.

RECENSENTVR PRAETER-
*ea quaedam insignes plantae, ac herbae ibi na-
scentes, quae vsui Medico plus ca-
teris conferunt.*

Recens in lucem editum

*Ab honestissimo viro FRANCISCO CALCEGLARIO Vero-
nensi Pharmacopola, in Campana aurea officina.*



Francofurti ad Moenum.
M. D. LXXXVI.

CLARISSIMO DOMINO
PETRO ANDR. MATTHIOLO SE-
NENSI, SERENISSIMI PRINCIPIS FER-
dinandi Archiducis Austriae, &c. Consiliario,
atque Medico primario,

Franc. Calceolarius Pharmacopola Veronensis, S. P. D.



PVSCVLVM meum, quod antea Italico sermone edideram, tibi Latinum factum (vt petis) mitto, cum tuo de plantis compendio in lucem edendum: siquidem communi hac lingua nunc conscriptum, omnibus in Europa nationibus tuo auspicio facile innotescet, cum tua mirifica monumenta per vniuersum ferè orbem circumferantur. Etenim non in Italia solum, sed apud ceteras nationes, tanta tu autoritatis extas, tamq̃ latè tua fama, nomenq̃ diffunditur, vt nedum libri de materia medica, sed & cuiusvis generis descripti, merito tibi dicari, & nuncupari possint, quòd à tuo tantum clarissimo nomine facile protegantur. Accessit etiam, vt hoc tuae auctoritati voluerim commendatum, illa iam diu animo inherens meo tua in me beneuolentiae opinio, tot experimētis tuorum in me officiorum comprobata: qua quidem me inducit ad credendum, opusculum hoc meum non solum tibi carum futurum, sed tuo patrocinio apud omnes studiosos, & bonos viros non modicam gratiam initurum. Commodum sinè (vt scribis) huic libello in tuo de plantis Compendio futurum esse locum non diffido: nam ad medicam materiam re ipsa cognoscendam, non parum asseret commoditatis, atque etiam quasi comitem prestabit, quo plantarum studiosi in montem illum stirpium ferè secundissimum ducantur, illasq̃ certis locis reperiant. Siquidem ab vrbe in montem cunctas ipsius itineris partes explicat, & quo comœatu in eo perficiendo sit opus. Locaq̃ omnia speciatim ostendit, in quibus diuersarum plantarum genera virescunt, ac florent, hac tamen serie, vt copiosiores tantum eorundem locorum stirpes connumerentur, ne cum plura genera eodem in loco oriantur, studiosorum ingenia confundant. Quod verò copiosius reperitur, id locum sibi vendicabit, eiq̃ nomen tribuet, & nostram considerationem ad se conuertet. Præterea cum plura loca iisdem plantis abundant, is modus descriptioni adhibebitur, vt eo adnotato, qui prius in itinere obuius fuerit, cetera deinceps prætereantur: nisi sint aliqua præstantiorum fortasse generum, de quibus ob earum dignitatem, meminisse oporteat, in quocunque habeantur loco; alioqui quantum possumus breuitati studēbimus. Vtinam verò de ceteris montibus, atque locis, qui plantis raris, & mirificis abundant, similes extarent historiae, quæ non solum indagatores ad loca illa perlustranda animarent, sed iter ostenderent, ac materiam medicam tot difficultatibus plenam suā pristina claritati, se duce, restituerent. Namque tuis doctissimis commentarijs theoriam continentibus, instructi homines discendi cupidi, ad alteram partem in scientijs omnibus necessariam, nempe experientiam ipsam, facilius sese addicerent: cuius in plantarum notitia primas partes esse tu bene nosti: qui illam tam diligenter adhibueris: Optarem sane ceterarum eiusmodi regionum, posse me tibi historiæ conscribere tuo ipsius compendio alioqui numeris omnibus absoluto adnectendas. At verò id à me scio non requires, quod præstari ab vno homine non

ne non

ne non possit: quare velim, ut animi mei propensam erga te voluntatem (ut tua est humanitas) gratam suscipias: cupio enim pro virili modo omnibus, tibi semper gratificari. Ceterum Baldus mons non modico simplicium medicamentorum numero refertissimus est: in quibus ego conquirendis, examinandisq, non mediocres impendi sumptus, atque labores, doctissimis semper ac peritissimis viris adiunctus. Inter quos fuere Iulius Moderatus, Antonius Tolomeus, Aloisius Anguillarius, Vlysses Aldrouandus, & alij complures in Academijs Italicis studiosi. Præteream præclarissimos illos senes Hieronymum Fracastorium, & Lucam Ghinum, qui (quicquid in hac scientia profecerim) mihi autores, ducesq, extitere. Taceo Excellentissim. Montesaurum, Iulianum Fumanellum, & alios præstantissimos huiusce civitatis medicos, qui tantum laboris per inuita, aspera, ipsius montis loca, quandoque mecum subire non sunt grauari, ut varios ac mirificos naturæ effectus in plantis contemplarentur. Quibus non minus grata fuit mea herbarum observatio, quam mihi illorum de plantis doctrina iucunda, adeo ut iam possim multa de rei plantaria controuersijs in medium proferre, atque ex sententia determinare, quæ breuitati studens & vitanda arrogantia causa prætermittam: quamuis (proh dolor) hoc tempore à quocunque vix in re plantaria tyrunculo hoc iam usurpetur, ut vel peritissimis contradicere audeat ignarus quisque. Huius autem Libelli forma tanquam cuiusdam catalogi eorum omnium plantarum erit, quæ in celeberrimo hoc monte reperiuntur: suis locis particulatim descriptarum, ut cuilibet aditus, & lustratio locorum omnium, atque herbarum inuentio facile pateant. Erit igitur in tuo hoc scriptum compendio satis congruens, quoniam illi plantas communiter exponenti ac figuris veras imagines ostendenti, loca inueniendarum illarum describens, tanquam famulus erit atque minister. Quinetiam commodissimè in tam præclaro herbarum omnium volumine, faciliè hoc exiguum meum poterit illustrari, atque à calumnijs omnibus quæ aliquam posse videntur caliginem obducere, tueri: ut non minus hac loci mihi facta liberalitas, concessio, atque tutela cara sit futura, quam hac mea voluntas tibi in hoc ministerio tuis scriptis suggerendo grata. Bene vale.

Verone Idibus Februarij. M. D. LXXI.

PETRVS

PETRVS ANDR. MATTHIOLVS
SENENSIS MEDICVS,

Franc. Calceolario Pharmacopæo Veronensi. S. P. D.



QUOD iam diu desiderasti compendium à nobis conscriptum de Plantis omnibus, de quibus diffusè satis in commentarijs nostris in Dioscoridem meminimus, in eorum studiosum usum, qui indagandis, noscendisq; legitimis simplicibus nauant operam, iam pridem absolui, ac propediem typis excudendum mittam. Quamobrem tuum opusculum quod de itinere è Verona in Baldum montem omnium ferè fama per celebrem, & plantarum refertissimum ad me misisti, illi statim adnectendum curabo. Scio enim me hoc tuo libello apud multos bonos viros beneuolentiam longè maiorem initurum, si etiam præter descriptas plantas, locum ostendam ubi eæ copiosissime ac non vulgares inueniantur. Cæterum id magis eos, & tibi, & mihi beneuolos reddet, quod in ipso tuo opusculo nō solum itinerandi normam tradideris, sed vniuersas quoq; plantas descriperis, quæ vnicuiq; montis ipsius loco ab imo ad summum gradatim enascuntur. Erit enim hoc omnibus adeo gratum, ut ubi senserint te ab inuidis morderi, existimationem tuam, probitatem, sinceritatem, atq; doctrinam modis omnibus tuebuntur, ita ut tibi honori, et studiosis vtilitati libellus iste tuus sit futurus. præsertim cum me ipsum habeas promotorem, ac defensorem. Scio enim abs te non solum me amari plurimum, sed præ cæteris etiam obseruari. Ego verò ut de mea in te propensione, ob tuarum, nempe sinceritatis, fidei, solertie, peritæ, diligentieq; meritum aliquid dicam in obrectatorum tuorum censuram: admiror sanè quàm maximè valeas in componendis absq; omni fraude medicamentis, & ijs præsertim, quæ à clarissimis olim medicis magnis Imperatoribus parabantur, ut latius & diffusius in commentarijs nostris in Dioscoridem, de tua admirabili Theriaca libro sexto præfati sumus. Scio tamen meis laudibus ibidem conscriptis, & tibi, & mihi inuidos complures comparatos, qui aliorum virtutibus insidiantur. At cum inuidia virtuti perpetuò sese opponat, & tandem inuidos ipsos quodam veluti inarismo conficiat, eorum maledicentiam minime curare debemus. Scio ego non deesse pharmacopæos, non in Italia solum, sed in alijs quoq; exteris regionibus, qui legitimorum simplicium peritiam habent, & in componendis, parandisq; medicamentis exercitatiissimi sunt, adeo ut possint rectè & Theriacam, et cætera generosa antidota parare: de quorum laudibus possem quoq; multa scribere si mihi cum ijs perinde ac tecum intercederet consuetudo, & medicamentorum, quæ ab ijs parantur, certam aliquam haberem notitiam.

riptum
menta-
studio-
simpli-
pedicm
sculum
um fe-
tim ad-
rs bene-
locum
magis
itine-
ne uni-
sim hoc
tionem
tur, ita
cum
mea-
te pro-
me-
quàm
præfer-
ut la-
mirabili
conscri-
tutibus
inuides
de cura-
lin alijs
t, & in
sint re-
bus pos-
consue-
rem no-
ritiam.

ritiam. Sed cum id haud mihi fateri liceat, alijs eorum laudes describendus re-
linquo, & te præ cæteris laudandum, promouendumq; mihi proponam: seruata
tamen cæterorum fama, fide, peritia, ac sedulitate. Cæterum si quis (quisquis
ille fuerit) de mea fide dubitauerit, tutus ad te accedat, tecum loquatur, tuæque
omnia videat & examinet, non tamen malignis, ac distortis oculis, sed claris
& apertis. Hoc si fecerit, cognoscat quidem apertissime, non immerito à Mat-
thiolo laudari Calceolarium, & eius antidota præ cæteris commendari. In-
trent penetrentq; qui selectissima omne genus medicamenta noscere, ac mani-
bus tractare cupiunt in tuum Museum; in quo prætiosa, ac rara recondis.
Apertum enim illud inuenient (quæ tua est cum omnibus liberalitas) & te ad
omnia videnda ostensores habebunt. Quid dicet cum viderint, quæ ego vidi,
Et probauit apud te tantum? Mirabunturne? profecto mirabuntur, & præ stu-
pore obmutescunt. cum inspexerint Costum, Amomum, Aspalatum, Calamum
odoratum, Folium, & quod magis mirum est, etiam Opobalsamum. Videbunt
præterea fossilium complurium varia genera, ipsiq; admodum rara, & permul-
ta quoque naturæ miracula, nempe plantas animaliaq; in lapides multiplices
versa, & alia non minus monstrosa, à te adeo diligenter asseruata, & in ordi-
nem digesta, ut omnes, qui tam rara tamq; præciosa monumenta inspexere, sum-
mopere stupeant. Taceo rara admodum animalia, quæ inibi summo artificio
arsæfacta spectantur. Taceo peregrinas, & nouas plantas, fructus, radices semi-
na, quæ ex remotissimis terrarum locis delata sunt, ne maiorem tibi inuidiam
pariam. Quæ omnia magno sumptu, & labore tibi comparasti non tam lucri
faciendi causa, quàm iuuanda Reipublice, & famæ consequendæ desiderio.
Prætereo quoque, quæ in tuo Myropolio mirifica asseruas antidota. Theriacam,
inquam, iam omnibus celebrem, Mithridaticam antidotum illam regiam,
atque antidotum etiam illam nostram, & nostrum de Scorpionibus oleum,
quæ tibi & mihi tam diligenter, fideliterque parasti, ut nihil addi posset. Præ-
clarus es pharmacopæus, præclarus, & accuratissimus simplicium indagator, ac
censor, cur ergo curas vitiligatorum insidias? Velim omnino ne cures, cum
tibi nihil officere queant. Non desunt tibi (mihi crede) medicæ materiæ peri-
ti, qui sua tantum autoritate te ipsum, & tua omnia tuebuntur. Scio ego
non deesse eruditissimos medicos, quibus ex commentariorum nostrorum le-
ctione ingens tua probitas, ac in parandis Antidotis peritia innotuit. qui con-
fectis difficillimis, ac longis itineribus ad te profecti sunt, non modo ut te de fa-
cie cognoscerent, sed ut à te veluti ab Andromacho, & Galeno, Theriacam, &
alia complura generosa antidota consequi possent. Inter quos licebit mihi nunc
hic commemorare Ioan. Baptistam Nocetum Pötremolensem & Ioan. Baptistam
Olinū Cremonensem Medicos sanè ac viros, singulari doctrina illustres, & ma-
teria medicæ peritos, qui suis literis se multum mihi debere fassi sunt, quod ex cõ-

mentarijs nostris illis innotueris, te inuiferint, & præclarissima antidota abs te acceperint. Taceo laudes, quibus multis encomijs te prosequuti sunt, & quæ de his, quæ apud te viderunt, enarrant. Miranda enim sunt quæ de te scribunt, ac de tuorum medicamentorum miraculis. Præmittam & ego quoque, quæ de mirificis Theriacæ tuæ operibus dici possent, quod tamen non facerem nisi id prius in commentariis nostris in Dioscoridem præstitissem. Quin etiam cum Antidotus ipsa iam ubiq; de se, suaq; ipsius præstantia dicat, loquatur, & prædicet, non est ut de ea plura præfari contendam. Hoc tantum addam, ne scire Matthiolum, ubi ei parem adinuenias. Facinus esset magnum si ea velim in hominum vsum promouere, quæ scirem non carere impostura: quidam fortasse faciunt. Quin etiam haud minus facinus esset, si quæ scirem ad conseruandam tuendamq; hominum vitam profutura, eadem non promouerem, & laudibus non commendarem, sed ne longius tuas prosequar laudes, & ne tam amplo meæ in te beneuolentiæ animo inuidorū aures obtundam, cætera tacere decreui, de quibus præclarissimi Medici Veronenses, qui omnibus ferè horis tecum versantur & viuunt, longè melius ac diffusius quàm ego testari poterunt. Tu verò, ut semper soles, diligenter cura, ut antidotum & oleum nostrum de scorpionibus contra venena, & virulentorum animalium ictus, quorum parandi rationem in commentariis nostris descripsimus, ad finem deducantur. Si quidem tametsi Romæ non desint, qui hæc iam passim parent in multorum Heroum gratiam, & vsum, sunt tamen eorum plerique, qui sæpe suis literis ad me datis antidota ipsa à me petant, quod sibi omnino persuadeant, quæ à nostris prodeunt manibus cæteris fore præstantiora. Bene vale.

Tridenti, Idibus Ianuarij. M. D. LXXI.

I T E R

ITER BALDI MONTIS, FRANCISCO CALCEOLARIO

VERONÆ IN OFFICINA CAMPANÆ

aurea Pharmacopola Auctore.



BALDVS Mons in Italia celeberrimus in faucibus alpium quibus Rhetia ab Italia diuiditur, altissimus, latissimusque reſidet, in ipsis Veronenſis, & Tridentini agri conſinibus. Hic itaque cacumen montis extollens, ceteros vicinos montes altitudine ſuperat, atque excellit, adeo vt amœnitate, ſitu, pulchritudineque non ſit quouis altero inferior. Radices habet, qua Solem orientem ſpectat in Atheſis fluminis littore. Ita verò ad occidentem in amœniſſimis Benaci oris. Ab Auſtro deinde campestrem quandam planitiem, & ab Aquilone alios alpium montes contingit. E cuius ſummo iugo magna cum luſtrantium voluptate atque admiratione à ſiniftra parte ſubundum ſpectatur flumen, quod à præruptis & altiffimis ſcopulis erumpens, per anguſtum admodum, & anfractuolum iter rapidiſſimo curſu deſcendit ad valles. Ex aduerſo autem latere humilioreſ viſuntur colles, & ſubſequitur quoque vallis cula, quas maxima campeſtris antecedit planities, ſpaciola admodum, æqualis, inculta tamen & nulla arbore impedita, adeo vt plane inſtrumtum repræſentet. Huius ſecundum ſatus Atheſis flexuoſo itinere perſente, quod quoniam magnus ſit fluuius, ob ſuantiam tamen è ſummo montis verò præſcipientibus paruus riuus apparet, & in conſpectum ingredi cernitur. Vnde & ciuitas ipſa Veronæ, adeo, vt eius ſitus, forma, ad ſua ambitus totus, ac queque eiufdem partes diſtinctæ ac particulatim internolent queant. Quod ſi contingerit cælum perſpicua ſerenitate clareſcere, vniuerſa agri Veronenſis planities libere perſpici poteſt. Viſuntur quoque vicinæ vrbes, & oppida, quæ adeo ſubſide inſpicientium oculis apparent, ac ſi Belgici pictoris penicillo, omni cum arte, ac venuſtate, aliqua in tabella, aut potius linteo depicta ſpectarentur. Ab altera verò parte Benacus occurrat Lacus, qui quamuis ſex milia paſſuum diſtât, adeo tamen vicinus, ab æſtiniſ altitudinem videtur, vt ſi quis velociſſimo curſu ſuſtinere ſibi temperare deorſum contenderet, exterreſciet quidem, ventus ne in eum collabens irrueret. Spectantur hinc circum lacum ipſum horridi admodum, ac inaccessi montes, ſæterque crepidines, ac rupes, ſcopuli eminentiſſimi ac nudi: propius verò non procul à littore amœniſſimæ videntur oræ oleis, & myrtis reſectæ: quin & viuentes colles, & montes, ac denſis admodum lauris veſtiti. Pagi quoque multi, atque oppida. Inſula, Peninſula, nauigationes, piſcationes, vnde etiam placidiſſimæ, mox in diſtantiæ littora fremere, nauigantes ad portus properare ex ipſo montis iuge cernuntur. Præterea, quod fortalle nonnullis eorum videbitur, ſereno in montis cacumine exiſtente Cælo, paulò tamen interius denſiſſimis nubibus obſcuro, non ſolùm tonitrua horrenda, coruſcationeſque quandoque ſunt, ſed & grandines, & pluuia impetuoſa admodum bom-

bo, in ipsum decidunt lacum, non sine magna nauigantium iactura. Quæ quidem omnia tam pulcherrima, admiranda, delectabiliaq; spectacula faciunt, vt præ stupore nonnulli veluti attoniti fiant. Quemadmodum enim nullus spectantium oculus horum prospectu satiari potest, ita nec lingua reperiri, quæ omnia rectè narrare ac exprimere posset. In ipso autē monte tanta est locorum, & rerum varietas, quod prorsus longū foret omnia ex ordine recensere. Sunt enim valles ex puro saxo non parua, accliuēs, decliuēsq; scopulosæ, atq; admodum squallida: è contra verò spaciosissima, amplissimaq; pratorū pascua, numerosa herbarum, & florum varietate referta, & ex his quidem plana quædam, atq; umbrosa, quædam decliuia atq; aprica. Extant etiam amplissimorum fontium frequentes, ac limpidissimæ scaturigines, nō solum in imis montis ipsius locis, sed in medijs, atq; etiam in summis eiusdem iugis, è quibus tam copiosè emanant aquæ, vt earum potu numerosæ pecudum greges satis superq; satiari queant: ad quorum scaturiginum fontes non gregarij pastores modo, & syluani homines, verum & qui conquirendis plantis insudant, expositis in gramine cibus, sese refocillare solent, paucis adiunctis obsonijs. Prætereo, ne longior sim, frondosas, ac densas fagorum, quercuum atq; ilicium syluas, quin etiam quasdā castaniferis tantum arboribus stipatas, atq; nonnullas, in quibus syluestres proueniunt pinus, atq; excellissimæ abietes atq; larices. Cæterum quid dicā de aeris, cœliq; varietate? Mira profecto. Siquidem qui montē circūquaq; perlustrant, breuibus etiam intervalis, magnā aeris inæqualitatē experiantur, ad eò, vt pleriq; non modo regionem, sed clima se mutasse opinentur. quod hæc quidē pars exorienti Soli, illa vero Occidētī aduersa fuerit, quædam, quæ Sole torreatur, alia quæ umbris perpetuas habeat. Hic niuib; ac glaciæ perpetuis est tate tota alget locus, ibi verò estus est magnus. Alijs verò quondam partibus, omni ferè anni tempore vernalis quædā adest temperies; quæ quidē locorum ac situm diuersitate, sit quidem q̃ tanta etiam plantarū varietas, in hoc mōte proueniat, quanta vsquam in Italiā tota reperiatur. Distant igitur Verona huiusce admirabilis montis radices viginti milibus passuum; ab ip̃s verò imis ad summam, quinque aut sex milibus. Discedendo itaq; Verona ad montem Baldum, statim extra urbem iter est per campēstrem, latissimamq; fertilissimam, vbi copiosè virescunt.

Thymalus.
Helioscopus.
Cyparissias.

Pitrisa.
Sed paulò vterius reperiuntur.
Palmi genera plura, quorundam opinionē descripta.
Nitidaria.
Corinthus Plinij *Rosula*, *Rulpa* dicta.
Geranium multorum generum.
Eryngium.
Lupinus domesticus & *syluestris.*

Aschusa tria genera.
Milegrana ab aliquibus *Epipactis* dicta.
Securidaca.
Dipsacus.
Attractylis.
Rubea.
Tlasi multorum generum.
Plantago aquatica.
Sium.
Glaucium.
Sisymbrium aquaticum duplex.
Xiphium.
Ocimoides.

Interca

Interea peruenitur ad pagum quendam, qui distat ab vrbe quinq; milia pas-
suum super dextra Athefis parte in campestris planitie latere positus: cuius
nomen multis innotuit gentibus. & præsertim Transalpinis militibus, qui è
Germania profecti in Galliam Cisalpinam contendunt. Buxolengus ei nomen
est ita à viuò colle appellatus, qui totus Buxo arbore vestitur. hinc itaq; vterius
proficiscendo, quæ sequuntur hic plantæ reperiuntur.

Botrys.
Hypecoum Matth.
Amellus Vergily.
Alisma.
Acanthus.
Eriodranum maius & minus.
Astragalus.
Terebinthus.
Abrotonum album.
Mahaleb.
Helicrysum.
Flammula Iouis.
Oncina.
Berberus vulgaris.
Holostium.
Rhamnus tertius.

Spergula. i. Apparine.
Trageponum flore purpureo, & luteo.
Bellus maior & minor.
Anthemis flore albo, & rubro.
Adonis Matthioli.
Cotula foetida.
Aparine.
Gallium flore albo & luteo.
Abyssum quorundam.
Althea.
Colchicum.
Pseudomyagrum.
Lagopus.
Aeglops.
Potium alterum.
Lycium.

Hinc peruenitur ad quandam meam possessiunculam, quæ Rirole (quasi
Ripa) nostra vulgari lingua vocatur, vbi fuit antiquitus in summo colle Arcæ lo-
ci natura tunc temporis munitissima, de qua in historia Veronenli frequens fit
mentio, cuiusq; adhuc diruta visuntur vestigia, atq; ruina. Hic quoq; suos ha-
bet fines vallis Lagarina, quæ ita est, quo Tridentum, & in Germaniam itur.
Ad hanc vsq; Arcem creditur Athesim olim peruenisse, antequam fauces illæ
montis hominū industria diducerentur, quæ la Chiufa vulgo dicuntur. Quo-
niam aurem merces ratibus per Athesim allata, ad hanc vsq; arcem, ad ripam
tanquam in portum conuehebantur, facile locus hic Ripæ nomen adinuenit,
vnde nos Rirole corrupta appellatione vulgari idiomate appellamus.

Hinc per quandam vallem iter dirigitur, frugiferis campis, & pratis, atque
gelidissimis fontibus, vtilissimisque refertissimam, in qua, in ipso itinere inue-
niuntur stirpes non pauca; quæ hæc sunt.

Pulsatilla Matthioli.
Ligustrum.
Reseda Plinij.
Polygala.
Dryopteris.
Polypodium.
Tribulus terrestris.
Amellus.
Vinetoosicum, seu Asclepias, vt quidā
Alliaria.

(volunt.

Psyllium felij Coronopi.
Polemonia.
Olyra.
Lupinus sylvestris.
Chondrylla.
Digitalis lutea, & purpurea.
Cacalia.
Centaurea media.
Ageratum.
Arisolochia vtraque.

SSS 3

Euphra-

Galiopsis.
Eupaterym Diosc.
Oenanthe. i. Filipendula.
Euphrasia.
Heliotropium maius.
Ballote.
Populus virag.
Alnus.
Periclymenum.
Chamaepitys.
Hermodactylus Mes.

Stachys.
Lunaria odorata.
Draba.
Atriplex sativa & sylvestris.
Iberis.
Crocus sylvestris.
Fruentum Saracen. Matthioli.
Thymbra.
Elleborus niger.
Daphnois.
Bryonia.

In postremo huiusce vallis loco, pagus est Caprini, vbi ab imo Baldus mons incipit attolli. Quo in loco opus est in montem ascensurus, sibi com meatum comparare, nisi eum secum è Verona tulerint, quincem de vestimentis sibi providere, ad sustinendum si opus fuerit die quidem imbrem & ventos, nocte verò frigus: vltius enim pagi non sunt, vbi necessaria nancisci possint, sed tantum pastorum tuguria & sylvanorum hominum case. quam ob causam non esset ab re etiam iumenta habere, quæ tentorium militare, & alia utensilia deferrent. Ceterum transmissio Caprini pago, hæc in propinquis locis reperiuntur.

Viola arborescens.
Scabiosa.
Morsus diaboli.
Consolida Regalis.
Viola alba Theophr.
Oxys.
Anagallis vtrique.
Iacca nigra.
Sideritis Abillea.
Mithridatica.

Alectorolophos. seu cristæ galli.
Pes asferimus.
Xanthium.
Symphytum maius.
Alopecuros.
Delphinum. i. flos Regius maior & minor.
Dictamnium album.
Flos Solis Matthioli.
Anthyllis.

In ipso autem ascensus initio, inuenitur Corone templum Deiparæ virginis dicatum: magnæ sanè religionis, ac nō minus loci ferè inaccessibilis natura, mirabile, quod in quibuscunque festis diebus D. Mariæ virgini consecratis, ac sollemnibus, magna admodum hominum confluit multitudo. Ceterum cōfluentibus transeundum primum est ab vnius montis iugo in alterum per longum admodum subliceum pontem: deinde verò ascendendum accliu admodum calle, adeoque angusto, vt vix singuli commodè incedere valeant, quo sæpe fit vt obuijs factis vix locus ad transitum super sit. Ab ipsa solummodo natura angustus iste transitus factus est in montis ipsius latere in marmore, quod vtrinque instar parietum ad perpēdiculum excurrit. A calle verò ipso ad summum montis fastigium tantæ altitudinis ipsum est latus, vt vix telum validissimo arcu excussum summum locum attingat: ab eodē verò ad imum, quingenti aut fortasse plures intercedunt passus. At quod iter hoc spectantibus terribilius est, proficilcentibusq; laboriosius, tātō magis ad ascensum inuitat animi voluntas videnti ac perlustrandi tā solitarie religionis Fanū: & quoniā in calle ipso nascuntur.

Saxifraga maior Matthioli.

Daucus Creticus.

Corydalis, splis

quibus-

quibusdam dicta, atque etiam pyrethrum, non frustra iter illud perficitur. A
coronæ deinde templo recedendo multæ sese offerunt stirpes, nempe.

<i>Palma Christi diuersarum generum.</i>	<i>Spina alba.</i>
<i>Chamæleon albus.</i>	<i>Virga aurea.</i>
<i>Gratia Dei.</i>	<i>Batrachium Apulegij.</i>
<i>Conyca omne genus.</i>	<i>Gingidium.</i>
<i>Seseli Aethiopicum.</i>	<i>Elatine.</i>
<i>Myrrhis.</i>	<i>Pityne Theophr.</i>
<i>Cicuta.</i>	<i>Auricula muris.</i>
<i>Perfoliata.</i>	<i>Triticum vaccinum.</i>
<i>Aiſon multorum generum.</i>	<i>Seseli Creticum.</i>
<i>Phalaris.</i>	<i>Lamium Plinij.</i>
<i>Oxylapathum.</i>	<i>Hastula regia flore albo.</i>
<i>Sejimum.</i>	<i>Hornithogalum.</i>
<i>Rhus.</i>	<i>Phyllirea.</i>
<i>Castanea.</i>	<i>Verbasci plura genera.</i>
<i>Oxyacantha magna.</i>	<i>Ophioglosson.</i>
<i>Thalictrum.</i>	<i>Sannicula Diapensia.</i>
<i>Caryophyllata montana Matthioli.</i>	<i>Sanguisorba.</i>
<i>Bisforta.</i>	<i>Arum minus.</i>
<i>Egyptyros.</i>	<i>Seseli Peloponense.</i>
<i>Campanula Fuchsi.</i>	<i>Phalangium copiosum.</i>
<i>Pecten Veneris.</i>	<i>Cardiaca.</i>
<i>Pes asserinus.</i>	<i>Eruca.</i>
<i>Centaurium minus.</i>	<i>Clymenum Plinij.</i>
<i>Epimedium.</i>	<i>Tilia.</i>
<i>Clymenum Matth.</i>	

Post Coronam haberi potest hospitium in pago Ferrario, à quo parum inui-
cem absunt Prabazarius, Maon atq; Nouetia loca sanè cæteris altiorib⁹ cultio-
ra, atq; mitiora. Hinc item ascenditur in latissima ac vberissima prata, fontibus
pulcherrimis referta; vbi numerosæ, ac magnæ ouium, & armentorum greges
aluntur, à Maio mense in Septembrem vsq; Hæc inter spacia nascuntur.

<i>Peplus.</i>	<i>Bellis caruleus.</i>
<i>Norminum sylvestre.</i>	<i>Hyoscyamus albus.</i>
<i>Trinitas.</i>	<i>Phuparum.</i>
<i>Aconitum Pardalianches quorundam.</i>	<i>Sagitta Matthioli.</i>
<i>Solanum maius, seu Bella donna.</i>	<i>Onobrichis.</i>
<i>Asterum.</i>	<i>Lonchitis aspera.</i>
<i>Crocus martius.</i>	<i>Sferra cauallo.</i>
<i>Polygonatum angustifolium.</i>	<i>Seseli peloponense.</i>
<i>Prunella i. consolida minor.</i>	<i>Hastula regia flore luteo.</i>
<i>Erysimum.</i>	<i>Primula veris.</i>
<i>Picris maior & minor.</i>	<i>Ambrosia duorum generum.</i>
<i>Orchis multorum generum.</i>	<i>Amellus.</i>
<i>Antirrhinum duarum specierum.</i>	<i>Allium anguinum Matth.</i>
<i>Tussillago duorum generum.</i>	

Sss 4

Per

Per hæc itaq; prata proficiscentes in Atilonem perueniunt, vbi à dextra val-
lis est ingens, quæ à summo ferè montis iugo vsque ad Athesim profundissima
permeat: in qua imbrium aque, atq; fontium circum scaturientium excurrunt:
Quæ quidè vallis à loco superius citato, vernacula lingua, La valle de Artillon
nuncupatur. Hæc itaq; ab his qui plantarum cognitione delectantur cõmemo-
randa, ac celebranda fuerit, q̃ in ea cõplura præstantissimarum plantarũ gene-
ra abundè proueniant, quæ nõ dixerim in Italia solùm, sed fortasse in vniuersa
Europa vix reperirentur. Equidè ego hoc profectò asserere possum, me hãc in
vallem non venisse vnquam, quin nouã aliquam pulcherrimam; nec antea vi-
sam repererim plantam: Hic autè etsi plura plantarum genera ex iam cõmemo-
ratis nascentur, earũ tamen, ne prolixior sim, haud iterũ meminero, verũ de
his tantum sermonem faciam, de quibus hæcenus non scripseram. Et sunt hæc.

<i>Scordonia.</i>	<i>Vua vrsina.</i>
<i>Pilosella.</i> { <i>Maior.</i>	<i>Felix vtraque.</i>
	<i>Tilia arbor.</i>
	<i>Clynopodium.</i>
<i>Phu minimum.</i>	<i>Erica vtraque.</i>
<i>Gnaphalium.</i>	<i>Meum.</i>
<i>Semperuium vtrunque.</i>	<i>Viola lutea.</i>
<i>Pulmonaria.</i>	<i>Panax Chironium.</i>
<i>Nardus Celtica.</i>	<i>Saxifraga alba.</i>
<i>Sideritis prima.</i>	<i>Diapensia.</i>
<i>Rubus Idæus.</i>	<i>Tormentilla.</i>
<i>Onagra.</i>	<i>Taxus arbor.</i>
<i>Solidago Saracenica.</i>	<i>Arisarum.</i>
<i>Bifolium.</i>	<i>Cyclaminus duorum generum.</i>
<i>Petasites quorundam.</i>	<i>Phyllirea.</i>
<i>Sannicula Cordi.</i>	<i>Myrtillus Matthioli.</i>
<i>Digitalis.</i>	<i>Chamaecerasus.</i>
<i>Virga sanguinea.</i>	<i>Tora.</i>
<i>Arbutus.</i>	<i>Nardus montana.</i>
<i>Clematis altera.</i>	<i>Tragium Germanicum siue vuluaria.</i>
<i>Senetium maius.</i>	<i>Cyanus matius, & minus.</i>
<i>Senetium minus.</i>	<i>Dryopteris.</i>
<i>Sambucus racemosa.</i>	<i>Satureia.</i>
<i>Sorbus torminalis.</i>	<i>Muscus terrestris.</i>
<i>Sorbus syluestris Matth.</i>	<i>Herba paris.</i>
<i>Aconitorum diuersa genera.</i>	<i>Combreum Plinij.</i>
<i>Chrysanthemum flore albo.</i>	<i>Daucus cretensis.</i>
<i>Noli me tangere.</i>	<i>Lychnis syluestris.</i>
<i>Tithymalus maior.</i>	<i>Campanula cæulea.</i>
<i>Angelica.</i>	<i>Hysopus Montana.</i>
<i>Napellus flore albo.</i>	<i>Costum amarum vulgare.</i>
<i>Cirsium.</i>	<i>Elhylon.</i>

Anti-

tra val-
diſſima
errunt:
rtillon
nemo-
gene-
huerſa
hac in
tea vi-
nemo-
um de
nt ha.

Antitoræ.
Lunaria racemoſa.
Betonica.
Viola marianna.
Orobanchemag.
Lucciola.
Gentianula flore purpureo.
Luparis, acutiſſeſpecies.

Napellus veriformis.
Sigillum Salomonis.
Carum.
Geniſta alpina.
Dentaria.
Martagum.
Fragaria.
Lampſana.

In ſuperiori huiusce vallis parte quædam paſtorum ſunt tuguria, vbi Veronenſis agri & Tridentini fines habentur, à quibus nō longè abeſt Sylua ingens reſiniferarū arborum, Tiliæ, Betulæ, Carpini, Anagyris vtriuſq; Aquifolij atq; aliarum arborum, reſertiſſima, in qua Monticolæ, ac Syluani homines reſinam ferè omne genus, nempe Larigiam, Pineam, Abiegnam, Piceamq; colligunt, quin etiam, & è Larice Agaricum. Circum hæc paſtorum atregias præta ſimiliter habentur, in quibus album Veratrum, albuſq; Chamæleon, Calamintha montana, Gentiana, & Napelli genera omnia abunde proueniunt.

Dum autem hinc ad ſummum montis iugum aſcenditur, reperitur longo ſatis ſpacio Silermontanum, & Seſeli Peloponenſe. Cuius radices impoſtores quidā legitimi coſti vice ſuis in Theriacis uſurpare voluerunt. Hic vera reperitur Ciſtus atque Hypociſtis. A dextra relinquuntur altiſſimæ, atq; aſperrimæ montis ſummitates quæ ab Vrſis, Lupis, Sylueſtribus capris & id genus feris quadrupedib; frequentātur. Quibus in locis inter duriffimos lapides enaſcuntur tria illa plantarum genera, de quibus quoq; ſuperius meminimus. Nempe Montana, & Celtica nardus, atq; Cretenſis daucus.

Hinc haud longè Mons diſtat, quem maiorem appellant, quodd cætera Baldi montis ſaltigia excellat. in cuius ſumma parte planities eſt herbola, nec omnino inæqualis, è qua ampliſſima ſpectatur regio. pagis & oppidis numerofiſſis reſerta. Mantuam, Ferrariam ac etiam Patauiam uſque ſeſe diſfundens: Ex altera verò parte omnes citra, vltraq; Benacum oræ, à Ripæ Tridentinæ oppido, vbi Benacus ipſe Lacus initia ſumit, ad Piſcheriam uſq; , vbi ad exorientem Mintium fluuium terminatur, oculis ſubiectæ ſunt: quæ quidem amœnitatē, venuſtate, pulchritudine, omniq; deliciarum genere adeo nitent, vt nihil delectabilius inueniri poſſit. Ibi enim ferè ubiq; viridaria habentur, in quibus Armenica mala, Aurantia, Limonia, & quæ Adami poma vulgus appellat, perpetua fronde virent. adeò vt toto ferè anno perpetuo vere fruuntur accollæ, cum non ſolum odoratiſſimis floribus, ſed fructibus, hæ prætioſiſſimæ arbores onuſtæ perpetuo ferè ſpectentur. Hic ſecus itinera ſepes ubiq; ferè ſunt ex Lauris artiſcioſiſſimè concinnatæ, nullo ramuſculorum diſcrimine. Nec hoc mirum videri debet, cum Laurus frequentiſſima in collibus, & nemoribus ſua ſponte proueniat. cæterum & illud quoq; omnem ſuperat admirationem, odor, nempe ſuauiſſimus, qui aſſlatu quodam mirabili ab Aurantium & Myrti floribus ſpirat. Si quidem hæc Hæſperidum plantæ abſq; multa cultorum opera in agris & collibus propagantur, & in eam ſe attollunt proceritatem, qua alijs in locis, & Salices, & Vlmi prouenire ſolent. De viridarium horum prouentu ac vbertate, vix quiſpiam crediderit, quippe ex vno tantum terra ingero Medico-

ſſs 5 rum

rum Malorū confito, centum, & quinquaginta, & quandoq; plures ducatos coloni annuatim recipiunt. Succurrit nunc dum de his verba facio, me pluries non sine admiratione obseruasse in hoc ipso agro viniferas vites, numerosis admodum oleis ipsisque pulcherrimis, & speciosis, adalligatas, & sub ipsis copiosas crescere segetes. aded vt vno tantum agro, frumentum, oleum, & vinum recipiant. Hic fontes multiplices inspicias cryalli instar limpidos, & riuulos labentes, qui per pagos illos grato murmure excurrunt; propè quos ædificia magni sanè vsus erecta sunt tum ad frumenta molenda, oleum exprimendum chartamque parandam, tum ad ferrum excoquendum. & malleis ducendum effigandumque; cuius metalla his in locis copiosa habentur, atque, vt vno verbo dicam, ora Benaci lacus, quantulacunque sit, cæteras Cisalpinæ Galliæ oras amœnitate, prouentu, pulchritudine, ac omni deliciarum genere facile antecellit: Sed hæc obiter dicta velim, vt plantarum cognoscendarum studiosos, qui ad montem Baldum videndum proficiscuntur, ad hanc quoque fertilissimam, amœnissimamque oram inuisendam inuitarem. Quod si fecerint, non solum magna cum voluptate dies noctesque transigere poterunt, sed prompta illis erit occasio tres singulares videndi plantas. Etenim in Turri vallecule, citralacum posita Mandragoram copiosam inuenient: Ad Diuum verò Vigiliatum montem habebunt, cuius totum latus Rhododendris stipatum cernitur, floribus tum albis, tum rubris, admodumque speciosis. Quin etiam in minoritarum monachorum insula, floridam, ac pulcherrimam videbunt Palmam, quæ quidem hac in nostra regione arbor spectatu rara admodum est. Sed vt iam ad rem propositam redeamus. In ipso itaque monte maiori, de quo dicebamus nascuntur.

Lunaria racemosa.
Pseudo doricum.
Sannicula varia species.
Leontopodium Matthioli.
Geranium argenteum.
Alchimilla argentea.
Polium primum.
Orobanche valde magnum.
Auricula muris.
Calamintha.
Aquileia fusca.

Cynocrambe.
Cnicorum Matthioli.
Picea sylvestris ab incolis appellata.
Mughus Matthioli.
Pinus sylvestris montana.
Lampjana.
Fabaria.
Scorpioides.
Lunaria Græca.
Chamelea.
Thymelea.

Propè montem ipsum maiorem vallis est de ossibus dicta, eam (vt puto) ob causam, quod in altera propinqua vallecule circum theatri instar, omni ex latere, lapides complurimi exesi ac perforati extent, ac promineant, quæ humanæ caluariæ speciem, ac cætera ossium genera representent. cur autem lapides hi excauati, attriti que videantur, aliunde prouenire non crediderim, quàm ab ingentibus frigoribus. Siquidem locus is rarè à solis radijs incalescit. Nam cum hic essem Iulio mense ardente iam Syrio, & niues, & glaciem copiosam inueni. Hic circumquaque copiosa est.

Iberia.

tatos co-
pluries
merofis
psis co-
vinum
riuiolos
edificia
tendum
tendum
no ver-
allia o-
cile an-
diosos,
ritilissi-
nt, non
compta
cula, ci-
Vigili-
nritur,
minori-
lmam,
Sed vt
o dice-

to) ob
i ex la-
huma-
apides
iam ab
m cum
nueni.

Iberis.

Iberis.
Ilex.
Filipendula duplex.
Mentha vitraque.
Menthastrum.
Solanum maius. i. herba bella donna.
Eptaphyllum.
Aparine.
Simphtum petraum.
Acacalis.
Anyllis.
Anemones multorum generum.
Chondrylla multiplex.
Hedera terrestris.

Carduus vulgaris.
Libanotis.
Verbenaca.
Apocynum.
Pistolocchia, i. Capnos magna.
Sphondilium.
Serpillum vitrunque.
Panax Heracleum.
Collutea.
Pent. phyllum album.
Vmbilicus Veneris alter.
Phyteuma Matricoli.
Sambucus montana.

Paulò vltra ossium vallem in ipso primo descensu, per vniuersum ferè latus, cui vallis vaecaria nomen est, pratorum spacia sunt, minutissimarum herbarum tam plena varietate, vt subnigricantem ferè colorem repræsentent, mira interimi florum emergente varietate: quæ quidem nullo cespite aut lapide impedita adeo firmæ, vegetæq; assurgunt, vt quamuis die tota à pecudibus depascantur, resumentes noctu quicquid diu deperdiderunt, primo statim mane florentes, & prorsus intactæ sese ostendunt, nullo erosionis vestigio apparente adeò, vt longè magis valeant, ac adolescant, quàm quæ in hortis, sepibus & muris obductæ diligenter excoluntur. In his itaq; locis pululant, ac florescunt.

Arthetica.
Galiopsis.
Caryophyllata montana Matth.
Gentiana.
Thapsia.
Peuced. num.
Nerium alpinum.
Potamogetum.

Ferula.
Anonis.
Carduus lacteus.
Herba gattaria.
Gramen Parnasi.
Ageratum.
Piarctica.
Paonia.

Medijs huic pratorum spacijs locus est parvus, ac planus, montis lateribus, ne scio an ab arte, aut natura excisis in semicirculi modum. Ibi interiori, ac superiori parùm loco ex ipso viuo saxo, aqua clarissima prorumpit, quæ non sine grato murmure in planitiem delabens, magnum, ac nitidissimum alueatum conficit fontem. quæ verò super defluunt aquæ à summis fontis ipsius labris exigua planitiem illam circum eunt ac deinde diuersos in riuulos diuisæ, per virentes defluunt herbas. Pastores hunc fontem Brigaddellum vocant. Insignis quidem, ac celeberrimi nominis fons hic est, tum ob aquarum scaturientium vbertatem, tum quòd potu omnium opinione cæterorum fontium saluberrimus habeatur: qua propter quoscunque in ipsum aduenientes montem, itinere defatigatos suo murmure ad se inuitat, & ad gratissimas umbras circumstantes allicit. Circum huiusce fontis riuulos Imperatoria copiosa prouenit, & aliæ quoque plantæ. Cæterùm haud longè à vaecaria valle adiacet Ime, seu vallis Bassiana, vbi proueniunt.

Abutilon.

Abutilon.

Cruciata.

Barba capra.

Aconitum luteum roseo flore.

Radix rhodia.

Capnus.

Rubea sativa.

Iacca.

Alisma.

Cirsium.

Centaurium magnum copiosum.

Post vallem Bassianam vallis frigida paulò inferius est. In quibus vallibus præta itidem habentur. verùm non adeo pulchra, lataq; vt in valle vaccaria. Cur autem ita vocentur hæ valles, quid alleram non habeo. Scio tamen in frigida ipsa valle provenire hæc, quæ sequuntur simplicia.

Polygonatum angustifolium.

Clymenum Pliny.

Eritrodanum.

Elaphosolum.

E. hium.

Genista Germanica.

Chelidonium minus.

Cirsium.

Daphnos.

Chamaelea.

Coronopus serpens Matth.

Hypericum.

Ascyrum.

Androsolum.

Cori.

Ad hæc vsque loca non vulgares illæ reperiuntur plantæ, de quibus superius hæcenus meminimus, nec reliquum est, vt de iisdem vltius sermonem faciamus. Qui verò in montem veniunt, & si redeant Veronam aut eodem, quo venerunt itinere, aut alia, qua velint via, plura tamen simplicia, quæ vsui aliquo esse possint, quàm quæ à nobis conscripta sunt, profectò non inuenient: qua re de itinere redeundi, nihil mihi scribendum fuit, ne verbosius quàm par sit, historiam hanc prosequi videar. Brevitati ergo indulgens, vt ab initio mihi proposui de reversionis itinere nil aliud scribam, quàm quod poterit vnusquisque pro suo arbitrio vel hunc vel illum tramitem sibi deligere. Cæterum ego quidem breuem hunc plantarum libellum, in Baldo monte, nascentium, scripsisse volui, vt nonnullorum precibus obtemperarem, atq; etiam in publicum vsum edere, quem si quis legere, & secum habere nō dedignabitur, is quidem per se ad stirpes sibi comparandas in montem ipsum ascendere poterit: indeque simplicia fere omnia asportare, quæ in communem pharmacopæorum vsum esse debent, eaq; præsertim quæ non vbiq; reperiuntur. Quandoquidem noster iste Mons, nō secus ac pulcherrimus hortus in quē coloni ex diuersis regionibus cōplurimas raras attulerint plantas, sua sponte refertissimus, fecundissimusq; habetur. Poterit quoq; meum hoc opusculum non solum his, qui medicæ materiæ dant operam, quiq; medicam facultatem profitentur, sed & quibuscunque qui rem plantariam excolunt, esse non solum vtile, sed etiam iucundum. Nam perceptis prius apud Dioscoridem plantarum historijs, notis, ac saporibus, atq; amplius ex doctissimis, refertissimisq; Matthioli commentarijs, ac ex nouo eiusdem plantarum compendio, in quo pariter extant plantarum icones ad viuum expressæ, quod secum quocunque venerint deferre poterunt: quin etiam si contigerit ibi esse quenquam plantas conquirentem, vbi non vna, sed cuiuscunque generis sexcentæ vel plures breui etiam spacio conspicuuntur.

spiciuntur, poterit proculdubio spontè, & per se se illas iam instructus inuenire, atque cognoscere. Similiter quandocunque alicui studiosorum aliorumve bonorum virorum comitatu, aut animi refocillandi gratia, aut speciosa, raræque alicuius plantæ visendæ desiderio in suo natali solo, ad hæc amœna loca se conferre libuerit, id illis vnus huiusce nostræ admonitionis auxilio, factu facile futurum spero. vbi forte perito, atque exercitato duce carerent. Neque (vt ego reor) eos suscepti laboris pœnitebit, cum senserint, atque nouerint non modò delectationem ferè incredibilem, sed maximam inde se percepisse vtilitatem. Tantam enim re vera, animi tranquillitatem lætitiâque ex hoc itinere percipient, quantam mente concipere, aut verbis exprimere nemo vnquam possit. Cuius rei fidem facere possent Clariss. ac Reuerendiss. Antistes Hieronymus Lipomanus, Franciscus Ianuarius, Iacobus Moschaleus. ambo non solum nobilitate clari, sed benignissimi quoque, & mei amantissimi. quin etiam Excellentiss. Fumanellus & Gerrinonus acerrimus simplicium indagator, ac nobilissimi Veronensium complurimi, & aliarum Ciuitatum Proceres illustresque viri, rei plantariæ studiosi, qui solitarios hos tractus peragantes, tantum delectationis, & voluptatis capiunt, vt ad vitales spiritus exhilarandos, & ad animum vel curis, vel studijs, lacessitum subleuandum, potiorem locum non inuenientes, istuc quotannis summa cum iucunditate sese conferunt. Inuiferunt quoque mecum, ac perlustrarunt vniuersum hunc montem Ioannes Baptista Oliuus Cremonensis, & Nocerus Pontremolensis, medici excellentissimi & non simplicium modo, sed compositorum quoque medicamentorum admodum studiosi. Cæterum vt iam finem dicendi faciam, qui, rariores, præciosioresque expetunt plantas, quàm, quæ in Baldo monte proueniunt, ij in Cretam, Cyprum, Syriam, Ægyptum, atque orientalem Indiam nauigare poterunt, vt superioribus annis faciebat honestissimus Cecchinus Martinelus Venetij pharmacopæus in Angeli officina, vir quidem apprimè medicæ materiæ peritus, nec vnquam satis laudatus. Id, quod ego quoque, facerem, si per illum in quo nunc sum vitæ statum, liceret.

FINIS.

CATALOGVS PLANTA- RVM QVAE IN HAC EPITO- ME CONTINENTVR.

A.

A Bies	48. 49	Agaricum	413	Anchusa	734
Abrotonum mas	459	Ageratum	795	Anchusa altera	735
fœmina	460	Ageratum minus	796	tertia	736
Abfinthium	452	Agnus castus	105	Androsamum	677
Abfinthium marinum	455	Agrimonia offic.	756	Androsaces	638
456		Aruga	679	Androsaces altera	639
Montanum	453	Albucum	371	Anemone	386
Ponticum	454	Alcea	669	Anemone II.	387
Seriphium	455. 457	Alchimilla	908. 909	III.	388
Seriphium vulgo dictum		Alisma	674	III.	389
458		Alliaria	589	V.	390
AEgyptium	457	Allium	328	Anemones diuersi flores	391
Santonicum	457	Allium anguinum, alpinum		Anethum	517
Abutilon	601. 668	329		Angelica	899
Acacia	103	Allium vrsinum	330	Angelica syluestris	900
Acacia altera	104	Alnus	68	Anguria	297
Acantium	435. 441	Aloe	450	450	515
Acanthus	442	Aloe America	451	451	443
Acer maior	63	Alfina	850. 851	Anjerina	758
Acetabulum	858	Alibea	667	Anibenus siue Chamamilla	
Acetosa	230. 231	Alibea altera, siue Abutilon	645	645	
Atchillea	750	668		Anthyllus	680
Acorum verum	5	Alypum	985	Antirrhinum	920
Acorum falsum	6	Alyssum	558	Antirrhinum II.	921
Aconitū pardalianches	822	Amaracus	490	III.	922
Pardal. Theoph.	823	Amaracus tenuifolia	491	III.	923
Pardal. minus	824	Amarantus	791	Antora, siue Antitora	837
II. 827. III. hyemale		Amarantus cristatus	792	838	
828. IIII. 829. V. 830		Ambrosia	596	Aparine	557
VI. 831. VII. 832		Ambrosia altera	597	Aphace	319
VIII. 833. IX. 834		Ammi, Ameos Officin.	522	Apiastrum	574
Acuta spina	85	Ampeloprasum	323	Apios	980
Adiantum	924	Amygdale	169	Apium hortense	526
Adonis	647	Anagallis aquatica	396	Palustre	527
Adonis flore pallido	648	fœmina	395	Apocynum	841
AEgylops, siue festuca	927	mas	394	Apocynum repens	842
AEgylops altera	928	Anagyris.	671	Apollinaris herba	807
AEthiopsis	886	Anagyris altera	672	Aquifolium	84
				Aqui-	

INDEX PLANTARVM.

<i>Aquileia, siue Aquilina</i> 404	<i>Auena sterilis</i> 928	<i>sylvestris</i> 233
<i>Arabis</i> 341.342	<i>Aurantia mala</i> 150	<i>Canina</i> 998
<i>Aracus</i> 802	<i>Auricula muris</i> 408	<i>Bryonia</i> 987
<i>Arbor lude</i> 140	<i>Vrsi</i> 706	<i>Bubonium</i> 904
<i>Arbutus</i> 168	B.	<i>Buglossum</i> 914
<i>Argentaria petraea</i> 909	<i>Ballote</i> 572	<i>Buglossum vulgare</i> 915
<i>Arisarum</i> 369	<i>Balsamina</i> 989	<i>sylvestre</i> 916
<i>Arisarum alterum</i> 370	<i>Balsamina altera</i> 990	<i>Bulbocastanum</i> 609
<i>Aristolochia clematis, Sara-</i>	<i>Barbula hirci</i> 312	<i>Bulbus vomitorius</i> 373
<i>cenia, tertia Plinij, longa</i>	<i>Barbula hirci II.</i> 313	<i>Buphthalmum</i> 651
<i>vulgaris</i> 421	<i>Bardana</i> 387	<i>Buphthalmum flore purpu-</i>
<i>longa</i> 420	<i>Batisecula</i> 288	<i>reo</i> 652
<i>quarta</i> 422	<i>Been rubrum</i> 24	<i>Bursa pastoris</i> 340
<i>rotunda</i> 419	<i>Bellis maior</i> 653	<i>Buxus</i> 101
<i>Armeniacae maiora</i> 146	<i>media, syluatica, monta-</i>	C.
<i>minora</i> 147	<i>na</i> 654	<i>Capa</i> 324
<i>Artemisia</i> 595	<i>minor</i> 655	<i>Capa Ascalonia</i> 327
<i>Arum</i> 365	<i>minima</i> 656	<i>scitilis</i> 326
<i>Arisflos</i> 366	<i>Bellidus species</i> 656	<i>scitilis</i> 325
<i>Arum minus</i> 367	<i>Berberus vulgaris, siue Cre-</i>	<i>Calamintha</i> 481
<i>Arundo</i> 72	<i>spinus</i> 86	<i>Calamintha aquatica</i> 483
<i>Arundo palustris</i> 73	<i>Beta</i> 255	<i>montana</i> 482
<i>Asarum</i> 19	<i>Beta rubra</i> 256	<i>Calamus odoratus</i> 30
<i>Asarina</i> 20	<i>Betonica</i> 681	<i>Caltha, calendula offic.</i> 918
<i>Ascyrum</i> 676	<i>Betula</i> 69	<i>Caltha palustris</i> 594
<i>Asclepias</i> 559	<i>Bistorta</i> 683	<i>Cannabis</i> 670
<i>Asparagus</i> 259	<i>Bistorta minor, alpina</i> 684	<i>Canna Indica</i> 731
<i>Asparagus sylvestris</i> 260	<i>Blattaria</i> 885	<i>Capillus veneris</i> 924
<i>Asphod. lus foemina</i> 372	<i>Blitum</i> 234	<i>Caput canis, vituli</i> 920
<i>mas</i> 371	<i>Blitum album</i> 236	<i>Capparis</i> 375
<i>Asplenium</i> 640	<i>rubrum minus</i> 235	<i>Capparis sylvestris, fabagi-</i>
<i>Aster Atticus</i> 904.905.906	<i>sylvestre</i> 237	<i>nea vel leguminosa</i> 376
907	<i>Botrys</i> 598	<i>Cardamomum</i> 11
<i>Astrantia Alpina</i> 533	<i>Botrytis, lunaria</i> 643	<i>Cardiaca</i> 864
<i>Attractylis</i> 561	<i>Bonus Henricus</i> 368	<i>Carduus D. Mariae</i> 445
<i>Athanasia</i> 650	<i>Borrage</i> 914	<i>Carduus non aculeatus</i> 437
<i>Atriplex</i> 240	<i>Brache cuculi</i> 883	<i>aculeatus</i> 438
<i>Atriplex sylvestris I.</i> 241	<i>Brassica capitata</i> 250	<i>lacteus, & lactarius</i> 445
II.	<i>Cauliflora, Cypria, Pom-</i>	<i>benedictus</i> 562
III.	<i>peiana</i> 252	<i>sylvestris</i> 439
<i>marina</i> 244	<i>Crispa, Sabellica</i> 249	<i>Cavota</i> 509
<i>Auellana Indica</i> 178	<i>leuis</i> 248	<i>Carpinus</i> 71
<i>Auena</i> 191	<i>marina</i> 253	<i>Carpinus Plinij</i> 63
		<i>Cartamum, Cnicus</i> 995
		Carum

INDEX

Carum	516	Chamaleon albus	428	phytum.	
Caryophyllata	725	niger	429.435	Consolida media	702
Caryophyllata palustris vel		niger alter	430	minor	703
aquatica	726	Chamaleuce	594	regalis	521
Caryophyllata montana	727	Chamamelon siue Chame-		saracenicæ, vide Virg. 441-	
Caryophylli	349	milla	645	rea.	
Caryophylli Indici	406	Chamamelū Romanum	646	Conyza	612
Caryophylli Indici minores		Chamapit hys	679.680	Conyza minor	613
407		Chameriphes, vide Palma		Conyza tertia	614
Caryophylli flores domestici		minor.		Conyza alia	615
350		Chelidonium maius	402	Conyza species aster	907
sylostres	351	minus	403	Corallina	871
Cassia poetica, Monspelien-		Cherua minor offic.	968	Coriandrum	523
sium	26	Chrysanthemon	793	Coris	678
solutia	25	Chrysanthemon minus	794	Coris Monspelien sium	699
Castanea	118	Cicer	204	Cornus	158
Castanea equina	119	Cicer sylvestre	205	Coronopus	276
Castrengula	866	Cichorium	284	Coronopus sylvestris	277
Caucalis	305	Cichorium verrucarium	287	Cortusa	728
Caulorapum	251	Cicuta	839	Corydalis	592
Cauda equina offic.	770	Cirsium	903	Costus vulgaris	28
Cedrus	57	Cistus	94	Costi radices	27
Cedrus Phœnicia	58	Cistus femina	95	Cotinus	123
Lycia	59	Citra mala	148	Cotonea mala	142
Celtica nardus	13	Clematis	694	Cotonea maiora	143
Celtis siue Lotus	155	Clematis flore multiplici	695	Crasula purpurea	412
Centaureum maius	425	Clematis altera	696	Crespinus	86
minus	426	tertia	697	Crispula	340
luteum, perfoliatum, dia-		Clinopodium	563	Crithmum	272
phyllum	427	Clinopodium alterum	564	Crithmum II.	273
Cepæa	673	Clymenum	712	III.	274
Cerasa, siue Cerasia	137	Cnicus	995	IIII.	275
Cercis	140	Cochlearia	271	Crocodilium	435
Cerefolium	302	Coccum infectarium	773	Crocum	33
Cervaria, ceruicellum	513	Coccifera Ilex	774	Crocus sine flore	34
Cerrach vide Scolopendrium.		Colchicum	845.846	Cruciatæ	417
Chamacerasus	138	Colocasia	209	Cucio phera	129
Chamacyparissus	460	Colocynthis	982	Cucumis longus	295
Chamadaphne	938	Colubrina	683	satius	294
Chamagelimum	37	Colutea	540	sylvestris, asininus officin.	
Chameiris	4	Colutea scorpioides	541	946	
Chamadrys, Triffago	567	Condrilla	290	Cucurbita	292
Chamadrys altera	568	Condrilla altera	291	Cucurbita Indica	293
Chamalea	973	Consolida maior, vide Sym-		Cuminum sativum	518
				sylue-	

Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze.
CFMAGL 1.7.257

INDEX

Gil. Melanthium	551	Herbapedicularis	947	Impia	606
Gladiolus	730	Herba Iudaica seu pagana		Intubus	282
Gladiolus Indicus	731	748		Intubus crispus	283
Glastum	409	Herbatorum Chimistarum	836	Intubus sylvestris	284. 285
Glycyrrhiza	423	Herba torminalis	606	Iphyum	372
Glycyrrhiza vulgaris	424	Herba paralytis	883	Irio 343. Irio alter	344
Gnaphalium	605	Herba Trinitatis	912	Iris	1
Gnaphalium vulgare	606	Hermodactylus	847	Iris sylvestris maior	2
Gospium	203	Hermodactylus offic. falso	845	minor	3
Gramen	741	Herniaria, Herniola	690	Iris humilis	4
Gramen Manne	742	Hieracium	524	Isatis domestica	409
Gramen II. floridum	743	Hieracium minus	525	sylvestris	410
Parnassi	744	Hippoglossum	919	Iua muscata	587
Aculcatum	745	Hippolapathum	232	Iuncus	780
Grana Paradysi offic.	11	Hippoclinod vel leuifolium	529	Iuncus floridus	781
Gratiola, Gratia Dei	464	Hirculus	14	odoratus	29
H		Hirundinaria	559	Iuniperus	53
Halicacabum repens	814	Holostium, siue Holesium	707	Iuniperus maior	54
Halymus	83	Hordeum	188	K.	
Harmola	496	Horminum	628	Kali	246. 247
Hastula regia	371	Horminum sylvestris	629	L.	
Hedera	398	Hyacinthus	798	Labrum Veneris	43. 432
Hedera helix siue minor	399	Hyacinthus orientalis	800	Lactuca	293
Hedera terrestris	400. 401	Orientalis alter	801	Lactuca florescens	299
Helenium	35	Tripolitanus	799	sylvestris	300
Helianthemum Peruvianum	503	Hydropiper	352	Ladanum siue Ledum	97
proliferum	504	Hyoxyamus	807	Lagopus	724
Helichrysum	787	Hyoxyamus albus	808	Lampisana	233
Helichrysum Italicum	788	tertius	809	Lantana vide Viburnum	
Creticum	789	Peruvianum	810	Lapathum	228
Heliotropium maius	1000	Hypocotum	806	Lapathum rubrum Cretense	229
minus	1001	Hypericum	675	Lappa minor offic.	926
Helxine	849	Hypocistis	96	Larix	45. 46
Helxine dissampelos	753	Hysopum	463	Lathyrus	968
Hemerocallis	616	I.		Lauendula	18
Hemerocallis altera	617	Iacea	912	Laurus	60
Hemionitis	641	Iacea altera	913	Laurus Alexandrina	936
Hepatica montana	764	lasminum	36	sylvestris	61
Heptaphyllum montanum	909	Iberis	184	Ledum	97
Heptaphyllum porphyranthe		Ilex	113	Lens	210
mon	762	latifolia	114	Lens minor	211
Herba cancri	340	coccifera	774	Lens palustris	852
Herbagattaria	484	Imperatoria	532	Lens palustris altera	853
Herba Paris	835	Imperatoria Alpina	533	Lentiscus	50

Leonio-

PLANTARVM.

606	Leontopetalon	565	Lupini	216	Moldauica	576
282	Lepidium	377	syluestres	217	Melongena	820
283	Lepidium Aegineta & Pli-		Lupulus	933	Mentha	477
285	ni	378	Lupulus scemina	934	Mentha altera	478
372	Leucoium album & purpu-		Lychnis	569	Mentha Graca	480
344	reum	619	Lycium Italicum	100	Menthastrum, siue mentha	
1	aureum	620	Lysimachia	686	syluestris	479
2	Leuconarcissiflorum	957	Lysimachia altera	687	Mercurialis	996
3	Leuconarcissiflorum bifolium		M.		Mercurialis scemina	997
4	956		Magistrantia	532	Mespilus prima	153
409	Leuisticum vulgare	529	Mahaleb	91	vulgaris	154
410	Libanotis	544	Maiorana	490	Meum	7
587	Lichen	782	Mala	141	Milium	193
780	Ligusticum	505	Mala Armeniaca maiora si-		Milium Indicum	194
781	Ligusticum alterum	506	ue praeocia	146	Milium Solis	659
29	Ligustrum	89	minora	147	Millefolium maius	877
53	Lilionarcissus	955	Aurantia	150	Millefolium stratiotes	876
54	Lilionarcissus Bononiens.	958	Citria siue medica	148	Millegrana	690
	Lilium	570	Cotonea	142.143	Millemorbis	866
247	Lilium conuallium	618	Limonia	149	Moly	498
	Limonia mala	149	Punica vulg. Granata	131	Momordica	989
432	Limonium	721	Infana	820	Morsus Diaboli	397
293	Limonium alterum	722	Malua	238	Morus	179
299	Linum	200	Malua arborea maior mo-		Morofycus	180
300	syluestre	201.202	scutos	239	Musa	127
97	Liquiritia	423	Malus Punica	130	Musa cum fructu	128
724	Lithospermum minus	659	Malum terre	419	Muscari	373
233	Lithospermum syluestre, ar-		Mandragoras	818	Muscus arboreus	31
	uense vel nigrum	660	Mandragoras mas	819	Muscus marinus	871
228	Lolium	198	Marrubium	573	Muscus marinus alter	872
229	Lolium murinum	768	Martagon	571	Muscus terrestris	32
926	Lonchitis aspera maior	664	Marum	493	Mutelina	8
546	minor	665	Masticaria offic.	649	Myrica	74
908	Lonchitis aspera Marantha		Medica mala	148	Myriophyllum	896
18	666		Medium	729	Myriophyllum alterum	897
60	Lotus	155	Melanchium satium	551	Myrrhis	898
936	Lotus Africana	157	syluestre	552	Myrtillus	135
61	Urbana	893	syluestre alterum	553	Myrtus	132
97	syluestris	894	Melegeta offic.	11	Myrtus Tarentina	133
210	Lunaria minor	755	Melilotus	492	exotica	134
211	Lunaria minor Chimiflarum		Melissa, Melissophyllum Meli-		N.	
852	642		tena	574	Napellus	836
853	Lunaria minor, botrytis	643	Melissa Molucca siue Cöstan-		Napus	222
50	Luparia	827	tinopolitana	575	Nares vituli	920
110-					Tis 2	Narcissus

INDEX

Narcissus I.	951	Onosma	633	Peplus	969
II. Flore pleno	952	Ophioglossum	364	Pepon	296
III. totus luteus	953	Ophrys	943	Perfoliata	888
IIII. 954. V.	955	Opision Theophr.	957	Periclymenum	713
VI. 956. VII.	957	Opopanax	499	Periplocarepens	972
VIII.	958	Origanum	466	Perisca	144
Nardus Celtica 13. alia	14	Origanum Monspelienfium		Perficaria rubra	145
Indica.	12	468		Perficaria	352
Italica.	17	Onitis	467	Perficaria altera	353
montana 15. alia	16	Vulgare	469	Personata	887
Nasturtium	335	Orontium Archigenis.	923	Pes leonis	908
Natryx.	444	Oryza	192	Pes leporinus	724
Nerium, seu Rhododendrum.		Ornithogalum	315	Petafites.	592
843		Orobanche	311	Petafites flore albo	593
Nicotiana	810	Osyris	930	Petrofelinum vulgare	526
Nigella.	551	Oxalis maior	230	Apium bortenfe.	526
Nuces auellana, pontica, seu		minor.	231	Petrofelinum Macedoni.	528
pranestina.	177	P.		Pencedanum	530
Nux Indica	173	Paeonia mas	657	Phalangium	580
Iuglans.	172	Paeonia femina.	658	Phalaris.	661
Metella	175	Palma	124	Phafoli	212
Myrsitica	174	Palma Chrifti maior.	626	Phellodrys	117
Numularia	755	minor	627	Phoenix	768
Nymphaea alba	634	Palma humilis minor	125	Phyllirea	90
lutea 635. parua	636	Panices Chironium	501	Phyllitis	579
parua alia.	637	Panax Chiron. minus	502	Phyllum	621
O.		Panax Asclepium	500	Phu 21. minus	22
Ocimastrum Valerianthon 24.		Heracleum	499	Phu minimum	23
Ocimoides, fue Ocimastrum.		Panicum	195	Phu peregrinum	24
739.		Panicum fylueftre.	196	Picea	47
Ocimoides flore pleno.	740.	Papauer erraticum	802	Pilofella	708
Ocimum	308.	Satiuum	803	Pilofella maior	709
Ocimum II.	309	Multipluci flore	804	Pimpinella minor	776
III. minus	310	Corniculatum.	805	Pimpinella fanguisorba	777
Oenanthe	609	Parietaria offic.	849	Pimpinella fanguisorba ma-	
Oenanthe II. & III.	610	Paronychia	785	ior	778
III. aquatica, repēs.	611	Paronychia altera.	786	Pimpinella faxifraga	775
Olea domestica, fatiua	110	Parthenium	649	Pinus	39
fylueftis	109	Pastinaca domestica.	507	Pinus maritima primum ge-	
Oleaster	ibid.	Sylueftis	508	nus	43
Oleaster Germanicus	81	Pecten Veneris	304	Secundum genus	44
Olusatrum	530	Pelecinum	631	Pinus fylueftis montana	40
Ononis	443	Pepleos	376	Alter Mugo	41
Ononis lutea.	444	Peplia.	970.	Tarentina, Cembro, &	
				Cermo-	

P L A N T A R V M.

969	Cermelo	42	Pruna cerea pracocia & se-	Rapacaulis	251	
296	Piper	345	rotina	164	Rapunculus	221
888	Piper Aethiopicum	346	Prunella	703	Rapum	218
713	Indicum	347	Prunus	163	Rapum longum	219
972	Pistachia	170	Prunus sylvestris	165	sylvestre	220
144	Pistacia agrestis	171	Pseudoambrosia	596	Refta bouis	443
145	Pistilochia	422	Pseudoapios	981	Rhabbarum	414
352	Pisum	213	Pseudocostus	28	Rhamnus	78
353	Pisum minus	214	Pseudodictamnium	474	Rhamnus II. 79. III. 80	
887	Pityusa	967	Pseudohelleborum	942	Rhamni species	81
908	Platanus	62	Pseudohermodactylus	848	Rhaphanus	223
724	Platanus Germanica	63	Pseudolotus	156	Rhaphanus longus	224
592	Plantago maior	261	Pseudomelanthium	554	Rhaphanus rusticus, mon-	
593	media	262	Pseudomyagrism	901.902	tanus	225
siue	longa	263	Pseudonardus	17	Rhodia radix	769
526	aquatica	264	Pseudonardus femina	18	Rhododendrum	843
528	Polemonij species	24	Pseudopyrethrum	543	Rhus	121
550	Polium	586	Pseudostachys	578	Rhus minimus Plinij	136
580	Polium alterum	587	Pseudoscomorus	181	Ribes vulgaris	88
661	Polygala	929	Pseudostyrubium	356	Ricinus	959
212	Polygonum mas	688	Psyllium	811	Rosa	98
117	femina	689	Ptarmica	354	Rosa sylvestris	99
768	minus	690	Ptarmica altera	355	Rosmarinum	544
90	marinū & cocciferum	691	Pulegium	471	Rosmarinū coronarium	545
579	Polygonatum	692	Pulmonaria	783	sylvestre	546
621	Polygonatum vulgatum	693	Pulmonaria altera	784	sylvestre minus	547
22	Polypodium	993	Pulsatilla	392	Rubia sativa	662
23	Polypermon	237	Pulsatilla lutea	393	sylvestris	663
24	Polytricum offi.	925	Pyra	152	Rubus	751
47	Poma Adami	151	Pyrethrum verum	542	Rubus ldeus	752
708	Amoris	821	Pyrethrum alterum, pseudo-		Rumex	228
709	Pontiana	810	pyrethrum	543	Ruscus	935
776	Populus alba	65	Pyrola	723	Ruta	494
777	nigra	66	Q.		Ruta capraria	497
ma-	Lybica seu alpina	67	Quercus	111	Ruta sylvestris	495
778	Porrum	321	Quinquesfolium	759	sylvestris Harmola	496
775	Porrum sectile	322	Quingz folium album	761	muraria	785
39	Portulaca domestica	257	minus	760	S.	
um ge-	sylvestris	258	palustre fragiferum	762	Sabina	55
43	Potamogeton	873	R.		Sabina sterilis	56
44	Potentilla	758	Radix Scythica	424	Sagitta	874
na 40	Poterium	440	Ranunculus	380	Sagitta maior	875
41	Primula veris	653.883	Ranunculus II. 381. III. 382		Salix	107
ro, &	Primula veris altera	884	III. 383. V. 384. VI. 385		Salix amerina	105
Cermo-					Tet 3	Puffila

1027

INDEX

Puffula, humilis, salicula	108	Semen sanctum	457	Solanum hortense	812
repens	108	Sempervivum seu Sedum ma-		halicacabum	813
Salsicornia	247	ius 854. minus	855.	somniferum	815
Salvia 475. minor	476	minimum	856.	somniferum alterum	816
Sambucus	975	arborescens	857	maius	817
Sambucus aquatica	977	Sena	538	Soldanella vide Brassica ma-	
montana	976	Sena Alexandrina	539	rina.	
Sanguinaria	340	Senecio	869	Soldanella Alpina	254
Sanguis Draconis	229	Senecio maius	870	Sol Indicus	503
Sanguisorba	777-778	Serpentaria maior	359	Sonchus	278
Sannicula	763	Serpentaria minor	365	Sonchus levis	279
Sannicula alpina siue gutta-		Serpillum	488	levis 11.	280
ra	764	Serpillum alterum	489	flore caeruleo	281
Sannicula altera	706	Serratula	682	Sorba	160
Sannicula quinq. folia	704	Sertula campana	492	Sorbus sylvestris vel aucupa-	
Satureia	486	Sesamoides parvum	944.945	li	161
Satureia altera	487	Sesamum	197	terminalia	162
Satyrium basilicum, vide		Seseli Aethiopicum	512	Spartium	949
Palma Christi		Aethiopicum vulgare	513	Sparganium	732
Saxifraga	716	Mafiliense	510.511	Spatula fetida	733
Saxifraga II.	717	Peloponnense	514	Spherocephalus	435
III. 718. IIII.	719	Sferra cauallo	642	Sphondylium	548
magna 720. hircina	775	Sideritis	746	Spica Celtica	14
Scabiosa 710. minor	711	Sideritis secunda vulgaris	747	Spica Nardi	13
Scammonia	971	Siliqua Aegyptia	25	Spina alba	434. 435. 436
Scammonia Monspelienf.	972	Siliqua	139	Spina acuta	85
Scariola minor	284	Siliqua sylvestres	140	infectoria	82
Sclarea	630	Siliquastrum	140.347.348	Spinachium	245
Scolopendria offic. falso	579	Sinapi	332	Split	892
Scolopendrium	640	Sinapi alterum	333	Stachys	577
Scolymus	437	III.	334	Stachys agria	947
Scolymus sylvestris	439	Sifer	226	Staphylodendron	171
Scordium	588	Sifer alterum	227	Stellaria	908
Scorpioides	1002	Sisymbrium hortense	267	Stellaria argentea	909
Scorodoprasum	331	sylvestre	268	Sternutamentaria	354
Scorconera Hispanica	314	aquaticum	269	Stoechas	465
Scrophularia	866.867	aquaticum alterum	270	Stoechas citrina	790
Scylla	374	Sium verum	265	Stafusaria offic.	947
Sebestena	166	vulgare	266	Stramonium	175
Securidaca maior	631	Smilax aspera	931	Stratiotes millesfolium	876
minor	632	hortensis	318	Strumaria	926
Securidaca quorundam	642	levis	932	Struthia mala	143
Sedum	854.855	Smyrnum	530	Styrax	38
Segale	190	Smyrnum Creticum	531	Suber	115
				Suber	

P L A N T A R V M.

812	Suber angustifolium	116	Tragum	779	Vinca peruinca	694
813	Succisa	397	Trasi	316	Vincetoxicum	559
815	Sycomotor	180	Tribulus	714	aliud flore nigro	560
816	Symphytum maius	700	Tribulus aquaticus	715	Viola purpurea	910
817	petraeum	699	Trichomanes	925	arborescens	911
818	sulerosum	701	Trifolium asphaltites	581	Viola alba Theophr.	957
	T.		pratense	582	Viperina	314
254	Tamarix	74	pratense alterum	583	Virga aurea	748
503	Tanacetum	650	acetosum	584	Virga aurea folijs non serra-	
278	Tassus barbassus offic.	878	Trinitas	585	tu	749
279	Tatula	176	Triffago, seu chamadrys	567	Pafforia	433
280	Taxus	840	Triticum	185	Sanguinea	159
281	Telephium	411	Tubera	317	liscum	555
160	Telephium purpureo flore	412	Tussilago	590	Viscum polycoccon	556
supa-	Terebinthus	51	Tussilaginis flores	591	Visnaga	303
161	Tesitulus I. 622.	II. &	Tussilago aliera, siue Farfu-		Vitex	105
162	III. 623.	III. 624	gium	594	Viticella	909
949	V.	625	maior	592	Vitis alba	987
732	Tenarium	566	Tulipa minor	958	nigra	988
733	Thamariudi	126	Typha	607	Idaea	135
435	Thapsia	948	V.		Idaarubra	136
548	Theriacaria	356	Valeriana montana aut pa-		Sylvestris	986
14	Thlapi I. 336.	II. scorodo-	lustris	23	Vinifera	1003
13	thlapi 337.	III. saxati-	Valeriana rubra	24	Vlmus	70
436	le 338.	III. Creticum	Venenam terre	419	Vmbilicus Veneris	764. 858
85	siue Cappadocium	339	Veratrum album	939	Vmbilicus Veneris alter	859
82	Thymelae	974	Verbascum	878	Vnedo	168
245	Thymus	485	Verbascum II. mas	879	Vngula Caballina offic.	590
842	Tiliamas 92.	femina 93	III.	880	Vnifolium	744
577	Tinus	61	synefire	881	Vrtica	861
947	Tithymalus Characias	969	aliud	882	Vrtica II. 862. III.	863
171	Cyparissias	964	Verbascum aureo flore Diosc.		Vshen	246
908	Dendroides	965	885		Vua spina, siue crispa	87
909	Helioscopius	963	Verbenaca	797	Vua versa, siue lupina	835
354	Leptophyllos	966	Veronica	461	X.	
465	Mirsinites.	961	Veronica femina	462	Xanthium	926
790	Paralios	962.	Verrucaria offic.	1000	Xyris	733
947	Tora maior 825.	minor 826	Vesicaria, seu halicacabum		Z.	
175	Tormentilla	685	repens	814	Zazyntha	287
876	Toxicum	825	Vetonicum	350	Zea	189
926	Tragacantha	446	Viburnum	122	Zedoaria Auicenna	837
143	Tragoriganum	470	Vicia	320	Zyzypba	167

F I N I S.







